

**MEDICINA  
HIPPOCRATICA  
EXPONENS  
APHORISMOS  
HIPPOCRATIS...**

---

Johannes : de Gorter











# M E D I C I N A H I P P O C R A T I C A

E X P O N E N S

A P H O R I S M O S H I P P O C R A T I S

A U C T O R E

J O A N N E D E G O R T E R

*A. L. M. Medicinae Doct. & Prof. Ord.*

E D I T I O Q U I N T A I T A L I C A

Ab innumeris mendis purgata

C U M I N D I C E L O C U P L E T I S S I M O .



N E A P O L I M D C C L X X V I I

A P U D V I N C E N T I U M U R S I N U M

E X P E N S I S S T E P H A N I M A N F R E D I I

---

S U P E R I O R U M P E R M I S S U .

RE 1250



# TYPOGRAPHUS

## AD LECTOREM.



Ræclaros *Joannis de Gorter* in Aphorismos Hippocratis Commentarios , Amstelodami pridem editos , nunc Typis nostris excusos Tibi damus , Candide Lector . Extitere quidem non pauci numero , qui scriptis suis Hippocraticæ Artis Canones illustrare conati sunt . Verum cum universa Physica Scientia , ac præsertim Medica quotidie magis augeatur , perficiaturque ; præclare de eadem meritis est Auctor noster , qui nova experiundo detexit , novoque lumine Hippocraticam Scientiam ornavit . Imo qua pollet ingenii virtutisque præstantia , celeberrimi Senis Doctrinam explanans , ita hanc ipsam expedit , ut quæ veritati consentanea cognovit , uberiori oratione firmaverit ; quæ vero minus interdum consentireprehendit , improbare non dubitaverit . Scilicet Vir Doctissimus diuturnis laboribus docendo scribendoque ad summum perfectionis dignitatisque gradum Medicam Facultatem evehere assidue studuit ; quippe e ludo egressus immortalis *Viri Hermanni Boerhaave* , quem propria fulgentem luce nihil attinet laudibus celebrare . Quamobrem gratiam nos habeamus oportet Viro clarissi-

rissimo *Josepho Bertini* in Florentina Academia Publico Medicinæ Professori, ac Regi Xenodochii, Collegique Florentini Medico præstantissimo, qui pro Sapientia sua Auctores optimos non modo quæ verbis quæ scriptis æmulari, sed nova quoque Typorum luce pervagationes clarioresque reddere cupiens, ad edendos egregios hosce Commentarios nos impulit; atque ex domestica Bibliotheca depromptos singularem humanitate tradidit recudendos. Eos igitur accurata diligentia adornatos, & mendis, quæ in priorem Editionem irreperant, expurgatos exhibemus.

# AUCTOR LECTORI.



Uæ nunc publici juris fiunt Commentaria , non erant Disputationibus destinata ; at Studioforum desideriis satisfacere volens , antequam in lucem prodeant , ventilanda speciminum nomine exhibui.

Specimen primum continens *Apb. I. ad IX.* censuræ publicæ submitit *Joannes Bon Harderovico-Gelrus* , ad Diem 30. Maji 1739. Alterum vero continens *Apb. X. ad XXV. Theodorus de Gorter Enchusa-Batavus* , ad Diem 21. Junii 1739. Sed ut aliis quoque Medicinæ cultoribus inservirem , curavi tot imprimi Exemplaria , quæ ad alicujus Libri editionem sufficiunt.

Cum vero Aphorismorum Hippocratis Primus Liber esset ventilatus & impressus , eum nunc in lucem emittere volui , deinceps vero reliquos , quamprimum publice ventilati fuerint , animus est , ut ita Disputantium & Lectorum desideriis simul satisfaciam.

PRÆ-

# P R Æ F A T I O.

*Medicina  
quibus  
modis  
compara-  
tur.*

I.



*D* artem Medicam acquirendam duæ tendunt viæ , altera est Experientia , quam inter medendum comparamus , altera est Doctrina , seu Dogmatica , qua quis instruitur , antequam Medicinam proficietur.

*Experien-  
tia.*

II. Sed quia experimentum est periculosum , & ars nimis longa , quam ut possit exercitio unius hominis comparari , oportet eum , qui Medicinam proficisci satagit , prius addiscere præcepta & fundamenta hujus artis.

*Doctrina.*

III. Illa autem præcepta variis modis traduntur : arrisit Hippocrati per breves , sed tamen solidas sententias , quas vocat Aphorismos , hanc promulgare artem , ut sit quævis sententia absoluta , non respiciens ad priora vel sequentia.

*Aphori-  
smi.*

IV. Complectuntur hi Aphorismi sententias seu regulas generales , quas paucis verbis proposuit Hipp. Num istas detexerit experientia propria , num desumpserit ex aliorum observatis , scientia Medica nihil interest . Sufficit enim in Medicina veritates cognoscere , sed quisnam istas promulgavit , nihil facit ad usum Medicum . Laudandus autem est , qui tales posteritati consecravit , ne cogamur semper novas detegere cum hominum detrimento.

V. Præstantius foret , ad formandam doctrinam , certum aliquem sequi ordinem , ille enim facilius in memoria retineri potest ; sed rerum multitudine , & permissione auctor cogitur recedere ab ordine , puras atque absolutas proferens sententias.

VI. Illæ autem sententiæ sæpe admodum obscuræ sunt , variasque pariuntur interpretationes , & vix intelligi possunt ab indoctis , quare ampliore explicatione egent . Ita potest Medicinæ discipulus paucis verbis concipere Medicinam , & si quid dubii sit aut obscuri , consulere Commentatorem.

VII. Non omnibus autem Commentatoribus idem est scopus : quidam enim , ut Litteratores , sensum verborum explicant : alii cuncta congerunt in laudem Auctoris , sive sententias veras sive falsas divulgaverit , non multum curant . Denique alii ad ampliandam scientiam unice contendunt , minime curantes , num Hipp. vel quisvis alius eam sententiam divulgaverit.


VIII.



VIII. *Inter hos ultimos me profiteor ; an recte vel secus fecerim, aliis dijudicandum relinquo. Ego semper existimaui, nos non ad gloriam vel honorem alicujus, sed ad usum & utilitatem in Medicina scribere debere. Quare vitio non verrat Lector benevolus, si interdum a sententia Hippocratis recedam, non ut hujus viri eximii censor esse velim, sed quia post istud tempus multa præclara sunt detecta, quæ hunc virum latuere.*

IX. *Non miretur Lector benev. me sententias non firmare Lo-  
eis ex aliis auctoribus compilatis; multa equidem congeffi, ut perspi-  
cerem quid alii sentiant, recitare autem nolui, nisi quædam, quæ  
ad honorem vel gloriam Auctorum adduci possunt; ne videar alio-  
rum labores vilipendere, vel animo malevolo carpere, cum expertus  
sim, istud remorari scientiam, ad quam excolendam unice contendo.  
Neque ad firmandam meam sententiam aliorum dicta adfero,  
quia auctorum sententiæ ad Medicum nullam habent auctoritatem,  
sed experientia, & ratione firmanda est veritas : in his ad ma-  
jorem fidem hinc inde auctoris locum recitabo.*





# M E D I C I N A H I P P O C R A T I C A ,

E X P O N E N S

A P H O R I S M O R U M

H I P P O C R A T I S

L I B R U M P R I M U M .

A P H . I .

I. *Vita brevis, ars longa, occasio celeris, experimentum periculosum, iudicium difficile. Oportet autem non modo se ipsum exhibere, quæ decent facientem, sed etiam agrum, & præsentem, & quæ externa sunt.*



Phorismus hic duas res complectitur, prima est, qua demonstratur, scientiam medicam difficile comparari posse, quia longa serie observationum est stabienda, ad quod vita nimis brevis, occasio præceps, & non liceat in viventibus hominibus impune facere experimenta. Alteram regulam generalem suggerit, secundum quam Medicus, æger, adstantes, & res externæ se gerere debeant.

II. *Vita hic accipitur pro illo curriculo temporis, in quo homo aptus est addiscere præcepta Medica, eaque valet opportuno tempore ad cognitionem & curationem Morborum adhibere: ita excluditur pueritia & decrepita senectus, quibus per vitam hominis scientia Medica nihil emolumenti accipit. Imo maxima pars ætatis infumitur, antequam homo possit aliquid addere ad artis perfectionem; quamdiu enim ad fastigium scientia non pervenit; artem non valet augere; at laborat sibi comparare, quod alii observaverint vel detexerint: adeo ut pauci restent anni in ætate nostra, in quibus aliquid addere possumus ad perfectionem scientiæ; imo vix sufficit unius hominis ætas ad addiscenda ea, quæ in arte medica inventa sunt, quare Hippocr. non sine vera ratione pronuntiavit, vitam*

*Vita brevis.*

A

tam

2  
tam brevem esse, præprimis si comparetur ad ea omnia, quæ in arte Medica sunt addiscenda.

Ars Ion.  
54.

III. Admodum disputant Medici, num Medicina sit *Scientia* vel *Ars*. Quia vero in scientia sufficit habere rei cognitionem, etiamsi nihil efficiamus, sed in arte supponitur cognitio, quæ quoque operationem exsequitur, magis convenit Medicinam vocare artem, quam scientiam, quia Medicina nullus est, nisi aliquid præstat ad salutem humanam. Eam artem esse longam quisque fateri cogitur, siue respiciat tempus, in quo illa excolta fuit, siue ad tempus, quod infumitur, antequam quis possit omnia sibi comparare, quæ in Medicina sunt addiscenda: atque longa est, si comparetur ad hominis vitam. Quippe ars Medica una cum Morbo habuit originem, quam primum enim homo corripiebatur Morbo, auxilium quæsit, hoc autem tempore tam imperfecta fuit, ut vix mereatur artis nomen. Et quoniam ad nostram quoque ætatem duravit, nulla potuit esse ars longior. Cum nunc ars Medica ad tantam perfectionem venerit, longum quoque tempus est impendendum antequam possumus cuncta addiscere: non sufficit enim, ut Empirici, quedam prompta possidere medicamina, sed ars Medica ex scientia anatomica, ut habeatur cognitio fabricæ; ex Chemicis, ut cognoscat humorum mutationes; ex Physica, ut intelligat actiones firmarum partium, est petenda; dein per experimenta & observationes in corpore humano addiscere oportet, quid speciale sibi vindicet Morbus. Hucusque versatur in scientia Medica, sed ut artem excolat virtutes Medicamentorum sunt addiscendæ, ut istis, atque instrumentis, aliisque rebus in Dieta tradendis, valeat præsentem morbum tollere, futurum avertere, incurabilem palliare. Antequam hæc omnia cognoscuntur, longum tempus infumi debet. Interim labitur æras, ut vix aliquid superfit temporis, in quo ars Medica incrementum possit capere. Hoc quia viderunt multi, aliquam duntaxat partem excoluere, tota ars nimis multa complectitur, in qua quoque aliquem progressum fecere. Laudanda sunt eorum opera, sed qui artem Medicam exercere vult, debet omnium habere notitiam, quod autem paucis contigit.

Occasio  
celeris.

IV. Opportunum agendi tempus a morbo dependet, qui non omni tempore idem agere permittit; imo in morbis acutis, aliisque præcipitibus casibus prompta sunt adhibenda auxilia, ne cunctando moriatur ager, vel in deterius ruat: at vero in chronicis non tam accurate temporis momentum est observandum, quia subitaneis mutationibus minus obnoxii sunt. Si vero in præsentī tempore aliquid boni præstare possumus, imprudentia esset expectare in crastinum. Monet igitur sapienter Hipp. occasionem esse celerem, ne ex culpa nostra per cunctationem aliquod detrimentum fiat homini. Constat ex observatione hæc, Medicum in omnibus oportere versatum esse, ne cogatur primo consulere libros, quo forsitan tempore effluxisset occasio agendi, sed habere debet omnia auxilia in promptu, quibus levare potest ager.

Experimentum  
periculosum.

V. Non omne experimentum est periculosum, ita enim Physici, & Chemicis multa experimenta faciunt, ut ad maiorem perfectionem deducant scientiam, in quibus nihil periculi subest. In medicina autem Experimentum est periculosum, cum temerarie periculationis finis sit mors. Experimenta in arte Medica raro bonum effectum sortiuntur, si enim quis medicamentum incognitum propinat in morbo incognito, ut multi faciunt Empirici, si juvat, casu juvat, & ex decem ne unus curabitur; ita erat in primordiis artis, sed postquam cogniti sunt morbi & cognita atque detecta medicamina, temere foret hominis vitam & sanitatem periclitari. Etiam non caret periculo exhibere in morbo cognito medicamentum, cujus virtus non satis perspecta est, ut multi faciunt, qui novis student, & præstantiam ex pretio, aut multis laboribus ad præparandum medicamentum im-

pendis

penſis demetiunt: neque ad curationem aliquid valet virtus medicamenti cognita, ſi lateat morbi cauſa. Sed ut ex arte & ſine periculo curetur æger, morbi cauſa cognita eſſe debet, & quomodo illa poteſt tolli: atque cognita debent eſſe virtutes in medicamentis, quæ cauſam illam tollere valent. Tales autem exercitium non vocatur experimentum, ſed eſt experientia, multis experimentis confirmata. Qui ſine prævia harum rerum notitia artem Medicam aggreditur proſiteri, peſtis eſt in Republica cenſendus, multos enim trucidat, ac paucos ſervat. Dolendum ſane eſt in Republica bene conſtituta ferre, idiotarum periclitatione & experimentis temerariis multos inſontes letho dari, & hominem, arcem animæ immortalis, temerariis experimentis committi. Utinam nemini niſi in arte Medica eruditiffimo, hanc artem proſiteri eſſet licitum.

VI. Judicium in Medicina nititur præmiſſis, ex quibus perpenſis Medicus judicat, quænam ſit iſtius morbi cauſa, & quomodo tolli poſſit aut debeat. Judicium difficile. Cauſæ antecedentes, natura ægri, & apparitiones ſuggerunt iſtas notiones, ex quibus Medicus concluſionem formare debet. Sæpe vero cauſa præcedens latet, utrum ſit in aere, cibo, potu, vel aliis rebus: quare Medicus & æger neſciat ſæpe eam cauſam antecelliſſe; interdum æger quadam idioſyncraſia ipſi tamen ignota laborat. Et apparitiones ſeu phænomena non ſemper eandem cauſam latentem ſignificant. Ex his tamen abſconditis & ſæpe incertis Medicus certum judicium debet proferre, quam difficile hoc ſit, neminem latere poteſt. Triplex eſt judicium in curationibus faciendum; primum, ut veram cauſam, quantum humanum ingenium valet, ex dictis abſconditis ſæpe inter ſe comparatis, eruat. 2. Si poſt cauſam detectam quædam naſcuntur ſymptomata, ut judicare valeat, bona ſint an mala, quæ vocatur Crifis bona vel mala: ea cognitio ex experientia multiplici in cauſa ſimili hauritur, ſine qua in morbis nemo valet decernere verum: ad hanc partem excolendam requiritur homo experientia admodum inſtructus. 3. Denique perpendere debet, quid ſit in ea cauſa agendum, vel ſequitur tunc naturam, quæ ſæpe hanc vel illam molitur evacuationem, qua ſuſtulit morbum, eam tunc imitari oportet; vel examinat curationes in ſimili cauſa cum ſelici eventu factas, iſtas tunc ſequitur. Sed in his omnibus non errare aut decipi, humanum ingenium fere ſuperat; quare multos deterruit harum omnium rerum difficultas, ut potius experimento vago & experientia empirica, quam dogmatibus certis voverint exercere artem Medicam, cum ſummo ſcientiæ & hominum detrimento.

VII. Altera pars hujus Aphoriſmi breves ſed ſolidas ſuggerit regulas, quas Medicus tenetur obſervare, ut ſeliciter ſuam artem exerceat. Auctor ad quatuor perſonas ſuam orationem dirigit: primo ad Medicum ipſum; 2. Ægrum; 3. Adſtantes, qui auxilium fuerunt; 4. ad Res externas quæ incidere poſſunt. Alterâ pars.

VIII. Medicum oportet 1. ut ſit magno ingenio præditus, qui poteſt ex omnibus iſtis abſconditis eruere verum, qui vero in judicando ſentiat ſe ineptum, ſe potius abſtineat, ne multi ægri ex ejus inſcitia detrimentum capiant. 2. non præmature ſe accingat exercere artem, cum multa ſint addiſcenda, antequam quis vera a falſis decernere valeat. 3. ſit religioſus, ut nihil in ægris faciat ſciens, quod non feciſſet in ſemetipſo ab eodem morbo correpto. 4. habeat in agendo auctoritatem & conſtantiam, quia ſine auctoritate æger nullam in Medico fidem habet, & ſi fluctuat, ſemper aliud quid agendo, exiſtimabit æger, Medicum morbi eſſe inſcium. Multo plura ſunt in medico noranda, quæ in officio Medici proponuntur. Medicus qualis eſſe debeat.

IX. Adſtantium officium eſt curam ægri gerere, quia ipſe impotens aliorum auxilio eger, illi igitur ægro ſuccurrere debent, & Medicorum præceptis exacte obſequi, ut omnia rite apud ægrum peragantur. Adſtantium officium.

# MEDICINA HIPPOCRATICA

Eger  
quomodo  
se gerere  
debeat.  
Res ex-  
ternæ  
quales  
esse de-  
beant.

X. Nisi æger fideliter narrat, quæ sentit & patitur; quænam præcesserit causa, in Medico non est veram morbi causam eruerè: requiritur quoque in agro, ut mandatis Medici obtemperet, aliter enim frustra laborat Medicus.

XI. Res Externæ neque sint impedimento curationi, neque turbare debent crisin in acutis; lectus sit consuetus: absit rumor, strepitus, omneque animi pathema, Medicamenta rite sint præparata, odore, colore, & sapore quantum fieri potest grata.

## LIB. I. APH. II.

II. **I**N perturbationibus alvi & vomitibus sponte contingentibus, si quidem qualia purgari oportet, purgentur, consert, & leviter ferunt: sin minus, vice versa. Sic & vasorum evacuatio, si quidem talis fuit, qualis fieri debet, consert, & bene fuerunt. Sin minus, vice versa. Inspicere itaque oportet regionem, & tempus, & ætatem, & morbos, in quibus convenis, aut non.

I. **H**ipp. in hoc Apotismo præceptum generale præbet in evacuationibus copiosioribus ultro abortis, per alvum, vomitum & alia loca, num illæ sint permittendæ, promovendæ, vel sistendæ, & ut Medicus sciat quid sit faciendum, adjicit cautelas, nempe facilem & difficilem tolerantiam evacuationum, sed quoniam hoc solum non sufficit, ratio habenda est regionis, temporis, ætatis, & Morborum. In expositione igitur hujus debemus primo respicere ad spontaneas istas evacuationes, quibusnam ex causis oriuntur. Dein quænam cautelæ sint observandæ, ut promoveatur vel moderetur illa evacuatio.

Evacuatio spontanea.

II. Si per Emunctoria naturalia major humoris copia evacuatür sine Medicamento assumto, & sine causa externa hanc evacuationem concitante, quam in sanis fieri solet, vocamus spontaneam vel ultroneam Evacuationem. Complectitur quoque sub hoc nomine omnes reliquis evacuationes, ruptis vel dilatatis valis, factas e locis, ex quibus in sanis nulla fieri solet evacuatio.

Evacuatio copiosior salubris. Ex abundantia.

III. Hæ evacuationes modum excedunt primo, si in corpore est humoris morboosi abundantia, sive ille humor ex nimis ingestis fuerit genitus, sive morbo factus, sive bonus tanta copia collectus, ut destruat æquilibrium inter causas agentes & molem movendam. In his omnibus casibus si natura faciat copiosiorē evacuationem, qua educitur in morbosum, vel quod abundat, salubris talis est statuenda, homo enim liberatur a morbi materia, & redigitur corpus ad æquilibrium.

Copiosior mala.

IV. Ultronea etiam 2. fieri potest evacuatio in humorum abundantia, quæ tamen non avertit morbosum, sed eum relinquit humorem, educens sanum: vel tam magna & subitanea evacuatio, quam vires corporis ferre nequeunt; illa autem non est laudanda, cum novum sæpe inducat morbum priori pejorem: ita aqua hydropicorum ex rupto umbilico: vel pus nimis copiose evacuatū in empyematicis, subitaneam mortem induxit.

Copiosior sine abundantia.

V. Denique 3. natura sæpe molitur evacuationem copiosiorē, etiam si nulla adsit abundantia; vel quod humores sint colliguescēti, aut putredine liquati, ut sponte effluant: vel oscula emunctoriorum nimis relaxata, cunctos transmittunt liquores. Tales evacuationes ultroneæ semper sunt damnandæ.

Unde cognoscitur bona vel mala.

VI. Ut autem sciamus, quænam ex his tribus evacuationibus accidit, observandum est, num fiat cum Euphoria vel Dysphoria, id est, num ægri vires per evacuationem hanc augeantur, & morbi vehementia minuatür, quando dicitur evacuatio fieri cum Euphoria, & vocatur Critica, ut fit in primo casu. Sed si æger nihil emolumenti ex tali evacuatione percipit, imo vires minuuntur, & morbus magis exasperatur, talis evacuatio fit cum Dysphoria, & vocatur symptomatica.

VII.

VII. Hanc observationem facilioris & difficilioris tolerantiae instruere medicum, num sit evacuatio permittenda, augenda, aut moderanda, sponte liquet. Scimus enim, nisi evacuatione tollatur morbi materia, vel abundantior humor, non debere talem permittere, & adhuc minus promovere evacuationem, quare ex observatione hac certi sumus, num conducatur, aut non. Hinc recte præcipit Hipp. si fiat evacuatio cum Euphoria, eam esse promovendam, sed si fiat cum Dysphoria, eam sistendam esse, quia Medicum oportet minuere, non augere morbum.

Regulam  
curationis  
suppedi-  
tat.

VIII. Unicum hoc signum cum interdum potuisset fallere; vel non satis observari, ut æger non percipiat, num ex bona causa levantur vires, cum sæpe evacuationes fiant, quas mox sequitur mors, quæ tamen magnum videtur adferre levamen, ut sæpe in moribundis experimur, necesse itaque est alia quoque consulere, ut simus certiores. Inter ea primo recenset *Regionem*. Quædam regio enim non solum majorem evacuationem fert, sed & sine ea homo vix sanus vivere potest; aliis autem in regionibus quavis evacuatio copiosior damnum infert. Hic autem loci non possumus omnes percurrere regiones, ut præcepta tradantur de evacuationibus, quare hoc observare sufficit, si exerceamus medicinam in quadam regione, ut in ea observemus, quid boni aut mali in loco faciat evacuatio. Si deteximus in tali regione facile tolerari evacuationes, eas quoque permittimus fieri, sin vero secus sit, quantum fieri potest istas evacuationes compellimus, & artificialem evacuationem.

Regio  
quid fa-  
ciat ad  
cognitio-  
nem.

IX. Addit secundo loco *Tempus*, quod distinguunt in vernale, æstivum, autumnale, & hyemale, aliter in solstitium & æquinoctium. De his autem temporibus suis locis agitur: hoc loco sufficit observare, id tempus tolerare evacuationes copiosiores, quod in corpore collexit humorum abundantiam, quæ vix tolerari potest in inevitabili instante temporis mutatione: ita ver ferre potest copiosiores evacuationes, quam autumnus, quia instans æstas suo calore partes firmas relaxans, non potest æqualem ferre liquoris quantitatem, corpora si enim hyeme ponderosiora sunt, quam æstate, ergo vernali tempore hæ copiosiores sunt salubriores, quam aliis temporibus.

Tempus  
quid fa-  
ciat ad  
cognitio-  
nem eva-  
cuationis.

X. Non sine gravi ratione *Ætatem* addit, quamdiu enim multum increvit homo, uti infantes & pueri, talis ætas non habet humorum abundantiam, quia quod confectum est, in corporis incrementum cedit: huic itaque ætati non convenit evacuatio larga: neque in senibus copiosior evacuatio est toleranda aut facienda, cum corpora senectute debilitata, vix valeant tantum conficere, quantum ad sustentationem sui requiritur. At constans ætas, præprimis si non amplius corpus increvit & valens est, largam patitur facile evacuationem, hoc enim tempore ætatis natura in mulieribus concitat menses, & in viris sanguinis fluxum ex naribus, facileque copiosorem evacuationem sustentat, & frequenter incidit in morbos, qui ex majori humorum copia nascuntur.

Ætas  
quid fa-  
ciat ad  
cognitio-  
nem eva-  
cuationis.

XI. Non omnes *Morbi* vetant aut exigunt evacuationes, sed quidam ex his neque isti, qui in principio ferunt evacuationem, circa finem eandem exigunt. Omnes autem percurrere morbos, non est hujus loci, pro generali regula sufficit notare morbos inflammatorios, acutos, calidos, cum motu humorum validiore, & qui humorum abundantiam arguunt, expostulare evacuationem largiorem, quæ si non fiat, arte est facienda: morbos autem suppuratorios, putridos, pituitosos, frigidos, cum motu minore, vel in quibus antecessit copiosior evacuatio, ut in puerperis, omnem respicere evacuationem.

Morbi  
omnes  
neque ve-  
tant, ne-  
que egent  
evacuati-  
one.

XII. Denique distinctionem proponit inter evacuationes, quarum tres proponit, 1. vomitum, 2. alvi egestionem, 3. alias reliquas evacuationes. In quibus omnibus sponte contingentibus, qualia purgari oportet, purgentur, confert, & leviter ferunt. Id est per dicta emunctoria talis debet evacuari humor, qui emun-

Evacuatio  
per con-  
veniens  
emuncto-  
rium.

810.

Clorio convenit minime alienus. Nam si verbi gratia sanguis redditur copiosior, aut meraca egeruntur, vel revomuntur, quamvis copiosior, evacuatio fuisse laudabilis, nunc vero damnatur, quia non evacuantur, qualia oportet.

Vomitum  
quando  
permitten-  
dus.

XIII. *Vomitum* igitur spontaneus copiosus permittendus & promovendus est, si reddat cacochyham in ventriculo collectam, in morbis inappetentia & stomachi vitii in sua cessione, si tum per vomitum levantur symptomata, & augentur vires, scimus, cum vomitum sustulisse Morbi materiam, sed si illa absint indicia, vel quod aliena reddantur per vomitum, vel morbus a vomitu augeatur, absit credere, vomitum allaturum levamen.

Alvi ege-  
sid quan-  
do per-  
mittenda.

XIV. Id quoque sentiendum est de spontanea copiosiori *alvi egestionem*. Hipp. enim hoc loco utitur vocabulo, quod perturbat alvi egestionem significat non mediocrem: quia naturale est, ut alvus exoneretur, quod de vomitum dicitur nequit. Talis immodica alvi egestio debet reddere materiem in intestinis collectam, vel in ea confluentem, cujus materiae educatione tollitur morbus: saepe hoc in casu per purgantia evacuationem adjuvamus, ut corpus ab omni alieno liberetur. Sed si evacuatio hæc non conveniat morbo, ut Phthisi, empyemati, aut si aliena emittantur; aut si æger difficile fert hanc evacuationem, non est illa evacuatio promovenda, sed moderanda, vel cohibenda.

Evacuatio-  
nis regulæ  
observan-  
dæ.

XV. Per varias evacuationes reliquis intelligit evacuationes. Solummodo ex primis viis per vomitum vel secessum possunt reddi humores; sed reliquæ evacuationes naturales, artificiales, vel quæ solutis vasis contingunt, ex communi massa deducuntur. Ergo de evacuatione per urinam, sudorem, salivationem, & de sanguinis missione eadem sunt observandæ regulæ, quæ superius fuere notatæ.

## LIB. I. APH. III.

III. **I**N *Exercitansibus boni habitus ad summum progressi periculosi sunt, si in extremo fuerint*. Non enim manere possunt in eodem, neque quiescere. Quum vero non quiescunt, non amplius in melius augecere possunt: reliquum est igitur ut in deterius. Ob has igitur causas bonam habitudinem non tarde solvere confert, quo corpus rursus renutritionis principium sumat. Neque vero collapsiones ad extremum ducere oportet, periculosum enim est. Sed qualis natura est ejus, qui perferre debet, ad hoc ducere convenit. Similiter autem & evacuationes ad extremum ducentes periculosa sunt: & rursus renutritiones in extremo existentes, periculosa sunt.

Evacuatio  
in sanis.

I. **U**T Hipp. in præcedenti Aphorismo tradidit generales cautelas in evacuationibus ultro obortis, ita in hoc præcipit canones observandos in corporibus sanis, si arte faciendi sit evacuatio, aut renutritio, ne utraque modum excedat. Evacuationis necessitatem ea ratione firmat, quam ex athletarum bono habitu desumit. In expositione hujus occurrit: 1. Num corpora sana egeant præternaturali vel artificiali evacuatione, & quousque illa permittenda, vel facienda. 2. Qui modus servandus est in refectione. 3. Ponderanda est ratio, quam adduxit Hipp.

Sanitas  
definitur

II. Antequam determinari possit, num corpora sana per evacuationes sint ab ea laudabili statu depellenda, inter Medicos primo constare debet, quid intelligant per *Sanitatem*. Sanus autem tunc dicitur homo, qui omnes suas actiones exercet vel exercere valet cum constantia & oblectamento, cui nihil est alienum in corpore, cui quoque inter actiones & humores habetur æquilibrium. In tali igitur corpore nihil est, quod sui ablationem exigit, cessat igitur Curatio Curatoria, ut vocant Medici, quidquid enim facimus, in deterius ruit. Sed de curatione præservatoria inter Medicos maxima lis est, & fere omnes sequuntur aucto-

Sanitas æ-  
geat cura-  
tione.



auctoritatem Galeni & Hippocratis, non quod ex experientia id desumptum sit, sed ex ratione.

III. Agendum, si rationibus est dimicandum, cessat auctoritas: & quia his temporibus accuratio est anatomica cognitio; & plura sunt facta experimenta chemica & physica, audeo sine arrogantia profiteri, Medicos his temporibus plus valere rationibus, quam Hipp. aut Galenus, vel alii veteres. Nemo tamen existimet, id antiquis vitio dari, quod multa nescivere, quæ inferior ætas derexit: forsitan hi viri præpollenti iudicio fuere præditi, sed defectu experimenterum non raro fuere hallucinati. Quamobrem, si veteres rationibus utuntur, non sumus coacti eorum auctoritatem sequi.

IV. Corpus vivens sanum in se habet motum vitalem, semper aliquid deterentem & inutilem facientem, quod detritum & alienatum per emunctoria naturalia expellit: inde generatur refectionis seu nutritionis necessitas. Nutritur autem assumtis alimentis, quæ eodem illo motu vitali convertuntur in similia ea, quæ ablata fuere inevitabili lege. Quamdiu in ætate constanti, (nam quamdiu homo crescit, plus conficitur, quam corrumpitur & evacuat, ) tantum boni ex assumtis præparatur, quantum motu vitali detritur, & corrumpitur, & expellitur, perfecta manet sanitas, & nulla eget Medicina. Sed si nimium conficitur, generatur humorum abundantia, quæ destruit æquilibrium: in hoc casu necesse est vel naturalem augere evacuationem, vel artificialem facere, aut minus ingerere, ut ita corpus redigatur ad suum æquilibrium. Talis autem status non est sanus, sed est morbus ex abundantia, etiam si non sentiat. Sæpe enim adfunt morbi, qui nulla præbent indicia, ut varices, vel vomica internæ, quæ tamen a morbis non excluduntur.

V. Ad præveniendos autem morbos sæpe coacti sumus humoris copiam minuire. Ita feminae ad pubertatem venientes necesse est ut menstruas purgationes habeant, quibus id abundans evacuant: ita juvenes cum euphoria hæmorrhagiam patiuntur, sed licet non contingant, manent tamen sani, nisi a longo tempore fuere assueti. Tantum valet consuetudo, ut etiam si fuerint deteriora, indulgendum sit: sed tunc non deducitur indicatio ex sanitate, sed consuetudine. Præstantius autem est malis non assuescere; aut si assueti sumus, sensum a concepta mala consuetudine recedere. In feminis autem alia est ratio, quæ a Deo ita sunt creatæ, ut sua corpora valeant, si grvida sint, incrementum præbere fœtui, & post partum suppeditare lac sine corporis debilitatione: quæ necessario sequeretur, si corpora foeminarum non plus nutrimenti conficerent ex assumtis, quam ad nutritionem sui requireretur. Menstrua igitur purgatio in feminis inter naturales evacuationes est recensenda. Quæ si fiat, aut si grvida vel lactans sit, non eget evacuatione præternaturali. Si vero femina in principio gestationis abundantia sanguinis laborat, quod embryo minus convertit in incrementum sui, quam femina ante prægnationem eodem temporis termino solebat evacuare, expedit venam secare.

VI. In istis igitur corporibus, quæ ex assumtis alimentis plus boni conficiunt, quam detritur & expellitur motu vitali, (excepimus autem feminas, nisi menstrua purgatio inter naturales evacuationes admittatur.) tandem generatur morbus ex abundantia, quæ præternaturali evacuatione tolli debet, ne ex destructo æquilibrio peiores generentur morbi.

VII. Ad evitandum in hujusmodi corporibus æquilibrii destructionem & inde nascendos morbos, solam evacuationem sine cunctatione faciendam Hipp. præcipit, & merito: præstantius enim est quantitatem detrahere, quam morbos ex destructo æquilibrio expectare. Id autem mali est in hac medendi methodo, quod homines tunc nimis assuescant huic artificiali evacuationi: quam tamen consue-

Nutritio-  
nis neces-  
sitas.

Evacu-  
tionis ne-  
cessitas.

Evacu-  
tionis boni  
sæpe præ-  
venitur  
morbi.

Menstrua-  
tio est  
evacuatio  
naturalis.

Quibus  
ex abun-  
dantia fit  
morbus.

Evacuatio  
facienda  
in abun-  
dantia.

tudinem potuiffemus evitare pariori diæta, & laboribus durioribus, quibus vel minus fuppedatur, vel magis confumitur, ut non fit neceffe corpus artificiali evacuatione laceffere.

An fola  
fanguinis  
miffione  
minuenda  
abundan-  
tia.

VIII. Omnes fere Commentatores hic præcipiunt fanguinis miffionem. Videtur autem mihi Hippocratem quæcumque voluiffe evacuationem, ut in præcedenti Aphorifmo indicavit: nam per vomitoria & purgantia quoque volumus minuere abundantiam. Qui enim frequenti vomitu, aut alvo turbata laborant, tandem pallent; quibus constat has evacuationes etiam poffe minuere fanguinis rubri quantitatem.

Evacuatio-  
ne immo-  
dica an  
auferenda  
abundan-  
tia.

IX. Multum quoque fe fatigant hunc locum de mediocri evacuatione conciliare cum *Lect. Aph. 23.* ubi præcipit ad animi deliquium effe ducendam, quafi Hipp. fibimetipfi obloqueretur, fed fi infpicatur ratio eo in loco proponenda, facile conflabit ita fieri debere. Hoc loco præcipit enim evacuationem faciendam in humorum abundantia, ne fierent inde morbi: fufficit igitur tantum ducere, ut refitatur æquilibrium, fed non ultra: peccare enim æque poffumus defectu humorum, quam abundantia: quare modus non eft excedendus per nimiam evacuationem. Hoc quoque novit Hipp.; neque vero collapfiones, inquit, ad extremum ducere oportet, periculofum enim eft. Id eft in fanis ceteroquin corporibus fola abundantia laborantibus, non debemus per immodicam evacuationem facere, ut vafa inanita collabantur, feu evitando malum ruerent in deterius.

Refectio  
quanta  
debeat  
effe in  
defectu.

X. Ut eft modus fervandus in evacuatione, ita etiam in Refectione feu *Reinfitutione*, quam Hipp. *ἀνάψις* vocat. Supponitur homo vel ex inedia, vel multis laboribus, vel morbo præcedenti, ita humoribus privatus, ut quoque ab hac parte destructum fit æquilibrium, fed ceteroquin fanus. In tali cafu præcipit Hipp. Refectionem non fieri debere subito, feu magna copia fimul. Huius rei ratio eft evidens; nam fi appetitui indulgeamus, qui fæpe nimius eft, ut poft curationem quartanæ febris per antidotum, tantum ingeritur, quantum a corporis viribus jam adhuc infirmis subigi nequit. Id igitur ingeftum, fua copia fupprimat alterius vires, & quia actione vitali non fubigitur, in fibi propriam corruptelam convertitur, quæ corruptela multos morbos in nobis producit. Neceffe igitur eft, non plus ingerere, quam quod viribus iftis infirmioribus vinci poteft: præftantius enim eft famem pati, & fenfim recuperare vires, quam nimia ingurgitatione magis debilitari, & in novos ex corruptela morbos incidere.

Habitus  
bonus an  
perfilere  
nequit.

XI. Reftat examinare Hippocratis Rationem, quæ eft tanquam fundamentum, cur debeat fieri evacuatio in perfecta fanitate. Non poteft, inquit, bonus habitus ad fumum progressus in eodem ftatu permanere; quia natura femper aliquid molitur, quare, fi actio hæc nihil boni præftare poffit, malum facit. Vera illa effet ratio, fi per motum vitalem, qui hic vocatur natura, duntaxat fieret confectio in melius. At oblitus fuit, vel nescivit Hipp. eodem illo motu humores quoque bonos corrumpi, & partes firmas deteri, quare natura, etiam fi corpus ad fummam perfectionem deduxerit, femper tamen habet aliquid elaborandum: nempe ut id alienatum concoquat & expellat; & ut nova ingefta affimulet bonis humoribus. Nulla ergo eft ratio, cur corpus a perfecta fanitate fit defledendum, fed præftat eandem confervare fanitatem.

Athletis  
cur expe-  
dit facere  
evacuatio-  
nem.

XII. Qui vero genio nimis indulgent & pancreatice vivunt, corpora fua nimia alimentorum copia fagiunt, & tamen parum exercent, ut illa abundantia motu corporis confumatur, quemadmodum *Athletæ*: his expedit aliquando detrudere fanguinem, ut confervetur fanitas, quia humorum bonorum abundantia laborant. Sed inde non poteft in omnibus fanis generalis deduci regula, nam qui parcius vivunt, & fuum corpus magis exercent, non egent evacuatione hac, & manent fanis, ita multi temperate viventes ad fummam fenectutem fanis manent, sine

ne ulla evacuatione præternaturali, hæc ergo cautio ad sanitatem conservandam referenda est ad istos, qui sua corpora saginant, sed non est propterea generalis regula.

## L I B. I. A P H. IV.

IV. **T**enues & exacti vietus, & in longis semper affectionibus & in acutis, ubi non expedit, periculosi sunt: & rursus vietus ad extremam tenuitatem progressi, difficiles sunt. Et repletiones ad extremum progressæ, difficiles sunt.

I. **V**ersatur Hippocr in tradendis regulis generalibus, ita in *Aph.* 2. præcepit, quid esset agendum in spontaneis evacuationibus; In *Aph.* 3. autem proposuit evacuationes artificiales in hominibus sanis. Hoc autem loco tradit generalem de Diætâ, qualis oporteat esse in morbis, deinceps acturus est de Diætâ moderanda in hominibus sanis.

II. *Diætâ* seu vietus latam & strictam significationem habet: Late si sumitur, indicat sex res non naturales, quæ hodie numero quaternario absoluntur, ut sunt 1. ingesta, 2. gesta, 3. retenta & excreta, 4. applicata. Strictiori significatione accipitur pro usu alimentorum, in quo sensu hic ab Hipp. sumitur, quoniam hic solummodo verba facit de nutritione.

*Diætâ quæ dicatur.*

III. In nutritione autem hic duo extrema attingit, nempe nutritionem pleniorē, & parciorem; observat, quid vietus hi maxime distantes faciant in morbis acutis & chronicis. De reliquis autem vietus speciebus aliis locis agit.

IV. De *Tenui & Exactâ Diætâ* dicit Hipp. eam in longis morbis semper periculosam esse; in acutis interdum, quando nempe non expedit; in sanis autem extreme tenuem difficilem esse. Ergo præcepta tradit de tenui vietu in tribus casibus. Initium facturi ab ea, quæ statuitur in sanitate, 2. in morbis longis, 3. in acutis, ita meliori ordine sequetur doctrina.

*Diætâ tenuis.*

V. *Extrema Tenuis Diætâ* proxime accedit ad jejunium. Eam dicebant fieri veteres, si parum admodum ingerebatur de alimentis facilis admodum materiæ, atque hoc per longum tempus: eam dicit difficilem esse. Hoc præceptum opponi videtur Celsi effato & multorum, abstinentia & quiete multos morbos præveniri & curari. Sed etiam si parum comedimus, aut mediocrem copiam ingerimus, pergit tamen motus vitalis deterere partes firmas, & corrumpere humores: si vero parciore ingestione tantum non potest restitui, quantum consumitur & corrumpitur, id merito difficile dici potest, quia homo inde debilitatur. De hoc autem vietu in sequenti Aphorismo amplius agendum.

*In sanis.*

VI. Si exacta diætâ, quæ nutritioni non sufficit, in morbis longis instituitur, periculosa est. Morbi enim longi sensim debilitant vires, & vietus exquisitus detrahât necessarium nutrimentum, quare homo talis binis causis debilitantibus afficitur, quarum una sufficiebat ad inducendum debilitatem, quare periculum est, ne sufficiat æger, qui mediocri vietu erat sustentandus, ut posset ferre morbum illum longiorem. Non debemus vero in oppositum incidere, imperando his pleniorē vietum, uti multi existimant, quo plus ingerimus eo magis nutrirî, cum morbo longo corpora debilitata, neque copiosiora, neque concoctu difficiliora, in nutrimentum convertere possunt, sed in corruptelam spontaneam abire permittunt. Ex hoc autem præcepto deducimus, summam medelam non quærî oportere in strictissima Diætâ, ut multi contendunt in morbis chronicis.

*In Chronicis.*

VII. In morbis autem acutis passim Hipp. & alii exactam seu parcam Diætâ præcipiunt, hic vero loci dicit periculosam esse, si non expedit. Quare regulariter in Acutis convenit Diætâ parcior; sed invenitur casus, in quo non conducit: hunc casum quia non exprimit hic loci Hippocr., ex aliis locis sup-

*In acutis.*

plendus est. Intelligi autem potest ex iis, quæ mox sequuntur in Aph. VII. ubi vero non (est morbus peracutus) plenior vîctu uti necesse est. Si enim homo ceteroquin sanus corripitur morbo, qui ex sua natura desiturus est inter quatuor dies, ille homo tantum chylosi habet in suo corpore, ut non sit periculum, eum defectu alimenti debilitari tam brevi tempore: adeoque motus vitalis hoc tempore unice elaborandum habet morbi materiam, cum non divertatur novorum alimentorum concoctione. Si vero morbus ille acutus ultra quatuordecim dies sit perseveraturus, tam diu non restaret chylus in nutrimentum vel bonos humores convertendus, quare aliquid est exhibendum, quod non eget multa corporis actione, & quod vires non superat sua copia, ne circa morbi finem, & morbi vehementia, & defectu alimenti debilitetur æger. Ille itaque est casus acutorum, in quo exquisitissima dieta non caret periculo.

## L I B. I. A P H. V.

V. **I**N tenui vîctu delinquentes ægrotantes, magis læduntur. Omne enim delictum, quod committi poteris, magis magnum committitur in tenui quam in paulo plenior vîctu. Quapropter etiam in sanis periculosus est valde tenuis, & constitutus, ac exactus vîctus: quoniam delicta gravius ferunt. Ob hoc igitur, tenuis & exactus vîctus periculosus est magis quam paulo plenior.

I. **S**upponit in hoc Aph. Hipp. omne nimium naturæ inimicum esse, fieri posse damnum ex parciore & largiore vîctu: sed comparationem nunc facit inter excessum & defectum, quid majus damnum inferat, tam in sanitate quam morbis: & concludit, majus malum fieri ex defectu alimentorum quam ex abundantiore.

II. Ut conclusio hæc refutetur vel comprobetur, 1. inspicienda est regula generalis, omne nimium naturæ inimicum esse & nocere. 2. Quid faciat vîctus abundantior. 3. quid vîctus parciore. Denique producta horum inter se sunt comparanda, ut constet, quid majus malum induxerit.

Alimenta  
nimia.

III. Neminem latet, Deum ita nostrum creasse corpus, ut sit definitis actionibus limitatum, quos limites si transcendamus, statim delectamur de statu bono: in his autem quædam observatur latitudo, ut possumus decedere aliquo modo a mediocri assumentium copia sine sanitatis detrimento; potest enim homo paulo plus & minus comedere quotidie sine ulla noxa: quia vero mediocritas non est adstricta ingestioni, sed viribus corporis, eadem itaque quantitas, quæ mediocritas est debilibus & otiosis, nimis parca est robustis & operariis, & vice versa. Quæ igitur quantitas habita ratione virium corporis, mediocritatis limites excedit, sive fiat in excessu sive defectu, nimium dicitur. Id nimium, quia vel tantum non suppetit vel plus suppetit, quam requiritur, ut maneat sanitas, semper detrimentum adfert, atque hoc non solum in alimentis porrigendis, verum etiam in aliis quoque rebus obtinet, ut demonstraturi sumus (ad Aph. LI. Lib. 2.)

Plena dietæ.

IV. Vîctus plenior non solet ita ex copia æstimari, sed ex natura assumentium, diluta enim etiam si sint copiosiora non faciunt vîctum plenior, cum in maiori copia alimentorum difficilius digestionis sæpe plus nutrimenti habeatur. Si itaque plus alimentosi assumitur habito respectu virium corporis, quam corpus istud possit mutare in suos humores, plenior est vîctus. Id autem quod a viribus vitæ non subigitur vel ita manet, ut assumebatur, quando vocatur *Crudum*: si vero assumta diutius retenta in loco calido & humido, quemadmodum fit in nostro corpore, per spontaneum motum, sive sit fermentationis, sive putrefactionis, commutantur in alienam indolem, humor tali modo natus vocatur in primis viis ca-

co-

cachylia, & per totum corpus dispersus cacochymia. Qui liquor natus varios morbos inducit. Si vero ager deinceps se absteineat a tali copiosiore ingestione, non suppeditatur Materia, ex qua cacochylia vel cacochymia formari potest: itaque pergente motu vitali id alienum sensim subigitur & expellitur, quoniam non habet scaturiginem, ergo per Dietam solum valemus morbos ex pleniori victu natos curare: ita recte præcipiunt, per abstinentiam multos morbos curari, illos nempe, qui ex pleniori victu fuere nati.

V. Tenuis autem seu strictissima Dieta tunc statuitur, si minor alimenticopia suppeditatur, quam potuisset viribus corporis in proposito casu præparari, non respicimus hic ad quantitatem ingestam, sed ad comparisonem virium corporis, & consumptionem corporis nostri. Ita homo se multum exercens tenui victu fatigatur, si non ingerit plus, quam alius otiosus: ita robustus tenui victu utitur, si iisdem alimentis & eadem copia utitur, ut homo debiliior. Si minus suppeditatur, itaque, quam detritur & corrumpitur actione vitæ, necesse est, ut tale corpus laboret defectu, qui quoque simul inducit debilitatem: & quia non suppeditatur novum, id quod corruptum & detritum est, omne non evacuatur, sed portio relicta bonis mista, etiam generat cacochymiam. Si tunc ille homo pleniori victu utitur, ea quæ ingesta sunt ob vires debilitatas non convertuntur in bonum succum, sed tunc sæpe laborat duplici genere cacochymiae, nempe ex humoribus propriis inutilibus factis, & ex crudis vel sponte alienatis alimentis. Id quoque incommodi accedit, quod quæ a bona sua indole per nimiam actionem degenerarunt, deinceps nequeunt in bonum succum converti, sed si fiunt actione vitali sensim deteriora, ut semper debeant evacuari: interim succurrere non possumus substituendo bonum succum, quia ingesta non præbent bonum succum, nisi præcesserit concoctio virium vitæ, quæ cum nimis debiles sint, potius ex assumtis suppeditatur crudum vel corruptum, quam bonus humor. Inde toties reconvalescentes ex morbo ex pleniori victu in cacochymiam & cachexiam incidunt: & nisi agri vires restarentur, & mediocrem victum servent, diu manent valetudinarii.

Tenuis  
Dieta.

VI. Si nunc conferamus ea, quæ ex parciore & largiore victu eveniunt, sine hæcitatione pronunciare possumus, *Delinquentes in tenui victu ægrotantes magis ladi*. Quippe producta ex victu pleniori sponte potuere emendari, & expelli, si autem restitissent in primis viis, aut per purgans potuissent eliminari, & ex tota massa per diuretica & sudorifera; imo sola abstinentia morbi causam eradicare valet detractio pabulo; vel motu musculari id crudum quoque subigi potest & expelli: sed alienum ex tenuiore dicta natum, & inducra debilitas neque motu, neque largiore victu tolli potest. Quare si sit peccandum, minus malum esset, in abundantia quam in defectu committere errorem. Hoc quoque verum esse in morbis Acutis & Chronicis, superius demonstravimus.

Tenuis  
victus  
magis  
ladi.

## LIB. I. APH. VI.

VI. **A**D Extremos morbos, exactæ extrema curationes optime sunt.

I. **I**N tradendis regulis de victu hunc interposuit Hipp. Aphorismum, ut sit pro fundamento generali, cujus species etiam illa est curatio, quæ per victum curat. Si ergo generalis regula procedit, specialis de victu quoque est admittenda, quod nempe debeamus tenuissimum victum vel perfectam inedium imperare in morbis extremis.

II. *Extremus, ultimus, postremus aut summus morbus*, ita ut nihil supra sit, tunc dicitur præsens, cum morbus minatur interim, cui nisi succurramus prom-

Morbus  
extremus.

te, brevi vel certe interficiet. Tales morbi sunt 1. acutissimi, qui tanto impetu exagitant corpus, ut nisi compescatur, omnia destruat; in hoc præcipiti casu largiorem mittimus sanguinem, & ducimus alvum, & abstinemus ab omni victu, quæ omnia in mitiori malo non essent faciendæ. 2. Chronici tales multum sunt, quorum causa vi vitæ tolli nequit, neque solita medela emendari. Ita os carie infectum respuens medelam, extirpationem exigat; Cancer, si fieri possit, simul & semel abscindendus; angina quæ minatur suffocationem, bronchotomiam indicat; pus in pectore parencethesin; fractura cranii terebrationem. Ita curationes omnes dicuntur *exactæ extremæ*, quia violentæ sunt & nunquam nisi in summo discrimine adhibentur; cum præstantius sit truculentam subire operationem, vel amittere aliquam partem, quam ut homo moriatur. Regula igitur est generalis, violentæ & extremæ curationes sunt adhibendæ, si malum neque vi vitæ, neque mitioribus superari queat, & minetur interim vel majus malum.

Curatio  
extrema.

# LIB. I. APH. VII.

VII. **U**bi quidem peracutus est morbus, statim etiam extremos labores habet, & extreme tenuissimo victu uti necesse est. Ubi vero non, sed pleniore victu uti licet, in tantum subdescendendum est, in quantum morbus extremus mollior fuerit.

Diaeta in  
morbo a-  
cuto.

I. **I**n hoc aphorismo determinat victus quantitatem ex morbo præsentis, & ex omnibus morbis eam eligit classem, quæ est acutorum; hos iterum acutos distinguit in peracutos, & minus acutos, vel molliores. Et in peracutis imperat tenuissimum victum: in molliore autem seu remissione victum pleniorum.

Morbi pe-  
racuti.

II. Omnes morbi, qui brevi tempore vel cessant vel ad interitum vergunt; sive cum, sive sine periculo sint, vocantur *Acuti* (vid. T. 53. XLVII.) modo non durent ultra viginti quatuor, vel ad summum quadraginta dies; qui vero ante diem quartum terminantur, *peracuti*, & *acutissimi* vocantur.

Peracutus  
futurus  
conjectur.

III. Peracuti sunt vel cum laboribus, id est validissimis symptomatibus; quæ ab irrita vi vitæ concitantur, quales hic ab Hippocrate proponuntur; vel sunt sine laboribus multis, uti morbus peracutus benignus, Ephemera febris vel Synochus simplex; vel peracutus malignus, uti Pestis, & aliæ Febres malignæ brevi tempore interficientes; vel peracutus periculosus, uti Apoplexia, Lethargus, Angina.

Tenuis-  
simus victus  
in peracu-  
tis.

IV. Si incipit morbus acutus cum magno æstu, siti, siccitate, pulsu duro, respiratione frequenti, magna molestia, anxietate & aliis vehementioribus symptomatibus motus validioris circulationis, cognoscimus eum morbum fore peracutum; nam initia tam valida sensim incrementa diu tolerari nequeunt, quin omnia sint destructa: apposite itaque adjecit Hipp. *statim etiam extremos labores habet*, ut cognoscamus speciem morbi acuti, & eum peracutum futurum esse.

In quo a-  
cuto veta-  
tur tenuis-  
simus.

V. In tali peracuto morbo expertus est Hipp. tenuissimum victum prodesse, quoniam tenuissimus victus, & ob minorem quantitatem, & qualitatem facile superabilem, non eget multa virtute agente corporis, quare conducit corpori debilitato ex morbo: neque verendum est ex defectu alimentorum, uti in chronicis, cum corpus diu ferre debeat morbum: & in peracutis, ubi vires sunt debiles, & tempus breve, non est verendum, defectu alimentorum vires debilitari.

Qualis

VI. *Ubi vero non.* Ubi scilicet morbus ille acutus non statim incipit cum multis laboribus, ex quibus judicamus, morbum diutius duraturum & simpliciter acutum fore. In tali statu non debemus victu tenuissimo uti, quia tunc tantum alimenti est ingerendum, quantum sufficere potest ad sustentationem corporis.

VII. Differentia victus exposita, quæ est inter victum morborum acutissimo-  
rum

rum intra quatuor dies desinentium, & inter victum acutorum diu durantium ultra viginti, imo 40. dies, Hipp. voluit reliquos quoque intermedios determinare. Ad hoc dicit, quo acutus morbus magis accedit ad acutissimorum genus, eo parciori diæta est utendum; quo vero ad diuturniores accedit, eo meraciori & copiosiori victu utendum, ne vires cadant defectu alimenti. Nam in morbis acutis, qui prope accedunt ad acutissimorum genus, tantus defectus ex parciori victu non est expectandus, quam in iis, qui ad longissimum genus accedunt: & in his minor est vehementia symptomatum, quæ victum largiorem vitarent, quam in illis; quare quo acutior est morbus, eo parcior debet esse victus; & vicissim quo morbus est longior, eo largior victus est concedendus.

diæta in  
acutis.

## LIB. I. APH. VIII.

VIII. **Q**uam in vigore fuerit morbus, tunc tenuissimo victu uti necesse est.

I. IN præcedenti demonstratum est, qualis nam victus debeat esse in vehementiore & mitiore morbo: nunc proponit sine discrimine omnem morbum acutum, sed in eo vult distinguere tempora morbi, quæ accuratissime passim ab Hipp. citantur. Ex temporibus morbi eligit *Vigorem* seu *Morbi statum*, qui vocatur *æxus*; in quo tempore morbi causa validissima inter symptomata; id est quando ab initio morbi symptomata non amplius incrementum, sed nunc persistunt, post quod tempus, vel moritur æger vehementi causa obrutus, vel morbus declinare, id est mitigare incipit, prævalentibus viribus vitæ, quibus superatur & denique expellitur morbi causa.

Tenuissi-  
mus in  
morbi vi-  
gore.

II. In hoc temporis articulo summum est discrimen, & maxime laborant vitæ vires, quæ si deficiunt, æger succumbit. Per se itaque pater, Medicum nihil agere debere, quod vires avocare vel suppressere potest. Si nunc probari possit, alimenta ingesta vel avocare vires vel istas suppressere, dicti veritas constat. In præcedentibus demonstratum est & nemini quoque dubium esse potest, quia alimenta ingesta subigenda sint viribus nostri corporis; itaque hoc dum peragunt, a duabus causis urgentur vires, a materia nempe morbi, & ab alimentis ingestis, quare ex vires, quæ vix sufficiebant ad superandam morbi materiem, nunc deficere debent, cum desiderantur insuper ad alimentorum subactionem.

III. Neque hoc tantum, sed in morbi vigore materia morbi disponitur, si supervicturus sit æger, ad crism seu evacuationem criticam, quæ debet fieri ad naturalia emunctoria, ut præparata materia eliminetur: si vero hoc tempore contraria fiat humorum determinatio ad interiora, salubris critica evacuatio perturbatur, retinetur materia, obsidet interiora, homo non liberatur a morbo, sed materia retenta vel opprimit, vel novam facit exacerbationem, ut hoc semper pronuntiatur, si ex signis constat, post morbi vigorem, materiem criticam non evacuari.

IV. Restat itaque probare, ab alimentis sumtis determinationem fieri ad interiora. Hoc deducimus ex generali lege in nostro corpore observata, quæ constat, si alicubi quædam functio sit peragenda, copiosiores eo versus derivantur humores. Ita inter masticandum affluit saliva in os; dum ventriculus est plenus, copiosior succus pancreaticus & bilis funditur in duodenum: omnesque humores conspirare videntur, ut communi adferant auxilium ad elaboranda alimenta. Hoc naturale in sanitate non desinit, dum morbus quoque adest: Imo ita creatum est corpus, ut, si alicubi noxium hæreat, eo mandet copiosiores humorum fluxum, oculus enim irritatus lachrymas fundit, & acris masticatoria salivam eliciunt, imo

Alimenta  
ad inte-  
riora de-  
termi-  
nant.

imo anus vellicatus suppositoꝝ rejicit contenta. Hic quonies fit alia secretio, evacuatio follet minui; quare vomitorium & purgans a cute ad interiora derivat liquores, non quod copiosiores faciant evacuationem, sed quod partes agitatae eo versus derivent humores. Inde naturalis crisis, quæ expectanda erat per emunctoria, aliam directionem patitur, atque materia ea cum humoribus copiosis ad ventriculũ confluentibus post cibum sumtum, eo ducitur, quo motu inverso perturbatur ea crisis salubris, retinetur materia, & derivatur in interiora loca.

V. Quamvis itaque Hipp. constanti observatione didicit, victum pleniorẽ hoc tempore obfuisse & ægros aggravare, non caret ratione, ut non solum diætã Hipp. quotidiana observatione videamus confirmatã, sed & ratione quodque comprobata. Ne autem nimius esset alimentorum defectus, selegit talia alimenta, quæ vix egent aliqua corporis actione.

Tenuissi-  
mus in  
paroxyf-  
mo.

VI. Quæ diætã sunt de vigore morbi acuti continui, optimo jure ad *Paroxysmos* quoque referri possunt, cum in febribus intermittentibus singuli paroxysmi tanquam integri morbi acuti haberi possint. Cautè propterea evitant Practici in vigore paroxysmi largius nutrire, sed eligunt apyrexiam, ut nutriendum, quando corpus minus vexatur vehementia morbi.

## LIB. I. A P H. IX.

IX. *Simul autem conjectare oportet, an æger ex victu durare possit ad morbi vigorem: & utrum ille prius deficiat, & ex victu durare non possit: aut morbus prius deficiat ac obtundetur.*

Diætã in  
morbis in-  
cremento.

I. **D**E Diætã in morbi vigore egit in præcedenti, nunc vero de Diætã in morbi Incremento vult agere. At certam regulam proferre non valet, sed exigit conjecturam vel judicium, ex quo concludere debemus, num parcius vel largius æger in Morbi Incremento nutriendus.

Quantum  
alimentor-  
um dan-  
dum in  
morbis.

II. Præmonendum est, vires nostri corporis æque debilitari ex defectu alimentĩ, quam superari multitudine: nam ita est nostrum corpus creatum, ut suis actionibus se destruat, quod nutritione nova est refarciendum; quæ refectio si non satis fiat, minuuntur vires, quod tam in sanitate quam morbo verum experimur. Itidem plus ingestum quam quod viribus vitæ potest vinci & in bonum succum converti, vires opprimit, & in corruptelam abit.

III. In morbis itaque, qui vi vitæ sunt superandi, tantum debet dari, quantum sufficit ad conservandas vires, ne ex defectu alimentĩ debilitentur, ne plus dandum, quam a viribus superari possit, ne supprimantur vires, & ingesta malum succum ex defectu præparationis suppeditent. Ad hoc Medicus præcipue attendere debet in morborum acutorum Incremento, cum tempus, nempe *Æquũ*, instat, in quo maxime laborare debent vires ad morbi causam subigendam: quod si tunc diminutæ sint vires ex defectu, vel oppressæ ex majori copia assumptorum; periculum erit, ne vincat materia morbi & pereat vel succumbat æger.

IV. Ut medicus itaque cognoscat, quanta quantitas sit danda, hoc sola conjectura assequi potest, nam quo acutior est morbus, eo parcius nutriendum; quo vero diuturnior morbus est, eo largius nutrire debet ( ut ex *Apb.* 7. constat ) inde victum in morbi incremento debet determinare ex signis morbi acutioris vel longioris futuri.

Ex sym-  
ptomatum  
vehemen-  
tia.

V. Quia vero hoc judicium desumitur ex vehementia symptomatum, quæ validiora sunt, si acutissimus futurus est morbus, sed mitiora, si longior morbus expectatur, cautelam necessariam adiecit ad evitandum errorem in supputatione his verbis, *aut morbus prius deficiat ac obtundetur*. Quippe initia conspiciuntur sym-  
ptor-



ptomata ex bona & mala causa. Si causa morbi est parva, mitia symptomata conspiciuntur, cum vis vitæ non multum instigatur ad vehementia symptomata inferenda: ex hoc judicaret itaque medicus largius nutriendum esse, quia vires valentes facile diatam largiorem ferre possunt, & quia *ἀρχὴ* longe distat. Sed sunt etiam mitia symptomata ex mala causa, si nempe vires vitæ a morbi causa superantur. Quippe non est in nobis morbi causa, quæ vehementia symptomata infert, sed vires corporis instigatæ per morbi causam. Si igitur tam valida sit causa, ut vires emergere nequeant pauca & mitia conspiciuntur symptomata, non quod morbi causa sit parva, sed quod superentur vires. Hoc prudentissimos sæpe fecerit medicos, non attendentes, num mitia fiant symptomata ex bona vel mala causa, quare sæpe ægri moriuntur, extra opinionem medici. Tale quid fieri, perpetua observatione in morbis acutis constat, qui abeunt in sphacelum; præcedentia symptomata validissima mitia incipiunt fieri, & ita ægri cum summa spe levaminis, & futuræ sanationis, ex improvise moriuntur. Hoc monet Hipp. ne decipiamur lenibus his symptomatibus, dum morbus deficit vel obtunditur. Num si tunc largius nutrimus, magis obruentur vires, quæ forsitan elucetæ fuissent.

VI. Ut melius intelligatur quid Hipp. intelligat per mitia symptomata, discrimen ponendum est inter symptomata Vehementia, Maligna, & Benigna; nam si in corpore notabilis observatur mutatio in actionibus, aut actiones admodum auctæ, illæ actiones conspectæ vel observatæ dicuntur Symptomata Vehementia; non quod signa illa conspecta ex morbi causa proveniant, sed actione vitæ mutata vel aucta; inde in vehementibus symptomatibus non ita veremur interitum ex morbi causa, sed ex actione vitæ destruentem omnia. Symptomata autem Maligna tunc fiunt, quando a causa morbi actiones vitæ minuuntur, quare cum vix ulla fiat actio in corpore, exigua quoque fiunt signa; sed quoniam illa oriuntur ex magnitudine causæ morbi, adeoque verendum est, ægrum non sufficere posse, inde constat, quo sunt mitiora symptomata, eo periculosiora esse; nam declarant eo majorem esse causam. Mitia autem & Benigna tunc fiunt, si præcessere vehementia symptomata per auctum vim vitæ, quæ nunc, minuta instigante causa, sensim leniora fiunt.

Quid  
symptomata  
vehementia  
& mitia.

## LIB. I. APH. X.

X. **Q**uibus igitur statim vigor est, his statim tenuis victus adhibendus est. Quibus vero vigor posterius, his ad illud & paulo ante illud tempus subtrahendus est. Antea vero uberius æger victu tractandus est, quo durare possit æger.

I. Præceperat Hipp. (Aph. 8.) in acutissimis morbis tenuissimum victum præscribi debere, eandem quoque in vigore (Aph. 8.) & in præcedente vero regulam præbuit, qua evitatur error ex mitioribus symptomatibus: nunc istud nutriendi genus ulterius inculcat in morbi Incremento: proponit quidem in Incremento acutissimorum tenuissimum victum; in Principio autem acutorum plus dandum esse: hujus victus rationem istis locis dedimus.

Dixit in  
morbi in-  
crementi  
principio.

II. Sed in hoc loco differentiam victus describit in principio incrementi, ejus progressu & circa finem seu initium status. Statuit in principio incrementi, post datam regulam generalem victus tenuissimi in acutissimis, & victus in acutis, largius nutriendum esse, quam circa finem hujus stadii, rationem addit, ut sufficiat æger.

III. Regula est generalis, ex alimentorum defectu vires cadere, & ex abundantia in morbis vires supprimi. Ex hac causa in morbis acutissimis, qui sunt brevius durationis, tenuissimum victum præcipit, & quandoque perfectam in-

diam;

diam; ita etiam in morbi vigore, quia tunc vis vitæ ad morbi materiam coequendam multum laborat: quod ergo incrementum morbi propius est ad *expulsi*, eo magis de cibo est detrahendum, ne tamen deficiat.

*Dieta in  
duobus  
generibus  
acutorum.*

IV. Ne autem de victu regula in omni morbo acuto accipiatur generalis, parcius vel uberius in morbi incremento esse nutriendum, duo genera morborum acutorum proponit, unum quod brevi tempore ad statum venit, alterum autem quod ad quatuordecim dies & ulterius sit duraturum, antequam ad vigorem pervenerit; in illo tenuissimum victum vel inedium imperat, in hoc largiorem victum concedit, qui sensim minuendus, quo magis morbus ad statum venerit. Regula hæc est utilissima, quoniam circa statum tenuissimus victus esse debet, ne vires corporis premantur in elaboranda materia morbi & alimentis assumtis: sed si non nisi post aliquot dies sit vigor expectandus, æger defectu alimenti nimis esset debilitatus, ita ut circa vigorem ob defectum alimenti non sufficeret ad subtractionem & expulsionem materiz morbi.

V. Hæc pulchra regula paucis potest esse usui medicis, nam medicus ad ægrum vocatus in principio morbi acuti, præscire debet, num brevis vel longus sit futurus morbus: si enim brevem expectat, tenuissimum; si longiorem, pleniorum victum concedere debet: at paucis datum, hanc differentiationem ex præcedentibus phenomenis eruere, propterea, nisi simul indicetur futura longitudo vel brevitatis, nihil emolumenti ex hac regula habet æger.

*Brevitas  
morbi.*

VI. Febris acuta continua brevis solet observari in juvenibus robustis, ætate; calida & tenuia præbens excrementa; statim in initio, si signa critica apparent in urina & sudore; si morbus ex sua natura brevis est, ut febris scarlatina, ephemera, morbilli; si in pleuritide & peripneumonia statim apparent spura cocta. Ne igitur multitudine ingestorum laudabilis coctio & expulsio materiz morbi turbetur, tenuissimus victus est concedendus: nam æger talis cum exiguo victu sufficere potest per paucos istos dies, donec subacta & expulsa sit materia.

*Longitudo  
morbi.*

VII. In morborum acutorum initio cognoscimus, longiorem fore morbum ex dictorum (vi.) absentia; si morbus vehementioribus symptomatibus incipit, sed statim delitescere videtur sine ratione, id est sine laudabili evacuatione; urina intense rubra, tenuis, clara, spumosa; frigida & crassiora excrementa; inconstantia in omnibus signis; evacuationes per consueta loca: in morbis pectoris sputum nullum; corpus vehementer pallidum aut citrinum; sudores frigidi, exigui, vel nulli: hæc si adsunt, paulo largius nutriendum, donec ex signis coctionis in urina vigorem instare sciamus, quando parcius dandum, ne perturbetur crisis. Quamobrem autem dicta signa brevitatem & longitudinem præfagiunt, aliis locis exponetur.

## LIB. I. A P H. XI.

XI. *In exacerbationibus cibum subtrahere oportet. Exhibere enim noxium est. Et quicumque morbi per periodos exacerbantur, in exacerbationibus subtrahere oportet.*

*Dieta in  
& inter  
paroxysmos.*

I. Versatur Hipp. in tradendo victu morbis acutis accommodato, sed quoniam duplex genus est acutorum, unum, quod eodem tempore increfcit, stat, decrefcit & finitur, qualis febris hodie vocatur *Continua*: alterum genus autem totam periodum illam non æquali vigore absolvit, sed uno tempore symptomata magis urgent, quam alia, ita tamen, ut nunquam æger a febre integre liberatus sit, quam febre hodie vocant *Remittentem*. Itaque si morbus acutus nunc occurrat per exacerbationes ingravescentes, sciendum quoque erat, an non ipsæ exacerbationes & remissiones aliquam facere debuissent in victu mutationem.

II. Tra-

II. Traditam hanc regulam in victu morbi acuti remittentis etiam ad amplio-rem usum adducere vult, quamobrem in fine hujus aphorismi repetit priorem regulam, & eam applicat ad reliquos quoque morbos, tam febriles Inter- mittentes, quam Chronicos, qui per paroxysmos fiunt. Quare non parum allucinantur, qui existimant, Hippocratem eandem rem bis repetere, cum repetitione hac hanc regulam de victu ad multos morbos utilem facere, quod sine repetitione non potuisset fieri.

III. Quid sit Paroxysmus in morbis, exposuimus (Comp. T. 53. XXI.) Tunc vel nullo vel tenuissimo victu uti debere, superius (Aph. 8. VI.) notavi- mus. In hoc nunc casu ita est accipiendum; omni tempore exhibere potuit cibum ab initio morbi ad statum, sed sensim parcius; verum si morbus in- crescat per paroxysmos sensim graviore, non est licitum omni tempore dare cibum, sed præcedenti regulæ id insuper est addendum, nos in vigore istius particularis paroxysmi quoque cibum detrahare debere, & si quid dandum sit, id exhibendum esse, dum paroxysmus quiescit, ac corpus paroxysmo gravi- ore pressum, magis aggravetur a cibo sumto.

IV. Alterum genus febrium est Intermittens, quæ inter paroxysmos ali- quod tempus permittit, in quo nulla febris symptomata sentiuntur, quod pro- prie vocatur Apyrexia. Uti est febris quotidiana, tertiana, quartana, & se- mitertiana, in his instante paroxysmo corpus non est nutriendum, sed finito paroxysmo, quia non solum corpus a paroxysmo & cibo onustum magis la- borat, sed etiam ingestus cibum per motum turbatum febrilem in succum alie- num commutatur. Idem quoque sentiendum in Intermittentibus protractis, indutibus naturam remittentium; possunt hujusmodi febres, ut sæpe expe- rimur in quartanis autumnalibus reduplicatis & prolongatis, per longum tem- pus durare, ut æger tam diu inedia vexari nequeat, sed cogatur in ipso pa- roxysmo cibum capere: eligendum tunc est tempus decrementi paroxysmi.

V. Morbi Chronici intermittentes, ut Epilepsia, Podagra, si periodos regu- lares habent, eandem regulam exigunt, quæ præcepta est in febribus; si enim instat paroxysmus, a cibo abstinendum; & in paroxysmo podagræ tenuis dieta concedenda, quoniam paroxysmus diu durans non permittit tam diu a cibo abstinere: sed Podagræ generalis paroxysmus aliis curtiorebus paro- xysmis, ut recte observavit Sydenham, componitur, quare secundum hanc regulam in generali paroxysmo id est observandum, quod superius in remit- tentibus (111) notavimus. In Epilepticorum paroxysmis, qui nequeunt cibum capere non est opus hanc regulam adducere.

## LIB. I. APH. XII.

XII. **E**xacerbationes autem & constitutiones indicabunt morbi & anni tempora, & periodorum ad invicem collata incrementa, sive quotidie, sive alternis diebus, sive longiore fiant tempore. Sed etiam iis, quæ mox apparent, eadem in- dicantur, velut in pleuriticis putum, sistatim appareat veniente morbo, abbreviat: si vero postea appareat, producit. Et urine, & alvi excrementa, & sudores, cum apparent, vel judicatu faciles, vel difficiles, vel breves, vel longos morbos fore indicant.

I. **S**ensum hujus Aphorismi quia quidam non recte capiunt, non erit inutile aliis verbis perspicuum facere. Morbi judicatu faciles & difficiles, longi & breves desumuntur: sed 1. ex exacerbatione seu modo invasionis morbi: 2. ex morbi constitutione seu natura: 3. ex anni temporibus: 4. ex paroxysmis se invicem excipientibus longiori, breviori intervallo: 5. ex epiphænomenis, signis nempe post

post morbi invasionem apparentibus in sputo, urina, alvi excrementis, sudoribus.

Morbus fa-  
cilis & dif-  
ficilis.

II. Morbi faciles & difficiles duobus modis a medicis accipiuntur. 1. Morbi ex sua natura raro multum damni inferentes, uti febris ephemera & tertiana vernalis, alique morbi sponte desinentes, vel medicamentis facile abigendi, dicuntur iudicatu faciles: verum qui sæpe hominem interficiunt, aut diu durant, multa & gravia inferunt symptomata, medicamentis & diætâ vix obtemperant, dicuntur iudicatu difficiles; ut omnes morbi maligni, putridi, acuti, vehementes. 2. Morbi nomen servantes, licet sint benigniores vel vehementiores, ita habetur pleuritis, peripneumonia, febris, morbus acutus & chronicus facilis & difficilis iudicatu, ad quod detegendum, & præcipiendum multa signa attulit passim Hippocrates.

Longus &  
brevis.

III. Duplici quoque modo accipitur morbus Longus & Brevis. 1. Quidam morbi ex sua natura Breves sunt, cum, vel sine periculo, ut ephemera, apoplexia, phrenitis. In quibus scilicet vel morbi materies actione vitæ facile superari & expelli potest, vel tam multa & valida, ut vim vitæ superet: alii vero sunt longiores ex sua natura, uti quartana febris, phthisis, scirrhus, cancer, omnesque morbi chronici; in quibus non respicimus ad periculum, sed ad solam durationem. 2. Morbi autem ejusdem brevitatis & longitudinis multis signis passim proponitur ab Hippocrate & aliis Præcticis, ut in morbo, qui diu durare potuisset & brevi finiri signa habeamus, ex quibus talem exitum præfagire valemus: (*Conf. Aph. 10. VI. VII.*)

Longus  
& ex In-  
vasione.

IV. Quinque fontes proponit Hipp. ex quibus derivat cognitionem morbi Longi & Brevis, facilis & difficilis iudicatu. Primus est ex Invasionis modo. Utinam observatione practica constaret statim ex invasione morbi num longus, brevis, facilis, aut difficilis esset expectandus morbus. Hoc autem didici observatione practica, & ex aliis intellexi, qui morbi cum duritie alicujus partis incipiunt, & qui longo tempore increscunt, antequam ad summum vigorem pervenerint, illos Longos futuros esse, cum ad duritiem solvendam natura diu laborare solet; & longum incrementum quoque secutum fuisse, a longo statu & decremento.

Longus  
ex morbi  
natura.

V. Qui morbi ex sua natura Longi habentur, superius recensiti sunt. (11) si vero morbi, qui breviores fuissent, prolongantur, ipsa prolongatio multa mala parit: nam ingesta alimenta minus debito præparantur, cum actio vitæ diuturnitate morbi debilitata & turbata, non valeat nova ingesta in eam bonam indolem mutare, qualis in sanitate requiritur, atque ipsi humores naturales ante morbi invasionem sani, perseverante hac sensim exuunt bonam indolem, & corruptam non omnino evacuatam generant in corpore cacochymiam. Partes etiam firmæ alienis humoribus irrigatæ enervantur, & laxantur, ipsa caro invenitur laxa & flaccida post morbos diu toleratos. Atque ex ita alienis humoribus parior spirituum proventus facit debilitatem virium, imo observavimus cum Sydenhamo, stultitiam ex febre protracta natam, solis torborantibus curandam, extincto morbo ita prolongato. Ex protractio morbo ultra modum certum est, vel materiem pertinaciorum esse, vel vires non valere materiem subigere, inde vel materies recrudescit sensim & recidivam facit, vel in aliam sæpe pejorem corruptelam abit, atque producit novum morbum, vel denique longitudine morbi ita deteruntur vires, ut pereat ager, qui non succubuisse ex eodem morbo, si non fuisset ultra modum prolongatus, quare quidam morbi per se non periculosi, prolongati autem hominem interire valent.

Longus ex  
Tempori-  
bus anni

VI. Vere & æstate morbi breviores, autumno & hyeme iidem morbi longiores & pertinaciores observantur, ita ut vernali tempore, si oriatur febris tertiana vel quartana, (quod autem raro,) brevitatem promittamus: Sed tertiana vel quartana mensibus autumnalibus invadens, sæpe totam hyemem perseverat, & quamvis antidoto extinguitur, post aliquot septimanas recrudescit, non cedens an-

te vernale tempus. Cui autem causæ hæc differentia sit adscribenda, non satis constat, an dependeat ex hyemis frigiditate, minuente insensibilem perspirationem, & materię morbi exhalationem; an vero ex pertinaciori causâ præcedente æstate solis calore nata. Forsan binæ hæc causæ concurrunt. Ætate autem ob maiorem solis calorem, uti quoque in regionibus calidis omnia fieri aciora & magis deleteria, constans observatio affirmat; hyeme autem & in regionibus frigidis mitiora manere; quod alienum ergo in ætate confectum est: si infecit corpus, deterius, quam quod hyeme conficitur; inde liquere videtur, æstivos morbos periculosiores esse debere quam hyemales. At tali modo res non est concipienda; nam morbi hyemales non producantur a noxia materia, quæ hyeme confecta est, neque æstivi ex materia in ætate nata, sed vicissim hyemales morbi sunt ex materia ætate confecta, & vernaes ex materia in hyeme facta. Nam dum in ætate solis calor humores in terræ ambitu excoerit, circa finem æstatis admodum sunt exaltati, & corrupti; accedens tunc frigus autumnale non emendat, quod antea corruptum fuit, sed corrupti exhalationem impedit, facitque, ut id quod telluris calore expellitur, alte ascendere nequeat, aeris enim frigiditas vaporis sublationem inhibet, quare nos materiem circa telluris superficiem vagantem inspirantes, nostrum corpus illa virulentia inquinamus, quam non facile excutere vel subigere possumus minuta perspiratione in autumno, unde autumnales morbi frequentes & pertinaces. Vernali autem tempore, quia corpus mitiorem materiem hyeme confectam inspirat, & sequente calore æstivo eam facilius expellit, aer, elevatis vaporibus in altum, magis depuratus quam autumno, citius liberat a morbo, dum autumnus post infectionem non subsistit novum suppeditare virus, quo aer est imprægnatus.

VII. Paroxysmorum durationem, anticipationem, postpositionem, reditus tempus, prolongationem, abbreviationem, augmentum, decrementum, intervalla temporis, reduplicationem, & multa alia promittere morbi longitudinem & brevitatem morbi, expositum inveniet Lector in Comp. 7. 53. XXII. quare non opus eadem hic repetere.

VIII. Dum morbus in corpore est natus, quædam alia conspiciuntur, sive dependeant ex morbi causâ, vel alia re accedente, quæ in textu dicuntur *max apparentia*, epiphænomena: hæc multa admodum morbi longitudinem & brevitatem atque reliqua indicant. Ex his pauca attingam, nam de his omnibus, ubi examinaturi sumus signa epiphænomena, fusius est agendum. Adducit auctor *sputum, urinam, alvi excrementa, & sudores*.

IX. Pleuritis & peripneumonia duo præcipui sunt morbi, qui ex sputo iudicantur, in his enim quo citius bonum sputum apparêt, eo citius quoque homo liberatur a morbo: & contra sputum malum, olens, amurcosum, spumosum, tenax, sero apparens, non solum morbum producit, sed & periculum portendit. Non est hujus loci cuncta de sputo, quæ ad hunc titulum collegi, proferre. Hoc solum est adstruendum, sputum cito prodians abbreviare morbum, sero apparens morbum protrahere. Quandiu morbus acutus intenditur, omnia inveniuntur sicca, & humores ulterius compinguntur; sed si morbus subsistit, ea compacta sensim incipiunt, solvi, quod solutum tunc aliquam portionem emittere incipit per emunctoria naturalia, inde cutis siccitas commutatur in levem humiditatem, urina nubeculam & aliquid sedimentosi præfert: ita etiam in morbis pectoris, trachea arteria & bronchia hucusque siccissima, nunc incipiunt humescere, & quod rudimentum sedimenti in urina aliorum morborum, id est in morbis pectoris sputum coctum, quod expectoratione redditur. Cito itaque apparens sputum indicat, subsistere morbum, & in solutionem tendere; sed si sputum in his non apparet nisi sero, certum est, morbi materiem tam tenacem esse, ut non po-

Brevis &  
Longus  
ex Paro-  
xismo.

Longus  
ex epi-  
phæno-  
menis.

Brevis &  
Longus  
ex sputo.

tuerit nisi longo tempore & iterata actione vitali subigi; itaque cum finem expectare non possumus, nisi præcefferit morbi status, ergo quo diutius durat antequam perventum est ad statum, eo quoque longior futurus est morbus.

**Brevis & Longus ex urina.** X. Quoniam omnia observata practica morbi brevitatem & longitudinem exhibentia, collecta inveniri possunt in *Comp. T. 36. LVII. 22. & 29.* non erit opus eadem hic recensere (*Conf. Aph. 31. & 34. Lib. 7.*)

**Brevis & longus ex alvi excrementis.** XI. Alvi excrementa viridia, potissimum in acutis, spumosa meraca, valde liquida & rursus compacta, varios colores habentia, cum vehementi strepitu emissa, copiosa in pectoris morbis, longitudinem præfagiunt: quia viridia & porracea in acutis corruptam bilem indicant, quæ brevi tempore in acutis subigi nequit, & talis quoque evacuatio non est critica, levamen adferens, sed symptomatica: spumosa colliquata pinguedinis & putredinis est indicium, & quoniam morbi putridi per longum tempus durant, talia excrementa quoque longitudinem præfagiunt. Reliqua autem indicia ex excrementorum colore, odore consistentia & quantitate ex *Comp. T. 90.* peti possunt.

**Brevis & Longitudo ex sudoribus.** XII. Frequentior non est via, qua morboſa materia e corpore eliminatur, quam per cutim sub forma sudoris; arteriæ enim & nervi in poros cutaneos desinentes totius massæ humorem aliena hæc via eliminare valent, inde roridi calidi sed copiosi sudores ad febris finem venientes post peractam coctionem (vid. *Aph. 36. L. 4.*) corpus liberant a materia morboſa: verum si sudores secum non ferunt morbi materiem, auferendo humorem bonum, majorem debilitatem inferunt; tales sunt copiosi & diffuentes alieno tempore, nullumque levamen adferentes: hujusmodi sudores longitudinem portendunt, nam nisi tollatur in acutis morbi materies, non definit morbus; & quoniam post tales sudores corpus magis fuit debilitatum, eo minus valet materiem morbi subigere: imo si cum sudore copioso non evacuetur morbi materies, signum est, eam pertinacem esse, ad quam tenacitatem subigendam & expellendam longum tempus est infumendum. Interdum quoque sudores prodeunt ex colliquis humoribus, uti sunt frigidi & copiosi, nam sudor bonus vi vitæ majore, qua simul concitatur calor corporis, est expellendus, quare frigidus sudor certum signum præbet, sudorem vel ex colliquis humoribus, vel relaxatis oculis profluere: utraq; hæc causæ longitudinem portendunt, nam putredo seu colliquatio & debilitas virium in acutis brevi tempore curari nequit.

XIII. Restaret in hoc explicandum, quomodo ex his fontibus demonstraretur morbus judicatu facilis, & difficilis; verum quia hoc ex brevitate & longitudine morbi facile intelligi potest, dicta sufficere reor.

## L I B. I. A P H. XIII.

XIII. *Senes facillime jejunium ferunt, secundo ætate consistentes. Minime adolescentes. Omnium minime pueri: ex his autem, qui inter ipsos sunt alacriores.*

**Alimento- rum defe- ctus in ætatibus.** I. Corpus nostrum sensim incrementum accipit, & ad statum perventum in eo conservatur alimentis assumtis, quæ etiam si nobis sint aliena, tamen assumpta ita actione corporis commutantur, ut veros nostros humores & partes firmas constituent. Quandiu crescit homo vel animal, ex alimentis assumtis non tantum conficitur, quantum actione istius corporis consumitur, deteritur & expellitur, verum plus conficiendum est, quod cedit in incrementum. Itaque actio conficiens validior est in crescentibus, quam in corporibus non amplius crescentibus. Ita est nostrum corpus creatum, ut motu vitali ex assumtis alimentis præparentur partes nostræ, & eodem quoque motu deteratur & consumatur, quod con-

se-

fectum est. Sed quo propiores sumus origini, eo actio, qua præparatio absolvitur, comparata ad causam deterentem, est major: quo seniores sunt animalia, eo illa præparans actio comparative est minor. Ex hac creata lege constat, eandem alimentorum quantitatem in crescentibus, ceteris paribus, citius commutari in bonos humores, quam in ætate provechioribus. Inde quo origini animalia sunt propiora, eo citius commutantur alimenta, quo vero magis ad senectutem accedunt, eo diutius durant, antequam alimenta fuere commutata.

II. Si igitur æqualis quantitas in junioribus & adultioribus alimentorum ingeritur, in junioribus citius consumpta erit, quam in adultis: Potest itaque in junioribus alimenti defectus esse eodem tempore, in quo nulla est in adultioribus ingerendi necessitas: si igitur puer & senex ad id tempus expectant, ad quod senex ferre potest inediā sine detrimento, puer necabitur alimentorum defectu.

Puer difficile, senex facilius ferre jejunium.

III. Quoniam hac actio cum ætate sensim decrevit, inde, quo successive magis distant ab origine, eo facilius longiore inediā ferre possunt, ex qua regula generali, ferre creata in nobis & aliis animalibus lege facile capitur totum mysterium, senes facillime &c. jejunium ferre posse, cum eam actionem immutantem minus validam habent.

IV. Addit Hipp., qui inter ipsos sunt alacriores. Sed & hoc etiam ex generali regula deduci potest; corporis enim exercitiis citius cibi subiguntur, nam tunc non solum motus vitalis hoc absolvit opus, verum etiam motus animalis, qui dum operatur, augeat quoque circulationem, quare operarii & exercentes plus alimenti assumere coacti sunt, quam quiescentes & otiosi. Pueros autem alacriores, agihioresque, cum corpus suum magis movent, quam segnes & torpentes, eodem modo ut exercentes citius subigere ingesta.

Alacriores difficilius ferunt jejunium.

## L I B. I. A P H. XIV.

XIV. **Q**ue crescunt, plurimum habent calidi innati: plurimo igitur egent alimento: sin minus, corpus consumitur. Senibus autem paucus calor: propterea paucis somnibus indigent, a multis enim extinguuntur. Idcirco etiam febres senibus non similiter acute, frigidum enim est corpus.

I. **Q**uod nos in præcedente Aphorismo ex creata a Deo actione vitali in nobis aliisque viventibus deduximus, id Hipp. Calido innato adscribit in hoc loco. Si quis existimat, Hippocratem magis cognitam reddidisse causam, quia citat Calidum innatum, nos vero legem a Deo creatam, eum existimo rem non satis perpexisse: nam dicere ex Calido innato fieri, sensum magis intricatum facit, si ulterius enim urgemus, unde ille veniat calor natus seu Emphyton thermon, id creationi, ut nos actionem vitalem, adscribendum est; & tum habet hanc difficultatem, Calidum innatum tum quoque esse explicandum, quod a Veteribus non peractum est: malo itaque statim in principio ad Creationis opus confugere, quod a nemine explicari potest, ad quod si veniant hodierni Medici & Physici, contenti acquiescunt, quam ut aliquid insuper incogniti interponam. Si qui sunt dicentes, se intelligere, quomodo actio vitæ sit creata, credo mentiri, fateor ego me latere. Invenio tamen, vitæ actionem esse in omnibus viventibus, qua distinguuntur a rebus mortuis.

Incrementum an a calido innato, vel actione vita.

II. Calidum innatum multa obtinuit nomina, nonnulli Flammam, Auram, Animam vitalem, Archeum eum vocarunt, putarunt esse Humidum primigenium calore & spiritu perfusum, quod a parentibus acceptum vocarunt Insitum, sed alimentis conservatum & revocatum dixerunt Influent, mera verba omni sensu carentia. Nam planta, insecta, & pisces vivunt, crescunt, nutriuntur, uti anima-

Calidum innatum.

lia



lia calentia, dum tamen non magis quam alia mortua caleant; quare vitæ actioni non semper junctus est calor. Et quoniam animalia frigida viventia eodem modo crescunt & nutriuntur, uti animalia calentia, Calor non est vitæ attributum inseparabile. Quid autem volumus per actionem seu motum vitalem, id in speciali *Exercitatione* 1. exposuimus; de Calore corporis egimus in *Comp. T.* 49.

Corporis  
Incrementum an a  
Calido innato.

III. Quod Hipp. observatione Practica detexit, invenimus vera fide nobis reliquisse, quod autem ex placitis Philosophorum sui temporis, quando hæc disciplina defectu experimentorum admodum erat manca & mutila, deduxit, non parum a veritate sæpe recedit. Non constat experimentis, infantes plus calidi innati continere, quam viri: imo ex apparitione videretur, calidum in adultis abundare, nam eorum corpora ad thermometrum calidiora inveniuntur, & a frigore externo non tam facile vincuntur, quam in tenella ætate; si ergo ex mente Hipp. magnitudo incrementi penderet a copia calidi innati, majus incrementum fieret in adultis, quam infantibus. Quod cum experientia contrarium comprobatur, hujus asserti absurditas facile patet. Atque frigida animalia etiam crescere non potuissent, si ex innato calido penderet incrementum. Quare augmentum non ascribimus Calido innato cum Hipp. 1. quoniam sine eo quoque quædam animalia crescunt 2. quia in calidis animalibus incrementum non est proportionatum calori.

Quæ corpora plurimum alimentum egent.

IV. Quatuor genera corporum invenimus multo alimento egere, 1. Corpora origini propiora, quoniam observavimus actionem immutantem assumpta in his validiorem esse, quam in adultis, & quia talia quoque corpora pro incremento elaborant: nolo tamen, ut sensus hic accipiat, ac si vellem infantem plus cibi capessere, quam adultum, sed habito respectu molis corporis, si enim decuplo ponderosius sit corpus adulti quam pueri, puer plus quam decima parte alimenti eger, qui fruiat adultus, ut vivere possit sine detrimento ex cibi defectu. 2. Assuetos multum cibi capere, hi enim cum mediocri quantitate dicuntur defectu laborare. 3. Operarii & suum corpus exercentes, quoniam in his non solum motu vitali uti in quiescentibus citius convertuntur assumpta; verum etiam motu animali, & motu vitali tunc quoque validiore fuso, in his subiguntur assumpta. 4. Corpora ex morbis subito reconvallescentia, quemadmodum post quartanam febrem sanata in his autem cavendum est, ne nimium simul ingeratur: famelici quidem sunt & alimento copiosiore egent, sed si appetitui indulgeamus, corpus adhuc dum debilius multitudine obruetur, & versabitur in recidivæ vel alterius morbi periculo.

Senes cur egent deficientibus.

V. Tandem ad senectutem perventa corpora labascunt, motus vitalis a Deo in corporibus viventibus creatus sensim languere incipit & debilitari, unde omnia sunt in senibus, quæ mala ex infirmiore actione vitali etiam in junioribus conspiciuntur, in quibus tamen recuperatis viribus, nata mala emendantur, in senibus autem, quia vires recuperari nequeunt inevitabili lege deperditæ, sensim in deteriora abeunt: quæ igitur mala ex deficiente actione vitæ nata ut evitentur & aliquo modo præveniuntur, adhibemus auxilio, actionem vitæ suscitantia; Hipp. dicit, egere *sonitibus*, id est adhibenda sunt auxilia, quæ majorem calorem sui potentia in corpore excitant, qualia hodie vocamus Calefacientia, qualia sunt spirituosæ & aromatica ( *Conf. Comp. T. 82.* ) Ita enim est nostra vitæ actio comparata, ut a quibusdam assumptis se validius agitet. Talia Calefacientia Senibus; minime vero Juvenibus sunt adhibenda, utpote his actio vitæ satis valens non eget stimulo, quem si adhibes, morbus fit ex nimia agitatione, sed senum corpora languentia stimulo exagitanda. Hanc autem adijcit cautionem, a multis somnibus extinguitur, & ut Galenus: Lampas medico olei nutritur, nimio autem obruitur: nam ut modico spirituosos resollantur senum vires, usque ad ebrietatem vero assumpto, eadem extinguuntur.

VI. Quo.



VI. Quoniam senum corpora sunt frigida, dicit Hipp. non corripiuntur febre acuta: experientia autem testatur, non raro senes febre acuta corripipi. Quare hic sensus alio modo est capiendus. Si senes eadem febre calida tentantur, quia juvenis, illa in senibus multo minorem calorem concitabit; atque levior causa, qua in juvene febris calida concitatur, in senibus modicum calorem suscitabit, quod ex hac lege generali facile deduci potest. Motus vitalis a nativitate usque ad perfectum incrementum sensum redditur robustior, in eo perstat, dein languere incipit; stimulus idem applicatus eo validiorem motum suscitatur, quo vis vitæ est robustior, inde pueri & senes parum, adulti vero maximum calorem experiuntur a stimulo.

Senibus  
acuta  
febre  
acuta  
tentantur.

## L I B. I. A P H. XV.

XV. **V**Entres hyeme & vere natura sunt calidissimi & somni longissimi: In his igitur temporibus etiam alimenta plura exhibenda. Innatum enim calorem majorem habent, nutrimento igitur copiosiore indigens. Judicium sunt Etates & Athletæ.

I. **H**ujus aphorismi sensus ut facilius capi & exponi possit, ejus aliquo modo mutabo ordinem. Alimenta plura sunt exhibenda hyeme & vere 1. quia ventres hoc tempore sunt calidissimi; 2. somni longissimi; 3. innatum calorem majorem habent; 4. judicium sunt Etates & Athletæ. Examinaturi sumus primo, quæ præmittuntur, ut videamus, an exinde per legitimam conclusionem inferre possimus, copiosiora alimenta danda esse.

II. *Ventres* multas significationes habent, interdum enim omnem cavitatem, aliter tres notabiles cavitates, caput, pectus & abdomen, vel ventriculum cum intestinis significant. Ex his in hoc loco Hipp. intelligit ventriculum & intestina, quoniam ab his partibus recipiuntur alimenta & in iis præparantur. Itaque ex sententia Hippocratis ventriculus & intestina hyeme & vere sunt calidissima. Hanc autem sententiam desumit ex communi opinione, qua statuitur, hyeme interiora magis calere quam æstate: sed quoniam hæc sententia iteratis experimentis per thermometra captis satis refutata sit, non est opus his amplius insistere, constat enim, æstate contenta ventris magis calere quam hyeme: quare hæc adducta ratio nihil suggerit ad probandum, nos egere pluribus alimentis hyeme quam æstate.

Hyeme an  
ventres  
calidissimi  
sint.

Ventris  
significa-  
tio.

III. Alterum argumentum est, quia cum somni hyeme & vere sint longissimi, corpora egerent plus alimenti. Ex assumpta hypotesi, a somno fieri coctionem, dictum Hipp. firmari potest, sed experientia contrarium probat, non solum enim animalia totam hyemem quasi dormientia non egent alimento, sed etiam quidam homines sopore oppressi per plures vivunt dies sine alimento, vel multo minori copia, quam quæ sufficeret ad sustentandam vitam in vigilantibus: atque experientia confirmat, somnum longiorem vitam conservare cum exiguo alimento. An igitur ratio experientie contrariatur? imo si falsa sit, quemadmodum hæc est hypothetica, nam a somno fit laudabilis coctio, ut exposuimus (*Persp. Cap. 6. v.*) sed per coctionem, quæ fit in somno, non intelligitur citior assumtorum subactio, nam in vigiliis citius subiguntur alimenta, quam in somno, utpote solo blando motu vitali in somno alimenta sunt subigenda; sed in vigiliis actione vitali validiore, & sæpe etiam motu animali promoveatur subactio. Hinc satis constat, quam perverse nonnulli statuunt, largiorem cœnam esse sumendam, quoniam optima fit a somno sequente coctio, quoniam alienam de coctione fovet sententiam. Satiis itaque est in infirmis largiorem evitare cœnam, ne somnus mul-

Somnus  
longior  
an egeat  
pluribus  
alimen-  
tis.

multitudine alimenterum turbetur, & cibus nimis diu quiescens corrumpatur. In robustis autem, qui solo vigente motu vitali omnia subigere valent, non est opus strictam hanc regulam servare.

Veteres an  
hyeme &  
vere ma-  
jorem ca-  
lorem in-  
natum  
habent.

IV. Superius (11) demonstravimus, ventres hyeme & vere non habere majorem calorem, sed hæc est alia quæstio, an vero calidum innatum (*Appb. 14. 11.*) his temporibus sit majus, nam statuunt in pueris, quibus ad thermometerum minor est calor, majus esse calidum innatum, adeo quidem æstiment, maximum esse posse calidum innatum, etiamsi ejus calor detegit nequeat thermometero, quemadmodum in aromate, & spiritu vini dicitur inesse calorem, quamvis is ad thermometerum non percipitur. Si pro Calido Innato, de quo multum litigant veteres, aliam rem cognitam ponamus, nempe eam actionem vitæ in nobis viventibus a Deo creatam, qua corpus nostrum suum accipit calorem sine calore vel igne adventitio, quem fieri demonstravi (*Persp. Cap. VIII.*) ex attritu, responsio erit facilius. Nam hyeme & locis frigidioribus hæc actio magis valens est. Nos versamur semper in aere ambiente frigidiore, quam est gradus caloris nostri corporis, certum itaque est, in nobis esse causam hunc majorem calorem producentem, quæ tanta est, ut corpus ab ambientibus refrigeratum, tamen suum caloris gradum conservet: si igitur in majore frigore externo æqualis maneat caloris gradus in corpore, vel si tantum non minuitur calor corporis, quantum augetur externum frigus, evincimur, causam calefacientem in nobis in eo aere frigidiore validiorem esse, quam in aere calidiore. Experimur quoque omnes, ex subito ingruente frigore corpus nostrum ad thermometerum magis refrigerari, quam si idem frigus aliquandiu persterit: quare in frigore perseverante causa calefaciens in nobis validior fit. Neque hoc est contra rationes, nam demonstratum est, pro validiore attritu augeri calorem, cum autem attritum a frigore in nobis viventibus majorem fieri, consentaneum est, quia partes firmæ nostræ a frigore uti omnia corpora contrahuntur & accurtantur; si ergo motus vitalis idem manet, sed cum aucta applicatione unius partis ad aliam, validior fit attritus, & inde major istius effectus, nempe calor. Hac igitur actione validiore transfluente humores plus patiuntur, seu quæ sunt aliena, uti alimenta, citius commutantur in bonos humores; atque ex alimenterum defectu novi assumendi nascitur necessitas. Inde roboratis visceribus hyeme major necessitas capiendi alimenta nascitur. Si igitur per Calidum innatum intelligunt Actionem vitalem, allati veritas satis constat.

Athletæ  
& ætates  
indicant  
copiosiora  
alimenta

V. Quænam ætas copiosioribus & paucioribus eget alimentis, superius (*Appb. 13. 1.*) notavimus. *Athletæ* autem ex consuetudine & corporis exercitio plurimo alimento egent; nam qui assuescunt sua saginare corpora, paucis alimentis non possunt contenti esse; atque corpora exercitata quia plus deturunt, citius defectu alimenti laborant. Hoc autem an ex calido innato majore proveniat, ex superius dictis facile colligi potest.

Conclusio.

VI. Ex allatis rationibus & experientia constat, hyeme largiora assumenda esse alimenta, sed non ex dictis rationibus Hippocratis, quia per se non satis firmæ sunt. Num vere quoque id sit faciendum, admodum dubito, quia, si corpus multitudine fuit onustum, accedens calor enervans actionem vitalem, partesque firmas laxans, facit humores non satis enervatis actionibus agitados, in alienam naturam degenerare.

## L I B. I. A P H. XVI.

XVI. *V*ictus humidus febricitantibus omnibus confert, maxime vero pueris, & aliis tali victu uti consuetis.

I. Tri-

**I.** Tribus in casibus Hipp. dicit, victum humidum conducere; 1. in febricitantibus omnibus; 2. maxime pueris; 3. confusis. Videtur ex textu constare, Austorem velle febrientes pueros & confusos humido victu utentes. Ergo sciendum est omnium primum, quid sit humidus victus. Qui nihil solidioris cibi capit, sed cuncta liquida magnaue copia aquæ diluta, victu humido utitur, ergo nihil tunc ingeritur, quin ita sit solutum, ut forma liquida intraret, quare ad subactionem non eget corporis actione, & effusione liquidi, quæ requiruntur cibo solido & sicco, antequam eo usque perveniat, ut lactea vasa intrare possit. Si liquida mediocri copia ingeruntur, non dicitur humido victu uti, sed humida copiosius ingeruntur vel & applicantur. Denique auxilia, quæ dicuntur saponea acescentia & fructus horæi, mediocri quantitate ingesta humectant, horum usus etiam dicitur victus humidus. Videndum nunc est, num tria hæc genera victus humidi omnibus febricitantibus pueris & confusis conferant.

11. Febris omnis sive sit essentialis sive symptomatica nunquam est præsens, nisi concitet majorem circulationem, calorem, & corporis ægritudinem. Ex febris causa non possumus ratiocinari, quia latet, seu res est nobis incognita, quæ se per hæc criteria prodit. Major autem *Circulatio* non solum ex morbo, sed etiam ex mechanica causa seu motu musculari semper inducit languinis lentorem, seu sanguis acquirit majorem conrescendi potentiam, atque quidquid ita compingi non potest, extruditur: massa sanguinis ita compacta multa mala facit, quæ non sunt hujus loci citare (vid. *Comp. T. 45.*) Ut autem hæc evitetur compactura, non solum humida sunt ingerenda copiosiora, verum etiam quæ humectant, qualia hodie dicuntur antiphlogistica; nam iis temperatur motus ille major & prævenitur nimia illa conrescibilis potentia in sanguine *Calor æstuans* in febribus breve omnia in putrilaginem convertens egregie iisdem temperatur, & quoniam dicta Antiphlogistica non facile per majorem calorem in putredinem convertuntur, quoniam sunt Acescentia, præ omnibus aliis in febribus sunt laudabilia: miror igitur perversitatem multorum, qui in omnibus febribus non dubitant dare decocta carnis, quoniam in corporibus a febre calentibus cito in putrilaginem convertuntur. Non novi, me unquam sine ægritudine, seu infirmitate observasse febrem: quæ ergo causa est, ut nova ingesta imperfectius elaborentur? nostrum itaque est evitare ea, quæ multa subactione egent, ut sunt cibi solidi; sed quæ facile vel minima corporis actione in bonos humores nostros converti possunt, uti sunt liquida, quæque soluta sunt antequam ingerebantur: imo quia in febricitantibus diffatur tenuissimum, ad subigenda ingesta alimenta non confluit satis magna copia liquidi; atque corpus humido privatum, hoc victu humido etiam suppetias accipit. Quare non solum ex sententia Hipp. verum etiam ex ratione & experientia conducit victum humidum præscribere febricitantibus. Prædictis graviter obstat, quid sit faciendum in Hydropico febricitante, nam victu humido augetur hydrops. At tales multæ in praxi occurrunt difficultates, si signa contra indicantia occurrunt, in quibus Medicus iudicium ferre debet, quid ex his contra indicantibus præcipue tollendum sit. V. G. si hydrops magis urget, quam febris, non est victus humidus imperandus, secus vero si æger ex febre magis periclitatur. Non est ex hydropis natura febricitare, sed si accedat, est morbus novus alteri accedens, vel producitur ex corrupto latice. Atque in morbis compositis generalis regula non valet, unde allata difficultas illa non est alicuius momenti, nam si vellem plures alios quoque compositos casus fingere, hæc regula generalis de victu humido febrientium sæpe pateretur exceptiones.

111. Nostrum corpus observatur a nativitate ad perfectum incrementum non solum augeri mole, verum etiam robore, ut quo propius est origini, eo minus sit

Victus  
humidus.

Febricitantibus

valens; ante natiuitatem enutritur enim solo præparato a matre succo; post natiuitatem lacte & pauxillo panis, non fert solidiora alimenta; sensim vero increfcens viribus etiam pollet; est ergo ex sua natura puerorum corpus debile, & alimentis liquidis concoctu facilibus sustentandum. Quod si oboritur in tali corpore per febrem maior infirmitas, in hoc itaque omnino debemus abstinere a cibo solido & concoctu difficiliore. Recte igitur Hipp. imperat victum humidum, præprimis in pueris febricitantibus.

Consuetis. IV. Corpus nostrum etiam malis rebus assuescere, notauimus (in *Persp. Aph.* 208. & 231.) hæc consuetudo hic est persequenda in victu humido. Quia longo tempore nihil nisi humida & digestu facilia accepit, ejus ventriculus & reliqua organa ita emolliuntur & relaxantur, ut imparia fiant duriora subigere: hoc experiuntur illi, qui ad evitandam podagram vel phthisin protrahendam utuntur dicta lactea; quod si lac amplius ferre nequeunt, & tunc volunt ad victum communem redire, haud facile priorem victum ferunt; ita operarii si longo tempore fuere otiosi, ad labores antecedentes citius fatigati erunt; qui se domi continere sunt consueti, in apricum vel ventum venientes magis læduntur quam consueti. Igitur maxime confert victus humidus omnibus febricitantibus, ut dictum est, sed præprimis consuetis, nam hi ob duas rationes per alium victum læderentur, 1. ex natura febris, 2. ex consuetudine.

### L I B. I. A P H. XVII.

XVII. **E**T quibus semel aut bis, & plura vel pauciora, & per partes os ferri conducatur, videndum. Concedendum autem aliquid & consuetudini, & tempestati, & regioni, & ætati.

I. **H**ic Aph. rigide primo examinat ingerendi tempora, seu quoties in die cibis sit dandus; dein quantitatem determinat. Sed monet deinceps, recedendum interdum esse a rigidissima hac regula ob consuetudinem, tempestatem, regionem, & ætatem. Quare primo generaliter inspicendum, quid magis conducatur in sanitate & morbo, semel aut bis, multum vel parum ingerere.

Quoties  
capienda  
alimenta.

II. Cum quidam homines semel, alii bis, imo ter quaterve de die cibum capientes omnes manent sani, experientia non constat, quid sit eligendum sanitati maxime conueniens in sanitate conservanda; itaque ratione quadam satagunt hoc examinare, tam in sanis quam ægotantibus. Quidam solummodo afferunt, bis vel ter de die tutius esse quam semel (vid. *Persp. C. II. XIII.*) alii vero contrarium statuunt. Videndum est habetur in textu: quid itaque videbo, si experientia non comprobatur unum vel alterum; & ratio vario modo a Medicis accipitur? Ponderabimus itaque rationes, ut inde aliquid certi petere possimus. 1. Capiuntur alimenta ut restituatur id, quod inevitabili actione corporis deditur, ex hac itaque ratione omni tempore & parum simul esset ingerendum, ut suppleatur amissum. 2. Ventriculus & reliqua organa chylopoietica facilius possunt parvam quantitatem simul subigere, quam magnam semel ingestam; atque saliva, bilis, ventriculi & pancreatis succus assiduo affluens, melius possunt parvam quantitatem simul ingestam superare & solvere, quam magnam, quia tanta copia horum liquorum confluit eo tempore dum semel in die comeditur, cum hærent alimenta in ventriculo & intestinis, quam affluit, si eadem quantitas partitis vicibus fuisset ingesta. Constat ergo ex causa, quæ alimenta præparat conducere, sæpius de die capere cibum saluberrimum esse. Sed *Sanctorius* (vid. *Persp. Aph.* 306.) Peltis est, inquit, comedere ante cibi præcedentis concoctionem. Hoc ergo confirmat bis aut ter de die capere cibum conducere, modo tantum spatium intercurrat temporis,

ut

ut præcedens ingestus cibus perfecte coctus sit. Istud ex hac recepta hypothefi adstruit, coctionem, quæ ad minimum quinque vel sex horas infumit, novo ingesto turbari, ut alimenta ebullientia in olla ab affusa nova aqua desinunt ebullire. At longe abest, nam in infantibus, qui fere omni hora lac sugunt, experimur non turbari coctionem ventriculi, & in reconvalescentibus & infirmis, quo sæpius & parva copia simul sumunt alimenta, eo facilius hæc subigere, & eo minus aggravari; atque rationibus allatis consentaneum est, eo melius esse quo sæpius assumuntur alimenta. Patet itaque ex his, falsam assumptam fuisse hypothefin, qua contendunt, coctionem turbari novo ingesto. Decepti utique sunt existimantes, coctionem turbari novo ingesto, quia hoc desumunt ex comparatione coctionis per ignem substratum, cum in nobis dicitur coctio, si actione vitali organorum, & affluxu humorum saponaceorum subiguntur ingesta, minime vero ab igne substrato, uti illi existimant. Videntur autem duz obitare rationes. Prima est, omnes homines in victu communi nunquam omni hora capere alimenta, si melius esset omni hora sumere, cur non faciunt istud? Hoc autem Dei benignitati est tribuendum, qui nostrum corpus ita creavit, ut quidem omni momento alimento egeat, sed huic molestiæ prospexit, ut quoque valeat semel in die si capiat alimentum, istud coacervare: eodem modo quoque cum excretionibus constitutum est, omni momento fecernitur urina & segregantur fæces, sed non fumus coacti excrementa omni momento reddere: hoc argumentum igitur non destruit utilitatem capiendi frequentissime cibum in ægrotantibus & ex ætate debilibus. Alterum est, non concedi tempus sufficiens collectioni bilis in vesica fellea; quia ventriculus semper manens in æquali distensione eodem modo cistam urget, dum vero a ventriculo vacuo cista minus compressa in se bilem colligere valeat, quam evomit, si deinceps ventriculus impletur. Innuittur hoc argumento, requiri bilis collectionem, quasi collecta stagnans redderetur melior & efficacior ad præparanda alimenta, quis hoc probavit? existimo acervaculum bilis nobis a Deo datum esse, ne essemus coacti omni momento cibum capere, sed ut eo tempore, quando ventriculus est vacuus, non efflueret frustra ad præparanda alimenta per duodenum transeuntia, sed tunc eo copiosius, si post jejuniū copiosiora alimenta ingererentur, ut simul præsto esset major copia humoris præparantis. Ex his itaque omnibus colligo, sanitati admodum conducere aliquoties de die capere cibum, & maxime debilibus ex ætate vel morbo: sed sanos & firmos in sanitate permanere posse, etiam si semel in die cibum sumunt, quia in nobis ita sunt fabricata organa, ut unica vice tantum possimus ingerere, quantum intra viginti quatuor horas requiritur ad nutritionem; quemadmodum hoc quoque in excrementis exonerandis experimur: sed propterea non sequitur eum modum optimum esse ad conservandam & recuperandam sanitatem.

III. Si attendimus ad scopum, cur sumuntur alimenta, facile est definire quantitatem generalem, nam in crescentibus paulo plus est ingerendum quam corpus deterit, quia ab assumtis incrementum debet formari; sed in ætate constante tantum est ingerendum, quantum consumitur, modo non sit causa vetans tantam ingestionem, uti sæpe in morbis. Ut itaque homo in sanitate sciret, quantum sit ingerendum, Deus nobis dedit monitorem, famem scilicet, quæ in sanis satis fideliter declarat, quantum assumendum sit: sed hanc minus quam saporem consulunt, quare gratiora nimia copia sæpe assumunt, minus grata vix ad sustentandam vitam. Qui vero sani viventes corpus nutriunt tanta quantitate alimentorum, quantum fame indicatur, & in potione a siti, non egent aliis regulis sanitatis quantitatem indicantibus, cum non omnes homines omni ætate, & anni tempore, in otio & quiete, eandem quantitatem requirant: semper tamen in sanis pari passu augeatur famis & sitis cum alimentorum necessitate (vid. nostram Exer-

Quantum  
assumen-  
dum

citationem de fame & siti. In morbis autem longe alia est ratio: sæpe enim vitata fames & sitis plus vel minus perit quam requiritur: corpus ex ægritudine debile non valet modicam præparare copiam; satius est emaciari parviori cibo, quam assuetam quantitatem ingerere, quæ subigi nequit, & tamen permittit corpus macie consumi, & insuper crudo & corrupto opplet.

Ex Con-  
suetudine.

IV. Tempus sumendi & alimenterum quantitas, tam in sanis quam ægrotantibus, aliquam mutationem patitur ex Consuetudine, quod, etiam si in præcedentibus ea fuere definita, interveniente tamen Consuetudine, debeamus aliquo modo a receptis regulis recedere. Tantum enim valet Consuetudo, ut dicatur altera natura, & qui certis temporibus consuevit esse cibum capere, si idem tempus recurat, appetitu aucto moneatur tempus esse capiendi alimenta: hi si alio tempore comedunt, alimenta difficiliter digeruntur; ita multi ex Consuetudine contenti sunt & sani vivunt semel in die capientes cibum: alii vero quater de die assueti, non nisi difficulter ferunt semel comedere. Idem quoque verum est de quantitate, nonnulli enim gloriosi se multum devorare vel bibere posse artificiosi fiunt heluones & bibones. His autem diu assuetis difficillime restituitur victus; quamvis id in sanitate tentant, sed morbo correpti aliquo modo perseverare debent in consueto vitæ genere; nihil enim in podagricis periculosius, quam dum doloribus langueant potum spirituosum in aquosum commutare; vidi quoque in hydrope postabufum spirituosorum damnosum esse omnino a spiritu fermentato abstinere. *A multa tempore consueta etiam si fuerint deteriora, insuetis nimis turbare solent. Lib. 2. Aph. 50.*

Ex Tem-  
peritate.

V. Temperates hic duplici modo capi possunt, vel significant variam aeris constitutionem, calidum, frigidum, humidum, siccum, nebulosum, pluviosum &c. vel respicere possunt ad solita anni tempora, æstatem, hyemem, ver, & autumnum; æquinoctium, solstitium. In his præcipit auctor, aliquid concedendum esse, uti hyeme frequentius & copiosius est dandum; ætate autem parcius; sed cuncta quæ præcipienda sunt in victu his temporibus & tempestatibus aliis in locis exponitur: debemus autem si morbus in tali aeris constitutione vel anni tempore occurrit, simul perpendere, num istis temporibus non debeat fieri quedam in victu mutatio, ut quoque ad ea aliquo modo nostram curationem dirigamus.

Ex Regio-  
ne.

VI. Regiones calidiores pauca sed diluta & humida magis egent; frigidiores vero solidiora & copiosiora: atque humidiores alimenta sicciora postulant, sed sicciores humidiora. Interdum quibusdam locis unum præ alio genus victus magis conducit: quæ omnia ex locorum inhabitatione sunt observanda, ut si in istis locis incidit morbus, aliquo modo recedamus a regula generali, nosque magis accommodemus ad victum tali in loco saluberrimum.

Ex Ætate.

VII. Ex his quæ superius (*Aph. 13. l.*) notavimus, facile est determinare, in exhibitione, tam quoad copiam, quam qualitatem, quando & quomodo debemus recedere a generali regula in ætate varia: in pueris enim & junioribus copiosiora & dilutiora exhibemus; in senioribus autem solidiora & pauciora. Ita semper est in medicina ratiocinandum: primo proponendus est casus singularis & absolutus, in quo cuncta præcepta traduntur; itidem in alio singulari casu: sed tunc deinceps hi duo inter se sunt conferendi, ut si differentia occurrat, eligatur temperamentum, ut nempe de singulis aliquid detrahatur & addatur, quo in casu composito non peccemus in nimis stricta regula hujus vel illius.

## L I B. I. A P H. XVIII.

XVIII.

Æ State & autumno cibos difficillime ferunt: hyeme facillime, deinde vere.

L In

I. IN Aphorismo præcedente præceptum generale tradidit, aliquid in alimentis porrigendis concedendum, esse Tempestati ( *Aph. 17. V.* ) in hoc nunc quatuor anni partes agit, ut cibus parcius sit exhibendus æstate & autumno, sed copiosior hyeme & vere. Ex quibus, autem causis hæc regula firmatur, videndum: nam his temporibus quædam naturalis debet fieri mutatio, quæ copiosiora, vel pauciora alimenta exigit vel tolerat.

II. Æstate solis calorem majorem partes firmas non solum nostri corporis, sed & alia relaxari, minus contractilia & elastica esse, atque humores omnes citius suscipere corruptelam, omnia experimenta suffragantur, cum calore enim majore chorda, corum laxantur, in frigore vero contrahuntur, ita ut ipsa metalla flexibiliora sunt æstate, dum autem in frigore hyemali rigeant: atque caro, pisces & cuncta corruptibilia brevi tempore in æstate putrilaginem contrahant, quæ hyeme diu sine corruptela potuerunt servari. Est ergo in partibus firmis nostris æstate minor actio quam hyeme; sed ingesta alimenta corporis actione erant subigenda, quæ nunc debilior facta, non valet ut antea tam cito ingesta subigere: itaque si eadem servatur ingerendi quantitas, aliquid de ingestis restabit in corpore non subactum. Hoc dein per spontaneam seu insitam actionem commutatur in corruptelam, quæ non esset expectanda, si tantum fuisset detractum de ingestionis quantitate, quantum vires fuere diminutæ per supervenientem calorem. Imo non solum enervatur ex calore contractilitas in partibus firmis, verum infirmior etiam fit motus animalis & vitalis, corpora enim nostra cum eodem pondere sentiuntur graviora, quia vires moventes fuere enervatæ. Quod non subactum est de ingestis, citius quoque in corruptelam convertitur, si itaque per abundantiam hyeme peccatum fuit, quoniam tarde in corruptelam convertitur, sequentibus diebus id abundans sæpe emendatur; sed in æstate protinus abundans in corruptelam conversum morbos parit: quare ætas minorem copiam alimenterum ferre potest quam hyems.

III. Ex allatis rationibus, cum aucto calore corporis vires minui, patere videtur, autumno facilius ferri posse alimenta, cum aer tunc frigidior fieri incipiat: sed pari modo non procedit, ab accedente frigore vires augeri, quemadmodum fit virium diminutio cum caloris augmento: nam per calorem, ut diximus, laxantur solida & exhauriuntur spiritus, sed per frigus augetur quidem contractilitas, verum non adduntur spiritus, qui generandi sunt propria actione nostri corporis. Inde ingruente frigore autumnali solida quidem contrahuntur, verum, quia vires simul non augentur, a quibus validis alimenta sunt subigenda, & quia minuitur insensibilis perspiratio, alimenta tam copiosa ferri nequeunt: nam ingesta a viribus infirmioribus minus præparantur, & quod exhalare debebat, retentum morbos parit: tum aer a præcedente calore maligna infectione inquinatus pronior est ad producendos morbos. Quare qui morbos autumnales studet evitare, caveat a nimia ingestione alimenterum hoc tempore; & studeat, ut conservetur corpus in eodem pondere, ut erat pondus æstivum, id est ut servetur corpus perspirabile.

IV. Tandem vero continuato frigore sensim magis roborantur corpora, nam ex frigore subito veniente non ita augebatur spirituum copia, ut valerent majorem alimenterum copiam ferre, neque statim emendatum fuit corruptum ex antecedenti calore æstivo, verum si hyeme diu continuatum fuit frigus, corpora ferendis oneribus redduntur paria; & tandem liberatur aer ab omni inficiente: Quare hoc tempore alimenta copiosiora non solum facilius feruntur, uti experimur omnes, nos hyeme plus comedere quam æstate, sed etiam in morbis victus humidus & parcius minus conducit, quam æstate. Hipp. autem rationem hujus redderet ex majore calido innato, cum ventres hyeme sint ex ejus sententia calidissimi. ( vid. *Aph. 15. IV.* )

Ætas  
difficile  
fert cibos.

Autumno  
difficile  
fert ali-  
menta.

Facile fe-  
runt ali-  
menta  
hyeme.

V. Di-

V. Discrimen ponere videtur Hipp. inter hyemem & ver, nam non dicit hyeme, & vere, sed *hyeme facillime, dein vere*, quasi innueret hyeme facillime ferri alimenta, sed vere minus, facilius tamen quam autumnus & æstate. Hoc non est sine ratione, nam hyeme & ob maiorem contractilitatem in partibus firmis, & spirituum copiosorem proventum facile fertur maior alimentorum copia, magisque deteritur, & inde copiosiora alimenta tam in sanis quam ægrotantibus desiderantur: sed vere ob accedentem calorem sensim relaxantur partes firmæ, verum quia calor non est nimius, sola valida adhuc actione vitæ subiguntur alimenta, inde vere minus ferri potest, quam hyeme, plus vero, quam æstate & autumnus.

## L I B. I. A P H. XIX.

XIX. **H**is qui per circuitus exacerbantur, nihil dare oportet, neque cogere, sed auferre de appositionibus ante iudicaciones.

I. **I**n præcedente Aph. XI. egerat Hipp. de Diætâ generali in paroxysmis morborum, qui dicuntur Remittentes & Intermittentes: deinceps dixit in morbis iudicium desumi ex exacerbatione, natura morbi, anni temporibus, paroxysmis, & epiphanomenis: hinc dat regulas diætæ ætate varia, tempestatibus anni, consuetudine; concludit aliquid concedendum esse consuetudini (Lib. I. Aph. XVII.) maiorem dandam quantitatem hyeme & vere, minorem autem æstate & autumnus; hanc nunc arripit occasionem ut dicat, quando nihil dari oportet. Tria enim in victu observari possunt, ut plus, vel minus vel nihil detur: ut itaque hoc ultimum traderet, vel debebat antecedentem Aphorismum XI. repetere, vel locum citare, ad clariorem autem doctrinam verba quam locum repetere. Hoc Hippocrati non est infrequens, nam sæpe eadem verba repetita invenies, si ejus opera pervolvuntur: & quando ordo pertractationis nos eo deduxit, ut eadem res antea fuerit explicata, locum præcedentem indicabo. Sensus hujus, quia iste ex præcedente peti potest, non est opus hic proponere.

## L I B. I. A P H. XX.

XX. **Q**ue judicantur & judicata sunt perfecte, neque movere oportet neque innovare, siue purgantibus, siue aliis irritamentis, sed sinere.

I. **H**uc usque egerat Hipp. de dirigenda diætâ in morbis, nunc autem mutat sermonem & agere vult de evacuationibus faciendis in morbis, initium fumens a morbis acutis, nam agit de crisi in morbis, quæ non ita in chronicis observatur: in acutis præceptum dat de irritamentis & purgantibus adhibendis determinato tempore acutorum, nempe dum morbus acutus judicatur vel judicatus fuerit; & hoc perfecte: nam si imperfecte judicatur vel judicatus fuit morbus, hæc regula non valet, ut infra constabit. Quare in hoc aphorismo primo determinandum venit, quid sit intelligendum per judicantur perfecte, & perfecte judicatum, deinceps quamobrem eo tempore irritamenta & purgantia sunt evitanda.

Crisis.

II. Crisis doctrina ab Hipp. accuratissime observata & descripta, a neotericis vario modo agitata, hodie admodum incerta & fallax, imo nullius momenti a quibusdam habita, facit, ut tiro medicus incertus, num obliervanda vel repudianda sit hæc doctrina, anceps hæreat. Veteres autem ex observationibus practicis in ægris, dum versabantur in locis calidioribus, atque ex ratione, qua statuebant pugnam vel luctamen fieri inter morbi materiem & vires vitæ, statuebant in morbis fieri crisin seu iudicium: Sed neoterici, vel quod minus attenderunt naturales

mor-



morborum mutationes; vel eandem præpostera curatione perverterunt; vel in regionibus frigidioribus minus observabiles sint, totam hanc doctrinam, ex assumpta hypothese, naturam non habere mentem, qua observaret tempora, omnino deleverunt & repudiaverunt. Quid autem sit sentiendum, paucis videbimus.

III. Omnes fere morbi acuti, qui nempe sensibili evacuatione finiuntur, vel metastasin faciunt ad aliquam partem, (nam inveniuntur quoque, qui materiem sensibilem non habent, ut pestis; atque alii, qui desinunt per insensibilem perspirationem, ut levis ephemera; vel crisin non subeunt, ut putridi & erysipelatosi atque maligni morbi) certo tempore morbi ex sua natura, si nulla inducitur mutatio vel per artem, vel res non naturales, moluntur evacuationem, qua eliminant morbi materiem. Hoc tantum interest, num ea evacuatio fiat certis diebus morbi, an vero indifferenter omni tempore & die. Neoterici contendunt certum tempus observare non posse naturam animæ carentem, at qui observat accuratissime stadia, quæ servant variolæ, nemo negare potest hodie adhuc morbi materiem servare tempora. Quod autem hodie crisium doctrina sit incerta, ex allatis rationibus facile colligitur, præprimis si quis morbos putridos & erysipelatosos observans, detegit, incertis diebus naturam moliri evacuationem, facile concludet omnia incerta, fore: sed aliquid certi esse in diebus criticis, morborum observatio affirmat.

IV. Crisis apud veteres duobus modis accipitur, vel intelligunt symptomata, quæ concitantur, dum morbi materia præparatur & expellitur, vel intelligunt ipsam evacuationem. Dum vis vitæ versatur in elaboranda materia morbi, quando in excretis quedam signa hujus confectionis conspiciuntur, dicebant, crisin instare: si vero dein augentur symptomata & procedit evacuatio materię præparatæ, concipiebant fieri crisin, post hanc evacuationem cum miscebant symptomata, dicebant crisin factam esse.

V. Quam primum ergo ac in urina vel aliis excretionibus apparent signa, quæ præcedere solent in morbis acutis, post quæ laudabilis secuta fuit evacuatio cum morbi diminutione, morbus dicitur judicari, atque etiam si natura versatur in expulsiōe, etiam dicunt, morbum judicari.

VI. Ultimum hoc & quando facta seu absoluta est evacuatio, morbus dicitur judicatus, nam dum evacuatio fit, quia antecessere signa hanc evacuationem præsignantia, res quidem versatur in iudicio, sed respiciens ad præcedentia, dicitur judicata. Si vero evacuatio fuerit perfecta, absoluta est judicatio, & morbus dicitur judicatus.

VII. Tria hæc tempora, primo futura evacuatio, secundo evacuatio ipsa, & tertio quando evacuatio fere absoluta est, distinguuntur in perfecta & imperfecta; nempe cum in futura evacuatione deteguntur omnia, quæ bonam evacuationem præcedere solent, perfecta dicitur: ita quoque in evacuatione & post evacuationem: sed si quedam notæ deficiunt, vel aliena simul conspiciuntur hoc tempore, crisis dicitur imperfecta.

VIII. Multi contenti sunt dicere, perfectam crisin bonam esse, imperfectam vero malam, sed junior medicus nesciens, ex quibus signis colligere debet, num in agro perfecta vel imperfecta fiat crisis, æque incertus est in prædictione & modo agentis, ac si nihil scivisset; quare operæ pretium erit istas hic addere notas, quas praxis detexit in morbis perfectam crisin concomitari, ut junior medicus ex istis detectis & observatis dijudicare valeat de perfecta & imperfecta crisi. (1) Omnis perfecta crisis fieri debet per *Evacuationem*, quoniam morbi materia ad aliquam partem deposita omnem quidem materiem deponere potest, sed quia non fertur extra corpus, illa liberatio est imperfecta. (2) *Evacuatio signis* antea debuit esse *indicata*, id est aliquid sedimentosi in urina præcedere debuit, ut constaret, præparationem materię morbi inceptam fuisse, cum unico momen-

to materia cruda non convertatur in coctam, sed sensim: si ergo statim magna fit evacuatio, illa critica esse nequit in morbis acutis. (3) *Satis copiosa*, idest respondens magnitudini morbi, quare copiosior in magno, quam parvo morbo esse debet: si enim parvus morbus magnam molitur evacuationem, hæc partim ex morbi materia, partim etiam ex bonis humoribus pervenit, quare non est perfecta crisis, quia ablatione boni alium sæpe inducit morbum. (4) *Per locum conveniens*; ita enim nostra sunt creata emunctoria, ut speciale materiem a communi massa segregare valeant, non vero sine discrimine omnem materiem morbosam, id quoque non fit in sanis; cerebrum enim fecerunt spiritum, hepar bilem, renes urinam, sed hi humores non segregantur a communi massa sine discrimine per quodcumque organum secretorium vel excretorium; frustra enim laborarem omnem urinam ducere per cutis spiracula, vel perspirabile omne per renes trajicere. Ita quoque sentiendum est, morbi materiem purulentam commodissime per renes segregari a communi massa, minus commode per alvum vel cutis spiracula: interdum tamen pus aliam affectat viam, sed in crisi perfecta reddi debet per renes, vel si in pectore hæret, etiam per sputum. (5) *Debito tempore*. Multi, ut monuimus, indiscriminatim omni tempore perfectam crisin fieri contendunt; Hippocrates autem passim inculcat, excretionem perfectam fieri debere diebus Criticis, si verum fateor, quod observavi in morbis acutis, Hippocratis sententiam veram inveni, si morbus perversa curatione vel errore in dieta non turbatur, optima crisis a me observata fuit diebus criticis: & ut non errarem in signis, sedulo perscrutatus sum variolarum stadia, in quibus mutationes magis quam in aliis morbis acutis sunt manifestæ, semper detexi, minime periculosas esse variolas hæc tempora observantes; sed ab iis temporibus recedentes, erant periculosiores: quare minus irridendi sunt veteres, quam a quibusdam fieri affolet. Tamen tempus non ita valet, ut crisis alio tempore sine vitæ discrimine non potuisset fieri. Experimur etiam, malas herbas florenti & semen maturum proferendi tempus accurate quoque observare, non est ergo mirum, semina morbofa sua quoque tempora servare, valeo tamen præmaturo flores & femina generare conciliato majore calore; & retardare, detracto calore naturali, hoc quoque fieri in morbis, experientia practica confirmat: optimæ tamen fruges debito tempore colliguntur, quare optima quoque est crisis, quæ critico die perficitur. (6) *Tollens omnem morbi materiem*, nam si aliquid relinquitur, id novum morbum faciet, vel recidivam inferet, quod cognoscimus ex virium incremento post eam evacuationem: nam si bonus humor evacuatur, vires inde non recuperantur, neque minuuntur morbi symptomata. Si omnes hæc notiones adsunt, *perfecta* dicitur seu optima; si multa vero, *bona* potest vocari; si quædam *mala*; & quo pauciora adsunt vel his contraria, eo *pejor* habetur.

In Crisi  
perfecta  
non mo-  
vendum.

IX. In Crisi diælis signis indicata, quæ ad salutem tendit, verat nunc Hippocrates *Movementia*; hoc expertus est observatione practica, si tunc irritamentum addatur, turbabitur illa crisis laudabilis, quia omnis mutatio inducit unum alterumve bonum signum detrahit. In vitæ actione modus est, a quo si recedit, vel quod motus fiat major, vel minor, in utriusque malum producit; nam motus major invertit laudabilem præparationem, & corrumpit bonos humores: ita tepor naturalis avium imprægnatum ovum facit producere pullum, minor impedit, major corrumpit. Inde contra hanc regulam non parum peccant, qui in variolis cum optimis signis erumpentibus exhibent calefacientia, movementia, quibus scilicet malignitatem excuterent, dum experiuntur variolas nunc bonas, his auxiliis in corruptelam verti.

Perfecta  
Crisis ve-  
tat pur-  
gantia.

X. Motus vitalis æqualis est per totum corpus in sanitate, sed in exonerandis liquoribus suos contentos liquores in vasis magis ad aliquam partem dirigit: atque

que in morbis observamus, impetum majorem interdum fieri ad caput, pulmones, hepar, aliaque organa: in ulceribus etiam si instat hemorrhagia, præcedit partis pulsatio indicans sanguinis fluxum magis ad eam partem dirigi motu vitali arteriarum: hoc etiam in mensium fluxu instante. Valemus etiam medicamentis ad aliquam partem dirigere fluxum, ut in purgantium diureticorum, emmenagogorum, sialogogorum exhibitione observatur: cuncta enim hæc ore assumpta, proprias tamen suas exequentur operationes: hoc etiam tota doctrina derivantium comprobatur, motum vitalem in arteriis sanguinem majore impetu ferre posse ad aliquam partem. Sed insuper observatur, si talis vel ex natura vel medicamentis fiat derivatio, reliquas excretiones minui & sisti, ut in sudoribus, si alvus fluat, in alvi fluxu, si sudor erumpat. Si ergo natura in morbo molitur crisin bonam vel per sudorem vel urinam, illa directio ex dato purgante pervertitur ad alvum; at vero quia illa morbi materia adaptata est, ut possit per cutis spiracula duci, ad intestina delata exonerari nequit, quia quodcumque emunctorium suum proprium liquorem separat & exonerat. Quare per purgans exhibitum retinetur id, quod in crisi perfecta fuisset evacuatum. Aquis tamen dubitare potuisset, si crisis fieret per alvum, an tunc illa non esset promovenda purgantibus: neque hoc faciendum in crisi perfecta, nam in ea evacuaretur omnis materia, si addas purgans, plus eliminetur, sed quia tantum non est de materia morbi, id quod purgantibus evacuas, est de bonis humoribus, qui cum detrimento ægri evacuantur. Ergo non sine ratione concludit Hipp. *sed sinere*. Nihil enim præstari potest medicamentis ad melius.

## L I B. I. A P H. XXI.

XXI. **Q**ue ducere oportet, quæ maxime vergans, eo ducenda, per loca convenientia.

I. **I**N generali evacuatione facienda Hipp. hæc tria observat. (1) Ut sit materia apta ad evacuandum, & quæ ablatione ejus mitigare vel curare possit morbum. (2) Ut observetur naturæ directio, nam reluctante natura difficulter procedet evacuatio, vel aliena evacuantur. (3) Sed quia interdum per alienam viam, quæ magnum damnum inferret, natura evacuationem molitur, in eo casu ductio derivanda est ad alium locum minus periculosum.

II. Qualia ducere oportet, in sequente Aphorismo præcipit, nempe *Coclea* non *Crua*. Tria sunt humorum genera, quæ evacuari possunt. (1) *Sola* materia morbi evacuationi adaptata, sed talis nisi hæreat in primis viis, eliminari nequit in morbi principio, nisi talis sit naturæ, quæ præparatione non eget, ut materia perspirabilis retenta. (2) *Coclea*, quæ in sequente aphorismo traditur. (3) Bonus humor, ut in venæ sectione, qui aufertur ad temperandum nimium motum & minuendam abundantiam humorum, si peccat: ex his ea ducere oportet, quæ cum emulamento ægri auferri possunt, quæ natura evacuare solet, si hominem in sanitatem restituit. Verum talis sæpe fit evacuatio sine ullis auxiliis, tunc illa quoque medicamentis non est turbanda, sed si experimur, naturam languere, suppetias ferre debemus, nam materia erat evacuanda, & non satis evacuatur, quare ejus evacuatio medicamentis est promovenda, hoc denotat *que ducere oportet*.

III. Sanguis materia morbi infectus ex cordis ventriculo sinistro in aortam pulsus, si sola cordis actione & elatere arteriarum propellitur, secundam leges hydraulicas æquali quantitate feretur per omnes ramos arteriarum, seu quantitates per æquales canales fluentes erunt eo majores, quo minor est resistētia. In vasis igitur integris & corpore quiescente, ut in decumbentibus ægris, pulla, fieri potest

Que ducenda sunt.

Observanda naturæ directio.

directio ad hanc vel illam partem major: nam si cor validius operatur, per omnes arterias æqualiter augebitur velocitas, ut experimur in fontibus salientibus per varia emissaria ex eadem scaturigine pervenientia; & vicissim languente cordis actione, per omnes arterias fit tardior fluxus. Certum igitur est ex observatis hydraulicis, si in nobis sola actione cordis peragatur circulatio, naturam facere non posse directionem, quæ tamen toties in morbis observatur: veritate itaque victi, cogimur admittere causam aliam, circulationem facientem, quæ potest in quodam ramo majorem & minorem concitare motum. Talis est motus vitalis in fibris arteriarum, nam si in alicujus arteriæ ramo major fit motus vitalis, in eo ramus accipit sanguis majorem impetum, quam in aliis: sed quoties liquor circulans in itinere accipit novum impetum, sanguis a tergo veniens, in eo ramo minorem inveniens resistentiam ob magis propulsam in eo ramo sanguinem; majori copia eo derivabitur. Ergo natura potest ad aliquam partem facere directionem, si modo concitetur in quodam ramo motus vitalis validior. Hanc directionem possumus quoque præstare topicis medicamentis, nam stimulantia applicata in istius levi arteria, majorem motum concitant: sed an directionem quoque facere possumus exhibitis internis medicamentis, minus liquet: quæ enim stimulant, quia toti massæ mista sunt, non videntur in speciali parte motum concitare posse. Verum aliter ratiocinamur in rebus mortuis & aliter in viventibus, multa sunt in nobis, quæ longe superant detectas leges motuum in physicis: & interdum fit in viventibus actio a nemine mente consecuta. Quis physiologicorum ex alimentis in machinis mortuis fecit lac? quis potuit ex sanguine solam separare urinam? bilem? semen? spiritus? si deficit organum motu vitali instructum, nihil horum ulla arte assequi potest: nam sanguis per organum tale mortuum transiectus, non conficiet urinam, semen, spiritus, bilem: quare directio vasorum, fabrica organi, transitus liquoris per id organum, non sunt sufficientes causæ ad horum liquorum præparationem & secretionem, adesse insuper debet motus seu actio, quæ in viventibus solis præfens est: imo hanc actionem in viventibus non omni tempore præsentem esse, docet observatio in feminis & lactis confessione, nam si illi humores non conficiuntur, præfens tamen est organum & fluxus humorum per istud in viventibus; verum naturaliter lac solummodo post partum formatur in mammis, & semen in matura ætate. Quare admittere debemus, in organis his requiri præter structuram & generalem motum vitalem, alium specialem motum, quem Deus in distinctis organis locavit. Eum autem motum seu actionem majorem & minorem fieri posse, experientia docuit; sentiunt enim fœminæ lactantes quodam tempore lac veluti ad mammæ pelli, quando etiam facilius & copiosius ab infante attrahitur; sed motus ille non dependet ab arbitrio lactantis, quare non est voluntarius motus, neque motus a generali causa dependens, cum in tali lactis copiosiore ad mammæ affluxu nulla observetur in cordis vel arteriarum actione commutatio, sed dependet a sola agitatione organi in mammis. Neque hoc solummodo in mammis, lachrymæ enim, saliva, & aliæ secretiones ex animi pathemate augentur, non quod totius corporis circulatio augeatur, sed in istis solis organis, ut taceam, quid sit in generationis actu. Negari ergo nequit, in organis specialem fieri posse motum: eum non pendere ab arbitrio nostro, neque a generali motu vitali. Hunc motum vocat Hipp. *Natura*, & vult si natura vergat ad aliquod organum excretorium, ut eo ducamus. Constat ex dictis præstare posse secretionem motum illum specialem in quibusdam organis; non ergo est absurdum, eundem quoque motum concedere renibus, intestinis, cuti, aliisque organis excretoriis, cui, si fiat, facilius est medicamentis suppetias ferre, quam eum auxiliis suscitare. Atque altera subest ratio: morbi materia non sine discrimine per quodvis organum secretorium a communi massa potest segre-

segregari, pus enim commodissime per urinæ vias, melancholicus humor per intestina, infectio venerea per glandulas salivales, variolosum per cutim, segregatur. Si ergo ex inchoata evacuatione percipio, motum specialem in quodam organo augeri, materiem aptam esse, ut per istud organum possit eliminari, non solum difficile erit ad aliud organum cum ducere liquorem resistentem naturæ, verum etiam sæpe frustra hoc contendimus, cum materia evacuanda inepta possit esse, ut per istud organum separari possit: quare inducta perturbatione per nostram præposteram sapientiam, non raro retinetur morbi materia in corpore, cum ægri damno.

IV. Quisnam sit locus conveniens evacuationi, non satis constat apud praticos, unus laudat cutim, alter alvum, urinam, vomitum, imo artificialem viam. Ut hoc generale in morbis cum iudicio tractetur, distinguendum est inter humorem generalem & specialem: nam quidam humores per omnia loca patiuntur educi, & tunc eligimus commodissimum: vel humores unico organo segregari possunt, & tunc debemus imitari naturam. Hæc autem regula in exemplis clarior fit. V. G. ob maiorem motum vel plethoram requiritur sanguinis evacuatio, sanguinis missionem instituo in pede vel brachio, quia locus est conveniens, in quo operatio potest institui: sed si natura conatur se exonerare per hæmoptoeon vel mictum aut vomitum cruentum, non sequor naturam, sed contra naturam divertere per aliam viam, quia æque facile per venam brachii vel pedis communis abundantia potest tolli, quam per vias istas periculosas. Aliter autem faciendum in particularis humoris educatione; si enim empyematicus deponat materiem ad alvum, tali evacuatione non liberabitur, cum omnis alvi fluxus malus sit in phthisicis & empyematicis, intestina enim non valent pus segregare a sanguine, genes id commodius peragunt, vel per sputum eliminatur, si ergo in empyematicis natura molitur evacuationem per alvum, ea cohibenda, & promovenda expectoratio & diuresis. Et, quoniam observatur in praxi, materiem repem per alvum evacuandam, etiam duci posse per cutim, & vicissim ad alvi fluxum cohibendum exhibentur sudorifera. Constat ergo secundum Hipp. præceptum, nos interdum recedere debere a naturæ conamine, si per alienam viam affectet evacuationem; atque hoc arte fieri posse, ex iis quæ supra disputavimus, satis firmari posse, reor.

Evacuatio per locum convenientem.

## L I B. I. A P H. XXII.

XXII. *Concocta purgare. & movere oportet, nam Cruda, neque in principis, nisi surgeant. Plurima vero non surgent.*

I. **M**axime fatigavit Commentatores hic Aphorismus, variam hinc adduxere interpretationem, & inversionem sensus, & ad probandum varia loca Galeni adferunt: sed quia auctoritas nihil valet in medicina, sed experientia, & inde deductis rationibus: veritas est adstruenda, videbimus quid Experientia & Ratio dicant. (1.) Examinandum, num concocta sint purganda & movenda. (2.) Num Cruda neque purganda neque movenda sint. (3.) Num Cruda non sint movenda & purganda in principio, nisi surgeant. (4.) Plurima non surgere.

II. Cuncta, quæ alimenti nomine ingeruntur, nobis sunt aliena, sed sensum actione viræ & affluentium humorum ita commutantur, ut maxima ingestorum pars convertatur in liquida & firma nobis propria, qualis elaboratio dicitur Nutritio: altera autem pars assumptorum huic nutritioni inepta, commutata tamen, ut præbeat alvi excrementa, urinam & perspirabile si actione corporis etiam fuerit subacta, & a materia nutriente separata, vocatur *Cocta*, nam si illæ excretiones præ-

Concocta quænam dicantur.

bent materiem minus elaboratam, vel & partem nutrientem, dicuntur Cruda emitti. Formatur ergo ex assumtis duplex generis materie coctæ. (1) Humor sanus perfecte elaboratus nostris assumulatus. (2) Humor alienus nobis inutilis, sed excretioni adaptatus, ex assumtis confectus, si emittitur, Coctum evacuari dicitur (vid. *Perisp. Cap. vi.*) Sed si humor ille bonus evacuat, vel quod emittendum erat, retinetur, dicimus evacuare & retinere Crudum. Nam bonus & utilis humor ratione evacuationis, dicitur Crudus; & bonus evacuandum retentus etiam dicitur Crudus.

In morbis.

III. In morbis alio sensu accipitur Coctum. Quædam morbi materia actione vitæ elaboranda est, antequam cum levamine emittitur, alia vero ulla virtute corporis preparari nequit; nam omnis materia morbi non ita mutabilis est, ut actione corporis subigi possit, quemadmodum non omnia, quæ per os assumuntur, in laudabile nutrimentum converti possunt; sed manent immutabilia, ut assumerebantur, vel abeunt in sibi propria mutationem. Morborum inflammatorum materia, quæ præcipuam partem acutorum generat, observatur actione vitæ commutari; vel forsitan in nutritivum seu bonum iterum liquorem, si parva fuit facta mutatio, ut in levissima febre, vel lentore nato validiore exercitio corporis; tunc potest ille lentor sine materie coctæ evacuatione in bonum succum commutari: sed si materia illa sit copiosior, attenuatur, interdum exit per insensibilem perspirationem, desinit, etiam morbus sine crisi sensibili. Sed si major fuerit degeneratio, constans observatio præcise docuit, evacuationem & retentionem huius dici Crudum evacuare & retinere, de quibus infra: sed si materia hæc continuata corporis actione fuerit subacta & evacuationi adaptata, dicitur Coctum, quando per emunctoria evacuat: sed retentum dicitur Crudum. Ut eviretur ambiguitas, res ipsa in exemplo clarius concipi potest: si quis in morbo acuto reddat urinam cum multo sedimento, albo, levi, constanter, is dicitur evacuare coctum, & morbi materies ab omnibus præcise statuitur coctæ. Verum si in eodem morbo istud sedimentum dispareat & reddatur urina tenuis sine sedimento, dicunt crudum retineri & talem urinam arguere cruditatem, quam materiem antea vocarunt. Ergo eadem materia morbi, quæ respectu evacuationis est coctæ, respectu retentionis est cruda.

Cruda quæ dicantur.

IV. In Cocti descriptione quasdam species Crudorum delibavimus, omnes vero in hoc loco, quantum ex præcise colligere potui, recensebo. (1) Alimenta ingesta sine commutatione per os, vel alvum, rejecta. (2) Eadem quoque corrupta & dein eiecta vel retenta. (3) Chylus bene elaboratus per emunctoria evacuatus. (4) Chylus corruptus evacuatus vel retentus. (5) Sanguis & reliqui humores boni evacuati: interdum tamen sanguis bonus in plethora vel impetu majore emissus cum levamine non vocatur cruda evacuatio. (6) Materia inutilis facta actione corporis & dein retenta. (7) Morbi materia quævis retenta si ve sit inepta si ve apta evacuationi. (8) Morbi materia non satis subacta & ita evacuata Cruda vocatur. Sunt ergo multæ species materie Crudæ, & id ex vario respectu, vel quia evacuat id, quod retinendum erat; vel retinetur id quod erat evacuandum; vel quod evacuat non satis subactum. De his omnibus plura videri possunt in *Comp. T. 39. Perisp. Cap. V.* & passim in *Perisp. App.*

Coctæ purganda.

V. Præcipit Hipp. Coctæ medicanda esse. Liqueat facile, qualem materiem Coctam intelligit, nempe (1) Materiem ex alimentis confectam evacuationi adaptatam (2) Nam si talis in morbo retinetur, ulteriori mora & motu perturbato corrumpetur, conducit ergo collectum illum evacuare per emunctoria naturalia; inde licitum est omni morbi tempore, si talia sive collecta, purgare corpus, id est liberare a materia illa coctæ, ne retenta novum morbum pariat, vel præsentem augeat. (2) Materiem morborum acutorum actione vitæ consue-

elaboratam, ut evacuationi (III.) sit adaptata: hæc quamvis matura sit, non tamen semper subsequitur ejus evacuatio, sed arte est facienda, uti in abscessu diutius clauso istud pus diutius stagnans corrumpetur in ichorem, qui absorptus novum morbum putridum facit. Talis ergo materia morbosa vel per naturalia vel artificialia emunctoria est educenda, si sponte hujus evacuatio non procedit.

VI. Cum duplex sit coctus humor, alter bonus ex alimentis in corpore retinendus; alter evacuationi adaptatus, & evacuandus, videndum, num hi humores sint movendi. Chylus in primis viis optime coctus, si diutius retineatur, commutabitur in cacochyliam, necesse igitur est ut moveatur, id est ducatur majore motu ad ea loca, ubi servire debet; quare dietetici admodum extollunt corporis exercitia & stomachica calefacientia eo tempore, quando chylus est coctus. Morbi materia ut est Lentor si conversus sit in pus, aut inflammatio in abscessu, omnino alia indicatio curativa nascitur, quam ante istud tempus: hucusque enim minuius morum per antiphlogistica, sanguinis missionem, & refrigerantia; sed nunc, si hæc facta sit mutatio, moventia adhibemus, & evitamus omnia motum minuientia; hinc in stadio variolarum suppuratorio licitum est calefacientibus uti, quæ damnum inferunt, si ante suppurationem propinantur. Utrique igitur peccant, qui semper calefacientia, & qui semper refrigerantia in acutis, inflammatoriis morbis, & variolis adhibent.

Cocta movenda.

VII. Duplex genus Crudi quia observatur (1), bonus humor corpori inferviens (2), alienus ineptus nutritioni & evacuationi, videndum, cur noceat horum evacuatio. Vires vitæ materiem morbi subigere debent & expellere, hæc quoniam generaliter minuuntur evacuatione boni humoris, tali itaque evacuatione minuendo causam præparantem, morbi curatio protrahitur: neque evacuatione boni detrahatur materia morbi, quare hujus evacuatio non valet morbum tollere, qui unicus est scopus medicinæ. Constante etiam observatione experimur in morbis inflammatoriis, evacuationem materiæ ante maturitatem exasperare morbum, qui enim apostema ante maturitatem aperit, morbum protrahet: quare Chyrurgi monent, abscessum ante maturitatem non esse aperiendum. Hoc imitantur medici in curatione febris ardentis acutæ, quæ est veluti inflammatio generalis per totum corpus; si conantur lentorem evacuare per emunctoria, morbus exasperabitur.

Cruda non evacuanda.

VIII. Nisi adjiciatur, quid sit intelligendum in hoc loco per Crudum, hæc regula, cruda non esse movenda, non procederet. Nam si virium defectu nata fuit Cruditas, uti in multis morbis chronicis, nisi moveamus crudum, id ad coctionem deducere non possumus: sed Hipp. hic intelligit Lentorem seu materiem morborum acutorum majore motu febrili compactam; si huic addas moventia, magis compingetur & ad maturitatem non perveniet: inde Chyrurgi nunquam Emplastra vel Cataplasmata calefacientia & moventia adhibent tumori inflammatorio, quando pus non est factum; neque Medici prudentiores in febris inflammatoriæ incremento adhibent calefacientia & stimulantia, ne lentorem ultra modum compingant.

Cruda non movenda.

IX. Turgere hic significat copiam humorum majorem impetum facientem, ut exeat. Ita in principio morborum acutorum sæpe turget sanguis, tunc oborta hæmorrhagia sedatur impetus & corpus minus turget: quamvis itaque per sanguinis educationem emitimus sanguinem seu humorem crudum, conducit tamen eam tunc facere evacuationem, non ut tollatur morbi materia, ut multi existimant, se ut nimius impetus, quo partes vel totum corpus turget, & qui laudabilem coctionem inverteret, temperetur: nam æque ex nimio, quam languidiore motu vitali pervertitur materiæ coctio. Ita etiam in morbis chronicis, si ventriculus & intestina cacochylia turgent, in principio conducit eliminare contenta.

Evacuare & movere si turgent.

X. Ne

X. Ne ergo medicus crederet, in omni principio acutorum & Chronicorum sanguinem esse mittendum, vel Vomitorium aut Purgans esse dandum, addit *Plurima non turgere*. Hanc raro practici observent regulam, nam invenio nonnullos statim vel venam secare, vel vomitorium aut purgans dare, sine ullo discrimine, existimantes hæc auxilia tollere morbi materiem; & in sua praxi confirmantur, quia sæpe levamen ex tali medicatione observant; si vero successum bonum non habuit, mædela, id morbi naturæ ascribunt. Sed monitus hæc regula, sedulo observavi semper in morbi Cruditate, num tureret materia; tunc adhibui evacuantia cum summo successu, aliter vero utiliter a me omissa sunt. Si quis variolas curandas habet, quæstio est, num in principio sanguis sit mittendus, aut alvus ducenda, unus hanc, alter illam sententiam tuetur, & acriter litigant. Verum his illa statim componi potest admittendo evacuantia, si materia turgeat, ut sæpe in juvenibus; & omittenda si non turgeat, ut in infantibus.

LIB. I. APH. XXIII.

XXIII. *Quæ prodeunt, non copia sunt æstimanda, sed si prodeant, qualia oportet, & facile serat. Et ubi ad animi deliquium ducere oportet, hoc etiam faciendum, si ager sufficiat.*

An Evacu-  
ationis  
copia non  
sit æsti-  
manda.

I. **D**uo diversa complectitur hic Aphor. (1) Ex quibus notionibus petenda sit cognitio bonæ & malæ evacuationis (2). An non interdum licitum sit evacuare usque ad animi deliquium. In evacuatione præcipit, æstimationem non fieri debere ex *Copia*, sed ex *Qualitate*, & *facili tolerantia*. Quæ res fensim examinandæ sunt.

II. Quæstio hæc bipartita potest concipi (1). Num nullo modo debeamus ad quantitatem evacuationis respicere (2). Num vero minus sit ponderanda quam evacuati qualitas & facilis difficilisve tolerantia. Primum hic velle Hipp. haud credo, quoniam utilissimum est in morbis, si evacuatio respondeat magnitudini morbi: nihil enim parvum est criticum; & nimia evacuatio debilitat: neque in morbo parvo magna debet esse evacuatio, neque in magno morbo parva evacuatio: sed tantum debet evacuari, ut judicare possimus, materiem omnem morbi ablatam esse. Minus enim evacuatum pro magnitudine morbi declarat, portionem materiæ morbi reliquam esse, quæ vel recidivam faciet, vel novum parietis magis autem evacuari nequit, quin id abundans desumatur ex bonis humoribus, & ita non levat: verum debilitatem inducit.

III. Cum humores boni & mali evacuati copiam egestionis præbeant, sola observatio quantitatis non sufficit ad cognitionem, nam incertus sum, num illa copia ex bonis vel malis sit petita. Necesse ergo est, simul respicere ad qualitatem egestorum. Quidam vero horum magis sit ponderandum, ita accipere potest: quantitas relinquit dubium, num sit ex bonis vel malis, atque facili est copię æstimatio: verum qualitatis observatio declarat, num bonus vel morbosus humor educatur & morbo conveniens, & summo judicio: est opus, ut videamus, num sit qualitas conveniens. Igitur magis attendendum ad qualitatem, quam quantitatem; sed non debemus propterea totam quantitatis observationem negligere.

Qualia  
oportet e-  
vacuari.

IV. Si omnibus in morbis eadem esset evacuanda materia, facile esset judicare qualia prodire deberent ad morbi solutionem, humores enim evacuati graphice cum omnibus his notionibus describi potuissent: sed qui prodeunt in uno morbo, damnosum sunt in aliis; quare decerni nequit, nisi addatur morbus, imo in-  
ter-



terdum morbi tempus, num quæ prodeunt, bona sint vel mala. Nimis longum foret omnes percurrere casus, quare unum alterumve adferam ad hujus rei clariorem intellectum. Bonum est in Pleuritide & Peripneumonia si sputum æquale, album, inodorum prodeat; sed varium, spumofum, flavescens, fetens, malum. In morbis acutis urina est bona modice tincta cum sedimento levi & albo; sed clara, tenuis, vel cum nigro sedimento lethalis. Sanguinis fluxus in acutorum principio bonus, circa finem autem lethalis. Sudores boni calidi ex toto corpore erumpentes; sed frigidi olentes, tantum circa collum & pectus, mali. Ex quibus rationibus autem dicta dicuntur bona & mala, aliis locis exponitur.

V. Ponamus hominem materia morbi obfessum, quæ materia irritat vires vitæ, ut inde quadam nascantur symptomata. Si motu illo concitato superatur & expellitur morbi materia, constat, corporis vires prævalere ad subigendum & expellendum; & si secuta fuit evacuatio, talis æger liberatus est ab ea materia, quæ vires opprimebat: ergo necesse est, ut facta evacuatione æger roboretur. Talis evacuatio dicitur fieri cum facili tolerantia, & propterea bona est, quia recuperantur ægri vires, & aufertur causa morbi. Si vero vires vitæ minus valent, sæpe etiam fit evacuatio, sed tunc vicis vitæ viribus vitæ humor ad emunctoria veniens transfinitur, non potest tunc fieri mali a bono separatio; sed effluit sine discrimine bonum & malum simul: quia vero bonorum evacuatio debilitat, & crudorum exoneratio recrudescere facit morbum, æger ille nullum levamen ex tali evacuatione percipit, imo qui antea non valebat morbi materiem superare, nunc hac evacuatione magis debilitatus succumbet.

VI. Superius (*Aph. 3. IX.*) demonstravimus ex Hippocratis sententia immodica evacuatione abundantiam non tollendam esse, hic vero contrarium videtur statui. Quare multi Commentatores refugia quaesiverunt, alii vero omnino contradixerunt: sed si res ipsa penitus inspicatur, a veritate non recedit Hipp. nam ponit casum, in quo facienda esset evacuatio usque ad animi deliquium, ut homo servetur, quæ si non heret, periisset homo; satius tunc est tam copiosam facere evacuationem & servare hominem, quam permittere, ut vi morbi opprimatur. Hoc ergo loco perstringit meticulosos, qui in morbo sola magna evacuatione curabili existimant, satisfecisse, si parvam fecerunt. Sed ad *Extremos morbos, extrema remedia exquisita optima* (*Aph. 6.*). Si aliquis pleuritide, peripneumonia, angina, phrenitide, febre inflammatoria tam valida corripitur, ut timor sit, ne homo servari possit, dum tantus sit in corpore motus, qui omnia destruet, vel imminet suffocationis periculum, si subito summa non adhibeantur auxilia, tali in casu præstans est sanguinem ducere ad animi deliquium ex lata plaga: nam minor evacuatio tam subitaneum levamen adferre nequit, quin prius extinctus sit æger. In his igitur oportet ducere ad animi deliquium, sed tam vehemens non est facienda medicina, si faciliori & leviori auxilio levare ægrum possimus: sed si aliter homo servari nequit, ut monet Auctor, id quoque faciendum est, cum ex indurata lipothymia per majorem evacuationem non tantum periculi sit expectandum, quam immineret ex morbi vehementia.

## L I B. I. A P H. XXIV.

XXIV. *IN acutis affectionibus raro, & in principiis purgante utendum, atque hoc diligenti prius adhibita cautione faciendum.*

I. **U**T intelligatur, an ex usu sit purgans exhibere in principio morbi acuti, sciendum est (1). Qualia purgantia fuisse Veteribus in usu (2). Quamnam morbi dicatur Acuta Affectiones (3). Quodnam tempus habuerit pro mor-

Evacuatio-  
tionis ju-  
dicium ex  
facili to-  
lerantia.

Quando  
oportet ad  
animi de-  
liquium  
ducere.

morbi principii: Ex his dein inter se comparatis iudicium ferri potest. His perpeclis tandem examinandum, quæ cautio sit adhibenda.

Purgantia  
Veterum.

II. Veteribus in frequenti usu fuit Helleborus, medicamentum validissimum, vel Colocynthis, Scammonium, Agaricus, aliaque drasticæ, quibus hodie, cum mitiora, ut Rhabarbarum, Sennam, Mannam, Cassiam possidemus, vix uti audemus. Veterum itaque purgantia magnam vim exercebant, & corpus mirifice turbabant; hodie autem istis lenioribus satis commode alvum ducere valeamus: quare hoc tempore licitum est etiam turbare alvum, quod olim non erat licitum. Quare olim in morbis exhibitum purgans sæpe crisin pervertebat, quod hodie minus verendum est.

Acutus  
morbus.

III. Acutarum affectionum apud veteres lata est significatio. (1.) Omnes morbi breves sunt acuti, sive sint cum vel sine periculo, ita febris Ephemera, Apoplexia, Phrenitis sunt apud ipsos morbi acuti, dum tamen nullum subit in Ephemera periculum. (2.) Acutæ quoque affectiones erant cum vel sine febre, ut ex allegatis morbis constat; modo brevi tempore morbus ex sua natura ad finem perducatur, vocatur Acutus. Acutæ autem affectiones, vel morbi, si absolute ponuntur ab Hipp. intelligit fere semper morbos breves, cito desinentes vel in sanitatem vel mortem, cum adjuncta febre, & non sine periculo. Hi acuti morbi calidi febriles sunt. (1.) Inflammatorii. (2.) Erysipelatosi. (3.) Putridi. (4.) Maligni. In quibus cum magna fiat signorum differentia, sæpe Aphorismi Hipp. sibi mutuo contrariari videntur: quare utilissimum foret in praxi medica, si semper adderetur in quam speciem morbi acuti hoc vel istud signum bonum, vel malum fuit observatum. In hoc loco intelligit Auctor morbum acutum Inflammatorium, ut infra patebit.

Morbi  
principium.

IV. Morbi acuti Principium triplicem habet significationem. (1.) Notat ipsam morbi invasionem, id est id tempus, in quo prima signa morbi apparere: nonnulli pro principio accipiunt id tempus, in quo æger lecto affigitur, sed tali modo nunquam accipitur ab Hipp. & hodiernis Medicis, nam si fieri debet numeratio dierum, V. G. in variolis, primus dies statuitur, dum æger corripitur febre variolosa, nam quarto die solent primo apparere pustulæ vel stigmata rubra, & in discretis variolis ne tunc quidem lecto affiguntur ægri. Intendunt vero ponitur principium, dum homo a morbi causa inficitur, etiam si nulla signa morbi appareant, quemadmodum in Hydrophobia, Venerea Lue, Peste, morbo Epidemico & Endemico, dum virus morbosum in corpore latitat. Communi autem significatione intelligunt tempus id, in quo signa morbi apparent. (2.) Totum quoque morbi tempus ab invasione usque ad statum pro principio capitur, adeo ut morbi Incrementum complectantur auctores sub generali titulo principii. (3.) Interdum ipsum etiam morbi vigorem intelligunt, modo signa eodionis non conspiciantur. Tria hæc tempora Hipp. hic velle videtur, quia *αὐτὰ* utitur in plurali.

Raro in  
acutis ad-  
hibendum  
purgans.

V. Purgantia omnia sive sint validiora sive mitiora, semper tamen contenta intestinorum ejiciunt, & faciunt humorum corrivationem ad intestina, fortiora autem magis, mitiora minus. Si ergo in acutorum principio intestina cacochylia sint oppleta, quam maxime conducit eam eliminare, ne incrementum morbo in maiorem corruptelam convertatur, & morbum augeat: verum his ejectionibus, non est iterum dandum purgans, nam tam brevi tempore ex ingestis nova fieri nequit accumulatio; quare semel & ad summum bis alvum ducere in morbi principiiis sufficit ad hunc scopum satisfaciendum. Si vero exhibeatur purgans ad eliminandam materiem morbi ex reliquo corpore, duæ nascuntur difficultates. (1.) Intestina non sunt organa secretoria naturalia ad eliminandas humorum impuritates ex circulatorio organo; huic muneri destinati sunt renes, & pori cutanei,

qua-

quare raro in acutis critica evacuatio observatur per alvum (*vid. Comp. Tr. 90., cxii.*) (2) In morbi principii omnia sunt cruda, sed *cocta purgare, minime cruda oportet* (*Aph. 22.*). Si autem morbus acutus nascatur ex bile corrupta, quæ hac via commode educi potest, conducit præprimis saponaceis ascensibus & salibus saponaceis neutris alvum ducere. Hodie autem multi existimant, parum differre operationem purgantis in morbis inflammatoriis a sanguinis missione; sed quia purgans omne semper aliquam in corpore commotionem facit, atque dirigit humorum fluxum ad alvum, quæ in sanguinis missione non observatur, atque raro crisis fit per alvum, ut monuimus, sed in principii frequentissime per hæmorrhagias, minus præstans tamen in acutorum principii, si ultra debitum terminum non apparebat in urina signum coctionis, inducta turbatione per purgans, postero die laudabile sedimentum in urina apparuisse cum ægri levamine: sed tunc non licitum est repetere purgans, nam perturbaretur crisis. Ergo constat, nos raro, id est semel debere; & raro, id est non in omni morbi acuti principio purgans exhibere.

VI. Qualis sit adhibenda cautio, ex exhibitione purgantium in morbis acutis colligi potest ex *Comp. T. 90., cxii.* His dictis constat, exhibendum esse purgans in principio, si corpus cacochylia sit onustum, si progrediente morbo adest in corpore materia morbi cocta, sed quæ retinetur; si materia morbi impetum ad caput faciat, ut derivetur ad alvum, his absentibus plus mali quam boni per purgans facere solemus. Si ulterius ponderare volumus in morbis acutis aliis morbis junctis, omnes morbi sunt percurrendi, in quibus alvi fluxus & purgans prodesse & nocere possunt, quos citavimus *Comp. T. 905. LXXI ad CXLVIII.*

Qualis sit adhibenda cautio.

## L I B. I. A P H. XXV.

XXV. *Si qualia purgari oportet, purgentur, confert, & facile ferunt: si vero contraria, difficulter.*

I. **E**Adem fere verba inveniuntur (*Aph. 2.*) scilicet in *perturbationibus alvi & vomitibus sponte evenientibus*; hic vero agit de generali evacuatione artificiali, si natura non molietur evacuationem, sed medicamenti faciamus evacuationem, illa si reddat talia, qualia oportet, id confert, & ægri facile ferunt: si vero ducas, quod non oportet, id quoque non confert, & ægri difficile ferunt. Ergo videndum, quales debent esse notiones, quibus constat, non talia ducere, qualia oportet: dein cur hoc confert & tale fertur, & contra.

II. Ducimus qualia oportet. (1) Si ducuntur cocta (*Aph. 21. iv.*) (2) Per emunctorium conveniens (*Aph. 2. xii.*) (3) Morbo conveniens (*Aph. 23. iv.*) (4) interdum evacuandus bonus humor, (*Aph. 3. v.*) si abundet vel nimium impetum faciat.

Qualia purgari oportet.

III. Talis evacuatio *Confert*, id est, præveniet ea mala, quæ ex retentione materie morbi, vel ex boni humoris abundantia aut majore motu erant expectanda. Nam materia morbi ad maturitatem deducta si diutius retinetur, corrumpetur, atque ita vel prolongabitur morbus, vel in alium degenerabit, ut si pus maturum sit in abscessu, confert educere pus; retentum enim diutius vel inquinabit totum corpus, vel abiit in ichorem. Confert etiam bonum ducere sanguinem in abundantia & majore motu; nam sæpe in morbis cum aucta circulatione generatur gangræna & sphacelus destructis partibus majore motu, qui prævenitur, si in principii debita quantitas sanguinis detrahatur.

Qualis evacuatio confert.

IV. Quæ vero evacuatio educit materiam crudam, non conducit, nam tali educatione non prævenietur morbus, imo potius morbus recrudescet, ut tumoris aper-

Qualis non confert.

apertura ante maturitatis tempus: & sanguinis missio, dum non abundat & non facit majorem impetum, quemadmodum in fine morborum acutorum & multis morbis chronicis.

Facile ferunt.

V. Omnis evacuatio in *sanis* debilitatem infert, nisi sit evacuatio naturalis educens id, quod inevitabili actione nostri corporis fuerit corruptum & detritum, nam plus educi nequit, quin auferatur de bonis humoribus, atque ita destruit æquilibrium inter liquores & partes firmas. Sed si adit *abundantia* aut major *Impetus*, destructum æquilibrium restituitur evacuatione, & motus nimis temperatur, atque ita statim agri percipiunt levamen ex hac evacuatione. Id quoque sentiendum est de evacuatione materiae morbi, quandiu enim morbosus humor est in corpore, ægri vires ab eo opprimuntur, & extinguuntur, nam agrotantes, amittentes vires apentes, non possunt ferre sine molestia solitam humorum quantitatem; & morbi materia humoribus mista laudabilem confectionem & secretionem spirituum invertit: inde qui ante morbi invasionem mediocrem copiam humorum ad causas apentes habebat in corpore, nunc debilitatis viribus in destructum æquilibrium ex superante humoris copia incidit; nam non fit supputatio æquilibrii inter quantitatem partium firmarum & fluentium, sed inter causas agentes & copiam humoris: potest ergo æquilibrium destrui solis diminutione viribus, ut fit in *sanis*, si corripuntur morbo vires debilitante. His igitur si detrahuntur humores, sive sint *sanis*, sive *morbosi*, restituitur æquilibrium, facta evacuatione: spontanea vel artificiali tam humoris *sanis*, quam *morbosi*, inde toties per sanguinis missionem & alvi ductionem, quæ evacuat etiam humores bonos, vires eriguntur copia majore pressæ. In morbis quoque acutis cum aucto motu invadentibus summo cum levamine statim in principio cœnantur evacuationes: nam motu circulatorio aucto, ut alibi demonstratur, arteriæ magis implentur & turgent humoribus, quam in quiete, qua turgescunt vasa arteriosa latitudinis modum excedentia molestiam adferunt, non nisi largiore evacuatione tollendam. Quibus igitur morbis statim adest valida circulatorio, his conducitur, nisi sponte fiat, artificialem facere evacuationem, ut ad mediocrem redeant arteriosa vasa. Hi homines igitur facile ferunt evacuationem largiorem boni humoris. Quod si in istis casibus fieri potuisset restitutio æquilibrii, detractio materiae morbi, non solum inde, sed & depuratione reliquæ massæ, ut ita perfectius præparentur spiritus, facile ferunt evacuationem largiorem. Cognoscimus itaque ex facili tolerantia, nam talia fuere evacuata, qualia oportet.

Difficile ferunt.

VI. Difficilis autem Tolerantia contrarium fieri indicat; nam quibus *larga* fit in perfecta sanitæ evacuatio, his inducitur debilitas; atque eo magis, si defectu humorum destructum sit æquilibrium: vasa enim modice distenta optime operantur, sed inanita collabuntur & languent. In morbis autem pluribus modis per Evacuationem generatur difficilis tolerantia. (1) Si evacuantur Cruda. (2) Boni humores in agro, neque abundantia, neque majore impetu laborante. (3) Copiosior evacuatio humoris alieni seu morborum. Horum dabimus exempla.

Evacuacionem Crudi.

VII. Sæpe sunt in morbis tam Acutis quam Chronicis copiosa evacuationes pravorum humorum, ex quibus non satis in medicina expertus judicaret, omnem morbi materiem auferri, dum tamen inveniat, ægrum tali evacuatione aggravari, & interdum breve post perire. Ita si morbi hi abierint in corruptelam seu collisionem, non raro magnam copiam vitioforum reddunt per alvum, ex qua evacuatione magnum expectant levamen: sed quia illa est iudicium corruptelæ & Evacuatio symptomatica, ægri deinceps aggravantur. Atque in principio acutorum magnæ evacuationes pravorum humorum, quia denotant morbi materiae abundantiam, difficile ab ægris feruntur. Phthisici quoque in alvi fluxum incidentes, plerumque pereunt. Has omnes Evacuaciones difficile ferunt ægri.

VIII.

VIII. Bonorum humorum, id est eorum, quales sunt humores corpori infer-  
vientes, evacuatio, nisi fiat in abundantia & majore impetu, difficile ab ægris  
toleratur. Qui verbi gratia in principio acutorum incidunt in hæmorrhagiam  
largam, aut quibus instituitur venæ sectio, ex ægri facili vel difficili tolerantia  
judicare valemus, num evacuatio ea proderit vel nocuerit. Qui enim post talem  
sanguinis emissionem minus dolent & calent quietioresve redduntur, sanum est  
profuisse. Qui vero inde non levantur, sed potius debilitantur, atque inquietio-  
res fiunt, non solum scimus ex difficiliori tolerantia nocuisse hanc Evacuatio-  
nem, ut talem proferamus prognosin; sed egregiam curationis quoque regulam  
præbet, quid faciendum sit: nam talis spontanea tunc evacuatio est cohibenda,  
atque evitanda est iterata venæ sectio.

Evacu-  
tionem  
Bonorum.

IX. Paradoxum videtur, Evacuationem malignorum difficile ferri posse ab  
ægro, cum auferatur morbi materia, quæ necessario levamen adferre videtur: in-  
venitur tamen in praxi frequentissime, ut in sequentibus constabit. Quibus hy-  
dropicis in cruribus fit abscessus magnus fundens ingentem puris copiam, quo  
major fit evacuatio, eo magis aggravatur. Sedimentum copiosum in urina de-  
monstrans morbi materiæ evacuationem, quo copiosius cernitur in morbis chro-  
nicis, eo difficilius fit tolerantia, & nisi minuatur sedimenti quantitas cum fa-  
ciliore tolerantia, æger non convalescet. Ulcus cacoethes quo majorem copiam  
virulenti ichoris fundit, eo difficilius ferunt morbum. Ita morbi omnes fomitem  
intus habentes, vel qui ex colliquatione interna nascuntur, quo majorem fun-  
dunt copiam virulenti humoris, eo difficilius tolerantur. Quare observatio To-  
lerantiæ tam in spontanea, quam artificiali Evacuazione admodum necessaria:  
confert enim per eductionem juvare, non lædere, atque hoc quam maxime  
cognoscimus ex facili vel difficili Tolerantia.

Evacu-  
tionem  
malignorum.

M E D I C I N A  
H I P P O C R A T I C A,  
E X P O N E N S  
A P H O R I S M O R U M  
H I P P O C R A T I S  
L I B R U M S E C U N D U M .  
P R Æ F A T I O .



*Est Hippocratem paucis Aphoristice Medicinam conscribendi modus arrisit, multi vero observationum in praxi historias publici juris fecerunt, quarum tantus exstet numerus, ut ne unius hominis vita ad istas pervolvendas sufficiat. Qui autem Aphorismos conscribere adgressi sunt, ut Ballonius & Baglivius, quædam duntaxat specimina exhibuere, ne utique vero totam Medicinam complexi sunt, ut fecit noster Auctor. Cum vero constitui totum opus de Aphorismis Hippocratis partis Libri publici juris facere, singulis præmittenda erat Præfatio: ne autem hæc constaret nudis verbis, aut inutili sermone, Compositionem Aphorismorum hoc loco exhibere volui.*

*Aphorismus est brevis, sed sententiosa oratio, quæ rei alicujus proprietates brevissimis verbis tradit, in qua non opus, ut antecedentibus vel sequentibus aphorismis cohercat, at ut sententia absoluta proponatur, fundata in experimentis vel observationibus medicis. Dum enim eadem res aliquoties occurrens, quæ dispersa est per multas historias medicinales, unica sententia proferatur, non amplius res hæc ad historiam vel observationem medicam refertur, sed ad Aphorismos seu canones medicinales. Ut sententia talis generalis vel particularis inveniat, non est fingenda hypothesis, ad cujus normam sunt componendi Aphorismi, sed quæ in praxi occurrunt, ut quæ in Observationibus exstant, sunt pervolvenda & memoriam mandanda, qualis modo etiam Empirici tandem sibi comparant generalem cognitionem. Quandiu autem pauci pertractantur morbi, ingenium satis vales ex observationibus his elicere regulas generales, uti fit in morbis Epidemicis, si sæpe idem genus morbi pertractamus. Si vero varios morbos pertractandos habemus, quemadmodum fit in quotidiana praxi, vel leæne observationum, rix aliquis erit tanta perspicacitate judicii præditus, & memoria firmus, ut in hac rerum multitudine valeat constantes formare aphorismos in omnibus.*

*Ut imbecillitati memoriæ & ingenii succurrerem, cogitare cæpi, an non esset  
modus*

modus aut auxilium, quod levare posset. Quæcunque igitur, quæ vel per propriam praxim, vel lectionem observatorum comparare potui, literis mandavi sine ullo ordine, nisi quod inventa serie numerorum distinguebantur. Cuncta dein nomina rem aliquam designantia, vitatis omnibus synonymis, quæ in tali annotatione inveniebam, notavi, hosque numeros congesti ad quandam analyticam divisionem universæ medicinae. Pergente itaque opere unumquodque nomen in analysi multos numeros, semper idem nomen indicantes, recipiebat.

Hucusque autem erat Medicina Empirica, nisi quod valerem ductu numerorum in adversariis eandem rem ubique invenire. Sed ut inde formarentur aphorismi, ordo erat inveniens, qui rem compositam in suas simplices species distingueret, qualis ordo in multis admodum differt, & paucis verbis hoc loco describi nequit. Ita tamen quævis res composita in suas species soluta, sine ulla hypothesi aut ratiocinio perspicui potest, neque tali modo error fieri potuit, nisi ipse Observator erraverat: quare tali modo nata medicina firma erit & stabilis ad omnia tempora.

Verum ut ex collectis his formetur Aphorismus, iudicio & prudentia opus est, ut Noster fecit Senex, is ingenio magno pollens ex propria praxi, & iis, quæ ex aliis didicerat, multos conscripsit aphorismos non solum in hoc, sed & passim in ejus operibus, non contentus sola observatione ægrorum, sed & res externas sic dictas non naturales & contra naturam perscrutatus est. Num vero hæc omnia memoriter conscripserit, an vero quodam sit usus artificio, non ita ex ejus scriptis constat. Videtur autem mihi, Nostri Auctorem seorsim collegisse quasdam regulas, dum versabatur in morborum descriptione; quoniam sæpe eadem verba aliis in locis repetita invenio, ut in Coacis prænotionibus, Epidemicis, libro de Morbis, & alibi; & quoniam inter Aphorismos raro perfectiorum alicujus doctrinæ series, sed videntur diversis temporibus exarati, ex rebus occurrentibus; animus forsitan fuit Hippocrati generalissimas seorsim colligere sententias ad levandam memoriam, cum scientia medica tam diffusa sit, ut memoria vix retineri possit.

Ut autem novi comparentur aphorismi practici & ab aliis traditi ulterius adstruantur, consue est illa recensita analysis dividenda, & subdividenda, donec res quævis composita in suas simplices species sit divisa. Illa tunc species per numeros appositos indicabit cuncta loca in Adversariis, ubi de ea specie agitur ex observatione practica: quibus perspectis, quæ detecta sunt in praxi medica, facile liquebit, num res illa sæpe, interdum, vel raro occurrat, num sit constans vel inconstans, quo tempore morbi, & in quo morbo, bonum vel malum, ut & qualem habuit exitum, quæ curatio in tali specie optime procedebat, quæ vero secus. Quando ergo aliquis ex his fidelibus observatis conficit Aphorismum, is æque certus erit, quam observatio practica. Hoc tamen commodi habet, quod paucis verbis rem aliquam specialem vel generalem complecti possit, quæ sparsim & multis verbis in historiis morborum invenitur.

Qui vero adgreditur hos Aphorismos explicare, eruere tenetur ex observationibus medicis, num sententia hæc in historiis medicis sit fundata, & quantum conveniat experimentis physicis in rebus mortuis, & quantum ab his recedat, dum complectitur res in hominibus viventibus assequendas. Quantum potuimus, hoc affectui sumus, primo perspicendo ea, quæ olim collegeram in adversariis de eadem re, quæ in proposito Aphorismo traditur; hanc deinceps rem experimentis Physicis & Medicis comparavi, ut eo clarior & firmior esset sententia.

Hic Liber Secundus in quatuor specimina divisus publice sit ventilatus; & quoniam duo specimina priori Libro destinaveram, hujus libri initium suis Specimen Tertium, continens Aph. I. ad XV. quod censura publica proposuit Gerbar-

Gerhardus Vermeer Harderovico-Gelrus, ad diem 28. Octobris 1739. Quartum autem specimen, continens Aph. XVI. ad XXVI. publice defendere iussit Godefridus Gerhardus Schoeler Romberga-Montensis, ad diem 5. Decembris 1739. Quintum specimen continens Aph. XXVII. ad XLI. Examini publico submitit Gerhardus Otto Raurwitz Zutphaniensis, ad diem 7. Maji 1740. Sextum seu ultimum huius Libri specimen, continens Aph. XLII. ad LIV. Disquisitioni publicæ exposuit Jacob van Calverlagen Amstelodamo Batarus, ad diem 28. Maji 1740. Si Deus largiatur viam & otium, inceptum opus, singulis annis unum alterumve Librum Aphorismorum in publicum emittendo, absolvere conabor.



## A P H O R. I.

26. **I**N quo morbo somnus laborem facit, lethale: si vero somnus juxet, non est lethale.

I.



Uid in hoc loco per *Laborem* sit intelligendum, facile ex Somnus laborem faciens. opposito sequente colligi potest, nam si somnus juxet, non est lethale, ergo hic per laborem intelligitur molestia, lætio, ærumna, noxa: ita describuntur a prædicis febres laboriosæ, in quibus summa est corporis inquietudo & molestia, & morbos difficile ferre. Si ergo æger absoluto somno se sentiat pluribus novis symptomatibus pressum, vel si præcedentia magis fuere aucta, dicitur somnus attulisse laborem.

Tunc autem quam maxime, si in ægris major nascatur molestia & inquietudo, taliaque symptomata, quæ malignitatem potius quam vehementiam declarant, dicitur somnus laborem facere, quia ægi tunc inquiri se jactantes, quasi laborarent, gestiunt. ( *Conf. Persp. Aph. 441.* )

II. Si vero æger ex somno prægresso se sentiat agiliorem, paucioribus vel benignioribus stipatus symptomatibus, nunc facilius quiescere potens, talis somnus dicitur juvans, quoniam declarat morbi magnitudinem per somnum fuisse minutam, sed ægi vires auctas. Cur autem illæ mutationes post somnum apparentes bonum & malum portendant, non potest intelligi, nisi præmittantur effectus naturales in nobis, qui ex somno fiunt; qui cum morbo comparati firmabant doctrinam.

III. Quæ in *Exercit. secunda* fufe disputavimus de somno, collecta proferam, ut unico aspectu res fiat perspicua. Si comparemus hominem dormientem ad vigilantem, invenimus motum animale omnino nullum, sensus externos & internos sopitos, carnem laxiorem, pulsum æquabiliorem minorem & rariorem, respirationem rariorem minus profundam, sed sæpe stertorosam, membra omnia laxa & flaccida, perspirationem parciorem. Quæ omnia simul sumta declarant vitæ actionem minorem esse, minusque consumi spiritus, quibus in vigiliis peraguntur sensus interni & externi atque motus animales. Itaque in somno naturali post vigiliis resolvuntur humores, præcedente motu majore compacti; fit spirituum materiæ accumulatio; concoquuntur humores, qui motu minore præparandi sunt; colliguntur humores magis in venis & cellulis; ex quibus in præcedente motu fuere depulsi, spatiosa inter partes firmas humiditate implentur, quare partes firmæ fiunt humidiores & laxiores; materia ad insensibilem perspirationem præparatur; vires augentur collectis spiritibus; sitis lenitur, & alvus humedatur ( *Persp. Aph. 349.* ); Caloris æstivi molestiam tollit.

IV. Qui autem aliquo morbo correptus est, non acquirit ea bona, quæ aliter ex somno placido in sanis prosuunt: nam ex mutationibus in dormientibus mali causa augeri vel minui potest: quare ut cognoscamus an prosit vel noceat somnus, alicujus morbi causa comparanda est cum somni mutationibus. Morbi generaliter dividuntur in Acutos & Chronicos, seu in morbos cum aucta & minuta circulatione. Quia in somno circulatio fit minor, facile liquet generaliter somnum magis concludere Acutus quam Chronicis: tamen si isti morbi seorsum examinentur, facile patebit, somnum in utrisque prodesse & nocere posse.

V. Concitatur somnus in acutis, primo si homo ob præcedentem motum majorem impeditus fuit dormire, nunc cessante illo motu aucto & perturbato in somnum labitur, qui si sit placidus, egregium ægrotantibus præbet auxilium: Somnus in acutis nam

nam æger per maiorem illum motum spiritibus privatus, laborans lentore seu sanguine compacto, atque solidorum siccitate, a somno ejus corpus temperato calore fruetur, viribus erit auctum, lentor erit dispositus ad crifim faciendam. Talis igitur somnus non solum *non lethale*, ut dicit Hipp. sed admodum salubre est. Huncque bonum statum cognoscimus ex viribus auctis, diminutione symptomatum, temperiore calore & motu, subsequente critica evacuatione, urina minus tincta, muto sedimento albicante saturata, pulsu minus duro & minus citato, respiratione liberiore & faciliore, madoris suffusione per totum corpus, faciliore morbi tolerantia. (2) Si autem in acutis ob maiorem sanguinis impetum ad caput opprimatur cerebrum, ut æger in soporem incidat, talis somnus ut signum malum est accipiendus: nam quod æger dormiat, morbi causa non augetur, imo potius minuitur, quia in maiore impetu conducit temperare motum, ut fit in somno, sed quia talis somnus concitatur ex mala causa, declarat ægri somnum non esse naturalem, sed symptomaticum, & inde id boni, quod ex somno provenire solebat, non producit. (3) Somnus inductus medicamentis hypnoticis, neque salutem, neque mortem declarat, nam omni tempore talis potest concitari: experientia docuit in principio acutorum somnum hypnoticis inductum raro profuisse, quoniam tempus non est in quo lentor mutari potest in materiam criticam; at suppurationis tempore conducit hypnoticis conciliare somnum, ut diu fuit observatum in variolis: quæ multo felicius curantur, si suppurationis tempore nimis motus compefcatur hypnoticis diluentibus. Hinc Papaverina miscet pectoralibus in sine peripneumoniz & pleuritidis.

Somnus in  
Chronicis.

VI. In morbis autem Chronicis, ut signum & causa malum inferre potest: morbi enim hi fere omnes languidiorem habent circulationem, minoreque actionem vitalem, si tunc ex viscidis copia opprimatur cerebrum, ut inde homo fiat somnolentus, & obdormiat, talis somnolentia indicans pituitæ in encephalo collectionem, malum est signum; atque ipse somnus non solvit pituitam, sed debilitata actione vitæ in somno major fit pituitæ collectio: quare in his neque somnus longior, neque hypnotica conveniunt. Interdum vero in Chronicis ex humore tenui & acri natis, aut quibus est motus perturbatus, ut in mobilitate & passionibus hysteris, somnus & somnifera conveniunt; omnium optime humores tenues somno & somnifero crassescunt, quod dicitur coctio in his humoribus; & nisi quies inducatur motui perturbato, non solet cessare pyroxyismus. Ita a priori determinare valeamus, num proderit somnus, vel damnum sit alaturus: in nostra autem opinione firmiores sumus, si peracto somno æger sentiat levamen vel laborem.

VII. Ex dictis facile liquet, in quo sensu capi debeat *Lethale*, & *non Lethale*: nam experientia docet, sæpe somnum attulisse laborem sine morte subsequente, ut hæc vox indicare videtur; quare pro lethale millem ponere *malum*, & pro *non Lethale*, *bonum*, quia post somnum, si æger percipiat levamen, inter præstantissima signa salutis instantis observatur.

## LIB. II. A P H. II.

27. **U**bi somnus delirium sedat, bonum.

In Delirio  
somnia.

I. **H**ic Aphor. est veluti exemplum prioris, nam posuit in quovis morbo somni indicia, hic vero duntaxat in Delirio, quoniam morbus hic exemplar præbere potest, tam in Acutis, quam in Chronicis. Omnis enim mentis abalienatio Paraphrosyne seu Delirium dicitur, sive fiat cum vel sine febre, tam a causa externa & cognita, quam interna latente. Quam maxime laborant Commen-

ta.

tatores Delirii species percutari, ut sit vel continuum, vel interpolatum, cum studio, tristitia, mœrore, furore, stultitia, & aliis notionibus, ac si multum faceret ad prognosin & curationem: hinc multa quoque fixerunt nomina, quæ magis retardant, quam promovent Medicam scientiam. In omnibus autem morbis nomen mutantibus ex phænomeno, quale est Delirium, percutandæ sunt causæ variz eum morbum producentes; præcipuas earum delibabimus, nam omnes recitare nimis longum foret.

II. Qui ex morboſa cauſa aliena percipit, cogitat, & agit, quam idem homo ſanus antea vel cogitare vel agere ſolebat, a Medicis talis cenſetur Delirare: nam aliena facere ex voluntate, malevolentia, vel quavis alia actione voluntatis, a Medicis non dicitur Delirare, quoniam mentis aberratio ex morboſa cauſa ſola ad forum medicum pertinet.

Delirii  
definitio.

III. Si percutemur morbos eorumque cauſas Delirium inferentes, invenimus iſtas in Externas & Internas ſatis commodè dividi poſſe. Quæ omnes (1) turbant æquabilem per cerebrum circulationem; (2) Deſectum ſpirituum pariunt; (3) Spirituum naturam mutant. Neque hæc generalis diviſio ad cognitionem, num ſomnus proderit, nec ne, ſufficit, ad huius enim diviſionis ſimplices ſpecies eſt deſcendendum, antequam certum poteſt comparari iudicium.

Delirii  
cauſa.

IV. Cauſæ externæ *Turbantes* ſpirituum æquabilem motum ſunt omnes cerebri læſiones a vulnere, contuſione, fractura cranii &c. in his, niſi tollatur Delirii ſenſibilis cauſa, ſomnus obrepens nihil boni præſtare poteſt, talis tunc ſomnus ex Cerebri oppreſſione generari ſolet, & tunc eſt mortis indicium: ſed ablata cauſa, ut in fractura cranii ſublato fragmento oſſis, vel educto humore ex encephalo, ſi obrepat ſomnus, valde bonum, quia ſignificat mali cauſam turbantem ablatam eſſe. *Detrahentes* autem cauſæ ſunt omnes evacuationes copioſiores, ſtudia ſeveriora profundiora, vigiliz protractæ: in his ſi ſomnus juvat, valde bonum, quoniam declarat, per ſomnum illum reſtitutos fuiſſe ſpiritus: ſed ſi non ſedat ſomnus, delirium tale malum eſt, quia inde ſcimus, non ex ſolo defectu ſpirituum, ſed ex eorum etiam mutata indole Delirare hominem. *Mutantes* naturam ſpirituum multæ ſunt externæ cauſæ; ita omnis ſpiritus fermentatus, ſtramonium, cicuta aquatica, aliæque philtra, atque morſus canis rabidi, & in ſervidis regionibus Opium. In his omnibus ſi ſomnus ſedat Delirium, ſervantur, ſed ſi non levat, admodum periculofum eſt.

Cauſæ  
Externæ.

V. A multis cauſis internis *Turbatur* æquabilis ſpirituum fluxus, ut generetur Delirium. Ita Inflammatio, Eryſipelas Meningum; ſanguinis impetus major ad cerebrum; commotio febrilis præprimis in capite, ſerum, lymphæ, acris quivis humor in encephalo collectus, morbus ad caput meſtaſim faciens: conſenſus præprimis affecto pulmone, hepate, diaphragmate: In quibus omnibus optimum eſt, ſi ſomnus delirium ſedat, nam, niſi minuantur vel evacuentur illæ morboſæ cauſæ, non ceſſabit Delirium: ut ſi quis obdormiat auctis iſtis cauſis, ſopore premitur, non vero fruetur placido ſomno, Hypnotica in his omnibus non æque bona ſunt: nam in Inflammatione & Eryſipellate non tollunt cauſam, ſed inducunt ſoporem, nihil levaminis afferentem, neque evacuant humorem acrem in encephalo collectum: ſed in maiore impetu, ſi ſimul adhibentur derivantia, ſanguinis miſſio, & refrigerantia, cum levamine conciliant ſomnum; atque ex conſenſu delirantibus egregium præbent hypnotica auxilium.

Cauſæ  
Internæ  
turbantes.

VI. Non raro poſt lochlorium proſtium in puerperis, vigilias diuturniores ex morbo diu toleratas, febres intermittentes & longas invaletudines, exhaustis ſpiribus, generatur Delirium, ſolis recuperatis viribus abigendum, quale etiam ſit in ſumma ſenectute: vel ſpiritus exſuncti commutatis humoribus in ſphacelum, ut in moribundis ex acutis, vel ſpiritus inviſcari lentore morborum acutorum,

Detrahen-  
tes ſpi-  
ritus.

aut viscoso chronicorum generant Delirium, in quo somni observatio multum valet. Nam qui ex debilitate virium delirant, si a somno levantur, magna spes est, tandem vires recuperari posse iterato somno. Delirium ex Lentore egregie levatur somno, quia somno placido Lentor commutatur in materiam, quæ critice evacuari solet: Sed in viscoso, quoniam augetur quiete & somno, somnus Delirium aut stulticiam augere solet.

Mutantes  
Spiritus

VII. Ut quidam externa (iv) valent ita commutare naturam spirituum, ut mens omnino sit alienata, ita etiam in nobis geperantur Morbosi humores crassius spirituum invertentes, qualis est bilis corrupta, materia melancholica, pus corruptum, deliquata materia chronicorum, urina retenta ad cerebrum delata. In his omnibus, quia per somnum non fit commutatio in melius, siue somnus fiat ex naturali causa, siue ex cerebri oppressione, nihil boni ex somno in huiusmodi Delirio est expectandum: neque propinanda sunt hypnotica: sed tale Delirium educatione & emendatione illarum causarum est curandum.

## L I B. II. A P H. III.

28. *Somnus, vigilia, utraque modum excedens, malum.*

Somnus  
modum  
excedens.

I. Omnes fere Commentatores hunc Aphor. absolute ponunt, tam in sanitate, quam morbo, & inde in sequentibus, *somnus vigilia utraque modum excedens, morbus*, eodem modo exponunt; sed ex nexu hujus cum duobus præcedentibus facile liquet, in hoc loco somnum & vigiliam ut signa epiphenomena capienda esse: nam in primo hujus libri exponi somnum in quovis morbo; in altero autem qualis esse debeat in Delirio; nunc vero dicit somnum & vigiliam longiorem quam exigit natura morbi, malum facere. Duplici modo forasus & vigilia excedentia, ut signum nempe & causa, malum indicans.

II. In sanis hominibus quandiu somno sit indulgendum, exposuimus (Ex 2. LVI.) Sed & ex istis constat hominem ex necessitate interdum longius, interdum vero brevius tempus, quam octo horarum, concedere debere somno, atque in omni ætate idem tempus non servandum esse: in his longius & brevius tempus non dicitur modum excedens, quia sanitati conducit. Sed si homo, cui competit somnus brevior, utitur longiore, & vicissim, aut qui longo eget somno, adhuc magis somno indulget, quam exigit sanitatis conservatio: in his omnibus somnus modum excedit. Ita etiam in morbis hic sensus capiendus; nam qui post diuturnas vigiliis longo fruitur somno, is non dicitur excedere modum, sed est convenientis, quia supplet defectum præcedentis temporis.

In acutis

III. Multi in ea sunt sententia, quo plus & diutius dormiunt ægri in *Acutis*, eo melius esse, quasi non potuisset somnus in acutis modum excedere, contrarium vero inculcat noster Auctor: nam in acutis oppresso cerebro ex mala causa, diutissime dormiunt, ut in *Caro*, in quo somno quo diutius detinentur, eo pejus signum, quo enim cerebrum magis est oppressum, eo profundior & diuturnior *Caro*. Sed somnus longior ut causa in acutis modum non excedit; nam relaxatis partibus firmis, temperatiore motu Lentor morborum acutorum optime disponitur ad criticam evacuationem.

In Chronicis

IV. In morbis autem *Chronicis* somnus modum excedens, ut signum & ut causa malum portendit. Omnibus fere morbis chronicis est tardior vitæ actio, quo humores abeunt in spontaneam corruptelam, & minus commutantur ingesta deficientibus viribus in bonum succum, quare talia corpora frequentissime laborant *Corruptela spontanea & Cruditate*, quæ causæ morbosæ ex minori actione in somno (Conf. *Exc. 2. XLII. XL., XIV., XXXV., &c.*) augentur: sed majore agi-

tarione sunt concoquendæ & expellendæ; quare in Chronicis raro per somnum longiorem curantur morbi, vid. (Aph. 26., VI.) Qui somnus ex morbosa causa modum excedit, quale exemplum habetur in *Lethargo*, nunquam bonum præfagium præbet: cerebrum enim Pituita oppressum non facile liberatur.

Vigilia  
modum  
excedens  
in Acutis.

V. Frequentius in acutis vigiliaz modum excedunt, & malam præbent prognosin: nam vigiliis protrahis, constat cerebrum continuo in morbo turbari, ut non concedatur quies pro somno capiendæ; quare in perpetuo vigilantibus, quoniam Lensor in acutis formatus, continuato illo motu raro ad criticam evacuationem deducitur: interim vigiliis & motu aucto in acutis quam maxime exhauriuntur spiritus, unde summa debilitas generatur.

VI. Minor & quietior motus in Chronicis disponit quidem corpus ad longiorem somnum capessendum, sed si æger nimis vigilat, inde scimus, aliquid acrelatitæ, quod hunc languidiorem motum turbat, atque vigiliis protrahis exhauriuntur quoque spiritus, quorum privatione corpus sensim magis debilitatur. Et quoniam viribus auctis superandus est morbus Chronicus, corpus vigiliis debilitatum, morbum quoque augeat. Inde in Chronicis hypnotica corpus ad naturalem somnum redigunt, vera videntur esse Cardiacæ.

In Chro-  
nicis.

## L I B. II. A P H. IV.

29. *Non satietas, non fames, neque aliud quicquam bonum est, quod natura modum excedat.*

I. *Generalem de omni excessu, & specialem de fame & satietate complectitur sententiam.* Omne nimium naturæ inimicum non est opus adstruere, utpote omnibus satis cognitum: quid autem hic per Satietatem & Famem sit intelligendum, non constat inter auctores: maxima pars sensum huius ad parciorem & copiosorem ingestionem alimentorum refert; de his autem in morbis superius egit Hipp. in Lib. I. Neque hic regulam tradere vult de quantitate alimentorum assumenda in sanis; nam statim in primo Aph. huius libri inceptit *quo in morbo*, & in eo examinavit somnum; conducit ergo, ut nunc regulas præbeat de sensu famis, quia versatur in corporis actionibus observandis, quid boni aut mali portendunt in quovis morbo.

Sensus A-  
phorismi.

II. Per satietatem intelligo hoc loco, si corpus præcedentia ingesta alimenta omnia subegit, ita ut si fuisset sanum, nunc debuisset esurire, sed quamvis nihil alimentosi sit in corpore, tamen talem sensum percipit ac is qui saturus est, ad est, cibum non appetit, aut si parum ingerit, statim saturus est.

Satietas.

III. Quid sit Fames, satis exposuimus (Exc. 3.) In hoc loco intelligitur sensus famis præter modum urgens, ut fames non placet modica ingestione alimenti, citiusque redeat quam in sanis hominibus redire solet post assumpta alimenta, imo urgeat ventriculo pleno. Utrumque hoc dicit Hipp. in morbis est malum, quod paulo altius ex suis causis est eruendum.

Fames.

IV. Ad famem naturalem concitandam (1) requiri Chyli defectum in sanguine; (2) ventriculæ vacuum alimentis; (3) bilis bonæ confluxum in ventriculæ vacuum, quæ nudæ ventriculi latera tangens sensum famis excitat, olfactus ab odoriferis & gustus a sapidis applicatis in Exc. 3. demonstravimus; si vero ventriculi latera mucos nimis obducta, vel bilis sit iners, cum alimenti defectu in ventriculo & chyli in sanguine, homo non solum saturus videretur, & minima ingesta alimenti quantitate oppletus, verum etiam multo difficilius quoque ingestum cibum in bonum chylum convertit.

Satietas  
non bona  
in morbis.

V. Constante observatione practica experimur, in fine morborum acutorum

Acutis.

hominem non securum esse, quandiu fames naturalis non redit; ut enim vires præcedente morbo amissæ restaurentur, bonus chylus est suppeditandus, qui in tali inappetentia imperfecte conficitur, ut notavimus Exc. 3., XL. Et vigente morbo acuto semper minor est fames, quam in sanis; si ager vero nihil appetit, sed semper saturus videtur, multo pejus est, quam si alimenta petit.

In Chroni-  
cicis.

VI. Frequentissime in Chronicis observatur, famem deletam esse, vel quod ventriculus pituita scateat, vel bilis sit iners: in his quia inappetentia malam latentem declarat causam famem extinguentem; & quia tunc imperfecte concoquantur ingesta alimenta, quæ morborum Chronicorum causam fovent, fatietas illa in Chronicis mala est censenda.

Fames nimia in morbis non bona.

VII. Ut olfactus & gustus interdum a morbosa causa concitantur, & tunc pro natura materiæ istos sensus excitante bonum & malum signum præbent hisensus, ut odor foetidus sine fetente applicato naribus; sapor salus, dulcis, putridus sine applicatione earum rerum, ita etiam fames ex non naturali causa excitatur in *Bulino* (Exc. 3., XLIII.) & *Cymorexia*, (Exc. 3., XLIV.) denotat morbosam esse, hanc alienam famem excitantem.

In acutis.

VIII. Naturale est in acutis parum comedere, si vero tantam Famem sentit, vigente morbo, ac sentiunt in sanis, talis tamen fames dicitur modum excedere: sed finito morbo acuto, aut in morbis acutis, qui per paroxysmos exacerbantur, bonum est sentire naturalem famem: quia significat, causas famem excitantes naturales intactas esse, sed in tali calu cavendum est a nimia ingestione alimentorum, corpus enim debilius non valet, ut sanum, medicrem quantitatem concoquere, sed permittit, portionem manere crudam, vel abire in spontaneam corruptelam.

In Chroni-  
cicis.

IX. In Chronicis autem morbis melius est, si fames modum excedat, quam si sit deleta: interim non est bonum nimia fame laborare, nam talis non fit ex sanitatis causa, & quoniam nimium quoque solet ingeri, quam id corpus ex ægritudine debile potest superare, corpus morbo & multitudine alimentorum onustum in graviorem solet incidere morbum. Paulo itaque minus, quam in sanis requiritur, est ingerendum, licet fames plura exigit, & interim nimiae famis causa est curanda.

## L I B. II. A P H. V.

30. *Spontaneæ lassitudines morbos denunciant.*

Lassitudo laboriosa.

I. Qui post Labores vel exercitia multa sentit in membris ad movendum ineptitudinem, ita ut, si membra movere conatur, debeat plus virium adhibere, quam antea solebat, atque in ipso motu aliquam molestiam percipiens, dicitur lassus vel defatigatus, illa autem lassitudo sequente quiete & somno iterum evanescit. Talis convenientis laboris magnitudini non recensetur inter morbos, & vocatur *Lassitudo laboriosa*. Qui vero ex minori labore fit lassus, talis dicitur debilis. Lassitudo hæc laboriosa erat præmittenda, ut constaret, quid esset sentiendum de causis Lassitudinem spontaneam inducentibus. Motum membrorum fieri copiosiore spirituum influxu, eoque motu spiritus consumi, colligi potest ex iis, quæ in *Comp. T.* 18. exposuimus. Hac spirituum consumptione nascitur major movendi difficultas, & frequentiore musculi agitatione relinquitur dolor seu molestia in ea parte, quæ utraque somno & quiete satis longa emendantur, regenerantur enim spiritus, & rediguntur humores atque partes firmæ musculorum æquali motu vitali in pristinam sanitatem, nullisque egent medicamentis.

II.

II. Qui vero in suis membris similem difficultatem & ineptitudinem sine laboribus prægressis sentit, is *Lassitudine spontanea* laborare dicitur: est ergo in corpore causa morbosa, ita minuens vel immutans spiritus, ut ad hunc motum peragendum sit defectus vel ineptitudo. Spontanea igitur est, non quia sponte sine causa nascitur, sed quia generatur sine laboribus præcedentibus, qui Lassitudinem in sanis inferunt. Hanc autem spontaneam lassitudinem veteres non sine ratione dividerunt in *Squalentem*, *Laboriosam*, *Ulcerosam*, *Tensivam*, *Phlegmonosam*, ex adiunctis symptomatibus causas Lassitudinis indicantibus.

Lassitude  
spontanea.

III. Qui in membris citra labores prægressos observat Lassitudinem cum cutis colore squalido, hæc signa juncta satis denotant, ex *Cachochymia* vel *Cachexia* hanc generari lassitudinem: atque ita formatur Curatoria indicatio, nos debere anticachecticis hanc discutere Lassitudinem, corpus esse movendum & fricandum. Talis lassitudo mane surgenti solet sentiri major, atque moderato labore levatur, quia id crudum aucto motu solvitur & expellitur, sed somno & quiete magis accumulatur.

Squalens.

IV. Lassitudine autem pressus si ne per momentum quidem in eodem situ manere potest, sed continuo præ anxietate membra hinc inde jactat, uti fit in febre laboriosa, talis lassitudo periculosissima est, nam ex lassitudine constat virium defectus, & ex inquietudine, organa vitalia affici, hominemque anxietate urgeri.

Laboriosa

V. Molesta vero sensatio in membris, quemadmodum in membris ulceribus obsessis, cum lassitudine tunc observatur, quando ex materia purulenta per corpus dispersa generatur lassitudo; sæpe etiam in scorbuto & cachochymia in acrimoniam conversa. Talis ergo lassitudo si sit ex pure, quietem exigit & medicamenta, quæ puris corruptelam inhibent: In chronicis autem Antiscorbutica & Diaphoretica præcipua sunt.

Ulcerosa.

VI. Ex humoris abundantia æque, quam ex diminutis viribus nascitur lassitudo, sed quia copia major non solum inducit lassitudinem: verum etiam impletionem, inde plethorici Lassitudine tensiva laborant, quæ facta naturali vel artificiali evacuatione evanescit: ita unica instituta venæ sectione, vel superveniente alvi fluxu tollitur sæpe vernali tempore lassitudo.

Tensiva.

VII. In febribus acutis, ardentibus, inflammatoriis frequentissime observatur Phlegmonosa Lassitudo, quia aucta circulatione & compacto lentore diminuti sunt spiritus, sed irritamento concitatus motus vitalis non desinit urentem calorem in corpore producere: admodum periculosa hæc est Lassitudo, antiphlogisticis curanda.

Phlegmonosa.

VIII. Omnes species spontaneæ Lassitudinis ex morbosa oriri causa, jam satis constat; ergo non est ambigendum, quid denotat *morbos denunciat*, nempe Lassitudo illa semper oritur ex latente Morbosa causa. Hæc autem phrasis sæpe in futuro sumitur, id est morbum præagitur. Lassitudo enim a quibusdam non accipitur ut morbus, sed ut signum indicans morbum instare; hoc declarant multi, si sine labore corpus sentiunt lassum, ajunt, morbum expecto, nam plus solito sum defatigatus. Hoc non est sine ratione, nam Lassitudo semper indicat minorem agendi potentiam, qua ingesta alimenta nova non satis subiguntur, & quæ sunt evacuanda, retinentur, ipsique boni humores ex laudabili statu recedunt: ita ex his corruptelis inductis per motum infirmiores variis nascuntur morbi. Ut igitur præveniantur morbi, spontanea lassitudo est curanda.

Spontanea  
morbos  
denunciat.

# L I B. II. A P H. VI.

31. **Q**Uicumque aliqua corporis parte dolentes, dolorem fere non sentiunt, his mens agrotat.

I. Quam

Sensus  
huius.

I. **Q**Uam maxime laborant Commentatores in hoc Aph. explicare, quomodo Dolor, qui sensus est molestus, tamen possit dici non sentiri, quia sentire. & non sentire simul constare nequeunt. Sed si verum capimus sensum, facile hæc dictio admitti potest, & non erit contradictoria, nam si pars quædam dolet, & manente causa dolorem ante inferente, pars illa non amplius, a nobis percipitur dolere, vero sensu dicimus, nos non sentire istius partis dolorem.

Sentire  
quid sit.

II. Ita creavit Deus nostrum corpus vivens, eique junxit animam, ut si in organo sensui dicatis, (nam non omnia organa communicant suas mutationes animæ) quædam a rebus externis vel internis inducitur mutatio, anima alicujus mutationis in istis organis redditur conscia. & quandiu durat mirabilis ille nexus inter animam & corpus, atque organum manet integrum, semper omnis mutatio in tali organo facta a mente percipitur: experimenta autem probant, animam agere in nervorum principia, & eorum principiorum mutationes, quæ in encephalo fiunt, immediate percipere; & quia sensuum mutationes a rebus externis fiunt in nervorum extremitatibus, igitur ipsa inducenda finibus nervorum mutatio per nervum vel ejus spiritus, est propaganda ad nervorum principia, seu aliquid aliud per nervum vel spiritus propagatura finibus ad principia, quod productum menti communicatur, ut mens percipiat aliquid fieri in nervorum extremitatibus. Hanc propagationem a finibus nervorum, ope spirituum fieri, qui continentur & fluunt in canaliculis nervorum, alibi (*Comp. T. 16.*) demonstravimus, & quidem hoc modo, fluunt spiritus ex encephalo æquali & continuo fluxu per canaliculos nervosos sensui famulantes; quoties ille liber fluxus retardatur, mutatur, aut turbatur in finibus eorum canaliculorum nervosorum, statim quoque influxus in principia eorum mutatur, quæ mutatio a mente percepta dicitur sentire. A causa autem interna non raro circa medium hujus canaliculi in transfluxu inducitur mutatio, qua in principio hujus canaliculi quoque turbatur spirituum influxus, quia tunc mens eandem mutationem percipit, quam antea percipiebat ex affectione extremitatis, mens errare dicitur, quamvis error non sit in mente, sed in organo, quod afficitur alieno loco.

Dolor  
quid sit.

III. Omnis causa sensum excitans in organo quovis sentiente validius agens nobis ideam doloris præbet, quamvis multi dolores ad solum organum Tactus referant: nam dolent oculi ex nimia luce; aures ex acutiore sono; lingua a nimis sapidis; & nares ab acrioribus odoriferis. Causam excitantem dolorem existimant consistere in tanta fibrarum tensione, qua ruptioni imminet: verum si omnes perscrutemur dolorem inferentes causas, detegimus, eas sistere liberum fluxum spirituum per canaliculos nervosos sensui dicatos, sive fibra nervosa tendatur, ut ita fiat angustior, sive prematur, sive ipsa contrahatur, ut in nimia excitatione & levi combustione, omne impedimentum hujus fluxus æqualis spirituum per sensuum nervos, dolorem inserit: leve autem impedimentum facit sensum, majus Dolorem, & quo impedimentum est majus, eo acrior fit Dolor, donec tandem totus subsistat fluxus, quando etiam subsistit Doloris perceptio: inde in sensum incrementum causa doloris tandem subito omnis extinguitur dolor, tunc nempe, quando impedimentum hujus fluxus eo usque fuit auctum, ut fluxus omnino subsistat. Mens ergo nostra percipiens in principiis nervorum impedimentum influxum, in nervis sensuum Doloris ideam præbet. Hinc, quo partes pluribus nervis ad sensum sunt ditatæ, eo vividior in istis Dolor; quo vero pauciores, eo Dolor obscurior, verbi gratia in ossibus; his autem nervis destituta licet afficiantur ab eisdem causis, in aliis partibus Dolorem intulissent, nullus tamen sentitur Dolor, ut sæpe in pulmonibus & hepate: sed loco Doloris sæpe



sæpe generatur Anxietas, quemadmodum observatur in Doloris metastasi ad interiora viscera minus sentientia.

IV. In Sensibus & Doloribus duo loca simul occupantibus observamus, si unus præ alio sit major, majorem non solum minuire, sed interdum omnino extinguere perceptionem mitioris, imo profundiore cogitatione sensus hebescent. (2) Si nervus sentiens in organo destructus sit, ut in parte quadam sphacelata: ita pars contusione destructa, vel combustione valida exusta non infert Dolorem: & pars antea vehementer Dolens per supervenientem sphacelum extincta, statim desinit dolere. (3) Quia alio in loco hæret Doloris causa, quam ubi mens Dolorem percipit, inde intercepta via communicationis, causa aliter Dolorem inferens nunc nullum Dolorem inducit: ita ligato, abscisso, compresso, vel destructo nervo; tendente ad partem Doloře correptam, statim facit omnis Doloris extinctionem. Tandem (4) quando principia nervorum, quibus mens consentit, ita immutantur, ut ad mentem debita non feratur mutatio, hoc in casu dicitur, mentem aberrare. Potest ergo mens esse incorrupta, & tamen non sentire Dolorem. Ex his igitur constat, nos non ita certos esse, semper mentem ægrotare, si non percipitur Dolor alicujus partis.

Dolorem  
fere non  
sentire.

V. Si vero constet ex signis, necessario in quadam parte Dolorem adesse, vel ex ratione sciamus, Dolorem non potuisse cessare, atque pateat, partem ipsam non esse destructam, aut nervum intermedium compressum vel destructum; his tamen non obstantibus, æger non conquerens de Doloře, demonstrat, vel principia nervorum non communicare menti, vel mentem ipsam ita ægrotare, ut mutationes principii nervorum inductas non animadvertat. In utroque casu a medicis dicitur, mentem ægrotare, nam si vitiatis spiritibus aut perturbatis principii nervorum, quibus consentit anima, aliena percipiuntur, mens tamen, etiamsi esset integra, diceretur ægrotare. An vero semper vitio corporeo, an vero mutatione mentis, an utrique vitiatæ æger non sentiat Dolorem, non est hujus loci amplius perscrutari.

Mens æ-  
grotat.

## L I B. II. A P H. VII.

37. **Q**ua longo tempore extenuantur corpora, lente rescire oportet: qua vero brevi, celeriter.

I. **M**ulti Commentatorum existimant, hunc Aph. absolute poni, minime coherere præcedentibus; contrarium vero statuo, quia nullus est magis conveniens præcedentibus, quam hic: in primo hujus libri Aph. inchoat descriptionem in quovis morbo, nempe Acuto & Chronico; examinavit in his somnium, vigiliam, satietatem, famem, spontaneam lassitudinem, atque dolorem fere non sentire: nunc vero regulam tradere vult de Refectione in maciatis post morbos tam Acutos, quam Chronicos. Nam post morbos Chronicos extenuata corpora præcipit lente rescicienda esse: post Acutos autem brevi. Perscrutemur hujus asserti rationes, ut in refectione macilentorum post morbos certas comparemus regulas.

Nexus.

II. Refectio duplici significatione recipitur a medicis: (1) Corporis vires præcedente morbo debilitatas restaurare, ne corpus ex Debilitate relicta morborum recidivare faciat, vel alium novum morbum producat. Talis Refectio tunc post morbum acutum statim facienda, quare Hipp. alteram Refectionem hic intelligit, quæ sit ingestione alimentorum, ut perperita quantitas in extenuatis post morbum restituatur. Præmonendum est de alimentis ingestis, ea quidem augere humorum quantitatem, sed ut suppleant amissum bonum, illa alimenta actione no-

Refectio  
quid sit.

noſtri corporis ita ſunt mutanda, ut amiſſis bonis ſiant ſimilia : quare ingeſta alimenta in corpore debiliore non ſubeunt hanc bonam huius actionis mutationem, ſed vel manent cruda, ut ingerebantur, vel per corruptelam alimentis propriam, in alienam indolem convertuntur. *Conf. Aphor. 3. x.*

Maciei  
ſpecies &  
cauſæ.

III. Conſtat corpus noſtrum partibus firmis & liquidis; firmæ partes in morbis parum conſumuntur, ſed liquores evacuantur ſæpe copioſe, unde corpus humiditate ea privatum dicitur Aridum. Si vero Pinguedo naturaliter multis partibus firmis interſtrata auferatur, talis corporis extenuatio dicitur *Macies*. In qua varias ſpecies notant Medici, ut ſi quis ex inedia vel improbo labore multum de hic Pinguedine amittat, proprie vocatur *Macies* aut *Corporis Extenuatio*. Qui vero toto corpore extenuatur ſine his præredientibus cauſis, & ſine aliquo viſibili morbo, niſi quod ingeſta alimenta defectu actionis corporis non convertantur in bonam pinguedinem, tales dicuntur *Atrophia* laborare. Similis extenuatio ex quodam membro; vel quod nutriens aſcio deficiat, vel influxus ſanguinis arterioſi in id membrum remoretur, pars illa *Aridura* dicitur correpta. Verum conſumtio totius, corruptione totius mæſæ inducitur, ſive fiat ex Deliquatione; ſive ex pure toti mæſæ miſto, eam vocant *Phthiſin* ſeu *Tabem*; eam autem diſtingunt in *Tabem nervoſam*, ſi fiat ex colliquatione, uti fit in multis Chronicis, & in *Purulentam*, ſi adſit abſceſſus vel ulcus internum: ſi vero ulcus hæreat in Pulmonibus, *Phthiſin veram* vocant. Summam vero Extenuationem, ut corpus ſit inſtar ſceleti pelle teſti, vocant *Marasmiſmum*. Ex his nunc ſpeciebus videndum, quamnam intelligit Hipp. Ex nervo cum præcedentibus conſtat, Hipp. eam intelligere Maciem, quæ vel ex morbo Acuto vel Chronico ſuit nata, remanens poſt morbi curationem, ut nulla alia ſit in eo corpore labeſ morboſa, niſi quod humores, & præprimis pinguedo, conſumpta ſint, quæ ſunt reſtituenda nutrimentis ingeſtis. In hac reſeſtione præcipit, Maciem reliſtam a morbo Acuto eſſe ſupplendam eſſe; ſed poſt morbum Chronicum corpus lente reſeſtendum eſſe. In reliquis autem ſpeciebus hæc regula non procedit, nam manente cauſa Maciem inducente, fruſtra tentamus reſeſtationem; imo obſervamus, quo largius nutriuntur talia corpora, eo ſæpe magis extenuantur.

IV. Qui morbi *Acuti* ſalubri critica evacuatione finiuntur, relinquunt corpus Laſſum ſeu Deſatigatum prægreſſo motu auſto, & Extenuatum expulſis humoribus, ceteroquin id corpus ponitur ſanum: nam aliquod vitium morboſum ſi reliſtum ſuit, abiit morbus Acutus in Chronicum, quando reſeſtationis regula ex natura morbi reliſta eſt petenda, & præceptum hoc ab Hipp. allegatum locum non habet. Tale corpus laſſum brevi tempore recuperat priſtinas vires, ut omnis Laſſitudo inducitur, ſi ejus ſit ablata cauſa, ita ergo valet nova ingeſta alimenta brevi convertere in bonum ſuccum, quo ſuppletur defectus humorum prægreſſo morbo Acuto inductus. Statim autem finito morbo, non ſunt multa ingerenda alimenta, ſed ſenſim eorum eſt augenda copia, cum incremento virium.

Post Chronicos.

V. Alia autem eſt *Chronicis* ratio, hi enim morbi Defectu virium nati, quavis evacuatione materiæ morbi ceſſant, non ſolum relinquunt in partibus firmis laſſitudo, ſed Debilitas quædam, quæ longo tempore eget, antequam ſuperetur itaque multo lentius ſuppediranda ſunt alimenta reſcientia; nam ſi paulo plus ingeris, ſuperantur vires, & ingeſta commutantur in corruptelam. Regula Reſeſtationis erat in Acutis cum augmento virium augere copiam nutrimenti; eadem etiam in Chronicis eſt obſervanda; ſed quia poſt morbos Chronicos lentius recuperantur vires, quam poſt Acutos, lentius quoque erit procedendum in Reſeſtatione; imo in his conducit ſtomachicis & roborantibus adjuvare reſtaurationem virium, & promovere ingeſtorum concoſtionem.

33. **S**I a morbo cibum quis capiens non roboresur, indicat corpus uberiore alimento uti. Si vero cibum non capienti hoc eveniat, evacuatione opus habere, nosse oportet.

**I.** **C**onvalescens ex morbo, ut monuimus, laborat tamen virium aliquo defectu & æquilibrio inter partes firmas & fluentes destructo, ablata nimia quantitate liquoris; ut igitur vires restaurentur, & æquilibrium restituatur, nova erant ingerenda alimenta tanta copia, quæ viribus incrementibus respondebat. Hæc autem comparatio difficillime fieri potest: fames enim major & minor hæc quantitate præprimis definire debet, quæ sæpe sanato morbo non est naturalis, interdum plus exigens, quam corpus subigere valet: imo interdum cessantibus omnibus morborum signis morbifica materia deposita hæret in ventriculo & intestinis, ubi stagnans nova ingesta alimenta corrumpit. Igitur necesse est ad restaurandas vires & restituendum æquilibrium, ut habeamus signa, quibus cognoscimus, num corpus istud nimio utatur alimento, num vero hæreat in primis viis cacochylia expellenda. Ita enim valet medicus moderari Diætam, vel exantlare alienum, ut pristina sanitas recuperetur. Totum hoc statuit Hipp. consistere in observatione virium multum vel parum comedentium.

**II.** Post morbum quemcumque perfecte curatum, relicta debilitate & destructo æquilibrio ex humoris defectu, necesse est ut fames fiat major: quippe ipse nutrimenti defectus est famis causa, & tunc semper etiam in sanis hominibus sentitur. Debilitas non est causa sensum famis impediens, nisi per debilitatem mali fuere nati humores, qui in perfecta sanatione supponuntur non adesse. Ita igitur constitutus homo si tantum ingerit, quantum fames exigit, ingestum omne subigere nequit: fames quidem indicat corpus alimento egere, sed corporis vires non valent tantam ingestam copiam alimentorum commutare in bonum nutrimentum. Quare corpus ex morbo convalescens, etiam si fames urget, non debet tantum ingerere, quantum ingerit corpus sanum, adeoque magis peccat, si plus ingerit, uti satisfaciat fami auctæ: nam id superfluum non solum corrumpetur, verum id simul corrumpet quoque, quod minori copia ingestum fuisset subactum & in nutrimentum conversum. Cui ergo fames reconvalescenti redit, huic parum edenti, seu tantum, quantum viribus debilitatis vinci potest, corpus roborabitur, plus vero comedens debilitabitur. Nam alimenta subacta roborant, eadem autem corrupta debilitant. Ex observatione reconvalescentis bene comedentis non solum cognosco, id corpus a præcedente morbo omnino fuisse depuratum, & non roborari nimia ingestione alimentorum; verum etiam quid sit agendum, quod auctor non præcipit, nam exquisitiore victu comparabitur robur, & si cacochylia interim in primis viis sit collecta, ea expellenda semel leni purgante.

**III.** Cui vero ex morbo convalescenti non redit fames, quæ necessario adesse debebat, ut superius demonstravimus, signum est alienum remansisse humorem in corpore, naturalem sensum famis extinguentem: quod hoc modo sæpe fit. Si morbi materia toti massæ circulantī mista morbum faciens, separata fuit in intestina & ventriculum, ut exoneretur, liberatur quidem corpus a præcedente morbo, sed materia in his locis collecta non solum extinguit appetitum alimentorum, verum etiam nova ingesta alimenta huic materię mista, in alienam nutritioni ineptam convertuntur. Cui ergo fames a morbo convalescenti non redit, signum est in primis viis morbosam collectam hære materiem. Pro *Cibum capiente* intellego famem, pro *Cibum non capiente* inappetentiam: nam id manifestissime patet

Post morbum multum comedent si non roboratur.

Non roborari in cibum capiente.

38 *MEDICINA HIPPOCRATICA* *Aph. 33.*  
 tet ex sensu hujus aphorismi; nemo enim ex morbo reconvalescens sine cibo sumto roborari potest, hoc quoque scivit Hipp. Quare si loco dictorum intelligatur fames & inappetentia, verus est hujus aphorismi sensus.

In inappetentia reliqua indicatur evacuatio.

IV. Præcipit Hipp. in cibo non capiente post morbum si non roboretur corpus, Evacuationem esse faciendam, sed qualem vult evacuationem, non determinat. Existimo autem facile determinari posse ex superius allatis rationibus; nam in his non redit fames, quia in primis viis collecta hæret Cacoehymia; igitur talis est facienda evacuatio, quæ hanc cacoehymiam evacuat, ut est purgans vel vomitorium. Eligerem purgans, quoniam tunc via ab ore usque ad anum expurgatur, & quia hujus operatio mitior magis conveniens est corpori debilitato, & quia naturalis est via pro excrementis ejiciendis. Vomitorium est vehementius, in veram faciens evacuationem, neque totam hanc viam evacuat. Nullam hic de Sudoriferis aut Diureticis facio mentionem, quæ aliena ex tota massa circulatoria eliminant, nam: quandiu his humoribus mista est morbi materia, morbus non est finitus.

## L I B. II. A P H. IX.

34. *Corpora ubi quis purgare voluerit, facile fluentia reddere oportet.*

Divisio.

I. Duplici sensu hic Aph. accipi potest; vel ut respiciat ad præcedentem aph. si corpus non roboretur in eo qui cibum non capit, cum facienda sit evacuatio; vel ut sit generalis regula in quovis morbo, si sit evacuandum. Utrumque examinaturi sumus, quando constat, quid sit intelligendum per *fluentia reddere oportet*.

Preparatio.

II. In Liquoribus vasis coercitis nullus est motus ad evacuandum:urgens, si excipias motum intestinum & gravitatem liquoribus propriam; sed ut contentus liquor expellatur, a partibus firmis est protrudendus; verum: tenacitas in liquoris partibus & cum partibus firmis, quibus adhærent, impedimentum est expulsionis: atque liquores ducendi per canaliculos minimos, ut sit in excretionibus corporis nostri, exigunt aliquam convenientiam (*Aph. 2. XII.*) ut non quilibet humor per quodlibet Emunctorium possit duci. Fluentia tunc ergo redduntur evacuanda, si destruaturs illa major tenacitas, & adaptetur alienus humor ad hanc vel illam Evacuationem, qualis mutatio medicamentis vel aliis auxiliis inducta hodie dicitur *Preparatio*.

Preparatio in convalescentibus.

III. Qui ex morbi materia toti massa ægrotat, tunc demum convalescit, si materia ea sit subacta; sed si simul evacuaturs, perfecta sequitur curatio; verum: retenta, vel alicubi deposita, videtur convalescere æger, sed vel recidivam patitur, vel in alium morbum, corrupta stagnante materia, relabitur. Imperfectam hanc curationem cognoscimus, si corpus cum inappetentia manet debile, ut in præcedente Aph. notavit Hipp. Sed in tali casu, quia materia evacuationi est apta, verum: retenta, magis conducit statim moliri evacuationem, quam præmittere præparantia, nam vitium non est in concoctione, sed expulsionis. Sin: vero post longiorem moram concrevit humor, fieri potest ut humor evacuandus: præparandus sit. Hanc itaque regulam ad generalem curationem mallem, quam ad specialem convalescentium referre, quia sæpe sine prævia præparatione difficile sequitur evacuatio.

In Acutis.

IV. Materia autem Morborum acutorum, ut est Lentor, evacuationi est inaptæ; aut si extruditur, morbum exasperat: ita per moventia in acutorum principio si materia quædam expellitur, ipsa evacuatio morbum auget binis rationibus: nam lentor eo majore motu: magis compingitur, & ex bonis humoribus novus generatur; ipsa etiam educio recrudescere facit morbum, uti experiantur, qui apople.

sterna ante maturitatem aperiunt, quia forsitan inchoata coctio in reliqua massa cruda præparationem promouet, ut fermentum integram massam panis in fermentationem citiorem conducit, & adjecto putrefacta reliquorum putredo acceleratur. Obstare autem videtur venæ sectio educens materiem in morbi principio; quæ promouet morbi acuti solutionem: at longe abest, venæ sectionem materiem inflammatoriam evacuari, bonum enim educit sanguinem, qualis tunc est in toto corpore majore motu acutorum compactus, ut evacuatione hac nimius ille motus pervertens lentoris præparationem temperetur. Hinc sanguinis missiones & hæmorrhagiæ præcipua sunt præparantia in acutis, cum frequentius motu aucto quam minuto impediatur lentoris concoctio. Itaque præparantia in acutis sunt præprimis illa auxilia, inter quæ quoque sanguinis missio & refrigerans alui ductio est numeranda, quæ motum circulatorium temperant, ut Lentor commutetur vel in materiem criticam vel purulentam. Hæc auxilia tandiu sunt adhibenda, donec Lentor hanc mutationem induerit, antequam ipsius materie est tentanda evacuatio. Interdum ob majus imminens malum ante maturitatem evacuatio est facienda, ut si tumor inflammatorius ad interiora minetur ruptionem, satius est protrahere hac evacuatione morbum, quam permittere, ut ruptione ad interiora æger pereat.

V. Eandem hanc regulam Præparationis in morbis Chronicis fere omnes prælici strictissime servant, ut non audeant cortice peruviano vel alio antidoto abigere febrem intermittentem, nisi præcesserit præparans; semperque antequam moliantur aliquam evacuationem, præmittunt aliquod præparans. Sed morborum Chronicorum longe alia est ratio quam Acutorum, quia varia sunt Chronicorum genera, quæ non omnia præparationem exigunt, ut sunt omnes morbi ab humore tenui provenientes; sed qui visciditatem adjunctam habent; ejus solutio loco præparationis præcedere debet, ut eo commodior fiat istius humoris evacuatio. Omnes etiam morbi firmatum partium, uti laxitas, rigiditas, humiditas, siccitas, sine prægresso præparante statim curandi sunt. Quare præparationis regulam magis generalem in Acutis statuo quam Chronicis.

VI. Purgare late significat omnem depurationem, qua aliena superantur a bonis & auferuntur, quare in medicina denotat sæpe omnem evacuationem alienorum humorum e corpore: ut plurimum autem proprie denotat evacuationem per alvum, in quo sensu hic ab Hipp. videtur accipi. Videndum igitur, qualis præparatio tam in Acutis quam Chronicis præcedere debet, antequam exhibetur purgans. In morbo Acuto correptis omnes medici statim sine ullo præparante præmisso exhibent purgans; in Chronicis etiam a purgante dato initium curationis multi inchoant: videtur ergo contra hanc regulam Hippocratis peccare, in qua præcipit, ubi quis purgare volueris, facile fluentia reddere oportet. Verum qui inde intelligunt semper præmittenda esse solventia, non intelligunt sensum: quippe si contenta intestinorum satis fluentia sint, non est opus solventia præmittere; si vero in intestinis hærent crassa & tenacia, quæ difficulter educi possunt, necesse est tenacia hæc primo solvere, & dein educere. Hoc etiam hodie in praxi verum est. Quare hoc modo hic Aph. intelligi potest. Si alvus ducenda sit, est attendendum, num contenta sint crassa & tenacia, num vero facile mobilia; quod si tenacia sint, præmitti debet solvens, ut commodior non solum, sed & perfectior fiat contentorum evacuatio.

Præparatio ad alvi ductiōnem.

## L I B. II. A P H. X.

35. *Impura corpora, quo magis nutriveris, eo magis lades.*

I. **S**ensus hujus absolute in omnibus potest accipi morbis, quando tradit regulam victus in omni corpore impuro, ut debeamus minorem alimentorum copiam dare impuritatibus laborantibus. Vel restringitur ad præcedentem (33) in Convalescentibus ex morbis, si cibum capiens non roboretur, nos tunc non debere copiosiore ingestione alimentorum onerare corpus. Utrumque examinaturi.

Impuritas  
quid sit.

II. Antequam aliquid certi statuere possumus de nutritione in Corporibus impuris, constare debet inter Medicos quid sit intelligendum per Impuritatem: de qua hic agit Auctor, nam multæ sunt impuritates quæ neque indicant, neque verant nutritionem, uti sunt externæ corporis vel ulceris sorditates, tam ex morbis quam neglectu depurationis. (1) quæ corpora valetudinaria solum ingestum cibum convertere nequeunt in bonos humores, qui cibis dein longiore mora corruptus & non evacuatus, vel in primis viis hæret, vel circulantibus esse permixtus, ea corpora tali succo onusta dicuntur impura. (2) Quæ corpora sana nimia copia alimentorum onusta non valent cuncta subigere & expellere, tandem multitudine corruptorum oppressa & infecta etiam dicuntur Impura. (3) Si morbi materia ex præcedente morbo facta non expellatur, sed intricata maneat aliis bonis liquoribus, vel alicubi detineatur, ita ut antecedens morbus videatur omnino curatus, sed homo tamen ad perfectam sanitatem non redeat ob alienam retentam materiem; talia corpora etiam dicuntur impura. (4) Denique humores actione nostri corporis inutiles facti, partesque firmæ detritæ, quæ per emundatoria naturalia debebant evacuari, in corpore retenta, ut sæpe fit, impedita perspiratione, ea faciunt quoque corpus impurum.

Nutrire  
quid demon-  
strat.

III. Videndum nunc est, an talia corpora sint nutrienda. Hipp. dicit, *quomagis talia corpora nutritur, eo magis læles*. Nutrire proprie significat per ingesta alimenta id restituere, quod inevitabili vitæ actione fuit deperditum: si hoc sensu hic reciperetur nutritio, absurdum foret, interdiceretur nutritionem, cum vitæ actione semper quedam pereant, quæ sunt restauranda. Sed per *nutrire*, uti in hoc loco, solam sæpe intelligunt alimentorum paulo copiosiore ingestionem. Hunc nutritionem non sine ratione interdicit Hipp. nam ut ingesta alimenta nutrant, corporis actione in nutrimentum sunt convertenda, quod difficilius fit in corporibus impuris, ut statim videbimus.

Impura  
corpora  
non nu-  
trienda.

IV. Vis vitæ valens omnem morbi materiem subigit & expellit; ea vero retinetur in corpore vel deficientibus viribus, vel obstinata resistantia materiæ, ne tamen homo defectu nutrimenti pereat, aliquid est porrigendum, de qua exhibitione superius multis locis; sed hoc tempore cavendum esse præcipit, ne alimentorum multitudine ægri collapsas vires conemur resocillare, corpusque emaciatum ex præcedente morbo saginare, non sortiemur bonum effectum, cum ingesta illa copiosiora alimenta non convertentur in bonum nutrimentum corporis nostri, quo fiet refectio virium & corporis splendor, sed in corruptelam, qua corpus magis debilitabitur & potius emaciabitur. Corpus enim impurum manens ex virium defectu, vix valens modicam cibi quantitatem in bonum convertere succum, multitudine obrutum succumbet, permittereque, ut non solum suppressis viribus boni humores etiam corrumpantur; sed etiam ingesta, per insitam spontaneam mutationem in loco calido, convertantur in succum nobis alienum; ita ut ea, quæ nutritioni erant destinata, præbeant novam morbi materiem. Quod vero corpus manet impurum per obstinatam materiæ morbi resistantiam, eadem hæc materia ingestis mista tanquam fermentum malignum, alimenta in alienam indolem nutritivi ineptam convertit. Quare corpora ea modica copia cibi sunt sustentanda, minime vero majore quantitate opprimenda.

## LIB. II. A P H. XI.

36. **F**acilius est replere potu quam cibo.

I. Aphorismus hic potest vel absolute poni, adstruens corpus tam in sanitate quam morbo facilius impleri posse potu quam cibo: vel restringi ad Resectionem corporis ex præcedente morbo debilitati. De curatione enim eorum jam ante (Aph. 32.) incepit agere, quæ ex morbo erant relicta, in qua præceperat Resectionem (Aph. 32.) Evacuacionem (Aph. 33.) Preparationem istius evacuacionis, atque in præcedente (Aph. 35.) nutritionem: in hoc nunc appositè agere potest, num nutrire debeat. Medicus Potu vel Cibo. Potest ergo hic Aphorismus duplici modo exponi, vel ut regula generalis, vel specialis. Quoniam in sensu hic ab Hipp. sumitur, non curò, quia scopus non est sensum auctoris interpretari, sed propositas sententias explicare, ut Aphorismi nobis duntaxat agendi normam præbeant.

II. Veteres existimarunt tres distinctas partes esse nutriendas, firmas nempe, liquidas, & spiritus, inde cibus solidus, potio, & vapor has tres diversas nutrent: verum non cogitabant non admodum magnam inter corpora & fluentia interesse differentiam, cum Caro in gelatinam vel jus coctione conversa, & lac coagulando concretum cibi nomine veniens, propterea non nutrent differentes partes, sed fluentes & firmas partes eodem cibo sive fluido firmo nutrir: imo vapor ab his non differt, quia est humidum solum aëri mistum. Præter dictos modos tres, addi potest applicatio in forma episthematis, atque injectio ope chymatis. De duobus his posterioribus quam maxime litigant multi existimantes nihil corpori communicari posse quod non intrat per vasa lactea, & quia ex eute & intestinis crassioribus statuant nulla oriri vasa lactea, contendunt his viis alimentum communicari non posse. Verum, ex his partibus per vasa absorbentia deferentia receptum, liquorem, tandem in venas cruentas recipitur, quod alio loco fusius est exponendum.

III. Facilius repletio in sanis his modis accipi potest. (1) Facilius fit impletio, quia potio sine prævia manducatione degluti potest. (2) Facilius quoque quoniam minimo tempore impleri potest ventriculus potione, sed longius tempus exigit, antequam impleatur cibo solido. (3) Quoniam alimenta in forma liquidi regulariter minore egent actione corporis, ut convertantur in nostros humores nutriendos.

IV. Si Repletio respiciat ad præcedentes aphorismos, idem significat quam Resectio. Qui igitur ex præcedente morbo sunt emaciati & debiles, hi facilius ingestio potu quam cibo refocillantur. (1) Nulla alimenta nutriunt nisi in fluxum sint redacta, aliter enim non possunt ingredi lactea vasa, quæ igitur ingeruntur liquida, non egent organorum chylopoieticorum actione, ea in fluxum redigente, sed statim prompta sunt, adeoque facilius tradi possunt corpori totum. (2) Ex morbo convalescentes plerumque oris siccitate & inappetentia laborant, quibus cibi solidi deglutitio redditur molesta, & interdum impossibilis, dum tamen admittunt potionis ingestionem: si vero accedit sitis, quod sæpe fit, avidissime potum ingerunt. (3) Solet quoque ad cibum subigendum major requiri corporis actio; quæ in convalescentibus parva est, quam ad commutandum potum; inde conducit in his resectionem facere alimento liquido & tenui, donec corpus recuperatis viribus magis sit firmatum, cibum solidum subigere valens. Inde etiam infantes solis potionibus sustentantur, denique sensim ad cibum solidiorem veniunt.

LIB.

## LIB. II. APH. XII.

37. *Quæ in morbis post crisin relinquuntur, Recidivas facere solent.*

I. *D*uo in hoc Aph. sunt examinanda, (1) quid sit Recidiva; (2) quomodo ea generari possit ab iis, quæ in morbis post Crisin relinquuntur.

*Recidiva.* II. Non omnis reditus in morbis a Medicis vocatur *Recidiva*, quare a ceteris congeneribus rite deernenda. (1) Requiritur ut redeat morbus priori similis, nam si post morbum sanatum alius nascitur, vocatur morbi Mutatio seu Transitus in alium morbum, ita morbi acuti sæpe transeunt in chronicos: talis Transitus si morbo est naturalis, & frequens, etiam dicitur morbi Exitus, ita abit inflammatio in abscessum, Sphacelum, & Scierhum; Transitus in sanitatem & mortem dicitur etiam morbi Exitus. (2) Ut totus morbus vel integre vel fere desinat, antequam sequens novus priori similis incipiat, nam citius inchoans sævire, Recrudescencia aut morbi Exacerbatio vocatur. (3) Ut reditus non sit ex morbi natura, inveniuntur enim morbi, qui ex propria sua natura per Exacerbationes, id est Paroxysmos totam periodum absolunt, talis autem reditus nunquam vocatur Recidiva, sed Paroxysmus: si vero ille morbus, qui vocatur intermittens, non amplius suis temporibus paroxysmum concitat, sed deinceps post aliquod tempus, talis reditus vocatur Recidiva; ut si quartana intermittens v. g. per quatuordecim dies nullum paroxysmum faciat, dein vero rediens dicitur quartanam Recidivare. (*Conf. Comp. T. 53. xvii.*)

*Recidiva duplex.*

III. Duplici modo fieri potest recidiva. (1) Si morbi materia ita fuit subacta, ut morbus lateat, verum si materia non omnino sit extincta vel expulsa, quæ dein adolefcens morbum priori similem profert, ut in nephritide & ictero a calculo, veneren lue, febre quartana, totus morbus plane evanescere videtur, sed ex latente causa deinceps recrudescit. (2) Si morbi materia omnino sit expulsa vel subacta, verum relinquatur ea causa quæ priorum morbum regenerare potest; quemadmodum in Hydropis curatione si relinquitur debilitas, sensim novum hydropem generans; in Cacochymia per Intemperantiam nata si curata fuit, homo in eadem intemperantia pergens Cacochymiam recidivare facit. Prius genus hic vult Hipp. nam dicit Recidivas fieri ab iis, quæ post crisin a morbis relinquuntur, ergo a materia præcedentis morbi non satis subacta vel expulsa.

*Quæ post crisin relinquuntur.*

IV. Per Crisin intelligi morbi commotionem, aut ipsam evacuationem, superius, (*Aph. 20. 14.*) notavimus, utroque sensu hic accipi potest; nam si perturbatione Critica præcesserit sine subsequente evacuatione, relicta morbi materia Recidivam facere potest: atque ipsa facta evacuatio, modo sit imperfecta, relinquens aliquam portionem de materia præcedentis morbi, etiam Recidivam producere valet: uterque hic modus a medicis vocatur Crisis imperfecta. Non sine ratione dicit Auctor, *Recidivas facere solent*, nam ea materia relicta non solum Recidivas facit, sed & materia commutata non raro degenerat in alium morbum, imo interdum interimit; vel ad quædam loca depulsa parit metastasin. Quare ex iis, quæ post crisin relinquuntur prædicimus Recidivam, verum etiam Transitus in alium morbum, mortem, & metastasin.

*Recidiva prædictio post imperfectam crisin.*

V. Ut itaque ex arte prædicatur Recidiva ex iis, quæ post Crisin relinquuntur, sciendum est (1). Nobis proponi morbum, qui crisis finitur, cum non omnes morbi per Crisin terminantur. (2) Illa Crisis debuit esse Imperfecta, quia post Crisin perfectam (*Apb. 20. viii.*) nunquam sit Recidiva. (3) Remanere signa, quæ declarant, materiem retentam potius resuscitare Recidivam quam metastasin, vel aliam mutationem morbi (*Conf. Comp. T. 53. xx.*) Signa hæc

gra



graphice depinxit Hipp. a, 444. ( „ Recidivæ sunt in his, quibus febribus desinentibus vigiliae fortes accedunt, aut somni turbulenti, aut corporis robur, aut dolor uniuscujusque membri; Et quibus febres sedantur, neque signis solutoriiis contingensibus, neque in judicatoriis diebus: Et si deficiente febre, Et sudore accedente, urinam fulvæ minxerint, albam subsidentiam habentem, his febres recidivæ eadem die expectæ. Hæ vero recidivæ quinto die judicantur extra periculum. Et si ex judicatione facta urinam rubicundam, rubram subsidentiam habentem minxerint, etiam his recidivæ febris fit eadem die, Et pauci ex hac servantur. Quum recidis febris ardens, plerumque etiam exudat. Et si revertens tot diebus desineat quot prius, etiam tertio recidivat, si non impari die dimiserit reversa. Plerumque fit cruda sive urina, & alia signa non secundum rationem eveniant, morbus in die judicatoria recidivat. Quandoque etiam revertitur in die judicatoria, his talibus relictis. ” ) Quibus si addantur signa Recidivæ præsentia ex urina ( Comp. T. 36. lvi. 29. ) admodum certa habetur Recidivæ prædictio ex iis, quæ in morbis post Crisim relinquuntur.

## L I B. II. A P H. XIII.

38. **Q**uibus Crisis fit, bis nox ante exacerbationem gravis est. Subsequens vero levior plerumque.

**N**Um quædam in morbis post Crisim relinquuntur, quæ Recidivæ facere solent, hic aphorismus definit, perfecta enim Crisis (Aph. 20. viii.) nihil relinquit, sed imperfecta semper aliquid, vel omnem materiem; utrisque antecedit nox gravis, sed post perfectam Crisim nox sequens levior; post imperfectam vero nox gravior. Hoc loco Hippocratem per Crisim intelligere ipsam evacuationem, minime vero perturbationem criticam, facile colligitur, quia per noctem ante paroxysmum gravem perturbatione critica intelligitur, quod augmentum morbi indicat instare Crisim, quæ si bona fiat & perfecta, faciet subsequentem noctem quietiorem; si vero imperfecta fuerit, sequens nox etiam erit gravis, quoniam corpus a materia morbi non fuit liberatum.

II. Istud tempus in morbis dicitur grave seu molestum, in quo symptomata morbi sunt vehementiora & plura, quam antea: instante Crisi necesse est symptomata augeri, & interdum alia accedere; nam in morbi statu solo fit Crisis. Quippe vis vitæ instigata a morbi acuti materia sensim majorem facit motum, quod verum est in omni irritatione, donec tandem vel hoc motu subigatur & expellatur causa irritans, vel motus se ipsum destruat, partemque destruat; & motus vitalis extinguatur: si alienum irritans subigatur vel expellatur, brevi post sedatio fit motus: sed si vis vitæ extinguatur, partemque spiritale scatur post validum motum, cessant quoque symptomata ex majore motu nata, sed nascuntur alia, quæ dicuntur maligna, etiam si videantur mitiora: sed si neque materies morbi vincatur aut expellatur, neque vis vitæ destruat, post pugnam aliena relinquuntur symptomata. Post hunc consilium ergo si nulla fiat evacuatio, aut metastasis, nox sequens manet gravis, quia morbi materia irritans fuit relicta: si vero sequitur evacuatio, hæc si educit morbi materiem, nox sequens levior; si autem alius evacuator humores faciens symptomaticam evacuationem, sequens nox iterum gravis est, quoniam corpus a morbi materia non est liberatum. Qualia vero symptomata hac nocte conspiciuntur, quæ noctem graviorem facient, determinari nequit, etiam si illa a prædictis annumerantur: nam prout varia instat Crisis (Comp. T. 53. xlv.) vel morbus terminatur in Abcessum, vel in aliquam Metastasin (Comp. T. 48. xvi.) symptomata differunt. Hæc quia quoque turbant

fo.

Nox gravis ante crisin.

64 MEDICINA HIPPOCRATICA Aph. 38.  
fomnum, qui nocte fieri debet, non sine ratione dicit Hipp. hoc ante exacerbationem gravis est, atque regulariter nocte solent graviores observari symptomata, quam de die.

## LIB. II. APH. XIV.

39. **I**N alvi profluvio mutationes excrementorum juvant, nisi in prava mutantur.

**I.** Quoniam post crifum descriptionem statim hunc Aph. de alvi profluvio ponit, potest itaque hoc alvi profluvium tanquam critica evacuatio capi. Sed si hic Aphor. non cohaereat praecedentibus, absolute sententia est exponenda de mutatione excrementorum in alvi profluvio. Utrumque futurus examinaturi.

**II.** Critica tam bona quam mala alvi dejectio observatur a praecis in morbo acuto (Comp. T. 90. cxiii.) & febre (Comp. T. 90. cxxix.) At raro Morbus acutus vel febris legitima per alvum deponit morbi materiem, cum intestina non sunt creata ad impuritates totius corporis eliminandas, in statu enim sano inutilia facta in ventriculo & intestinis, atque recrementa assumptorum hac via eliminantur; reliquae autem impuritates in circulantibus natæ, vel per renes, vel per cutem a communi massa segregantur & eliminantur; quare non est via regia ad eliminanda aliena toti massae mista alvus. Si vero inde confluent humores morbofi, colligationis signum est, quod humores soluti labe morbofa, non vero cocti & organici excretoris adaptati, in intestina conflant, & ita exonerentur. Hinc tam pauca a Praecis recensentur signa criticum alvi fluxum praesagientia (Comp. T. 53. xlv.) Quibus vero febris vel morbus acutus concitatur ex cacochymia harente in intestinis, mesenterio, & hepate, aut in quibus morbis acutis haec simul adest materia, his critica alvi perturbatio potest fieri, auferens alienum illum humorem: nam non solum ex intestinorum cavo evacuari potest humor alienus ibidem collectus; sed & alienus in vena portarum coarctatus, ad Hepar delatus; per duclum choledochum in duodenum exonerari potest: quare morbi acuti a bile corrupta vel materia melancholica alvi profluvio non raro tolluntur. In hujusmodi critica alvi evacuatione Excrementorum mutationes sunt observandæ. Nam dum corruptus talis humor deponitur, Alvi Excrementa admodum varia sunt; verum tandem naturalia & magis compacta prodire debent, quibus designatur, omnem eam materiem ablatam esse: si vero continuatur talis evacuatio malorum, malum est signum, quia denotat fontem esse perpetuum, ut fit, si istis in locis per putredinem continuo suppeditatur novus morbosus & alienus humor: adhuc pejus est, si Excrementa sensim deteriora evacuantur, nam in augmento putredinis aut corruptelæ sensim magis a sanis distantia excrementa ejiciuntur. Non parum ergo allucinantur multi, expectantes solutionem ex pravorum continuata vel aucta dejectione, cum tandem reliqui boni humores hac corruptela commutati eliminantur.

**III.** Si alvi copiosior egestio, ut in Diarrhoea (Comp. T. 90. lxxxiii.) Lienteria (Comp. T. 90. xxviii.) Dysenteria (Comp. T. 90. cxxv.) Cholera (Comp. T. 90. xli.) Fluxu hepatico (Comp. T. 90. c.) Excrementa diu similia ejiciuntur, malum est signum. Quippe ab assumptis alimentis non potest tanta suppeditari copia excrementorum, ut semper similia maneant; quin ipsa alimenta, quæ lactea intrare debebant, egerantur, ut in Lienteria conducti vero in hoc morbo excrementa mutari in naturalia, ut constet, chylum intrare lactea vasa; si vero loco chyli emittantur humores corrupti, id est si in prava commutantur,

id

In alvi  
profluvio  
morbofo.

id malum signum præbet, nam talis dejectio non emittit, quod retinendum erat, sed insuper designat chylum corrumpi: melius autem est, ut bonus evacuetur humor, qui potest inducere debilitatem & defectum humorum, quam ut bonus ille humor primo corrumpatur, & dein educatur, quia talis evacuatio non solum diæta quoque infert mala, sed insuper designat corruptionem, & facit corruptus ille humor, ut ceteri liquores, qui boni mansissent, hac corruptela inquinentur, & ad vitam sustentandam inepti fiant. Nec minus valet in ceteris morboſis alvi dejectionibus obſervare Excrementorum mutationes. Sensim debent ad consistentiam, colorem, & odorem naturalem redire, ut promittatur sanitas, ita enim constat, minui in corpore morbi materiem. Si vero morboſa continuantur emitti, certum est, fomitem esse intus continuo suppeditantem, vel bonos humores ad intestina delatos corrumpi & egeri, qualis evacuatio nunquam est critica. In prava vero mutari, eo pejus est, quia quo morbus fit major, quo corruptelaque magis intenditur, eo praviora generantur, & emittuntur. Qui vero ex pravis dejectis bonam proferunt prognosin, non parum decipiunt ægros, quoniam signum est augeri corruptelam, bonosque humores etiam corrumpi.

## L I B. II. A P H. XV.

40. **U**bi fauces ægrotant, aut tubercula in corpore exoriuntur, excretiones inspicere oportet: si enim bilioſæ fuerint, corpus una ægrotat: si vero similes sanis fiant, tutum est corpus nutrire.

I. **D**E Excretionum inspectione in faucium morbis & tuberculis per corpus obortis hic agit Auſtor, ut sciamus num illi morbi sint particulares ex vitio istius partis, num vero totum corpus una ægrotet, ut sciamus, tutum an sit corpus nutrire, vel medicamenta sint adhibenda. Faucium autem morbi & Tubercula corporis duplici modo accipi possunt, vel ut morbi ipsi particulares, vel ut metastases. Excretiones hic accipi possunt, vel pro sola alvi egestionem, quia de ea in præcedente Aphorismo egit, vel simul hic intelligi potest urinæ inspectio.

II. Faucium morbi difficilem deglutitionem aut respirationem facientes speciali nomine Anginæ vocantur, sed si illa symptomata non adsunt, vel non admodum difficilis habetur deglutitio cum libera respiratione, uti in parotidibus, atque tonsillarum, vel palati mobilis, vel uvulæ tumore, generali nomine hi morbi dicuntur ab Hipp. si fauces ægrotant. Pharynx est in textu, quo nomine intelligit totam partem posteriorem oris, quæ oculis conspici potest hiante ore & radice lingue depressa; hodie vero solum caput œsophagi vocatur Pharynx, & per fauces, plures adjacentes partes intelligunt. Hæ fauces si vitio organico corripiantur, uti reliqui morbi particulares, sana relinquunt excrementa, & urina quoque inde non mutatur; nutrire ergo licet, si deglutitio fieri possit, quia intus omnia sana bene subigunt alimenta. Sed si bilis corrupta hæret in ventriculo, illa eructans fauces comburit, tunc vero ex bile simul exeunte excrementa sunt bilioſa: in hoc casu magis a cibo abstinendum, quia bilis corrupta nova ingesta corrumpet, quare ab alimentis assumtis non generabitur corpori nostro nutritivus humor, sed morboſus, qui morbum augebit, vel novum insuper pariet. (Conf. Comp. T. 90. XLIX.)

In faucium morbis bilioſæ alvi excrementa.

III. Morbi autem faucium ex generali causa duplici modo generantur. (1) Si morbus generalis vehementissima sua symptomata in faucibus exerceat, quemadmodum Inflammatio, Erysipelas, Hydrops: tunc tota massa simili morbo infecta reddit urinam morbo convenientem. Ex his eligit urinam bilioſam, id est quæ intensiore flavum colorem habet, (Comp. T. 35., XIII. ad XVIII.) nam in tali urina etiam non adessent morbi faucium, non esset licitum nutrire, cum

Bilioſa urina.

morbi Inflammatorii, Erysipelatosi, Putridi, & Icterus, plura alimenta vetant. (2) Morbi faucium ex Metastasi, ut sunt Parotides (*Comp. T. 48., XVI.*) indicant corpus ab omni morbi materia non esse liberatum; si tunc redditur urina biliosa, summam cruditatem arguit, in qua non est licitum nutrire.

In corporis tuberculis, alvi Excrementa biliosa. Urina biliosa.

IV. Alvi Excrementa biliosa indicantia, bilem corruptam esse in primis viis, largiorem nutritionem vetant, siue Phymata adsint vel non adsint: eo magis quia verisimile tunc est Phymata, siue pustulæ sint parvæ, siue tubercula majora, ut furunculi, ex bile acri per corpus dispersa generari.

V. Talia autem Tubercula nata ex bile corrupta per totum corpus dispersa, vel ex alia materia flavescente, ut est pinguedo colloquata, vel pus in ichorem conversa, ex quibus redditur urina quoque biliosa, omnino non convenit nutrire corpus. Nam excretionem illæ morbosæ designant, totam massam circulantem materia corrupta infectam esse, cum tales evacuationes ex communi massa depromantur.

Vetant nutrire.

VI. Quando tale corpus nutritur, malum est, quia assumata alimenta priusquam in sanguinem veniant, a cacochymia in intestinis, cui admiscuntur ingesta alimenta, ita invertuntur, ut omnino laudabilem naturam suam exuant, vel per alienos admistos humores impediuntur in bonum chylum converti. Ita igitur cruda vel & corrupta cum chylo in sanguinem delata multorum etiam aliorum morborum causæ sunt. Ergo non conducit, his signis in alvi excrementis apparentibus, nutrire corpus. Neque prodesse potest, si bilis corruptæ signa in urina apparent; licet bonus chylus tradatur sanguini, corrupta bile infecto, ad ulteriorem perfectionem perducere nequit, quia a bile corrupta laudabilis coctio invertitur.

Quando nutrire licet.

VII. Si vero tam ex alvi excrementis, quam ex urina constet, primas vias non scateri corruptis humoribus, atque ex urina sana massam sanguinis puram esse, etiam si tubercula adsint, vel fauces ægrotent, nulla est manifesta causa, quæ nutritionem vetat: nam morbi illi non sunt nati ex vitio generali, cui alimenta admiscuntur, sed quia pars illa morbum in se fecit, reliquum autem corpus purum nutrirî debet, ut vires valeant, quæ requiruntur ad morbi particularis subtractionem. Præterea morbi particulares diuturniores esse solent, quam ut possent tam diu ferre inediam æger, donec morbus ille curatus sit.

VIII. Regula hæc specialis, magis generalis potest accipi, quia signa in excrementis, ex quibus deduximus, num tutum vel non tutum esset nutrire, non deducta sunt ex faucium ægritudine vel tuberculis, sed quoniam morbus alicujus partis, si designat totam massam infectam, vetat nutritionem, sed aliter permittit. Hinc inferri potest eadem regula de omnibus morbis particularibus ad dirigendam dietam. Ex eadem quoque doctrina patet, frustra sæpe examinari ad erudendas morborum particularium causas excrementa; quia sæpe sana prodeunt, etiam si corpus laboret particulari morbo.

## L I B. II. A P H. XVI.

41. **U**bi fames, non oportet laborare.

I. **U**t hujus constet veritas, examinandum (1) quid faciat Labor. (2) Qualis fames hic sit intelligenda. (3) Denique quam ob rem non sit laborandum, ubi fames.

Labor quid faciat.

II. Ut ut corporis Exercitium moderatum saluberrimum habeatur ab omnibus, invenitur tamen tempus, in quo hoc saluberrimum ceteroquin damnum inferre potest. Constat omnibus, Exercitium peragi motu musculorum, qui voluntari obtemperant; ad quem peragendum requiritur spirituum influxus, qui hac actione consumuntur: si ergo eodem hoc motu in nobis non fieret humorum restauratio

&

& cœlio, corpus necessario magis debilitaretur consumptione spirituum per moderatum etiam motum muscularem, quam si quiesceret. Sed si in nobis habentur humores crudi maiore motu ad perfectionem deducendi, quia Exercitio fit motus maior, maior proventus spirituum ex crudo succo habetur, quam dispendium spirituum per hunc moderatum motum, & inde sæpe corpora moderato motu reficiuntur & robustiora sunt. Idem alimenta assumpta in chylum conversa, circulantibus, mista, solo motu vitali minus debito assimilantur, verum accedente motu animali ad perfectiorem concoctionem rediguntur. Quare præstantissimum est, ut assimuletur chylus, exercere corpus; maior enim bonorum humorum habetur proventus ex eo motu musculari, quam ex eodem habetur dispendium bonorum & spirituum; atque corpus perfectius liberatur ab inutili humore per largiorem insensibilem perspirationem. ( *Conf. Persp.* 18. XI. )

III. Quid sit fames, ex *Exercitatione Tertia* satis constat, quare in hoc loco solummodo videndum, quotuplici sensu fames a Prædicis accipitur, & quali sensu hic sit capienda. Fames ex sanitatis & morbi causa concitatur. In sanitate & victu moderato tunc in nobis concitatur fames, si alimenta ex ventriculo & intestinis tenuibus sunt depulsa, atque Chylus sanguini traditus commutatus fuit in alios humores, his peractis Deus voluit, ut in nobis concitetur sensus hunc defectum declarans, quem famem vocamus. In sanitate permanens quoque observatur fames in iis, qui ex voluntate inedia se macerant, & ut olim fiebat in rigidissima dieta. At vero in morbis per varias causas ( *vid. Exerc.* 3., XLII. ) fames concitatur, quarum quædam subigerentur motu musculari, ut est acrimonia acida nimiam famem excitans. Quia vero Hipp. vetat laborem, satis constat, eum in hoc loco velle famem naturalem in sanitate, vel in rigidissima dieta, quia fames morbofa interdum labores exigit.

Fames  
quotu-  
plex.

IV. Corporis motu musculari consumi spiritus, concoctosque humores degenerare in excrementitios, atque chylum & crudum humorem in nostros bonos commutari humores, alibi demonstravimus. Igitur quandiu ex Crudis & Chylo maior fit bonorum humorum proventus, quam consumtio bonorum per exercitia corporis, ipsa exercitia saluberrima sunt. Verum si in sanis excitatur fames, signum est, omnem chylum esse consumtum, aliter enim in nobis sanis non fit fames, itaque motus muscularis facit degenerationem bonorum in excrementitios humores, & fit spirituum consumtio; verum quia in tali corpore nulla est materia, quæ eodem motu in bonos potest commutari humores, necesse est, defectum fieri bonorum, qui mutati vel colliguntur in corpore, & ita pariunt cruditatem ex alienis retentis; vel expelluntur, facientes maiorem humorum bonorum defectum.

Ubi fa-  
mes, non  
laboran-  
dum..

V. Quidam contendunt, ante cœnam & prandium corpus movendum esse ambulatione; alii vero contrarium statuunt: quia vero ad sanitatem conservandam hoc scire maxime interest, hanc quaestionem, quia ex præcedentibus facile determinari potest, hoc loco agitare volui. Qui perfecte sanus est, quinque ex evacuato ventriculo & intestinis, atque defectu chyli in sanguine fit esuriens, non conducit huic ex superius allegatis rationibus suum corpus ante cibum exercere. Qui vero antequam fames nova alimenta exigit, quique ventriculum & intestina alimentis semiplena habet, multumque chyli in sanguine, volens tamen, quia tempus est cœnæ vel prandii, cibum capere, huic conducit prius suum corpus exercere, ut chyli via exonerentur, & chylum in sanguine abundantem consumere, antequam nova ingerit. Quia vero mores sæpius suadent nondum fame monitis ingerere alimenta his temporibus, ut plurimum salubrius est, ante prandium & cœnam movere corpus. Illa autem regula damnosa est concinatoribus publicis, non audentibus cibum sumere in prandio, cum sequens oratorius labor, si fiat cum alimentis defectu in corpore, maximam debilitatem inferat. Propterea non suadeo, ut corpus suum multis alimentis hoc tempore onerent; corpus enim cibo onustum mul-

An cor-  
pus mo-  
vendum  
ante ci-  
bum?

to minus est agile; quemadmodum hoc in sequente Aph. explanabitur.

L I B. II. A P H. XVII.

42. **U**bi cibus præter naturam copiosior ingressus fuerit, id morbum facit. Ostendit autem sanatio.

**I.** IN hoc observanda veniunt (1) Quinam sit Cibus copiosior præter naturam ingressus; (2) Cur morbum pariat, & qualem; (3) Num ostendit sanatio, ut signum, vel curatio capiendum.

Cibum copiosior in sanis.

II. De pleniorē Diætā superius (Aph. 3. IV.) verba fecimus: in hoc autem loco examinaturi Cibum copiosiorē in Sanis, Morbo laborantibus, & Convalescentibus. Sani homines tantam exigunt Cibi quantitatem, quæ sufficit ad restaurandum id, quod inevitabili actione corporis fuit consumptum. Qui vero plus ingerit, id ingestum vel iterum redditur vomitu, aut alvi copiosiore evacuatione; vel corpori traditum plethorā aut obelitem generat, modo tamen actione corporis id ingestum in laudabilem succum converti possit; si vero etiam a nobis subigi nequit, varia genera morborum parit, ut infra exponetur.

In morbis.

III. Morbo autem aliquo afflicto, qui corpore est debilis, ipsam salubrem ceteroquin mediocritatem non fert: nam actiones corporis enervatæ quæ debebant ingesta alimenta in bonum convertere succum, nunc permittunt ingesta permanere tali indole, ut erant ingesta; vel permittunt corrumpi, ex quibus igitur non solum alienus generatur humor, sed copia majore ingestorum vires pressæ succumbunt. Quare ægris ne mediocris quidem sanorum quantitas est porrigenda, multo minus major copia. Hinc patet, quam perverse multi agunt ægrorum corpora ultra facientes, ut languentibus addant vires, cum cibo corpora onusta magis debilitentur.

Convalescentibus.

IV. Convalescens ex morbo corpus obtinet sanum, omni morbi materia liberatum, sed tamen debilitatum ex morbo præcedente: in hoc itaque corpore consumptus est chylus ex massa sanguinis, ablatae sunt crasse in ventriculo famem extinguentes, hinc fiunt famelici, quemadmodum observatur post febrem quartanam antidoto curatam; hoc corpus itaque debile & famelicum si tantum ingerit, quantum expostulat famem, nimium assumet: nam famem illa magnum chyli defectum indicat, sed vires debiliores non valent tam magnam subigere ingestorum quantitatem; quare si in Convalescentibus famem consentientibus nimium ingerimus, quod abundans opprimens vires, & degenerans in alienam indolem, vel novum parit morbum, vel priorem recidivare facit. Utile est igitur in Convalescentibus non indulgere fami, neque vulgi opinioni, qua statuitur, virium restaurationem ingestorum quantitati proportionatam, sed paulo minus ingerere, quam famem & communis victus ratio expostulat.

Morbum parit.

V. Cibus præter naturam copiosior in sanis (1) sua multitudine opprimit vires. (2) Actione corporis & humorum commutari nequit in bonum succum, nam si hæc absint, non dicitur Cibus præter naturam copiosior. Expositis his sequentiæ sunt. (1) Corpus onere pressum se sepe liberare conatur per vomitum, vel Alvi secessum: aut Cibus toti corpori traditus sudorem vel urinam copiosiorē parit. (2) Pars ingestorum abundans propriam suam servans indolem, tam in primis viis, quam in circulantibus, mole sua superat agendi æquilibrium, unde præcordiorum gravitas, oppletio, corporis languor, lassitudo, pigritia, somnolentia, quæ omnia sensim evanescunt per subsequente inediā, & corporis exercitia, quia novo non addito, corporis continuata actione, id quod antea erat abundans, tandem facta evacuatione inutilium, ad mediocritatem redigitur, atque ita sola abstinentia & corporis motu tollitur abundantia, & prævenitur in-

stans

stans morbus. (3) Non semper autem copiosior ingestus cibus tam diu suam bonam & commutabilem servat indolem, sæpe citius in corruptelam convertitur per motum intestinum cibo proprium, priusquam iterata corporis actione id, quod abundat subigi potuit, præprimis si continuetur in copiosiore ciborum ingestione. Si Cibus ita fuerit corruptus in primis viis, præbet Cacochyliam, in reliquo corpore Cacochymiam, imo Cachexiam; illi autem morbi non semper subsequente abstinentia & corporis motu superantur, cum actio corporis non valeat quantumque corruptelam inductam emendare & expellere. Ex hac igitur corruptela multi & varii fiunt morbi, quorum vix potest exhiberi enumeratio, ipsa enim assumptorum varietas diversos morbos parit, & corporis partes variaz phenomena distincta præbent. Quales præterea morbi fiunt in Morbo decumbentibus & Convalescentibus ex copiosiore Cibo, nimis longum foret enumerare.

VI. Ultimatum est demonstrare, num verba *Ostendit autem sanatio* ut signum vel curatio sint capienda? si quis præter naturam copiosiore ingestis cibum, & deinceps sequente usu alicujus medicaminis non corrigitur morbo, ipsa curatio ostendit nimium fuisse ingestum: sic sæpe ex juvantibus & lædentibus, id est ex modo curationis expiscamur causas. Qui vero nimis ingestis, & perpendit deinceps, corpus suum non valere tantam copiam in laudabilem humorem convertere, vel si sentiat corpus inde onustum, vel oppletum, format hanc indicationem curativam, corpus liberandum esse ab eo onere, ne deinceps in graviores morbum incidat: ergo in hoc etiam sensu ostendit sanationem. Uterque modus ut Signum & Curatio admitti potest. Mihi autem magis arridet amplecti posteriorem sententiam, quia non est opus, tam anxie per ablationem sequentem examinare, num nimis fuerit ingestum; ipse æger hoc facile indicabit: sed quid agendum, si Cibus ultra naturam ingressus fuerit, id medici est perpendere. Sanare debemus illam abundantiam, ne supra recensita mala fiant, ergo suggerit indicationem Curatoriam. Quali autem modo curari debeat, alibi tradetur.

*Ostendit autem sanatio.*

## LIB. II. APH. XVIII.

43. **E**orum, quæ confertim, & celeriter nutriunt, celeres etiam fiunt egestion-  
nes.

I. **T**ria in hoc Aph. exponenda veniunt. (1) Quæ confertim & celeriter nutrientia dicantur. (2) Cur ea celeres quoque faciant egestionem. (3) Qualem inde medici in dirigenda diæta usum habeant.

II. Vocabulum *Adspicius*, quod hic *Confertim* exponitur, a *Commentatoribus* & *Confertim* affatim & universim exponitur, reducitque vel ad quantitatem, vel qualitatem ingestorum. Sed quoniam scopus est res ipsas, quæ in Aphorismis proponuntur, ad majorem usum medicum redigere, minime autem ad eruendum verum Auloris sensum, Commentatoribus de vero sensu hujus vocabuli relinquimus suas sententias. Hoc loco conabimur adstruere, alimenta facilis conditionis, id est quæ celeriter nutriunt, magna copia, brevi temporis spatio, assumpta, celeres quoque facere egestionem.

III. Quæ alimenta celeriter nutriunt, earum partes tam laxæ inter se coherent, ut brevi actione separari possint, & adaptari ad ingressum vasorum lacteorum; quæ vero tardè nutriunt, earum partium firmior est coheræntia, & diutius in ventriculo & intestinis morantur, antequam in lactea intrare possint: quæ itaque celeriter soluta sunt, brevi tempore massæ circulantibus traduntur, & quæ tardè solvuntur, longius tempus infumunt, priusquam circulantibus permiscerentur. Sed Circulantibus tradita alimenta non tamen statim evacuationibus sunt adaptata, in hoc quo-

*Celeres egestionem faciunt.*

quoque organo ulterius sunt elaboranda; non est sine ratione adstruere, quæ in prima officina facile potuere actione corporis subigi, eadem quoque in sanguificationis organo celeriter adaptari posse, quare facilis digestionis alimenta non solum citam nutritionem præbent, sed actione corporis quoque celeriter ad egestionem faciendas adaptantur: hæc mediocri copia assumpta largam non faciunt egestionem per urinam, vel insensibilem perspirationem, aut sudorem, sed confertim ingesta, id est, magna copia simul brevi tempore copiosas evacuationes faciunt; cum hoc tempore multum suppeditetur materiæ. Sed difficilis digestionis alimenta mediocri quantitate assumpta, non possunt augere egestionem, & majori copia ingesta vires opprimunt, ut corpus non valeat se liberare ab opprimente onere, neque talia patiuntur tam brevi temporis spatio excretionibus adaptari.

Ufus hu-  
jus obser-  
vationis.

IV. Quibus itaque debilibus post confertim ingesta celeriter nutrientia oboritur urina, vel sudor copiosior, talis evacuatio neque est colligationis signum in Chronicis, neque crisis in Acutis, sed ab assumtis inducta: sed eadem evacuatio sine tali assumptione alimentorum, præcedentia indicare potuisset. Si morbi acuti materiæ evacuationi adaptata propter corporis siccitatem non exit, optimum est, præprimis si vires simul defectu alimenti sunt debiles, exhibere confertim alimenta celeriter nutrientia, suppeditato enim humido, tanquam vehiculo, facilius eliminatur illa concocta materiæ, & corpus defectu alimenti languens resuscillatur. Quibus ob susceptum externum frigus prohibita fuit insensibilis perspiratio, cum ex materiæ illa retenta acri febricitant, summum quoque auxilium experiuntur, si confertim celeriter nutrientia cubitum ituri assumant, subsequens in aurora largior perspiratio, vel sudor, id acre retentum simul per cutim vel renes eliminans, specificum febris antidotum prædicatur.

## L I B. II. A P H. XIX.

44. **A** Cutorum morborum non omnino certe sunt prædictiones, neque mortis, neque sanitatis.

I. **P**radicere posse in morbis aliquid Divinum esse, veteres existimant, & quam maxime in hac parte laborant, ut ita non solum apud ægros, sed & adstantes & amicos honorem, fidem, & auctoritatem aucuparentur. Equidem eximia est pars in medica scientia, in qua nemo plus præstitit, quam Auctor noster; totum enim ejus opus Prædictionibus est plenum, sed in hoc Aphor. statim monet, etiam si in sequentibus absolute dicat; hæc vel illa secutura, ita esse accipiendæ, ut interdum fallant; nempe omnes prædictiones non sunt tam absolute certæ, ut nunquam aliter evenire potuissent. Ut igitur constet, unde petatur in morbis Prædictio certa, fontes Prædictionis rimandi.

Prædictio-  
nis lons.

II. Quidam morbi, inter quos excellunt Acuti, certum sequuntur ordinem, quem omnes fideles Prædicti graphice depingunt: V. G. experientia constat, quarto die ab invasione morbi variolosi incipere stigmata rubra; septimo omnia stigmata in pustulas mutata esse, quarum quædam incipiunt suppurari; undecimo omnes pustulas suppuratas esse, & quasdam exarescere; decimo quarto omnes esse in crustulas mutatas, & jam incipere decidere. Sed insuper observant, victu & medicatione refrigerante hæc stadia longius infumere tempus; sed victu & curatione calefaciente stadia illa citius absolvi; addunt præterea phænomena, quæ in his stadiis fuere observata, tam in iis, qui convalescere, quam qui moriebantur. Hucusque medicus solum fidem historiam exaravit, ex qua deinceps formabit Prædictiones: nam si in morbi cursu detexit constantiam, intrepide audebit in morbo jam præsentem præfigere eadem, quæ antea constanti observatione

di-



didicit, in antecedentibus semper fieri. Quod enim in antecedente morbo erat Observatio, in sequente commutatur in Prædictionem. Ex hac doctrina facile liquet, quinam prædicere possunt & qui non valent: nam solus is novit præfagire, cui historia certa istius morbi est cognita, indoctus vero si hanc artem exerceat, mirum est, si res prædictioni respondeat. Vidi tamen & doleo, hanc artem æque ab indoctis quam expertis ad magnum vituperium scientiæ exerceri, & quia ægri nesciunt, num prædictio ex constante observatione vel signamento cerebri sit petita, docto & indocto æqualem præbent fidem, donec tandem suo detrimento experiantur, quinam horum ex Arte Prædictionem formaverit.

III. Si omnes morbi semper simili modo decurrerent, ut nunquam a tramite eo secederent, Prædictiones tandem æque certæ potuissent formari per longam feriem observationum, ut quævis alia in rerum natura res certa; sed idem morbus uno tempore aliquo alio ordine absolvitur, aliæque præfert phænomena, & exitum habet, quam alio tempore aut in alio homine: hoc mutabile per artem immutabile fieri nequit, & magnam in Prædictione præbet difficultatem. Hinc recte statuit Hipp. Prædictiones non omnino sunt certæ, sed propterea non sunt semper fallaces & incertæ, ut omnem Prædictionem debeamus repudiare. Mathematicum certum in his rebus nullus querere debet, sed quod fere semper ita observatur in morbis, pro certo admittere tenetur. V. G. Si quis assumit medicamentum dosin purgantis, & ejus non laxatur alvus, de hoc medicamento non dicit, incertum est purgans, quamvis semel, aut bis in speciali casu fallit, habetur tamen inter certissima purgantia, modo fere semper præstet operationem: simili quoque modo deducimus præfagium certum ex apparentibus ægrorum phænomenis.

IV. Morborum generalis divisio est in Acutos & Chronicos. Cur autem Hipp. selegit Acutos, quam maxime fe tortquent Commentatores, quasi Auctor hic vellet innuere, Chronicorum Prædictiones certiores esse. Verum Hipp. longe plures Prædictiones habet in suis operibus de morbis Acutis, quam Chronicis, quæ certum exitum ad salutem vel mortem complectuntur; ne igitur in his quæ præcipua sunt & videntur certissima, aliquis judicaret, has Prædictiones nunquam fallere, hoc aphorismo indicare voluit, ne deinceps semper hæc verba repetere deberet. Forsan ad solos morbos Acutos attendere voluit, non indicans Prædictiones Chronicorum certiores esse, nam hic quoque Aphorismus esset verus, si dixerat, Acutorum & Chronicorum morborum Prædictiones sunt non omnino certæ, cum veritatem praxim exercentes passim experiantur, Chronicos non minus quam Acutos interdum recedere a consueti ordine.

V. Opportunus hic mihi videtur locus, referare difficultates, quæ in Acutis præbent Prognosin incertam. Morbus Acutus non est unicum morbi genus, nam Inflammatorius, Erysipelatosus, Putridus, & Malignus, uno nomine Acutorum morborum recipiuntur. Quum vero inter hos magnum sit discrimen, non est mirum, si quædam phænomena conspiciuntur morbi putridi, & inde formatur Prædictio, ac si orirentur ex morbo Inflammatorio, quod talis Prædictio non respondeat exitui. V. G. sabubre est in acutis, si oboriatur hæmorrhagia larga, quia compescit impetum, temperat calorem, minuit capitis dolorem & pulsationem: at eadem larga hæmorrhagia in morbo putrido mortem præfagit, designans tantam corruptelam in humoribus, quæ vasa perdit, tantæque fluiditatem, ut undique effluent. Id quoque verum est de sudore & alvi egestione copiosiore, quare medicus etiam peritus sæpe anceps hæret, an bonum vel malum ex sensibili evacuatione sit præfagiendum, non satis attendens ad discrimen, quod est inter dios morbos, qui tamen omnes dicuntur Acuti. Ex hoc facile tanquam fundamento multa loca Hippocratis, quæ sibi invicem obstat videntur, nos facile & cum scientiæ incremento conciliare posse autumo. Hipp. enim noster se ubique fide-

Non omnia certa.

In Acutis.

fidelem gessit observatorem, non ex ingenio depromit sententias, sed hausit istas ex observationibus coram ægris. Non est ergo mirandum, si plures morbi naturalis distincti eodem nomine proferantur, quod post eadem phænomena bonus & malus exitus fuerit secutus.

## L I B. II. A P H. XX.

45. **Q**uibus, dum sunt juvenes, alvi sunt humide, iis senescentibus siccantur. Quibus vero, dum sunt juvenes, alvi sunt sicca, his senescentibus humectantur.

**I.** Si duo sunt Juvenes eodem victu utentes, quorum unus alvum magis constrictam & siccam habet, alter vero alvum humidam, magisque lubricam, hi si senescunt, fere semper hanc mutationem subeunt, ut alvus sicca mutetur in Lubricam seu humidam, & quæ erat humida, mutetur in Siccam: si vero talis fiat mutatio ex mutato victu, non debet referri ad hanc observationem, ut recte monet Galeus: qui etiam dicit, hanc observationem sufficere, licet nulla adjiciatur ratio. Commentatores tamen varias inquisiverunt hujus mutationis rationes, quas non sumus examinaturi, ne refutando consumatur tempus, nostram solam proferemus rationem, quæ num sit valens, aliis dijudicandum relinquo.

Alvi scioris naturalis causa.

II. Quoties per alvum egeruntur fæces compactæ, duræ, paucae, Alvus dicitur sicca a medicis; talis fit, vel quia ab ingestis alimentis & deglutitis & confluentibus in intestina humoribus nimis cito absorbeatur omne humidum, ut nihil nisi crassum, quod lactea intrare nequit, in cavo intestinorum relinquitur: vel ita fit, quia minor humoris copia in intestina confluit, nam si tale fiat ex parciore ingestione, vel victu exsiccante, talia sicciora excrementa ad hanc observationem non pertinent. Ergo in tali juvene vel est promptior humidi absorptio, vel parciore ad intestina confluxus.

Alvi Pmioris naturalis causa.

III. In cujus autem intestinorum cavitatem plus humorum confluit, vel in quibus parciore fit absorptio, huic sunt alvi fæces humidae, liquidæ & copiosiores, quales quoque fieri possunt per victum humectantem, sed tunc ad hunc titulum non referuntur.

Causæ mutantes.

IV. Causæ mutantes alvum siccam in humidam, humidam in siccam, sunt eadem, nempe sola mutatio juvenis in seniorem, quoniam eadem causa in eodem subiecto eundem effectum edit, sed in diversis subiectis sæpe contrarium effectum; ita igne liquefit cera, sed argilla in lapidem commutatur: per se igitur patet, nos hujus diversis effectus causam querere debere in corporibus juvenum, quod nempe causa alvi sicca per senectutem fere semper convertatur in causam alvum humectantem; & vicissim causa alvi humidae naturaliter commutatur cum ætate in causam exsiccantem.

Alvum siccam in humidam.

V. Quibus juvenibus est corporis robur, quo humores quam maxime compinguntur, & qui compingi nequeunt, per insensibilem perspirationem diffantur, his caro durior, compactior, corpus gracilius, sed tamen viribus pollens; quoniam talis juvenis confluentes in intestina humores promptè absorbet, & derivatio ad cutim pro insensibili perspiratione largiore est major, quæ in intestinis resistit, sicca esse debent & compacta. Talis autem juvenis robustus senior factus, naturali lege naturæ istius corpus sensim fit minus potens; minus igitur compinguntur humores, absorptio ex intestinis languidior, perspiratio minor, ergo ab eodem victu nunc, & in intestinis, & in reliquo corpore, plus humidi colligitur, inde sæpe ob abundantiorum humiditatem alvus sensim incipit magis humectari, & corpus pinguescit.

Alvum humidum in siccam.

VI. Quorum vero juvenum corpora sunt humida, succulenta, mollia, & tamen valentia, facile hæmorrhagiam ferentia, qualia corpora feminarum solent multum sanguinis menstrui fundere, & copiosum post partum generare lac. Talia autem corpora

pora juvenum cum ætate debiliora facta, minore humorum confedionem faciunt, quemadmodum quoque tales fœminæ sensim parciore menses habent, & minorem lactis copiam generant. His igitur, quia parcius succi pancreatici, hepatici, ventriculi copia in cavum intestinorum ferri incipit, contenta intestinorum minus diluta, fœciora & magis compacta debent reddi, atque hoc solummodo ex naturali mutatione, quæ omnibus accidit: nam si ex morbosa causa hæ mutationes inducantur, observatio hæc non deberet restringi ad sanam mutationem, ut fecit Hipp., sed ad morbosam.

## L I B. II. A P H. XXI.

46. **F** Amem vini potio solvis.

**I.** Fames duplici modo accipi potest: naturalis nempe in sanitate, vel præternaturalis in morbis, quia vero hic absolute ponitur videndum, quomodo fames tam naturalis, quam morbosa solvatur vini potione.

**II.** Famem naturalem in nobis concitari, si ventriculus sit vacuus, Chylus ferre omnis in reliquo corpore consumitur, quando vel a proprio succo, vel succo pancreatico refluente, vel bile exciteretur quidam in ventriculo sensus, quem alimentis solemus placare, demonstravimus (*Exerc. 111.*) si vini potio potest tollere istas causas famem concitantes, Hipp. veritatem dixit. Verum si quis vinum bibat, quod confectum est ex succo uvarum, fermentatione mutatum, aliquid ingerit nutritii, itaque post vini potionem ventriculus non amplius est vacuus, atque vini dilutione temperatur naturalis accedo in confluentibus & jam collectis humoribus in ventriculo, quare sensus hujus affectionis redditur minor, sed quia eo major est fames, quo major sit affectio, inde necesse est in perfecta sanitate, ut vini potio minuat famem.

Fames naturalis an solvatur vini potione.

**III.** Huic sententiæ quam maxime ob stare videtur, multos homines ante prandium & cenam potare vinum, ut desiderium appetitum erigant: si enim vini potio solvit famem, hi homines perverse agerent, cum tamen experiantur, a vini potione augeri appetitum. Qui ita simpliciter hæc dicta perpendit, existimaret, hæc si hi invicem omnino ob stare, verum qui animadvertit, nos posuisse perfectam sanitatem, & in eo casu agitur de quadam inappetentia, si ergo quedam sit inappetentia causa, quæ vini potione tolli potest, certe in hoc homine vini potione ad prandium vel cenam ingenderetur fames. V. G. Qui laborat ventriculi laxitate & visciditate, ita ut ventriculus affici non possit mucosæ obfusa refluente bile in ventriculum; hæc, si ingerat vinum, vel & spirituosam, quæ solvunt mucum, & ventriculum vi calefaciente & contringente exagitant, fieri fames major; cum post assumptionem vinosi, vel a vinoso aut spirituosissimo ipso, vel validiore applicatione laterum ventriculi ad contenta, aliquis in ventriculo concitatur sensus, quem famem vocamus.

Cur quidam patientium ad famem excitantur.

**IV.** De fame morbosa non tam certum potest ferri iudicium, illa enim ex multis causis potest generari, quarum quedam minuuntur, quedam vero non per vini potationem. Eligamus ex multis unicam causam excitantem famem non naturalem, ut in bulino, quod ventriculi contenta acriora inter plitæ ventriculi herentia præternaturalem famem excitent: quæcumque id acre applicatum diluant & remouent a ventriculi lateribus, quibus applicata sui vellicatione sensum famis excitabant, equidem in tali casu per ipsam dilutionem temperaretur sensus famis.

Fames morbosa an solvatur vini potione.

## L I B. II. A P H. XXII.

47. **A** Repletionem quicumque sunt morbi, evacuatio sanat. Et quicumque ab evacuatione, repletio: Et aliorum contrarietas sanat.

K

I.

**I.** Das proferit Hipp. curationis regulas in hoc Aph. unam in Repletionem per Evacuacionem: alteram in Inanitione per Repletionem. Ex quibus denique generalem Conclusionem format, *Contraria contrariis morientur*. Quare primo examinatur sumus, an in Repletionis & Inanitionis morbis hæc curationis regulæ sint universales & semper observandæ; deinceps, num conclusio illa generalis ad omnes morborum curationes possit applicari.

Quoniam  
sint Re-  
pletionis  
morbi.

**II.** Repletio tunc est, quando major humorum est copia in corpore, quam ad sanitatem conservandam requiritur: Quoniam triplex est in nobis humor (1) Chylifus ex alimentis assumtis confectus, quo nomine quoque complectitur ipsa alimenta assumta, nondum in chylum conversa: huius repletio *Sattietas* vocari potest, quam quoque significationem admittit *πλησύνωσις* (2) Bonorum tanta copia, ut inde æquilibrium inter humores & causas agentes destruat, qualis Repletio plerumque vocatur *πλησύνωσις*. (3) Humorum excrementitiorum & morbosorum in corpore redundantia, quæ *κακώχολια* vocatur. Hæc tria genera humorum suos morbos per solam abundantiam inferre possunt: qualia tunc conspiciuntur symptomata, illa dicuntur morbi Repletionis. Vel dicti humores diutius in corpore manentes, inducta corruptela nova symptomata inferunt, seu fiunt alii morbi Repletionis. Hos autem morbos, quamvis producantur ex aliena quantitate, ad morbos repletionis referri, constat ex annumeratione morborum, qui formantur ex mensibus retentis, vel hæmorrhagia consueta suppressa, quamvis non sint symptomata repletionis, sed corruptelæ supervenientis.

An quocumque  
Repletio-  
nis mor-  
bos vacu-  
atio fa-  
ciat?

**III.** Siccitatem & plethoram evacuacione sanari, nullum est dubium, nam per ablationem abundantie restituitur æquilibrium: an vero hoc quoque procedat in Cacoehymia, & quando reliqua abundantia per corruptelam mutata, non tam liquide constat. Nam quibus ex suppressis evacuacionibus, vel per degenerationem humorum fuit nata Cacoehymia, solis evacuantibus a morbo liberari nequeunt, quoniam materia illa, ante evacuacioni apta, per corruptelam inversa, non tam promte eliminari possit; & etiam si educatur, morbosa labes partibus firmis illata, post omnem evacuacionem restaret. Omnis enim materia morbosa non est educenda, nisi sit præparata (vid. *Aph.* 22. v. & v. 11.) igitur distinctione opus est, qui hanc regulam generalem ad praxin vult applicare, ne cuiusvis humoris repletionem hoc loco intelligat.

Evacu-  
ationis &  
defectus  
humorum  
morbi  
quoniam?

**IV.** Ut ex humorum abundantia destruitur æquilibrium, ita etiam ex humorum Defectu, per auctam evacuacionem inducitur, ab altera parte destruitur æquilibrium: Si per copiosiores Evacuaciones Defectus sit natus, remansens humor non est opus ut alienam possideat qualitatem; sed non diu durat, quin ex hoc destructo æquilibrio multi quoque generentur morbi. Quare etiam duplex genus morborum ab evacuacione: vel merus defectus & symptomata inde nata, atque morbi ex superveniente corruptione.

An hi  
morbi Re-  
pletionis  
curandi?

**V.** Quoniam in defectu humorum nihil alieni est in corpore, facilius videtur ille morbus curari posse, quam qui sit abundantia, quoniam sæpe adjunctam habet alienam qualitatem: sed si penitus inspiciantur auxilia, multo facilius erit morborum ex abundantia curatio, quam ex Defectu per Evacuacionem. (1) Evacuatio ipsa si morbum fecit per Defectum, non subsistit protinus, sed valeamus imperata abstinentia abundantie superpetias subtrahere, quibus detractis, corpus ipsum sine medicamenti auxilio minuit abundantiam; Evacuacionem autem sæpe multi laboris est compescere, vel moderari. (2) Purus defectus difficilior suppleri potest, quam pura abundantia minui. Copiosiore addito nutrimento non suppletur Defectus; quippe alimentis non satis actione corporis subactis, & in bonos humores conversis, refarcire defectum frustra molimur (vid. *Aph.* 3. V. 3.) his enim impletum corpus scateret crudis. Et quia semper in humorum Defectu est

est virium imbecillitas, non erit facile per Additionem refarcire, quod deficit. Verum abundantiam solam promte valemus vomitoriis, purgantibus, sanguinis missione, & abstinence ita minuire, ut non amplius abundet. (3) Quod si per defectum alii fuere induci morbi, ista materia corrupta si educatur, major inducit Defectus; tale corpus Replere, addit cruda; inde summa in curatione difficultas, ut superius (Aph. 32. IV. & V.) demonstravimus.

VI. Tandem examinare restat, num ex præcedentibus regula generalis curationis elici possit *Contraria contrariis mederi*. Ex iis, quæ disputavimus satis constat, non omnem Repletionem curari ablatione, neque omnem Defectum tolli Repletionem, non valemus itaque inde generalem formare conclusionem, sed duntaxat sæpe Contraria contrariis curari. Quoniam hanc regulam multi universalem faciunt, operæ pretium erit, quasdam proponere exceptiones, ut satis constet, quam circumspecte nos debeamus ad omnem casum hanc applicare regulam. Qui laborant hæmorrhagia ex abundantia & impetu majore, curantur sanguinis missione. Febris cacoehymica febre curatur. Pars gelu conficta solvitur nive applicata. Quæcumque perfrigerata sunt, excalescere oportet, præterquam a quibus sanguis erumpit, aut erupturus. Alvi fluxus sæpe per purgans, & vomitus per vomitorium tollitur. Inflammatio mitescit tepidis applicatis, recrudescit ab actu frigidis. Pars combusta non fert actu frigida. Ex istis & multis aliis exemplis, quæ adduci possunt, abunde constat, hanc regulam non esse generalem, sed sæpe locum habere.

Contraria  
contrariis  
meden-  
tur.

## LIB. II. APH. XXIII.

48. **A**Cuti morbi in quatuordecim diebus judicantur.

I. Quid sit morbus Acutus, & quinam varii morbi hoc nomine intelligantur, superius (Aph. 24. III.) definivimus; hos morbos nunc dicit judicari (vid. Aph. 20) quatuordecim diebus, id est: intra itud temporis spatium, sive septimum, sive septimo, undecimo die ab invasione, sive ipso die decimo quarto notabilem facit mutationem, vel ad mortem, vel ad salutem; vel ad melius, vel deterius. Cum vero morbi Chronici sæpe longum tempus infumant sine notabili mutatione.

II. Qui omnium apparitionum reddere conantur rationem, sæpe ipsa ratio observatione constante est obscurior, & in multos non raro incidunt errores. Quod morbi acuti veri intra quatuordecim dies notabilem mutationem faciant, tam constans est observatio, ut si non fieret in aliquo morbo, non reciperetur in Acutorum morborum classe. Qui ulterius urget, exigens hujus temporis termini rationem, existimans letale ex veritatis amore petere, meo arbitrio eum a vera ratione aberrare puto, ut facile liquebit, si terminus temporis ad alias res applicetur. Ut si quis quærat, cur non omnes plantæ eodem tempore florent, fructusque maturos proferunt? Cur non omnia animalia idem tempus gestationis habent? Cur una planta quotannis, alia perennis? & centena talia. Equidem tandem invitatus cogeretur fateri, Deum in creatione omnibus his terminum temporis præscripsisse, nos nescire, ex qua lege alia cuncta hæc eundem semper servant. A nobis tamen plus exigunt sciscitantibus materiz morbi mutationes, num ex quadam lege alia hunc temporis terminum servant. Cum vero rerum naturalium per scrutatores sint contenti, perpetua observatione constantem temporis terminum in aliqua re invenire, nos quoque non nimis curiosi contenti esse debemus, morborum acutorum materiam intra hoc tempus semper notabilem subire mutationem, hocque constare inter medicos a vetustissimis ad hoc usque tempus per continuam

Cur acuti  
intra qua-  
tuordecim  
dies  
judican-  
tur.

observationum seriem. Hunc autem terminum non tam fixum esse, quin possit prolongari & minui, nihil derogat, idem quoque in reliquis rebus naturalibus observatur; calor enim major applicatus præcoces profert fructus, & frigus maturitatem retardare valet. Quare tempus hoc solum nritur constanti practica observatione, quæ si non fuisset indagata, fateor, nos nunquam potuisse ex fabrica corporis, vel examine humorum hoc tempus in morbis timari. Ita multa sunt in morbis, quæ lateuissent physiologicos, cum talia per solas observationes in praxi sunt eruenda. Hinc quisque facile perspicit, subtilitates physiologicas in scientia medica utiles esse, nondum tamen valere cuncta, quæ in morbis accidunt, persequari. Morbus enim est res aliqua diversa, non semper servans leges in sanitate detectas: quare utile est praxin exercenti, ut non minus fe in observationibus practicis exerceat, quam ut solis subtilitatibus theoreticis totum tempus terat.

## L I B. H. A P H. XXIV.

49. **S**eptimorum quartus est index. Alterius septimane octavus est initium. Notandus vero undecimus: is enim quartus est alterius septimane. Notandus rursum decimus septimus: hic enim est quartus quidem a decimo quarto, septimus vero ab undecimo.

Dierum  
criticorum  
annume-  
ratio.

I. **P**ostquam posuerat Hipp. Acutos morbos in quatuordecim diebus judicari hoc loco voluit istos intermedios dies accuratius definire. Dividit igitur XIV. dies in duas septimanas; prioris initium est ipse dies invasionis; alterius est dies octavus ab initio, adeoque utrique septimane tribuit septem dies integros, nam finis prioris septimane est dies VII. & finis posterioris dies XIV. isti dies Critici dicuntur, sed dies IV. & dies XI. sunt Dies iudices, quibus diebus conspicerentur in morbis Acutis mutationes, indicantes vel VII. vel XIV. die futuram esse crisin. Si ergo ponatur dies octavus pro initio secundæ septimane, utraq; septimane pari divisione dierum distinguuntur. In morbis autem intermittentibus quivis paroxysmus pro uno die numeratur, dies vero apyreticæ vel induciarum non numerantur, adeo ut paroxysmus quartus, septimus, undecimus, & decimus quartus habeantur pro tot diebus, etiamsi multi dies interim præterlapi fuerint, in quibus nullus fuit morbi paroxysmus. Quomodo vero sit reliquorum dierum annumeratio & denominatio, aliis locis tradetur.

Num dies  
Critici  
sint obser-  
vandi.

II. Inter Practicos longo tempore fuit dissidium, num Dies Critici, quemadmodum traduntur ab Hippocrate & Galeno, in ægris observentur, num aliquem habeant in arte medica usum. Nonnulli tanquam pro aris & focis contendunt, in morbis observari, non quod ipsi istos observarunt in Praxi, sed quia ab Hippocrate & Galeno rotundis verbis, quemadmodum in hoc Aphorismo & multis aliis locis, descripti inveniuntur, quasi quæ ab his sunt dicta, quamvis non observentur in praxi, satis essent firma. Alii vero hanc sententiam oppugnant, non solum rationibus ex non respondente lunæ cursu, sed experientia in multis ægris, in quibus incertis diebus evacuationem criticam observaverunt Acutorum; verum etiam loca multa ex Hippocrate adducunt: ex quibus constat, his diebus Crisin non fuisse factam, sed omnino alio die. Et ut tamen rationem reddant, cur Hipp. hos dies ita descriperit, existimant morem sectari medicorum sui temporis, atque veteres, qui arcana in dierum numero quaesiverunt. Res ergo de diebus Criticis, de quibus tot libri sunt conscripti, relinquitur in incerto. Id autem certum est, si Dies Critici in Acutis magni momenti sunt æstimandi, male ageret medicus, si hos non observaret: si vero nullum certum habent, frustra laboramus tam accurate istos sectari.

III.

III. Hanc sententiam tam misere agitatam fuisse, ansam dedit (1) Morborum diversitas, qui uno nomine Acutorum proferuntur: si enim acutorum morborum unica & simplex esset causa, forsitan aliquid certi in terminis dierum quique medicus observasset; sed varias causas, varias species morborum uno nomine complectimur, quorum una causa suggerit constantibus temporibus suas mutationes, altera vero omnino sine ullo ordine incedit, non est mirandum, a quibusdam in diebus Criticis aliquod certum inveniri; ab alio vero medico cuncta incerta; imo non erit quoque mirum, si Hippocratis scripta, qui ex fide passim, quemadmodum in agris detexit, observationes vel inde deducta dogmata scripsit, rimamur, sepe inveniri, aliis quoque temporibus bonam fuisse factam crisin, vel omnino nullam diebus criticis. Medicos autem per morbum acutum intellexisse Inflammatorios, Erysipelatosos, & Putridos, atque Malignos, modo habent adiunctam febrem, imo quosdam ex morbis cum minore motu vitali, uti Apoplexiam, & multos alios, ex iis, quæ superius disputata sunt (Aph. 24. III.) abunde colligi potest. Quia vero dicti morbi in mutationibus producendis toto calo sepe distant, non est mirum, cum tamen omnes isti morbi uno nomine proferuntur, quod in compositis huiusmodi morbis sepe contraria observentur.

(1) prædicta  
nata  
observa-  
tionis.

(1) Acu-  
torum  
varietas.

IV. Alterum impedimentum, quod non minorem difficultatem parit, est Dieta varia & Regimen; quidam versantur in calidis & calefacientibus, alii laudant Regimen frigidum; alii venam secant, alvumque ducunt, & nil nisi antiphlogistica in acutis crepant; dum alii in eodem morbo per Alexipharmaca malignitatem seagunt ex cutis poris eliminare: ætas quoque varia & habitatonis loca citiori vel tardiori maturationi favent. In tanta quæso rerum diversitate si agiter morbus, qui ex sua natura certum habet temporis terminum, nonne unus bis potuisset absolovere totam periodum, dum alter vix pervenisset ad acmen? Imò vero hodie norunt media hyeme calore artificiali conciliato æstivos producere fructus. Atque media æstate in locis subterraneis creare glaciem. Sed si quis inferret, omnino incertum esse rerum ordinem, nemo huic haberet fulem; & tamen fidem præbent medicis, qui perversa curatione sua totum invertunt rerum ordinem, in morborum criticis diebus nihil certi inveniri.

(1) Varia  
Dieta,  
medica-  
tio, Cli-  
ma, Æ-  
tas.

V. Ex iis, quæ disputavimus, Criticorum dierum osiores nullam gloriam asportare possunt, nisi quod in omnibus morbis sic dictis Acutis non observetur certus temporis terminus: sed propterea non sequitur, omnes morbos acutos diebus criticis carere. Quia vero maxima pars Acutorum ex Morbis inflammatoriis constat, qui vel resolvuntur, vel abeunt in suppurationem, aut spaculum, atque interdum in putrilaginem, in his, inquam, si naturæ ordo non turbetur, accuratissime tempora Critica observantur, nisi morbus transeat in Putrilaginem. Fidem habeo ex manifestissimo morbo inflammatorio, variolis nempe benignis, nullus medicorum est, qui novit, quarto die erumpere exanthemata, septimo die suppurari, undecimo incipere exarescentiam, decimo quarto decidere arefactus variolas. Tantum in hoc valet naturalis & constans morbi mutatio, ut inde probati medici hunc morbum in quatuor stadia distinguant; eandem quoque constantiam in febre inflammatoria observamus. Qui vero variolas regimine calido trahat, citius facit, non tamen minori periculo absolvit hæc stadia: qui vero variolas aggreditur refrigerantibus, stadia sepe ad longius tempus protrahit; nondum tamen constat, Criticos dies inde ex sua natura incertos esse. Si vero variolæ abeunt in putrilaginem, quemadmodum in confluentibus non raro observatur, post eruptionem stadia omnino incerta sunt: adeo ut variolæ ultra viginti dies persistant. Ex hac ratione statuo, Criticos dies esse observandos in morbis Acutis, sed ne fallamur ex adiunctis signis, morbus Acutus in suas species est distingu-

Criticis  
dies in  
Acutis  
Inflam-  
matoriis  
observari.

guendus, atque solummodo in Inflammatoriis hæc rimandæ mutationes, quæ a veteribus ad Criticos dies referuntur.

*Causa criticorum dierum.* VI. Hac non contenti observatione practica, in morbis inflammatoriis causas hujus temporis conti sunt investigare, eamque plerique quæsierunt in Lunæ cursu, alii in stellis; sed quia Criticorum dierum osiores facile perspiciebant, omni tempore, & etiam contraria Lunæ phasi fieri Criticorum dierum annumerationem, eamque non referri ad Lunæ cursum, sed incipi numerari ab invasione morbi, quæ omni die fieri potest, hanc totam doctrinam non immerito repudiaverunt. Quare theoria Criticorum dierum huic doctrinæ semper obsuit. Verum quia, ut supra monui (*Aph. 48., 11.*) constantes mutationes sunt petendæ ex materia morbi natura, quæ eodem modo, ut plantarum semina, certo tempore ad maturitatem veniunt, florent, & ferunt fructum, solummodo restat sedulo perferuari, an non possimus ex observationibus practicis Criticos dies magis firmare, & ab erroribus, qui ex præpostera theoria irrepererunt, depurare.

*Dies Indices.* VII. Antequam Criticam evacuationem molitur natura, quæstio est, an non prius concitet in corpore mutationes, quæ sensibilia proferunt phænomena, eaque finito tempore prægrediantur; an vero crisis fiat sine præviis phænomenis. Si vero natura talia molitur, quæ instantem Crisin præfagiunt, & in iis servat ordinem, non erit sine ratione æque admittere Dies Indices, quam Criticos. Nullam hic inveniri impossibilitatem, ex iis, quæ superius disputata sunt, plane constat. Quippe non eodem tempore planta floret & fert semina matura, sed flores sunt frugum prædromi, & ex florendi tempore dijudicamus quoque, quo tempore matura sunt expectanda semina; neque pustulæ erumpentes in variolis statim sunt plenæ, sed ex tempore eruptionis determinatur maturitatis tempus. Illi igitur sunt Dies Indices, in quibus oboriuntur phænomena instantem evacuationem præfagientia.

*Quantum distant a Criticis.* VIII. Hippocrates passim alique Practici notant, si quarto die quædam apparent phænomena, septimo die futuram esse Crisin; si vero undecimo conspiciuntur, nos decimo quarto die expectaturos evacuationem Criticam: adeoque inter florendi & maturitatis tempus præterlabitur tempus trium dierum; num vero hoc sit possibile vel impossibile, non disputo, quia sola observatione practica veritas hæc firmatur, quæ me multosque alios practicos docuit, regulariter ea fieri, quæ Hippocrates notavit. Nonne unusquisque liberrime fatebitur, si videat septimo die ab invasione variolarum inchoare hinc inde pustularum suppurationem, regulariter omnes pustulas undecimo die maturas fore, & decimo quarto decidere? Quod si itaque quarto vel undecimo die in urina conspicio rudimenta seu inchoatam coctionem, nulla est ratio dissuadens, ex his signis apparentibus, hoc tempus vocare Diem Indicem. Dierum itaque Criticorum & Indicum doctrina firmo nititur talo, sed ex oscitantia, perversa medela, permissione multorum morborum a non satis in praxi attendentibus ad veterum nugæ, hæc temporum observatio damnata fuit.

## L I B. II. A P H. XXV.

30. *Quartana æstivæ plerumque sunt breves: autumnales vero longæ, & maxime quæ prope hyemem incidunt.*

*Criticorum dierum observatio firmatur Quartana.* I. Antequam redditur ratio, cur Autumnales febres quartanæ vernalibus plerumque sint longiores, non erit inutile, ex hoc Aphorismo adstruere veritatem Dierum Criticorum. Superius notavimus, solos dies paroxysmi numerari, ad intermedios apyrexie non attendi. Regulariter autumno incipientes Quartanae



næ evanescunt vere; adeoque æger per 180. dies circiter premitur a febre, in quo tempore sunt 60. paroxysmi. Hippocrates observavit in morbis longioribus quam dies 40., annumerationem fieri debere per vicenarium numerum. Inde 60. 80. 100. sunt ipsi dies Critici. Itaque febris quartana legitima, nulla perversa curatione aut errore victus turbata, satis respondet huic termino. Sydenham (Cap. v. de *Febribus Intermittentibus Annorum* 1661. 62. 63. 64.) sedulus morborum perscrutator, nulli addidit hypothese, ex meritis observationibus, ut fecit noster senex, firmare & excolere studens medicam scientiam, in eadem quoque est sententia, in Quartana scilicet febre Criticorum temporum habendam esse rationem, victus constante observatione, hic sola naturæ vestigia promens, hæc profert, verba, quod *Continuæ conceptam semel effervescentiam curvis unoque tenore persciant, Intermittentes autem partitis vicibus, ac diversis temporibus, eadem desuntantur.* Interim in utrisque fermentatio naturæ ducti peragitur spatio horarum 336. aut circiter. Hic igitur vir in practica observatione fidelis, victus observatione constante, voluit per numerationem horarum, ad tempus quatuordecim dierum restringere seu ad spatium 336. horarum, posuit pro singulo paroxysmo quinque horas cum dimidia. At vero inter nostrum & Sydenham calculum nulla est differentia essentialis, volumus enim utrique quartanam febrem diebus criticis finire, ille ad hoc faciendum facit additionem horarum, quibus premitur æger a paroxysmis, ego autem pro singulo paroxysmo posui integrum diem; sed si quis meum vel Sydenhami sequitur calculum, constat tamen, febrem Quartanam sequi Dies Criticos: dum Sydenham Quartanam perstringere voluit ad morbos acutos, ego vero ad morbos longiores, seu qui ultra XIV. dies excurrunt.

II. Antequam de febris Quartanæ longitudine & brevitate agitur, constare debet, qualem febrem medici intelligant per Quartanam. Omnes febres Essentialis dividunt in Continuas, Intermittentes, & Remittentes. Ex Intermittentibus, quæ per paroxysmos invadunt, & intermedias inducias faciunt, una est, quæ relinquit duos inter paroxysmos dies sine ulla febrili exacerbatione, hanc vocant Quartanam legitimam, quam quoque Hipp. hoc loco intelligit. Hæc vero si duplicatur, duobus diebus successivis paroxysmum facit, unum diem pro apyrexia relinquens, hæc dicitur duplex quartana, denique si omni die exacerbatur, eam vocant quartanam triplicem. Interdum aucto morbo & corporis viribus debilitatis, ita protrahuntur duplicati paroxysmi, ut mentiantur febrem Remittentem, vel Continuum. Ex his solis hoc loco intelligit puram, legitimam febrem Intermittentem Quartanam, quæ nullam commotionem febrilem duobus intermedijs diebus facit, nullum alium habet adiunctum morbum, in corpore ceteroquin sano & robusto.

Quartana febris.

III. Inutile foret tempus vernale describere, & adstruere, hyemem semper prægredi; at inde deducere, cur vernaes Quartanæ propterea fiant breviores, quam quæ adoriuntur autumno, altioris est indaginis. Ut ordine procedamus, investiganda sunt, quæ nobis naturaliter sunt hyeme, & qualem mutationem vere subeant. Hyeme aeris frigiditas facit, nos sine incommodo ferre posse majus pondus humorum (vid. *Perisp.* 193.) Eodem quoque tempore vix ulla fit in humoribus putredo: superveniens vero calor copiosorem dispositionem facit (Conf. *Apb.* 12. VI.) Qui morbi igitur ex deficiente motu, parciore dispositione in corpore fuere nati, ab accedente calore facilius solvuntur, & per intensibilem perspirationem dissipantur; quare regulariter non solum febris quartana, sed & alii morbi vernaes observantur breviores.

Vernalis cur brevior.

IV. Ut Hyems. Ver, ita Æstas prægreditur Autumnum; sed in æstate solis calore corpora magis ad putredinem disponuntur, quod attenuatum invisibiliter exhalat, verum accedente Autumno minuitur insensibilis perspiratio, colligitur corruptum in corpore, nam corpora Autumno solito sunt ponderosiora. Atque cor-

Autumnalis cur longior.

ru-

ruptibilia in ambitu telluris hærentia corrupta, virus emittunt, quod tam diu elevatur, ac aeris calor valet discutere vapores; sed vero accedente frigore, non desinunt tamen corrupta exhalare virulentiam, verum hæc in aere, quam inspiramus, hærens, nostrum corpus coinquinat, unde toties nascuntur morbi Autumnales præprimis post æstatem æstuantem. Adeoque hoc tempore frequentior est causa corpus inficiens autumnæ, quam vere: atque nos, ob parciorē diffusionem, receptam infectionem retinemus frequentius: imo quod inficit, pertinacius est, utpote corruptum, quod non patitur actione nostri corporis ementari, dum cruda vere accepta iterata tandem corporis actione assimilantur. Si igitur ex tali recensita causa formetur in Autumno febris quartana, non est mirandum, eam diutius persistere, quam si materia vernalis, quæ emendari & expelli facilius potest, quartanam concitaverit. Hæc omnia vera inveniuntur, si actione vitæ quartanæ materia sit subigenda & expellenda; sed si detectum habeatur antidotum, extinguens illam virulentiam, ut acidum & alcali se mutuo extinguunt, non erit opus tam diu tolerare quartanæ. Sed quia Hipp. hic agit de quartana, si actione vitæ curetur, curatio per antidotum hic non debet examinari.

Quo propius hyemem ingruunt, eo longiores.

V. Observavit præterea, quo propius hyemem, id est, mense octobri, vel novembri, adoritur quartana, eo longiorem esse. Ego vero in praxi febres quartanæ observare non potui; sed an verum vel falsum sit, non disputo: hoc autem inveni, non in omnibus epidemicis constitutionibus febres quartanæ, eas æque pertinaces esse.

# LIB. II. APH. XXVI.

41. **F**ebrem convulsioni supervenire melius est, quam convulsionem febri.

Morbus morbum esse supervenit.

I. **C**orpus morbo tentatum, non immune propterea est aliorum morborum. sed interdum alio infusper corripitur: novus accedens morbus vel potest ex eadem oriri causa, ut prior, vel ex sua causa propria. Regulariter quo una causa plura profert mala symptomata, quæ seorsim considerata tunc dicuntur morbi; eo majorem causam declarat: interdum vero quædam symptomata ex eadem causa concitantur, quæ futuram solutionem portendunt; sic sudor copiosus in febre, si absolute consideretur sudor copiosus, vocaretur morbus, sed nunc in febre oboritur, signum est solutionis. Si vero novus morbus accedat ex alia causa, illa potest corpus quoque aggravare, quia pejus est duobus morbis affligi, quam uno; interdum tamen accedens causa valet priorem extinguere, aut concitato motu, vel evacuatione priorem curare. Ergo non potest ex generalibus constare, quid sit melius, aut pejus, sed debemus hoc pendere in singularibus casibus. quæmodum hic facit Hipp. faciens comparisonem inter febrem & convulsionem, quoniam horum morborum primus veniat, melius, vel pejus iudicium præbeat.

II. In proposito aphorismo duo citantur morbi, Febris nempe, & Convulsio, qui se mutuo sequi possunt, non tamen perinde est, quoniam horum primus veniat. Aliis in locis dicit Auctor, febrem supervenientem solvere Convulsionem, & a convulsione superveniente perire, qui correptus est febre: hoc autem loco comparisonem facit melioris & deterioris. Observavit quidem noster Senex hanc in praxi veritatem, qualis vero subsit causa differentiam ponens, Commentatores maxime laborant investigare. Inde provenire debet, quod febris possit minuire, vel expellere Convulsionis causam, verum Convulsio non valet febrem causam tollere, verum eam potius augeat, vel denotet, novam morbi causam aggravantem accessisse. Igitur opus est, generales Febrium & Convulsionum causas & effectus rimari, ex quibus hæc veritas est elucidanda.

III,

III. In nostro corpore vivente duo diversi præprimis motus observantur, unus qui vocatur vitalis, in quem nullum exercemus imperium; alter vero animalis, qui a nostro arbitrio dependet. In motu vitali, qui consistit in alterna constrictione & relaxatione, quamdiu fumus sani, hanc invenimus legem, ab omni irritatione vel stimulo facere vel vibrationes suas frequentiores & potentiores, vel producere continuum constrictionem, quem motum Tonitum vocant, sed ab Hippocrate Tetanus. Quod si motus alterius fiat potentior & regularis, adjacentes humores quam maxime propellit, & corpus aucto attritu incallescere facit; sed inordinate si fiat & simul valide, tunc in organo vitali vocatur Convulsio; si vero successively fiat per aliquod organum & adjacentes partes, vocatur Convulsio fluctuans. Talis motus alterne constringens violentus in musculis motus animalis, etiam vocatur Convulsio, quæ si validior cum sensuum extinctione, Epilepsiam vocant. Costante observatione practica experimur, ex multo minore causa generari Convulsionem in organo vitali, quam animali, frequentior enim fit convulsifica intestinorum & ventriculi agitatio, quam Convulsio in membris externis.

Convulsio-  
nis des-  
criptio.

IV. Febrem autem definire laud facile est, quia tria stadia diversa observantur, quæ tamen omnia vocantur febris: ita in initio dum frigus urget cum motu vitali minore; in vigore dum Calor est ingens cum motu vitali aucto; in remissione dum sudor erumpit, redeunte motu vitali ad solitum tenorem, cuncta hæc ita distincta tamen vocantur uno nomine febris. Si hæc ab aliqua interna causa inferantur, plerumque noxium hoc incipiens agere, sistit motum vitalem, sed dein pergens, quam maxime motum vitalem instigat, quo transfluentes humores commutantur fere omnes (nam putrefactum & compactum hoc motu non assimilatur) ex sua natura in indolem nostram primo, sed dein pergentem motu aucto vel compinguntur in Lentorem vel deteruntur in Excrementitium. Hoc absoluto stadio, dum languere incipit ille motus, quod in excrementitium fuit conversum, per emundatoria cutanea sub forma sudoris eliminatur, atque sanguis hoc majore motu compactus sensim iterum incipit liquefcere.

Febris  
definitio.

V. Si nunc causæ & effectus convulsionis & febris inter se conferantur, facile erit definire, cur in convulsionibus quibusdam, si febris veniat, fiat solutio. Frequens enim causa convulsionis est acrimonia cruda, quæ ex spontanea mutatione est nata, quæque motu circulatorio aucto subigi potest & expelli, hæc ergo irritans nervos, faciens convulsionem, per motum vitalem auctum in secundo stadio febris subigitur sæpe, atque demum una cum sudore febrili in tertio stadio febris expellitur. Quare quoque huiusmodi Convulsionem per calefacientia aromatica curantur: non quod illa medicamenta specifica virtute extinguant acre Convulsionem faciens, sed instigando & roborando motum vitalem hæc materies vel assimilatur, vel expellitur. Utique omnis naturalis concessio in nobis viventibus hoc motu absolvitur, si moderatus sit, vel & paulo major: verum si multum augetur, multa quoque destruit, & optimam preparationem invertit. Est enim in nobis Cœlio talis materię morbi commutatio, quam amplius non valet symptomata morbofa producere, vel qua ita invertitur, ut quæ antea non potuit evacuari, nunc possit per organum secretorium a reliqua massa segregari. Quæ commutatio producitur motu circulatorio moderato, aut paulo majore, quam qui fit in sanitate. Nam languidior circulatio permittit spontaneam corruptelam, & validior nimis compingit.

Febrem  
convulsio-  
ni super-  
venire  
melius  
est.

VI. Si autem quis febre correptus convulsionem tentatur, sive illa oritur ex eadem febris causa, sive ab alia accedente, nihil boni inde possumus expectare: nam ex eadem causa veniens, declarat accedens convulsio in motu vitali causam fuisse auctam, quia ex multo minore causa commotio febrilis potest concitari, quam Convulsio: illa si præterea fiat in musculis motus animalis, adhuc majorem cau-

Convul-  
sionem  
febris su-  
per-venire  
pejus est.

fam significat, quia leviore causa motus vitalis inordinate convellitur, quam motus animalis. Neque juvat, ex nova accedente causa generari Convulsionem, quia non cogita est causa. Convulsionem faciens, quæ causam febrilem extingueret, ergo homo duabus causis morboſis laborans, quæ se invicem non destruant, in majore discrimine versatur, quam antea. Neque quidquam boni ex effectibus Convulsionis expectamus, ipse enim motus convulsivus major non subigit, neque assimulat, neque expellit febrilem causam, ille motus non est talis, qualem in motu febrili notavimus, qui humores concoquit, aut præparat, sed semper mala parit. Historiæ quidem testantur, motu febrili multos morbos curari, sed non novi, ab aliquo observatum fuisse, per motum Convulsivum unicum morbum fuisse sublatum. Ergo recte statuit noster Senex in hoc brevi, sed & utilissimo Aphorismo, melius esse, ut febris superveniat, quam Convulsio.

L I B. II. A P H. XXVII.

32. **H**is, quæ non secundum rationem levant, credere non oportet, neque timere valde, quæ præter rationem sunt præva, multa enim horum sunt inconstantia, nec admodum permanere, neque durare solent.

Ratio in  
morbis  
quid sit.

**T**otum mysterium hujus Aphorismi in cognitione rei, quam Rationem vocat Hipp. constitum est, quæ enim ex Ratione sunt, sunt constantia & permanentia, quare si bona phenomena fiant ex Ratione, certa salus instat; si vero mala fiant, valde timendum. Quæ vero bona sunt sine ratione, his fidei non debemus; & mala non admodum debemus vereri. Ut igitur omnibus constet quid sit Ratio in Morbis, in memoriam revocandum est, omnem materiam morbosam rem esse distinctam in corpore vivente, quæ non erat in facilitate præsens, sive lateat sine ullis phenomenonis, ut sæpe materies Luis veneret, & multorum aliorum morborum, antequam indicia præberet, sive manifesta signa exhibeat. Hæc res sui juris est, sed agitur actione vitæ, quare ut semina malæ herbæ, tandem adolescit, & in morbum perfectum erumpit. Ille autem morbus cognoscitur suis signis propriis, distinguiturque iisdem a ceteris, ita ut multa signa aliis quoque morborum causis sint communia, sed tamen quædam proferit diversa, quæ in nullo alio morbo conspiciuntur, vel quædam phenomena una proferit, qualia unita in nullo alio morbo inveniuntur; aut facit consequentiam singularem causarum antecedentium & signorum præsentium, quæ simili ordine in aliis morbis non occurrunt. Ex his tribus valet peritus Medicus unam morbi causam ab altera distinguere. Si tali modo rimatus est causam, non amplius versatur in perscrutandis signis, sed mentem applicat ad detectam causam, consulit dein vel fideles Auditores practicos, vel propriam experientiam de natura & naturali mutatione causæ detectæ; ex his invenit quales mutationes huic causæ sunt naturales, quæ mutationes fiebant, & qualia signa apparebant, dum causæ hæc viribus vitæ superabatur, atque ita extinguebatur; quales fiebant, si causæ hæc commutabatur in aliam naturam; & denique quales apparebant, si causæ hæc mala superavit vires vitæ. Ista mutationes tam parum ex proprio ingenio potest deducere, ac potuisset Botanicus ex conspecta radice vel semine ignoto terræ commissio divinare, qualia folia, flores, & fructus, sint expectanda. Sed si simul viderit ista omnia producta, tunc deinceps novit Botanicus quales mutationes futuræ sint, quoties suum cognitum semen vel radicem terræ committit. Ita quoque nos non a priori valeamus ex detecta causâ divinare mutationes futuras, sed si ipsi observavimus omnia producta istius causæ, vel legendo ex aliis observatoribus horum notitiam nobis comparavimus, valeamus ex causâ detecta,

sta, secundum ordinem mutationem huic causæ naturalem, quædam prædicere certa: quæ ab indocto prædici non possunt. Has mutationes naturales detectæ causæ in ægro apparentes, dicimus fieri ex Ratione, seu secundum Rationem, quia morbi causæ sequitur naturalem ordinem: si vero quædam alia phenomena in illo ægro apparent, non provenientia ex naturali ordine causæ, hæc dicuntur præter Rationem fieri, siue signa sint bona vel mala, quoniam vel ex aliquo incidente, vel nova accedente causa producantur.

II. Cuncta igitur phenomena, siue ad salutem, siue ad mortem tendunt, quæ naturalem mutationis ordinem sequuntur, constantia esse debere, nullus erit qui dubitet; nam, nisi ponatur, verbi gratia, in progerminando aliquod infortunium, planta suis temporibus fert folia, flores, semina; ita etiam in progressu morbi, materia infert suo tempore constantia symptomata: quam primum vero ob aliquod infortunium aliquo modo ab ordine deflectitur, propterea non infertur totius materiæ mutatio, sed cessante illa levi causa, quæ aliquam in ordine induxit mutationem, materia morbi viribus vitæ ulterius agitata ad priorem ordinem redigitur.

Quæ sunt præter rationem inconstantia sunt.

III. Quia ordinem turbans plerumque levis est causa, hæc viribus vitæ facile vincitur; quare morbi prioris causæ, deim sola in corpore relicta, pergit suo suscepto ordine absolvere totum cursum, qui per levem illam causam interruptus fuit. Si vero accedens causa quoque sit valida, ordo morbi fit permixtus ex binis morbofis causis simul agentibus. Sed quia accedens causa levis esse solet inferens ordinem turbatum, inde noster Auditor recte statuit, symptomata illa non diu solere permanere & durare; si vero illa causa semper esset levis, diuisset absolute illa anomala non diu durabunt.

Nec admodum permanente solent.

IV. In morbis periculosissimis, ex quorum causæ natura nobis per constantes in morbis observationes constat interitum esse expectandum, si aliquod bonum fiat phenomenon, uti videtur, huic monet non esse fidendum, quia tale quid provenit, vel quod morbi materia pro tempore quasi latitet, vel quod vis vitæ superata vehementia non inferat symptomata, sed mitia, & maligna symptomata ægro blandiantur. Ita febris ardens cum diris & vehementibus symptomatibus subito si lenimen doloris infert, tunc monet noster Senex, huic Levamini non est fidendum, ut multi faciunt, existimantes ægrum nunc esse incolumem, quum liberetur a gravissimo illo dolore, sed istud levamen erat sine Ratione, quia in eo morbo ex naturali ordine causæ tam subito sine manifesta humoris morbofi evacuatione non potuit fieri solamen. Ita in Pleuritide in suppurationem abeunte, si æger subito sine multa sputi vel urinx sedimentosæ evacuatione libere spirare incipit, hoc est sine Ratione; nam pus factum sine sensibili evacuatione non potuit evanescere; ergo id levamen est infidele: forsan abscessus fuit ruptus, effudit pus in cavum pectoris sed non liberavit hominem. Quare semper in memoria tenendum dictum Auditoris: non debemus fidere iis, quæ præter Rationem fiunt, neque valde timere oportet præter Rationem si valida oriantur symptomata, sæpe enim vis vitæ instante Crisi validissima infert symptomata, quæ tamen non veremur, cum nox ante crisin soleat esse gravis (Aph. 38. II.)

Neque oportet hac timere, aut dare.

## L I B. II. A P H. XXVIII.

33. **F**ebriticantium non omnino leviter, permanere, & nihil remittere corpus, aut etiam magis quam pro ratione colliquefieri, malum est. Illud enim morbi longitudinem indicat, hoc vero infirmitatem.

**N**on oportere iis, quæ præter rationem fiunt, fidere, neque ea admodum vereri in præcedente exposuimus, hujus rei in hoc Aph. tradit non solum

lum exemplum, sed id insuper ita exhibet, ut quoque ad prognosin applicari possit. Ex ratione enim est, ut corpus extenuetur proportionaliter cum magnitudine morbi. Si vero extenuatio corporis non respondeat magnitudini morbi, aliquid anomalum adest, vel quod impedit extenuationem, vel nimiam extenuationem facit. In hoc Aph. igitur videndum. (1) Ex qua ratione febres naturali ordine corpus debeant extenuare. (2) Ex qua causa talis in febre interdum non fiat Extenuatio. (3) Quæ causa præter modum corpus in febre emaciet. (4) Cur causa impediens emaciationem possit morbi Longitudinem prælagire. (5) Denique cur causa nimiam Extenuationem faciens Infirmitatem declareat.

Febris cur  
extenuat.

II. Nulla cognita est febris totam periodum absolvens, quin faciat majorem circulationem, & calorem, & finitur sudore copiosiore, si legitima sit: atque febris tempore pauciora ingeruntur alimenta, aut si æqualis ingeratur quantitas, ingesta tam probe non assimilantur, quam in sanis; quare secundum rationem est, facta largiore excretionem, cum parciore restauratione, corpus Extenuari, præprimis cum calore concitato etiam pinguedo liquefcat: simul per parte exeat. Quo igitur febris est major, eo etiam major Extenuatio fieri debet; quæ nisi sit notabilis, vix oculis animadvrti potest, inde in febre levi non observatur, sed in febre validiore, ut monet Auctor.

Quando  
febris va-  
lida non  
extenuat.

III. Sive post febrem seu in fine febris fiat copiosior evacuatio, sive non, sive ægri plus sub forma sæpe potationis assumant quam evacuant humores, tamen nimio motu febrili sæpe degenerati a sua indole. Hic humor evacuatus, ut monuimus, Extenuationem inducit; sed si non egeritur plus quam ingeritur, nulla fit Extenuatio: hoc si fiat, quia colliquefactum non expellitur, remanebit morbosus humor in corpore: si vero plus ingeritur, corpus erit crudo onustum.

Cur febris  
nimiam  
extenua-  
tionem  
inducat.

IV. Secundum rationem esse, tantam fieri Extenuationem, quæ proportionata est febrì, ex dictis colligi potest: interdum tamen hæc Extenuatio modum excedit, & propterea non dependet a sola febris agitatione, sed ab alia accedente causa. Hæc plerumque est Putredo vel Colliquatio, qua humores attenuati nimia copia excluduntur; ita ut pro magnitudine febris nimis extenuetur, ut sæpe observatur in febre Hæctica & Colliquativa dicta, in qua cum exigua incandescencia febrili sæpe summa observatur Extenuatio corporis.

Morbi  
longitudo  
ex minori  
extenua-  
tione.

V. Morbus solvitur actione vitali, si morbi materia subacta evacuationi adaptata, tandem viribus vitæ e corpore eliminatur: si vero illa materies non expellitur, uti in minori Extenuatione demonstravimus, vel quando interim operatur multo crudo, finis morbi secundum rationem non potest adesse; quare vel protrahitur idem morbus, vel recidivat, vel in novum alium morbum degenerat, prout nempe natura est materię retentæ, nunquam vero totus desinit. Quare ex hac observatione prædicta non solum prælagirem longitudinem, sed unum ex his tribus.

Cur nimia  
extenuatio  
Infirmitatem  
præla-  
git.

VI. Nulla observatur causa citius extinguens vires corporis quam Colliquatio humorum, quando naturalis potentia inter partes nostros liquores constituentes ita aufertur, ut vix cohereant: igitur si per motum febrilem majorem exhauriantur vires, ut sit ab omni febre, atque insuper per Colliquationem nova accedat debilitatis causa, nullus dubitare potest, quin major debeat generari Infirmitas. Hæc autem utraque operari causas in nimia Extenuatione post febrem superius comprobavimus.

## L I B. II. A P H. XXIX.

54. *Incipientibus morbis, si quid movendum videatur, move: vigentibus vero, quiescere melius est.*

Moven-  
dum quali  
sensu acci-  
piatur.

I. Omnes fere Commentatores per *movendum* intelligunt Evacuare per vomitum, secessum, & sanguinis missionem; verum frequenter verbum *xiv* signi-

significat omne id, quod existimas faciendum esse quovis auxilio; interdum quoque concitare motum indicat. Vix videtur verisimile Hipp. hoc loco voluisse *Evacuare*, nam de hac significatione superius egit (Aph. 22.) & de alvi ductione in Principiis (Aph. 24.) Quare in hoc loco examinaturi sumus. (1) An movendum sit, id est major motus faciendus. (2) An reliqua auxilia, inter quæ numerari possunt antidota, in principiis morborum sint adhibenda.

II. Non omnium morborum principia eodem modo tractanda, quum quævis causa suam propriam naturam fervet, quare in hoc loco solummodo agere constitui-mus de Incipientibus febribus, quia Hipp. versatur in curationis & signorum regulis in febribus tradendis. Junio-rem Medicum ancipitem hærere, num in febrium principiis debeat antiphlogisticis refrigerantibus temperare motum, num vero Alexipharmacis & Calefacientibus debeat intendere motum, nullus dubio; nam si inspicio praxin hodiernam, tota fere in principiis febrium constat, nitrosis, diluentibus, succis fructuum horæorum, acidis & acescentibus, junior medicus his imbutus si consulit Veteres, inveniens Veteres sæpe hoc tempore præscribere Alexipharmaca calida, sudorifera, ita incertus tamen praxin exercet; interdum ex doctrina comparata in ægro, qui alexipharmacis curandus erat, adhibet Refrigerantia, vel Veterum vestigia premens, præpostere proponit interdum Alexipharmaca. Quod si nostri Auctoris monitum fuisset securus, non ita versatus esset in ancipiti. Hic enim dicit, *si quid movendum videatur, move*. Vult itaque ut attendat medicus, num motus major sit faciendus in morbi principio nec ne; Si vero judicas movendum esse, move non cunctanter, sed in principio. Ergo hoc loco præprimis examinandum venit, an non interdum in principio febris debeamus motum majorem facere. Nullus est, neque ex Hodiernis, neque Veteribus, quin credat, si morbi materia viribus virâ sit subigenda, tantum concitandum esse motum, qui valet eam materiam morbi subigere & expellere; hinc veteres alexipharmacis hunc motum augere conati sunt, ut eo citius subigatur morbosa materies; quare adhuc multi in principiis variolarum alexipharmacis satagent extrudere materiem variolosam, non attendentes nimio motu omnem laudabilem coctionem inverti, materiemque cum ægri damno ante maturitatis tempus extrudi. Ea mala observantes neoterici, sæpe ex nimio motu & calore ante legitimum tempus materiem extrudi, omni ope conati sunt refrænare hunc motum refrigerantibus antephlogisticis, præprimis cum observent usu horum ægros multo quietiores esse. Verum hac methodo sæpe ita frænatur motus, ut ægri vires multitudine materiæ obrutæ extinguantur. Quid ergo sentiendum de his ita oppositis curationibus? num olim & nunc non sunt naturæ febrium eadem? an mutabitur rerum ordo, secundum Methodi mendi mutationes? Minime. Constans & perpetua est naturæ lex in morbis, sed variatis opinionibus misere agitur. Interdum enim sedatior motus, quam ad suba-ctionem & expulsionem materiæ morbi requiritur, est concitandus; interdum effræ-nus motus, quia omnia perverteret & destrueret, est sedandus. In hoc igitur casu dicit Hipp. si observas motum non sufficere, quod ex pulsu, calore corporis, & tinctura urinae cognoscimas, *move* in principio, ne vires a materia morbi op-primantur, & nimis diu protrahatur primum morbi stadium, aut relinquantur in visceribus impaëta morbi materia, quæ ad ambitum corporis erat pellenda. Si autem observas motum satis valere, non egebit stimulo. Quare sedulo attenden-dum in morbis, qui actione vitæ sunt curandi, ut tantus concilietur motus, qui valet superare, & temperetur, qui destrueret, ut ita moderato; & id est paulo majore, quem qui fit in sanitate, motu subigatur morbi causa.

III. Si vero primum stadium percurrit febris, & ad vigorem venit, non tam tu-gore non absolute præcipit, nunquam in vigore morbi movendum esse, sed exi-  
sti-  
Cur in vi-  
gore quie-  
scere me-  
lius est.

An major  
motus fa-  
ciendus in  
principiis.

Simat melius esse statim in principio. Si a principio morbi ita valuerunt vires, ut morbus ad Vigorem pervenire potuerit, fere semper hoc tempore plus mali expectandum ex nimio motu quam languente, Calor tunc & pulsus durus frequens, cum corporis siccitate urgere solent, tunc oleum non est addendum carnino, quare satius est sedare tunc illum nimium motum, ne omnia invertat & destruat. Post hoc autem stadium, si vires languere incipiunt, corpusque refrigerari, iterum erat tempus movendi, sed de hoc tempore alio loco dicitur.

An in principis antiodota danda?

IV. Si vero occurrit febris, quæ virtute medicamenti abigi potest, non quod medicamentum majorem aut minorem motum faciat, & ita curet, quia talis methodica curatio habetur pro curatione ipsius naturæ, sed per auxilia, quæ vel eliminare valent e corpore morbi materiem, vel ita extinguere, ut priorem naturam exuant, ut fit ex permissione acidi cum alcali. Secundum nostri Auctoris sententiam hæc essent facienda in principiis. Hoc imitati sunt multi & in Arte Medica Clarissimi viri, exhibentes vomitorium, vel purgans, vel sudoriferum eo tempore, ut eorum maxima fieret operatio in incipientibus paroxysmis, hæc pro arcanis sæpe sunt vendita vel celata, quasi specifica virtute infringerent materiem febrilem, dum tamen tota virtus in evacuatione erat locata. An vero in exhibitione Antidoti febris hoc quoque debeamus sequi, non consentiunt; in aliis autem Antidotis apud omnes valet, quo citius adhibentur, eo præstantius, ne, ut ajunt, malum nimis altas egerit radices: febrifugum autem excipitur a multis, ex quo autem fundamento, non satis exponunt. Generalis observatio est, quo citius applicetur Antidotum, eo melius: debet esse igitur aliquid singulare in materia febrili, quod facit recedere ab hac regula generali. Si perscrutemur venena & alias causas, quæ antidotis tolli possunt, fere omnes non patiuntur viribus vitæ subigi, ita venerea lues, hydrophobia; ergo quia in his nihil boni expectari potest cunctando, protinus ad antidota se conferunt Medici, sed febrilis materia sæpe sine auxilio a viribus vitæ subigitur, quare expectando absolvitur pars curationis: verum Acrimonia acida quoque viribus vitæ subigitur, non tamen dubitamus protinus propinare acidi Antidotum. Quare non satis firma stat sententia, nam omnino esset illicitum protinus Antidoto abigere febrem, si pura sit, nullusque alius præterea in corpore morbus, qui motu febrili posset minui. Experientia dictum firmat, sæpe enim fugata fuit febris Antidoto, sine ulla remanente labe morbosa, in principiis propinato; sed si febris corpus fecit ex ægritudine debile, sæpe fugata febre remansit Cachexia, vel Hydrops, qui morbi tunc perverso usus corticis peruviani adscribuntur. Si vero recessisset usus salis Ammoniaci, Gentianæ, Centaurii minoris, Absinthii, Cardui benedicti, Chamæmel, vel antiquarii Riverii, aut cujusvis novi inventi Antidoti, omnino caret periculo, solo autem Cortice subacta febris periculum inferret, quis credere posset?

## LIB. II. APH. XXX.

35. *Circa principia & fines omnia sunt debiliora. Circa vigores vero vehementiora.*

I. Hippocratem in præcedente magis respexisse ad motum faciendum, vel alia auxilia adhibenda, quam ad evacuandum, hic Aphor. declarat, qui veluti ætiologia est præcedentis; quasi diceret Auctor: si scire vis, quando movendum est, id ex temporibus morbi potest peti, nam movendum est, si debilis est motus, sed motus sedandus est, quando nimis viget, quia motus debilis est circa principia & fines, his igitur temporibus movendum est, sed nimis motus temperandus est in vigore. Tria tempora citantur, in quibus statuit regulas, nempe prin-



principium, vigorem, & finem: paucis videbimus, quid sit sentiendum de momentibus & motum sedantibus in his temporibus.

II. Quid per morbi Principium sit intelligendum, superius (Apb. 24. IV.) exposuimus: in hoc loco accipitur pro toto illo tempore, quod est ab inchoatione fere usque ad summum vigorem, vel notabile incrementum symptomatum. Cur autem hoc tempore omnia sint debiliora, non potest ex quantitate vel qualitate materiae morbi deduci, sed ab instigatis viribus vitae. Concipiamus noxium hærere, quod irritando febrem excitat, hoc noxium hærens in corpore non augetur quantitate, sed viribus vitae, si mutabile sit, subigitur aliquo modo, quare dici non potest in morbis, qui sanantur, circa vigorem deterioiorem accepisse indolem, quum aliquo modo id noxium sit subactum seu coctum, id est preparatum ad excretionem. Verum vis vitae instigata a noxio, non statim vehementissimum motum concitat, imò in invasione febris ut plurimum sistitur, ut patet ex frigore, quo fere omnes febres incipiunt. Sed pergente irritatione sensim magis concitatur motus vitalis, ita ut in vigore sit validissimus, tunc sapius corpus plus patitur ex eo motu aucto, quam ex ipsa morbi materia. Quod igitur circa principia omnia sint Debiliora, non ita debet intelligi, ac si vellet Hipp. vires corporis circa principia sunt Debiliores, sed motus vitalis tantum non est instigatus ac in Vigore. Si ergo videas pro ratione morbi motum vitalem non satis incrementum, stimulus debet addi, ut legitimo tempore per motum vitalem majorem subigatur febris materia.

III. Lex est perpetua in motu vitali circulario, ut si pars quædam stimuletur, non protinus concitet magnum motum, sed si continuetur stimulandi causa, sensim magis magisque ille motus intendatur; tandem eousque intenditur, ut si stimulandi causa non auferretur vel exstingueretur, pars ea destrueretur vehementissimo illo motu, & fieret sphacelus. Dum ad illum vigorem proritatus fuerit motus vitalis, morbi materia hac agitatione subigitur, atque ita vel tollitur vel mitigatur causa, si morbus tendat in salutem: nam nisi hoc fiat, pars ita agitata periret. Igitur circa tempus mutationis materia vehementissimus est motus vitalis: inde phenomena, quæ per hunc motum concitantur, hoc tempore, nempe in Vigore morbi, sunt vehementissima; non quod morbi causa tunc maxima sit, est enim tunc aliquo modo subacta, sed quia tandem motus vitalis fuerit instigatus.

IV. Post vigorem si homo convalescet, superata est morbi causa, verum omnis materia non ita est subacta & expulsa, ut nullo modo natura stimulari possit, quare ex residuo sed mitiore motus quoque vitalis cessare incipit. (2) Etiam si omnis materia esset ablata, statim non haberetur quies. Ut si spina sit infixa carni, concitatur dolor & calor in tali parte ex irritato motu vitali, sed si tollatur spina, ita ut nulla remaneat stimulandi causa, quemadmodum in ablata palea in oculo illapsa, quæ concitavit oculi inflammationem, per aliquod tempus, tamen continuatur nimis concitatus motus, sed sensim mitescet. (3) In morborum acutorum & febrium materia stimulante, quando totius corporis vires vitae fuere instigatae, post tam longum motum validiorem, incipiunt quoque deficere spiritus, quare ex defectu virum debet motus minui, seu symptomata minus valentia esse. Si vero ex hac sola causa, defectu, nempe spiritu, languescere incipit motus, symptomata videntur mitescere & debiliora fieri, sed sunt maligna, id est periculosa, sed non vehementia. Si vero mitescant defectu virum, una cum stimuli subactione, sæpe materia ita subacta, quæ viribus valentibus fuisset expulsa, in corpore retinetur, vel recidivam, vel novum morbum, vel mortem creat: opus est ergo hoc tempore instigare vires vitae, ut subacta illa materies expellatur. Hinc est, quod in fine morborum acutorum, & circa finem sæpe debeamus dare calefactientia, vinosa, spiritiosa, aromatica, ut moveamus, quæ in morbi vigore prohibentur, quia tunc magis veremur mala ex nimio concitato motu, quam ex multitudine vel ma-

Cur circa Principia omnia debiliora?

Cur circa Vigorem vehementiora?

Cur circa fines debiliora?

88 MEDICINA HIPPOCRATICA Aph. 55.  
malignitate materię morbi. Propterea aurea hæc est regula, quam præcipit in hoc Aph. Auctor, si conferatur ad præcedentem Aph. ut sciamus, quiescendum esse in Vigore, sed sæpe movendum esse in principiis & finibus morborum.

L I B. II. A P H. XXXI.

56. **A** Morbo belle comedenti; nihil proficere corpus; malum est.

**I.** Hic Aph. maxime convenit præcedenti, (33. II.) ubi exponitur, si quis post morbum multum comedens non roboretur, verum ibidem ut signum proponitur hæc sententia, nam denotat, corpus uberiore alimento uti in hoc autem loco non solum refertur ad robur virium, sed ad quantitatem quoque humorum, quare hic videndum, cur sit malum signum, si corpus non proficit, id est recuperat quantitatem, & sanum colorem humorum, postquam a morbo præcedente fuit liberatum, & satis comedit.

Convalescentes  
belle comedentes  
quid significat?

II. Quando morbus præsens vel sponte vel arte sublatu s fuit, propterea non statim perfecta recuperata est sanitas, quia nostrum corpus per morbum fatigatum, etiam si omnis istius morbi materia fuerit ablata, statim non superavit eam debilitatem ex morbo natam, & emendavit mutationem humoribus induclam, sed exigit aliquod temporis spatium, ut dicta emendet. Hoc non solum in morbis, sed etiam in exercitiis sanorum observatur, qui enim a laboribus desistit, aliquamdiu tamen manet lassus & fatigatus. Ut igitur resciantur ea mala, quæ a morbo relicta sunt, duo præprimis requiruntur. (1) Continuo sunt toti corpori suppedianda alimenta in primis viis præparata, quæ rescire possunt amissum. (2) Illa bona humoribus circulantibus tradita, ulteriori actione humorum & virium vitæ sunt assimilanda, ut resciantur id amissum. Non habemus certius criterium, ex quo constet, cum alimenta recte in primis viis præparentur, cum quod æger belle comedat, id est habeat famem satis valentem, & nullam molestiam sentiat ex assumtis. Igitur belle comedere designat, primam coctionem laudabilem esse.

Nihil proficere cur  
malum?

III. Qui ita comedit, semperque bene elaboratum chylum adfert sanguini, ex ratione videtur, tale corpus non solum sensim recuperaturum vires, sed etiam restauraturum amissam quantitatem humorum & pinguedinis, ita ut sanitatis splendor, quem per morbum præcedentem amiserat, brevi recuperetur. Si vero ea bona non sequantur, sed maneat corpus macilentum & exhaustum, aliquo lurido colore infectum, certissimum est eum laudabilem chylum, sanguini traditum, non commutari in bonos humores: quare indicium est aliquid a morbo fuisse relictum, quod hanc laudabilem refectionem intercipit & invertit. Malum utique est videre signa indicantia in corpore latitare morbosum, quod bonum chylum corrumpit. Est etiam malum præsagium, nam quamdiu corpus non proficit, timor est, ne aliquis morbus ex latente causa sit nasciturus. Operæ pretium est hic examinare causam, quæ facit, ut corpus nihil proficiat. Talis homo convalescens satis magnam copiam alimentorum ingerit, & quia corpus non augetur mole, necesse est, ut quoque habeat magnam evacuationem. Dux frequentissimæ hujus rei causæ inveniuntur in convalescentibus. Prima est tanta inducta imbecillitas virium in organis hæmato-poieticis, ut non valeant bonum chylum traditum in sanguinem alioque nostros sanos humores convertere; sed reddunt chylosum & utile vel per urinam, quæ tunc plerumque est alba crassa & copiosa, vel per alvum, quando dejectiones sæpe observantur chylosæ & solito copiosiores. Vidi ex hac causa miram faciem morborum esse natam, nam si ita diu manent valetudinarii, hoc crudum in acrimoniam sensim conversum plerumque aggreditur nervosum flamen, quod debilitatum & hoc acre irritatum versatile sæpe præbet dolores, vel miras convulsiones sæpe in partibus

bus motui vitali destinatis. Altera est relicta in humoribus putredo, quæ recipiens bonum chylum, eum in similem convertit corruptelam, hinc urina copiosa & colorata, atque sæpe spumosa, interdum tenuis, si omne chylosum liquefactum fuit; interdum vero crudo sedimento varii coloris saturata; imo sæpe tota massa manet turbida, quando materia non satis fuit liquata. Qualis est urina, talis est lymphæ per vala lymphatica cutis & oculorum trajecta, nempe sanorum lymphæ erat candida, & sanguinis globuli rubri miscelam rosei & splendidi coloris in cute producebant, nunc vero ex chylis & humoribus bonis, si adsunt, per corruptelam generatur flavescens corruptus liquor, atque pauci sanguinis globuli rubri, unde nascitur color ex pallido flavescens, ut est color cachecticorum, cum corporis extenuatione, qualis morbus vocatur a Medicis *phthisis nervosa*, qui, nisi succurramus, hominem post longam infirmitatem tandem interimit. Non sine ratione ergo pronuntiavit noster Auctor, malum esse non proficere corpus, tanquam signum latentis mali, & tanquam prælagium mali instantis, sæpe enim noster Auctor tales suo tempore observavit inde natos morbos, quales hodie in praxi quoque occurrunt.

## L I B. II. A P H. XXXII.

57. **U**T plurimum omnes, qui male habent, circa principia quidem bene comedentes, & nihil proficientes, ad finem rursus cibum non appetunt. Qui vero circa initia quidem cibum omnino non appetunt, postea autem bene appetunt, melius liberantur.

**I.** **N**on consentiunt Commentatores, quodnam morbi tempus hic ab Hipp. intelligitur, nempe Morbi initium, an vero initium Convalescentiæ, quod est tempus (*Comp. T. 53. XV.*) post finem morbi. Si autem respiciamus ad præcedentem Aph. voluit Hipp. initium Convalescentiæ: in qua quoque sum sententia. Versatur enim Hipp. in descriptione appetentiæ Convalescentium, & affirmat, belle appetentes malum producere, si Convalescens inde nihil proficit. Nunc vult amplius illa mala exponere, nempe observavit in Convalescentibus valetudinariis, id est in omnibus, qui hoc tempore male habent, ad finem cibum non appetere, & inde morbum recidivasse, vel novum fuisse natum morbum. E contra observavit in initio Convalescentiæ, ægros vix cibum appetere, postea vero bene appetentes melius liberari. Quare hoc *initium* non est morbi, sed Convalescentiæ. Hanc mutationem appetentiæ, quæ maximi momenti est in utroque tempore, nostris Commentariis explanare conabimur.

Quodnam morbi tempus intelligendum.

**II.** Ut homo percipiat, num Alimenti defectus sit in corpore, nobis innata est sensatio, quam famem vocamus, qua monemur corpus egere alimento, hæc igitur sensatio est naturalis, si defectus alimentorum excitatur: sed si eodem tempore, dum corpus privatum est alimento, homo non percipit hanc sensationem, morbosam est causam naturalem perceptionem, ad vitam sustentandam tam necessariam, intercepti, vel extinguens. Ergo Inappetentia semper agnoscit morbosam causam (*vid. Exercit. III.*) nemo enim medicorum diceret, hominem alimentis saturum laborare Inappetentia. Verum appetentia potest esse naturalis & morbosam; si enim defectus alimentorum famem excitat, naturalis est & semper laudabilis; quæ autem ex causis morbosis (*Aph. 29. II.*) concitatur, mala est. Quia vero Inappetentia semper ex morbo, fames vero ex utrisque generari potest, generaliter debemus pronunciare, Appetentiam præstantiorem esse Inappetentiam, sed quæ ex morbosâ sit causa, interdum pejorem esse posse.

An Appetentia vel Inappetentia præstantior.

**III.** Qui Convalescentes bene appetunt, indicare causam appetitum extinguentem esse ablatam, organa chylopoietica præparare ingesta, superius (*Aph.*)

In Convalescentibus.

36. II.) exposuimus: Ergo fames in Convalescentibus ab hac causa est præstantissima. Potest autem fames in Convalescentibus duobus modis mala esse, nam quæ a morbo redit, quoniam acris quidam humor in ventriculum confuens alienam appetentiam excitat, malum potest esse signum, atque præbens occasionem plurimam ingendi in corpore ex morbo debili, potest novos producere morbos, atque vires vitæ multitudinem ingestorum obruere. Quare Medici est in redeunte appetentia, num ex alimentorum defectu naturali redeat, perferunt, ne fami indulgeat, sed tollat morbosam causam non naturalem famem excitantem; & cavere in fame naturali, ne nimium ingerat (Aph. 33. II.) Bonum igitur est regulariter in Convalescentibus & sine morborum redire Appetentiam; sed malum potest esse signum, si redeat ex morbosa causa (vid. Exerc. 3. XLVIII.)

In morbis. IV. Appetentiam in morbis tam malum esse signum, eamque remorari curationem, non solum apud vulgum, sed, quod miror, multos medicos invaluit opinio, ut verear, vincere num valeam, rationibus hanc præposteram opinionem superare. Qui enim contendunt, laborat quartana febre, si habeat appetentiam, raro sanabitur, hoc firmant multis experimentis. Existimo tamen præstantius esse in quartana & aliis morbis frui Appetentia, quam labore inappetentia. Quippe superius demonstravimus, famem naturalem notare organa chylopoietica valere inappetentiam vero semper ex morbosa causa provenire: hoc si applicetur ad regulam iudicandi generalem in morbis, qua constat, quo plures functiones recedunt a naturali ordine, eo majores vel plures esse morbosas causas, atque iudicium ferendum esse ex magnitudine & multitudine causarum ad sanationem & interitum vel periculum: quo enim causa morbi est major, & quo plures adsunt, eo periculosior morbus, modo singulae sint æque valentes. Quia vero Inappetentia semper est signum causæ morbi, nunquam bonum præsagium præbere potest, sed appetitus rediens vel manens ex bona causa oriri potest, ergo tunc bonum est indicium. Potest tamen per accidens Inappetentia præstantior esse in morbis. Verbigratis, homo corripitur morbo, manente appetentia, hinc plus ingerit alimentorum, quam hoc corpus ægrotans subigere posset: alius vero Inappetentia simul laborans, parum ingerit; potest homo famelicus ille ob maiorem ingestionem in difficiliorem morbum incidere, quam ille qui Inappetentia laborat. Verum hic casus non destruit regulam, quod enim sit per accidens, non derogat regulæ generali; ita optimum sanitatis statum per accidens valeamus in deteriorem commutare. Ut si quis perfectè sanus in aquam prolapsus moritur, præstantius fuisset ægrotare; quia in lecto decumbens spem habet sanationis. Altera difficultas videtur majoris momenti: potest Appetitus ex maiore causa morbosa generari, quam Inappetentia, & inde periculosior esse. Hoc fateor, sed potest etiam ex minore causa morbosa generari; quare iudicandum est in morbosa Fame & Inappetentia, quænam harum causarum sit major, & inde; non vero ex sola fame, vel Inappetentia, ferendum est iudicium.

V. Antequam hanc mirabilem observationem aggredimur, appetentes in principio Convalescentie ut plurimum ad finem Inappetentia afficiuntur, status questionis ad mentem Hippocratis bene capi debet. Hippocrates proponit morbi præcedentis finem, atque ita initium Convalescentiæ, quo tempore æger se male habet, id est, liberatus quidem est a symptomatibus præcedentis morbi, sed manet adhuc admodum debilis, neque rediit naturalis corporis color, adeoque non ita ut antea est morbo pressus, sed tamen est valetudinarius multum adhuc distans a perfecta sanitate. In tali homine dicit, si appetitus viget, & bene comedit, verum dein non reficitur corpus, plerumque, ergo non semper, ad finem rursus non appetit. Hanc veram esse sententiam, experimentis & rationibus firmari potest. Talis Convalescens luclatur corpore debili & effectis humoribus, si tamen viget chyloficationis organum, bonum quidem præparat chylum, sed is circulatibus effectis & cor-

Cur appetentes ut plurimum ad finem non appetunt.

& corruptis miltis tandem quoque in similem putrilaginem convertitur, aut plus ingerit fame monitus, quam sanguificationis organum subigere valet, quod abundans in corruptelam convertitur; denique vigens appetitus ex aliena causa in Convalescentibus, tam in primis quam reliquis viis corruptelam parit ex assumo nutrimento; in tribus his casibus putrefactum tandem ad ventriculum quoque delatum omnem appetitum exstinguit. Verum si ex bona causa Convalescens appetit, non nimis ingerit, & sanguificationis organum non nimis debile, appetentia manebit, & talis æger brevi tempore recuperabit vires; naturalem corporis colorem & incrementum. Hinc plerumque ad finem venientes cibum non appetunt, sed non semper, ut ex allegatis mutationibus constat.

Qui postea bene appetunt melius liberantur.

VI. Alimenta in duabus præprimis officinis sunt elaboranda, antequam in bonos nostros humores convertuntur, nempe in organo Chylopoietico & Hæmatopoietico. Si nullum sit vitium in Convalescentibus relicum, quod impediret chyli commutationem in bonum sanguinem, potest tamen talis homo sanitatem recuperare, etiamsi in primis viis minus perfecta absolvitur chyli confectio: nam sæpe homines ceteroquin sani vivunt, qui tamen longo tempore defectu coctionis ventriculi & Inappetentia laborarunt, quoniam vitium in primis viis productum, deinceps in circulante organo emendatur. At minore temporis intervallo restaurata fuissent vires, si quoque organum chylicificationis valuisset, quare multi medici stomachum habent pro scaturigine multorum morborum. Si vero ex signis constat, circulatorium organum valere, sed Chylicificationis debile esse, verum sensum ejus actionem roborari, certum est omne malum tandem superatum iri. Hoc constat ex recensitis ab Auctore signis, nam valens est organum circulatorium, si æger laborans inappetentia post morbum, sensim ad naturalem appetitum redeat. Si vero una cum Inappetentia non valeret Circulationis organum, appetitus sensim non rediret, quia mali & corrupti humores continuo ad ventriculum delati omnem appetentiam exinguerent.

VII. Ex his quæ disputavimus non potest concludi, melius esse, ut æger Convalescens inappetentia labore, quam ut vigeat appetitus, ut quidam ex dictis Hippocratis colligere voluerit, quia dicit, melius liberantur, qui circa initia cibum omnino non appetunt, postea autem bene appetunt. Sed propterea melius liberantur, quia in iis, qui sensim appetitum amittunt, designatur, materiem morbi augeri, & vires vitæ debilitari. Verum quibus sensim redit appetitus, signum est, morbum minui, & vires augeri. Ergo ipsa appetentia est bonum semper signum, nam nisi rediret in eo, qui circa initia inappetentia laboravit, non facile liberaretur a morbo. Quare non ita in hoc Aphor. attendendum ad Appetentiam vel Inappetentiam, sed ad commutationem horum, tanquam signa indicantia augmentum vel decrementum malorum; melius enim est ut in initiis Convalescentiæ mala adsint signa, quæ sensim in meliora commutantur, ut est appetitus post inappetentiam, quam quod post bona signa sequantur mala, ut post naturalem famem si fiat inappetentia.

Conclusio.

## L I B. II. A P H. XXXIII.

58. **I**N omni morbo mente valere, & bene se habere ad ea, quæ offeruntur, bonum est: contrarium vero, malum.

I. **E**X omnibus partibus & actionibus in morbis non solum debet medicus petere indicia boni & mali, verum etiam ex mentis operationibus & affectionibus, adeo ut nihil relinquantur in toto homine, quin aliquid tribuat ad cognitionem & prædictionem formandam. Noster itaque Auctor ex Mentis ob-

Mens præbet signa in morbis.

servatione generalem suggerit in morbis regulam. (1) Bonum esse in quovis morbo mente valere, contrarium vero malum. (2) Bonum, mentem se bene habere ad ea, quæ offeruntur, sed contrarium, malum.

Mentem  
valere in  
morbis  
bonum.

II. Experimur omnes etiam sani Mentem omni tempore non æque valere; uno tempore conceptus formatur facilius quam alio tempore, atque sæpe cum corporis debilitate mentis actiones debilitantur. Non tamen cum omni virium imbecillitate minuitur mentis actio in ratiocinando, reminiscendo, & percipiendo, quia non omnia corporis vitia æquali modo menti consentiunt. Mens tunc dicitur in nobis valere, si sit prompta in sensibus internis exercendis; non facile turbatur per sensus externos; neque aliena imaginatur in sensibus internis, neque alio modo percipit per organa sentientia, quam naturalis sit per res externas perceptio. Igitur si in morbis ita valet mens, indicium est, stamen nervosum, & Cerebrum non agitari a vigente morbo, atque sufficientem esse in corpore spirituum copiam atque æquabilem fluxum. Ergo pars sane princeps est ilibata in nostro corpore, quia his partibus affectus mens non manet valida, aut debilitatur, aut aberat, vel non percipit, ut si æger non sentiat dolorem (Aph. 31. V.) Quæ omnia mala præbent indicia, quoniam ex numero majore functionum depravatarum deducimus morbi magnitudinem & periculum, atque ex paucis mutatis salutem.

Mentem  
se bene  
habere ad  
ea quæ of-  
feruntur,  
bonum.

III. Quid sit intelligendum per *Mentem se bene habere ad ea, quæ offeruntur*, non tam liquide constat, & nisi planius exponatur, nullam in observationibus morborum præbent unitatem, res enim, non verba sunt in ægrotantibus observanda, quod si nullus intelligat rem his verbis designatam, ipsa verba nihil valebunt. Offeruntur autem ægro alimenta & medicamenta, mens debet se bene habere ad ea. At se bene habet, si in alimentis eundem saporem, & odorem percipit, ut antea dum erat sanus, si eadem quoque expetit, seu habet appetentiam: verum si alienum odorem, vel saporem in iis percipit, aut si ad aspectum corripitur fastidio, mens se bene non habet ad alimenta, quæ offeruntur, & hoc erit malum signum. Nam alienati in nobis humores alienum odorem & saporem, dum capimus cibum, præbent, quando non accusant ægri humores corruptos, sed oblata alimenta, quia nesciunt istos odores & sapores alienos ex causa in nobis latente generari. Igitur bonum est, mentem se bene habere ad ea, quæ offeruntur, quia designatur alienis humoribus non affici organa sentientia; sed malum est indicium si mens se bene non habet, quoniam corruptorum vel alienatorum humorum præsentiam declarat. In medicamentis quoque hoc observari potest, si enim æger ab omnibus medicamentis abhorret, vix valet medicus quidquam præstare: si vero præter consuetudinem abhorret, idem est de medicamentis sentiendum, quod de alimentis monuimus.

## L I B. II. A P H. XXXIV.

59. **I**N morbis minus periclitantur, quorum natura, & ætati, & habitui, & tempori magis similis fueris morbus, quam in quibus eorum nulli fueris similis.

Sensus.

**S**I duo sunt homines simili morbo laborantes, & iisdem atque æque gravibus symptomatibus pressi, de his præcipit, cui naturæ, aut ætati, aut habitui, aut tempori non respondet talis morbus, propterea ille versatur in majore periculo, nondum tamen vult difficilius curari posse & diutius durare, quare in hoc loco solummodo attendit ad periculum. Fundamentum omnium ponitur in magnitudine causæ, quia ad similem morbum producendum in contrariis his major debet esse morbi causa, quam in alio homine, cujus naturæ &c. morbus est similis. Hanc comparisonem persequemur in singulis.

II. Per naturam hoc loco intelligit Hipp. Temperiem humidam, siccam, calidam, frigidam, biliosam &c. Sensus igitur est, morbus frigidus in frigida temperie est minus periculosus quam in temperie calida, quoniam ex minima causa frigiditatem inferre generari potest talis morbus; verum magna requireretur causa, quæ potuisset in calido temperamento producere morbum frigidum. Ut si homo temperamenti frigidi & humidi corripitur febre ardente æquali calore vexante, ac in homine temperamenti calidi, certe prior in majore versaretur periculo. Si enim hydropicus febre calida corripitur, plerumque moritur.

Pericul-  
lum ex  
dissimili-  
tudine  
naturæ.

III. Certis ætatis temporibus quidam fiunt morbi, qui in reliqua ætate rarius observantur, ut Variolæ & Convulsiones pueris frequentiores; juvenibus Hæmorrhagiæ: senibus morbi Catarrhosi & Pituitosi: hi morbi si conspiciuntur in alia ætate, propterea censentur periculosiores. Si enim æqualis numerus adu-  
torum vel senum laboraret variolis, quam est numerus puerorum, pauciores pueri e variolis perirent, quare adulti semper ita timent si variolis corripian-  
tur, dum vero idem morbus censeatur levis, seu non admodum periculosus in pueris: atque Epilepsia puerorum sæpe fit, & rarius interimit; in adultis au-  
tem raro, sed periculosior Convulsio. In Juvenibus frequens sit hæmorrhagia, sed non periculosa; in senibus autem semper periculosior observatur, quia se-  
nes non facile valent amissum sanguinem restaurare, & non nisi ex valida cau-  
sa in hæmorrhagiam incidunt. Obstare tamen videtur Hæmoptoe Juvenibus periculosiorem esse, quam adultioribus; hoc autem fit per accidens, quia ju-  
venis in hæmorrhagiam pronus, iterata hæmoptoe tandem pulmonis ulcus con-  
trahit, sed in reliquis speciebus non est majus periculum, morbus Catarrhosis  
& Pituitosis sæpe corripit senem, & diu durare solet, verum ille morbus æque  
gravis in Juvene majoris esset periculi. Quare generaliter hæc observatio po-  
test admitti, interdum autem contrarium experimur in quibusdam.

Ex diffi-  
militudi-  
ne ætatis.

IV. Ad Habitum corporis referre possumus Gracile, Obesum, Robustum, & Debile corpus. Si corpus Gracile verbi gratia corripitur hydropē vel œdemate, ille morbus periculosior erit, quam si in corpore obeso pedes tument; si vero obesus admodum extenuatur per phthisim nervosam, illa extenuatio majoris erit periculi, quam similis extenuatio in homine gracili. Ita virium debilitas in foeminis, & qui ex natura sunt debiles; sed si homo robustus ita debilitatur ut non plus valeat quam foemina imbecilla, certe majus periculum erit in Vi-  
ro, quam foemina.

Ex diffi-  
militudi-  
ne Habitu-  
tus.

V. Hoc etiam in anni Temporibus observatur, si quis hyeme corripitur febre ardente, aut æstate affligitur tanto tumore hydropico ac inverſis illis tem-  
poribus, majus periculum subesset. Qui autem autumnō corripitur febre quar-  
tana, illa erit periculosior & obstinatius resistens, quam si aggreditur vernali  
tempore. Quare hæc regula non tam universalis est admittenda, ut nullam pa-  
tiantur exceptionem; interdum tamen ad generalem prognosin statuendam multum  
valet, ut ex allatis exemplis constat.

Ex Diffi-  
militudi-  
ne Tem-  
poris.

## L I B. II. A P H. XXXV.

60. **I**N omnibus morbis, quæ partes ad umbilicum & imum ventrem sunt, cras-  
situdinem habere, melius est. Valde autem tenuēs & eliquatas ipsas habere,  
malum. Periculosum vero illud est, etiam ad infernas purgationes.

I. **N**ulla est in nostro corpore pars externa, quin possit sua præbere indicia  
in morbis, sed quia similia phenomena in partibus variis non suppeditant  
eadem indicia, cum subjacentia viscera in suo usu maxime differant, inde si qua-  
dam

dam in parte observantur phenomena, ex Anatomicis sciendum est, quamvis viscera tali sub parte externa detecta jaceant: atque inde in quadam parte latissima subdivisio est facienda, ut finitis nominibus semper aliquam portionem istius partis latissime indicemus, & nunquam aliam.

**Umbilicalis regio.** II. Duas assignat partes Auctor, nempe ad Umbilicum & Imum ventrem. Cicatrix funiculi umbilicalis foetus, quæ nunquam cum ætate eluitur, sed semper visibilem foveam circa centrum abdominis relinquit, ita omnibus nota est, ut non indigeat loci indicatione, verum medici ambitum circulem ad tres vel quatuor

**Sumen.** pollices ab umbilico illo vocant Regionem Umbilicalem. Pars supra regionem umbilicalem usque ad pectus, media inter hypochondria vocatur Præcordia, quia subter hæret os ventriculi superius, quod Cardian vocant. Partes autem ab utroque latere regionis umbilicalis dicuntur mollitudo laterum. Sed pars inferiora regione umbilicali ad pubem Hipp. *ἄρσος* vocatur, Latinis Sumen & Aqualiculus audit. Omnes autem hæ partes simul uno nomine dicuntur Abdomen.

**Regionis umbilicalis & sumenis contenta.** III. Quia scopus est per signa externa statum viscerum latentium rimari, non est opus morbos externos in integumentis communibus vel masculis abdominis exagitare, aut qui ad peritonæum pertinent. Sub Regione umbilicali hærent Tenuia intestina, atque Omentum; possumus igitur ex indicis circa regionem umbilicalem dignoscere, num partes magis minuscve tumeant. In Sumine hærent etiam intestina tenuia, & interdum Omentum; vesica autem urinaria ultra modum extensa hoc quoque in loco hæerere potest, sed tunc illa signa potius ad pudenda referuntur. At Uterus in gravidis multa quoque signa in his locis præbere potest. Hipp. autem cum dicat in omnibus morbis, gravidarum observationes in his locis non vult proferre. Quare quæ signa hic traduntur, solummodo adducuntur ad cognitionem Omenti, & Intestinatorum tenuium.

**Craffitudinem habere, melius est.** IV. Nihil melius est in morbis, quam ut partes naturalem magnitudinem præcedenti obstat videtur: verum in hoc loco adstruit, utrumque malum esse ultra modum Craffitudinem & Extenuationem in his partibus observare, at melius esse ex his si adsit Craffitudo, quam Eliquatio. Craffitudinem in Regione umbilicali & Sumine ex iis, quæ disputavimus, constat provenire a mole aucta Omenti, Intestinatorum tenuium, Mesenterii, vel impletione quadam in cavo ventris: talis fit impletio ex Pituita, vel Lympha, aut Crudis collectis in intestinis. Omnes autem illi morbi non sunt curati admodum difficiles, quoniam resolventibus & evacuantibus facile minuitur talis tumor.

**Tenuia & eliquata potius.** V. Si vero pinguedo fuerit consumpta Omenti, Mesenterii & Intestinatorum, quando anterior pars admodum gracilescit, signum igitur est morbum abire in putredinem, qua liquefcit omnis illa pinguedo; ille autem morbus est curatu admodum difficilis. Hæc comparatio reduci potest ad duplicem morbi exitum, vel in hydropem, vel putredinem circa hanc partem, sed quia collectio pituitæ facilius evacuari potest, & recuperatis viribus non facile redit; verum putredo difficile emendari potest, hæc observatio magni non solum momenti est ad prædicendum, sed etiam ad formandam indicationem curativam, num debeamus uti evacuantibus, & dein roborantibus, num vero antiseptics sic aggreddi curatio.

**Verant purgare.** VI. Sensus ex Hippocratis textu dubius est, num purgationes ad infernas partes periculose sint in Craffitudine vel Extenuatione. Qui vero præcedentia a nobis propoſita perpexit, huic nullum dubium remanere potest, quin sensus hic respiciat ad tenues & eliquatas partes, quia in laticis vel crudorum collectione conducit contenta ea evacuare; sed si putrefacta purgantibus adgredimur nimis, quam æger ferre potest, evacuabitur.

LIB.



## LIB. II. APH. XXXVI.

61. **Q**ui sana habent corpora, pharmacis purgati cito exsolvuntur, ut & qui pravo utuntur cibo.

I. **V**ires in corpore sano debilitantur, si boni humores, qui spiritibus materiem debebant suppeditare, auferantur e corpore; vel si suppeditetur humor spiritibus producentibus ineptus: quia, ut corpus maneant robustum, requiritur sufficiens bonorum spirituum influxus. Duas propterea causas adducit Auctor, nempe Purgans auferens bonum, & Cibus parvum aliena suppeditantem. Quia vero Purgans est in frequenti usu ad præcavendos morbos in sanis, & in Convalescentibus, ut corpora ad perfectam sanitatem reducantur, atque præveniantur recidiva, operæ pretium erit hanc sententiam penitus perferuari.

II. Purgantia præprimis Veterum validissima magnam quantitatem liquorum per anum evacuare, omnibus constat: si ponamus hominem perfecte sanum, is pauca continet in cavo intestinorum, quæ quotidie nomine dejectionis vel fecum ejiciuntur; si tali in homine fuscitetur tam copiosa evacuatio per purgans, prima vice plerumque intestinorum contenta emittuntur, deinceps vero reliqui humores, qui in intestina confluere possunt, illi possunt esse boni & mali, verum quia supponitur corpus sanum, ergo nullum habens in corpore vitiosum humorem, id, quod deinceps evacuat ex bonis humoribus, qui corporis actionibus inservire debebant, detrahitur: quare corpus bono & utili humore privatum debilitatur.

Purgans  
cito ex-  
solvit.

III. Existimant autem multi, corpora sana multas tamen quiesquilias & impuros in corpore habere humores, qui per purgans sunt despumandi & depurandi; hinc præcipiunt aliquoties alvum ducere conducere ad sanitatem conservandam, quare, nisi quis vernali tempore utatur portione majali purgante, ætate non potuissent vivere sanus. Nimis audax autem videbitur hanc abrogare laudabilem consuetudinem, & tamen, si sequimur nostrum Auctorem, purgans in sanis corporibus esset abrogandum, nam præcipit, corpora sana purgante cito exsolvantur, id est debilitari, aut in animi deliquium incidere, qualia mala producere non licet medico. Instare possunt, theoriam hodiernorum meliora docere, tunc temporis arcanum despumationis & depurationis non satis cognitum fuisse, veteres enim latuisse doctrinam chylicationis. At vero istud arcanum adhuc latet, nulla fit in intestinis despumatio aut depuratio, qualem statuunt; Intestina enim constituunt organum preparatorium, & qui humores in intestina confluunt, non sunt inutiles excrementitii, sed boni & agentes eo confluunt, saliva, succus pancreaticus, & bilis, ut absolvatur alimentorum concoctio & præparatio: quæ autem actione hac non possunt assimilari, tanquam inutilia postea rejiciuntur una cum humoribus istis, qui agendo inutiles fuere facti. Ergo intestina non sunt organa, malos humores ex bonis separantia, quando aliquod vitium hæret in massa circulante, organa enim liquorem ducentia, quæ annumerata sunt, secernunt bonos & utiles humores. Nemo igitur statuet, credo, ex dato purgante ita immutari naturam hepatis & pancreatis, ut nunc tantum non secernerent inutiles humores, & alias utiles: quare pro certo admitti potest in sanis corporibus per purgantia educi bonos humores, qui debuissent in corpore manere; & propterea & experientia & effatio Auctoris non est tutum corpora sana valida purgantia debilitare. Non tamen statuo nunquam purgandum esse, imo vero sæpe conducit, sed hic solummodo cum auctore nostro corpora sana a purgantibus debilitari, & hoc non conducere.

San-  
gus de-  
purat.

IV.

Cibus  
prævus et  
soluit.

IV. Qui comedit cibum nutritioni ineptum, vel qui solutus actione nostræ corporis alienum suppeditat humorem, corpus duobus modis debilitatur, primo quia non suppeditatur materia, ex qua boni spiritus possunt formari, & dein alienus humor circulantibus mistus naturam spirituum atque aliorum quoque humorum invertit, quare tale corpus defectu bonorum laborat, sed scætet crudis & alienis.

# LI B. II. A P H. XXXVII.

62. **Q**ui bene valent corpore, purgati sunt difficiles.

I. **N**on omnes Interpretes verba *παρὰ τὸν νότον ἐργάζονται*, eodem modo exponunt, quidam enim interpretantur *Difficiliter ferunt medicationes*, qui sensus magis conveniens est, ut infra constabit, quem ille, quem secutus sum in Editione ab *Almeloveen*. Egerat enim Hipp. in præcedente de malis ex purgatione per alvum & pravo cibo in corpore sano provenientibus: hanc nunc observationem applicare vult ad reliquas medicationes quascumque in sanis corporibus, adstruens *Corpora sana Medicationes ægre & moleste ferre*. Præcipuas itaque Medicationes in sanis corporibus delibabimus, ut pateat, num multi bene agant in sanitate conservanda medicationibus uti, ut est Sanguinis missio, Alvi ductio, Diureticum, Sudoriferum, Dieta rigidissima.

Sanis an  
conveniat  
sanguinis  
missio.

II. Quid sit sanitas alio loco (*Aph. 3. II.*) exponitur, solummodo respectiva sanitas ad Medicationes sequentes est proponenda. Respectu sanguinis missionis id corpus est sanum, in quo æquilibrium est inter sanguinis quantitatem & actiones moventes; quoriet enim supponitur sanguinis major abundantia, quæ tolli potest venæ sectione; non ponitur casus in corpore sano, nam qui laborat æquilibrio destructo, non est sanus. Quam primum vero detrahitur sanguis, ipsa Medicatione destruitur æquilibrium, atque æquilibrium destruere non conducit, ergo sanguinis missio erat omittenda, ut servetur æquilibrium. Multi tamen contendunt, saluberrimum esse auxilium vere mittere sanguinem; hoc etiam ex Hippocratis *Aph. 3.* constat, ubi præcipit: *Horum igitur causa bonum habitum solvere consensu baud cumulantur*. Ad eum autem locum observavimus, nisi Hipp. intelligat nimiam humorum abundantiam, sanguinis evacuationem non conducere. Sed quia in hoc loco vetat omnem Medicationem in *Corpore sano*, sed *Aph. 3.* citat *Bonum habitum*, existimo his verbis non esse eundem sensum adscribendum, sed Bonum habitum referendum esse ad plethoram, quando hic Aphorismus non est oppositus alteri. Vere autem salubriter venam secari ad conservandam sanitatem constans est observatio, & tamen non obstat huic sententiæ; præcipit enim Auctor sanis corporibus non conducere, ceteris in eodem statu manentibus; si quis contendit vere ad sanitatem conservandam egregium esse auxilium, quia calor æstivus sequens tantam humoris copiam nequit ferre, veram habuit observationem, in qua aliquid mutatur, ob quam mutationem, quam exspecto, instituebatur sanguinis diminutio. Si sit licitum addere aliquam mutationem, ut inde probetur sanguinis missionis abusus, eligerem Autumnum, quando exspecto frigus, tunc frigus superveniens post venæ sectionem multa mala induceret: quare nulla tam salubris, aut vix ulla damnosa regula potest proferri, quin valeam per accidens facere exceptionem. V. G. Vultus semper malum potest bonum esse, si fiat in homine plethorico, ut ita tollatur illa abundantia, quæ multa mala induxit, si homo per vulnus non evacuaverat illam abundantiam. Aut si vulnus aperuit abscessum latentem casu. Verum tales exceptiones non derogant regulæ generali.

Alvi ductio.

III. Quia superius (*Aph. 61. II.*) demonstravimus, Purgans exsolvere corpus

far

sanum, ad sanitatem conservandam conducere nequit. Ratio erat, quia bonos humores educebat, forsan ipsi spiritus quoque eliminantur, quia invenimus in majore confluxu humorum ad ventriculum & intestina facilis fieri animi deliquium, quam ut possimus judicare, eam Debilitatem, Vertiginem, Scoromiam, & Syncope fieri posse ex diminuta quantitate totius massæ. Anatomici doceant, ad intestina multo majorem copiam nervorum ferri, quam ad sensum & motum Intestinorum videtur requiri, alia enim pars corporis magis movenda, & acutiori sensu prædita paucioribus gaudet nervis; quare mihi verisimile videtur, in statu sano spiritus per hos nervos allatos reduci vasis lymphaticis mesenterii, & effusus in cavum intestinorum, reorheri vasis lacteis, & ita tradi circulantibus, ut præstant materiem novis spiritibus producendis. Verum si conciteretur alvi fluxus per validum purgans, ut Veteres facere solebant, credibile est istos effusos spiritus & corpore eliminari, reliquos in intestina exonerari, ut ita hujus materiæ defectus generetur: atque quia versus omnem partem stimulatam major copia spirituum derivatur, non erit sine ratione credere, ad intestina purgantia agitata tantam copiam spirituum ferri, ut reliquæ partes istis privatae langueant, unde dicta symptomata facile fieri possunt, quæ spirituum defectum arguunt. An tamen sanis corporibus nunquamandum purgans, cum multi medici ad præservandos morbos ita extollant purgantia, & fere omnem curationem a Purgante inchoent? Imo vero Purgantia eodem modo ut Sanguinis missio prodesse possunt, aut quandam intestina impuritatibus sciant. Verum prior casus non facit exceptionem, ut monuimus, & alter casus est morbus, quare non derogat huic regulæ.

IV. Quæ adductæ sunt rationes in Sanguinis missione, bonum humorem evacuare in Alvi ductione, intestina non esse organa depuratoria massam circulantem, & non possunt Renibus applicari; sunt enim organa inutiles humores a tota massa fecerantia & eliminantia e corpore, itaque quo, perfectior sit separatio, & ut loquuntur, despumatio, eo perfectior sanitas: imo addi potest, nostrum corpus sanum sua actione semper generare inutiles humores; quare perfecta depuratio, quæ fit per Diuretica, nunquam damnum inferre potest, inde tutum videtur Diureticis uti ad conservandam sanitatem. Qui ita libere cum indoctis ratiocinatur, nihil videtur opponi posse ad firmandam nostri Auctoris sententiam, qui Diuretica quoque interdicat. Videamus igitur, quid assumitur in hac sententia. Adstruunt, Diureticis perfectam fieri depurationem, qualis non fit in sanis, sed si corpus sanum non fecerant omne inutile, ut egeat adjutore, non est sanum; ergo qui per Diuretica conservant sanitatem, non ratiocinantur de corpore sano, sed ægrotante & debilitato, quod non valet omne inutile separare & eliminare, ergo inde non constat sanis conducere. Diuretica duplicata sunt, quæ quantitate ingesta copiosiores urinam suppeditant, vel quæ sua specifica virtute urinæ secretionem promovent. Aquæ tepidæ potum augere urinæ secretionem, nemo nescit; verum corpus sanum emittebat omne inutile per urinam, ergo post potionem plus evacuare nequit, nisi portio plura inutilia faciat, sed hoc non conducit: neque statui potest, nimia potatione aquæ corpus perfectiorem sanitatem acquirere, cum perfecta erat, antequam ingerebatur aqua; verum contrarium est verendum, illa enim nimia potatio, ut omne nimium, morbum producat. Quæ specifica virtute urinam fundunt, quia plus inutile non est in corpore, quam evacuat in sanis, ergo ipsum Diureticum plus educere nequit, sed quod evacuat, est ex utilibus humoribus. Huic tamen obstat videtur, Renes solos humores inutiles segregare, utiles relinquere, ergo majore evacuatione solos inutiles evacuari. Veritatem proferat hæc oblectio, modo maneat sanitas, Renes inutiles duntaxat fecerant liquores, at renes insigniti validioribus Diureticis, tam bonos, quam malos transmittunt liquores: forsan, ut monuimus de Intestinis ex magna

copia nervorum, qui tribuuntur Renibus, multi quoque spiritus eliminantur, si fiat per Diuretica ad Renes major determinatio; unde facile intelligimus, quomobrem ex Diureticorum abusu nascitur vertigo, temulentia, animi deliquium, & alii morbi defectum spirituum arguentes.

Sudoriferam & Diaphoreticum.

V. Quæ de Diureticis dicta sunt, ad sudorifera quoque applicari possunt. Accedit, quod Sudor semper sit ex causa violenta (vid. Persp. 180.) & sanis non necessarius, (vid. Persp. Cap. 15. II.) Atque corpus sanum satis largam Perspirationem habet, quam si augeas Diaphoreticis, expectamus morbos ex aucta Perspiratione (vid. Persp. Cap. 13. XIV. & Persp. Cap. 3. VI.)

Dieta rigidissima.

VI. Quid sentiendum sit de Dieta rigidissima & jejuniis in sanis hominibus, quia supra (Aph. 4. V. & Aph. 5. V.) egimus, non erit opus repetere.

## L I B. II. A P H. XXXVIII.

63. *P*aulo deterior & potus, & cibis, jucundior autem eligendus potius, quam meliores quidem, sed ingratiore.

I. Duo genera alimentorum hic proponit Auctor, quæ sanis & ægris dari possunt, nempe grata & salubria: quænam vero ex his sunt præferenda, an grata & minus salubria, (nam quæ omnino mala sunt, & non sunt esui, hic non accipiuntur;) vel ingrata & salubriora, hic etiam nolit talia, quæ propter ingratum saporem vel odorem sunt abominabilia. Concludit Jucundiora eligenda esse, etiamsi sint paulo deteriora. Ergo antequam hæc conclusio vel probari vel refutari potest, examinandum venit, quo sensu Deteriora & Meliora, atque Jucundiora & Ingratiore sunt capienda.

Deteriora & meliora alimenta

II. Cibis & potus melior & deterior dicitur vel per experientiam vel ex ratione aut potius opinione. Si sit aliquod genus alimenti, quod omnibus fere hominibus sanis male cedit, ut aggravet ventriculum, febriculam, anxietatem, cardialgiam & similia producit. Alterum genus est quod nullam molestiam hominibus sanis infert, sed quod medici tamen existimant pravi nutrimenti esse, ut sunt quædam genera avium, piscium, quadrupedum, quæ deteriora a multis censentur. Idem quoque in Ægrotis, quædam alimenta, ut pinguis, sale & fumo condita, quæ dum comeduntur, morbum aggravant; alia vero facile subiguntur, ut tenuia, macra, prisana. Sed ex medicorum sententia interdum fructus horæi, farinosa, statulenta inter deteriora numerantur; unus laudat multam potationem vel aquæ, vel vini, vel cerevisiæ, vel decocti alicujus; alter vero imperat abstinentiam. Quare communi consensu inter Medicos non constat, quænam semper sint Meliora, aut Deteriora; atque quod in uno morbo est optimum, in altero est pessimum, ut medicus habita ratione morbi judicare deinceps debeat, quid sit melius & deterius.

Jucunda & ingrata.

III. Quod alimenta sint grata vel ingrata, id a perceptione assumentium dependet, quæ his sunt suavia, aliis sunt abominabilia, imo in eodem homine ætate diversa observatur diversitas. Dulcia enim pueris, amara adultis magis placent; & gravidæ sæpe quædam summo desiderio appetunt, quæ postea fastidiunt. Ægri etiam sæpe sunt friculosi, qui antea moderata copia potionis erant contenti. Si observamus animalia, hæc norunt varia genera alimentorum eligere, & reliqua repudiare, instinctu naturali instigata: nos autem ratione magis ducti vix obtemperamus instinctui naturali, sed ducimur ratione, ut comedamus quæ ex ratione censentur grata, quasi in nobis nullus esset naturalis instinctus. Experimur tamen nos ea perceptione non omnino privatos esse, sed minus vigere quam in animalibus. Qui enim assumit, quæ ipsi sunt grata, ea facilius fert quam ingratam,

ta, quamvis in certis hominibus constat, illa huic homini ingrata faciliore esse concoctionis; potest ergo gratum & ingratum aliquid facere ad faciliorem & difficiliorem digestionem.

IV. Si nunc comparamus jucunda cum melioribus alimentis, facile erit dicere, quanam generaliter sunt præferenda. Jucunda habent instinctum naturalem, seu aliquid desiderium in assumente, quam ob rem sunt grata, hoc desiderium valet, etiam si alimentum sit concoctum difficile, ut tamen in tali homine bene cedat. Meliora autem talia non sunt omni tempore, & in quovis morbo, vinum conducit seni, non vero juveni, aque potus egregium auxilium in ardentibus, & hydropem auget; cibus durior conducit robustis, sed mollior debilibus. Ergo ex ratione nostra debemus judicare, quanam sint meliora. Verum nostrum ratiocinium quia non valet omnia minutissima perpendere, & semper meliora eligere; itaque tutius erit cedere desiderio assumentis, & non tam obstante ægris resistere, si hoc vel istud genus cibi, vel potionis appetat avidissime. Sed quemadmodum fit in nimium esurientibus & sitientibus, qui ex nimia ingestione læduntur, modus est servandus.

An Jucunda melioribus præstantiora.

V. Quæ disputavimus de jucundis & melioribus, sine multa mutatione hanc quætionem solvendam facile applicari possunt, quare ulteriore sermone hanc quætionem non persequar. Hipp. igitur in hoc Aph. non parum perstringit istos, qui semper ex ratione, sive sit vera, sive falsa, certum genus cibi & potionis ægris imperant, nolentes unquam vel minimam licentiam in visu decumbentibus concedere, quare sæpe audiunt, medicæ vivere pessime vivere. Etiam si experiantur, ægros contra opinionem medicorum assumsisse cibum vel potum, in quem summò desiderio flagrabant, sanitatem recuperasse ipsidem, tamen non desistunt obnixè in aliis ægris semel susceptam opinionem tueri. Qui vero Hippocratica medicina instructus est, didicit temperatius cum ægris agere, sæpe concedere ægris grata, etiam si ex ratione minus salubria videantur.

An Ingrata deterioribus magis noxia.

## LIB. II. APH. XXXIX.

64. *Senes ut plurimum quidem juvenibus minus ægrotant. Quicumque vero ipsis morbi sunt diuturni, plerumque commoriuntur.*

I. Non semper idem tempus ætatis vocabulo senectutis, & juventutis apud medicos intelligitur, cum terminos ætatis, ut hic fit, per senectutem & juventutem exprimunt, non intelligunt finitum ætatis tempus, quod senectuti adscribitur, sed a 40. anno ætatis, donec corpus ex decrepita senectute languescere incipit, inde in sequente Aph. assignat valde senes. Per Juvenes omne spatium vitæ a perfecto incremento corporis ad dictum tempus ætatis intelligit; ergo quæstio ita potest poni, an homines intra 20. & 40. ætatis annum frequentius ægrotent, quam inter 40. & 60. annum ætatis.

Senum & juvenum ætatis.

II. Num Hippocr. in hoc loco intelligat omnes morbos, an vero solos acutos, quia postea assignat in senibus Morbos Diuturnos, non consentiant Commentatores. Videtur autem mihi, Hipp. omnes intelligere morbos tam Chronicos quam Acutos, quia passim, si vult intelligendos acutos morbos, scribit in Acutis. Voluit autem in hoc loco comparisonem omnium morborum facere ex ætate, sed insuper adjungere, quod si seniores morbo Diurno corripiantur, plerumque istos perdurare usque ad mortem. Quæ sententia seorsum est exponenda.

An juvenes frequentius.

III. Qui existimat experientia probari posse plures juvenes ægrotare quam senes, facile fallitur, si calculum faciat ex numero ægrotantium vel in propria Pra-

Senum  
 diuturni  
 morbi cur-  
 ad mor-  
 tem dura-  
 re solent

IV. Omnes morbi diu durantes vel habent causam insuperabilem viribus vi-  
 taz, vel si causa fuisset superabilis, tantam induxerunt debilitatem, ut senum cor-  
 pus non valeat, nisi adferantur suppetiæ, eam causam superare. Quod si talis cau-  
 sa cum debilitatis viribus fuisset in juvenibus, spes esset, ut incrementibus viri-  
 tibus tandem potuisset superari, verum quia in senibus, raro tantum deinceps in-  
 crescunt vires, morbus ille ad mortem durare solet, nisi optima adhibita medi-  
 ca-

catione, vel minuatur morbi causa vel augeantur vires, quod interdum quoque fieri potest, quare Hipp. adiecit *plerumque*.

## L I B. II. A P H. XL.

65. *Raucedines & gravedines in valde senibus non coquuntur.*

I. Quoniam per senectutem non intelligunt medici idem ætatis tempus, ut monuimus (Aph. 64. 1.) & in hoc loco dicit Auctor, *Valde senes*, diuise. ergo necesse est secundum communem opinionem medicorum senectutem dividere, ut intelligamus, qualem ætatem Auctor hic intelligit. Dividunt senectutem in Crudam usque ad annum LX. ut indicavimus, mediam statuunt inter LX. & LXX. decrepitam a LXX. ad finem vitæ. Hic terminus vitæ in hoc loco indicatur per *valde senes*.

II. Aer pulmonibus receptus compressione pectoris ductus per contractam, rimam glottidis sonum format, qui eo est clarior, quo superficies hujus rimæ quid sit? est æqualior, & membrana cartilaginea rimæ glottidis formans regens est magis tensa. Si vero illa membrana nimis sit laxata, tumens, multa humiditate obfessa, vel inæqualis, vel mucos obducta, transactus aer obscurum & interdum nullum sonum edit. Hoc vitium in formando sono vel voce vocatur *Raucitas*, quæ igitur ex multis causis generari solet.

III. Si membrana vestiens interna narium, sinus frontales, maxillares, nares, imo interna membrana laryngis multum muci fecerit & colligit, ut inde impediatur libera respiratio præprimis per nares, cum sensu gravitatis & sæpe frigiditatis circa has partes, talis affectio pituitosa medicis dicitur *Gravedo*, quæ ex multis quoque causis generari potest, quod non est hujus loci exagitare.

IV. Inter frequentes causas Raucedinem, & Gravedinem inducentes est materia pituitosæ accumulatio in membrana pituitaria & quæ vestit laryngem interne, quæ collectio fit major, si in dicta membrana modus vitalis ita languet, ut ibidem delati humores soluti manere nequeant, sed quiescentes debiliori motu vitali fibrarum in hac membrana non propulsi sponte inviscantur: naturale igitur est senibus, in quibus vis vitæ languere incipit, ut fiant morbi ex deficienti motu vitali, qualis est morbus omnis pituitosus. Observamus enim, morbos pituitosos multo propterea frequentiores esse in senibus, quam in constante ætate. Non tamen necesse est, ut gravedo & raucedo sit in omni senes, sed quando motus vitalis in hac præprimis membrana languet, generantur hi morbi. Et quia facilius in senibus quam alia ætate, maxime in iis, qui ad decrepitam senectutem pervenerunt, quædam pars nimis debilitatur & relaxatur, hi morbi quoque frequentius valde senes aggrediuntur.

V. Per coctionem phlegmatis in Gravedine & Raucedine intelligebant veteres eam subactionem & mutationem, qua materia hæc assimilatur sanis humoribus, nam valde senes satis copiosa phlegmata rejiciunt, & tamen non sanantur, quare voluerunt commutationem in humoribus talem, quæ non eget evacuatione. Verum in valde senibus vix possumus expectare tantum virium augmentum, ut præveniat phlegmatis generatio, quare hi morbi plerumque concomitantur, nisi auxilio roborante aliquantulum roboventur illa corpora senilia. Hinc hyssopo, vino malvatico, hydromele vinoso, zingibere, aliisque calefacientibus in senibus curantur illa phlegmata, quæ in alia ætate minus valent.

*Raucedines*  
diuise.

*Raucedines*  
quid sit?

*Gravedo*  
quid sit?

*Cur senibus*  
*gravedo &*  
*raucedo*  
*frequenter?*

*Cur in*  
*senibus*  
*non con-*  
*coquantur.*

## LIB. II. APH. XLI.

66. **Q**ui sæpe & vehementer, absque manifesta causa, animo linguuntur ex improvise moriuntur.

Quid sit  
animi de-  
liquium?

**I.** A Uctores præfici quatuor species Animi deliquii describunt, quæ omnes solo gradu differunt, & singulis præbent suum proprium nomen, quod non parum remoratur scientiam medicam, præprimis facile inducit medicum juniorem, ut credat, has quatuor species distinctos esse morbos. Hoc si fieret in omni morbo, infinitus haberetur morborum numerus. Ut autem B. L. intelligat in posterum omnes has species, quas omnes vocabo animi Deliquium, sciat, subitaneum & non diu durantem motus animalis aliquem defectum, cum minore sensuum perceptione, ab auctorioribus vocari *Eclipsin*. Si vero motus animalis magis langueat, ut vix ullus sit, sensus fere omnis extinctus, pulsus admodum debilis, cum respiratione sana vel minore, quæ omnia subito invadunt & non diu durant, quod in omnibus his speciebus semper est observandum, *Leipothymiam* & *Leipopsychiam* vocant. Hic morbus gravior, ut æger omni sensu & motu animali privetur, & pulsus tam exilis fiat, ut vix percipi possit, corporis extrema frigeant, sudorque frigidus exprimatur, cum respiratione admodum minuta, & interdum per tempus subsistente, dicitur *Syncope*. Tandem gravissimus gradus statuitur, si homo insuper cada-veris jacet omni motu animali & vitali, atque sensibus privatus, sed tamen postea ad se redit: in his quia Anima videtur extincta, vocant *Aspsychiam*; sed ex abolito pulsu *Asphyxiam*. Quoniam Hippocrates dicit, qui vehementer animo linguuntur, non possunt primam speciem intelligere, sed ultimam vel penultimam.

Cur exim-  
provise  
moriuntur.

**II.** Animi deliquium nomen habet ex citatis phænomenis, quare morbus ipse non præbet futura indicia mortis, sed illa petenda sunt vel ex detecta causa hoc phænomenon producente; vel ex collectis signis, quæ causam absconditam indicant; vel ex futuris effectibus, qui ex tali phænomeno provenire solent. Tria addit Hipp. criteria; (1) ut sit vehemens; (2) sæpe recurrens; (3) sine manifesta causa. Igitur nemo potest ex natura causæ prædictionem formare, si enim fieret syncope ex sanguinis profluvio, catarrho, passione hysterica, vel alio cognito morbo, potuisset judicium desumere ex natura morbi, sed causa latet. Id tamen maximi momenti est, morbum in suo genere esse vehementem, & propterea periculum auget. Sæpe redit, habet ergo causam constantem, licet incognitam, quæ tandem vincere potest, hoc auget periculum. Et quia latet causa, difficultas curationis nascitur, nisi enim possimus morbi causam eruere, incerta est curatio. Sufficeret in theoria dogmatica ex tribus his signis collectis cum Hip., pronuciare, tales homines tandem ex improvise perituros, quia constante observatione prædicta hoc confirmatum est. Sed & alia est via prædictionis ex phænomenis, si perpendamus, quoniam causa interna latens esse possit, quæ potest mortem ex improvise inferre, & quæ habet tria hæc criteria. Si perpendo Phænomena, causa debet esse in organo motus vitalis vel animalis, primo aspectu videtur organum motus animalis & sensuum magis affectum, quia subito exsolvuntur vires motus animalis, & sensus exstinguunt; sed tunc peristeret pulsus & respiratio, uti in Apoplexia; Sed homo Syncope correptus fere privatur pulsu & respiratione, quæ phænomena non sunt ex affectu organo animalis, quia semper sequatur mors, ut experimur in apoplecticis. Sed si alterum examinemus organum, vitale scilicet, cuncta liquebunt. Ut motus animalis & sensus exerceantur, perpetuus æquabilis spirituum fluxus requiritur per nervos his actionibus destinatos: sed illi ut fluant continuo, etiam ex allato sanguine sunt secernendi: quoties sanguinis affluxus igitur cessat, subsistit etiam spirituum secretio & flu-

KUG 2



xus: si minor copia sanguinis adducitur, tardius & minori copia fluunt spiritus: in priori casu omnium sensuum privatio & virium exolutio, ut in Syncope; sed in posteriore casu generatur levis Eclysis. Causa igitur querenda est in organo pellente sanguinem ad Encephalon, vel in sanguine ipso. In hoc organo vel sanguine querenda est causa dicta tria criteria suggerens, & quæ valet ex improvise mortem inferre. Si nunc perscrutemur cadavera eorum, qui post vehementem syncopen fuere extincti, invenimus vel cor fuisse corrosum, putredine faniosa corruptum, aut ulceribus scæens; pericardium pure plenum vel consumptum, vel undequaque cordi accretum; polyposam concretionem in cordis ventriculis, auriculis, & ejus magnis vasibus. An vero omnes hæc causæ exhibeant casum ab auctore nostro propositum, paucis videbimus. Examina vi prægressa signa in istis, & detexi, omnes sine prophasi post frequentem Leipothymiam vel syncopen periisse, præter istos, quibus inventus fuit polypus: & inter hos quidem sine aliis cum alternata palpitatione perire. Quare credo non perinde esse, num in arteriis vel venis majoribus cordis polypus hæreat. Si sit polypus in Aorta vel pulmonali arteria, cor sanguine turgens vehementer simul palpitare debet, quare talis ager non perit sine manifesta causa, quoniam palpitatio etiam si sit phænomenon, inter causas a multis medicis censetur. Quibus autem polypus hæret in vena cava vel pulmonali impediens sanguinis fluxum in cava cordis, sola deficiente circulatione sine palpitatione generare potest syncopen. Imo vero mihi verisimilius videtur, si a præcedentibus causis morbofis frequens generetur animi deliquium, quod inde formetur polypus, qui tandem implens magna illa vasa vel cava cordis, mortem ex improvise inducit. In tam vehementi enim Eclysi perfecta habetur sanguinis stagnatio in cordis cavis & vasibus majoribus, & quia est ex sanguinis natura, stagnantem in quadam cavitare, tam in, quam extra nostrum corpus, concrefcere in thrombum, credibile, inquam, mihi videtur, quod quamdiu homo patitur syncopen, & sanguis manet fluidus, reviviscat, contractilitate remanente in vasibus, ducta sufficiente sanguinis quantitate ad encephalon: sed si stagnans ita concrevit, ut contractilitate remanente post extinctum motum vitalem, sanguis ad encephalon urgeri nequeat, ager syncope correptus ad se redire nequit. Etiam si mihi nunc constaret, cordis consumptione, pure in pericardio hærente, pericardii defectu aut coalescentia, allegatam speciem animi deliquii esse natam, fateor, me tamen non posse ullis auxiliis prævenire mortem ex improvise, quia nullum novi medicamentum, quod his morbis mederi valet. Quare ex perspecta causa coacti sumus solam hanc prognosin proponere cum Hippocrate. Removet autem omne dubium, quod semper restat in re incognita, an non interdum invenietur auxilium.

## L I B. II. A P H. XLII.

67. *Solvere apoplexiam, vehementem quidem, impossibile: debilem vero non facile.*

I. **A** Præcedente morbo non multum distat Apoplexia, sed pauciores functiones abolentur, quam in syncope: Apoplexia enim hodie vocatur a medicis ille morbus, qui subito invadit hominem, cum sensuum omnium interiorum & exteriorum extinctione, atque laxa immobilitate omnium musculorum motus animalis. Sed respiratio & pulsus non est opus, ut aliquo modo mutentur: si vero pulsus simul debilitetur, Respiratio fiat stertorosa & inæqualis cum spuma circa os, vehemens est Apoplexia, qualis hic ab Hipp. depingitur: sed debilis Apoplexia, quæ non multum mutat respirationem & pulsum.

II. Observavit Hipp. & Praxi quotidiana firmatur, omnes fere ex Apoplexia Cur periculisior  
perire, sed homines sæpe syncope corripi & convalescere: quare Medici hac obser-  
va-  
va.

ratione instructi non multum timent animi deliquium, sed admodum verebuntur Apoplexiam. Si autem consulamus symptomata in utrisque, syncope gravior est morbus, quam apoplexia, hæc enim relinquit respirationem & pulsus, illa autem utraque has quoque actiones vitales pro tempore extinguit. Corruit igitur regula practica, nos periculum deducere ex multitudine functionum lesarum, vel abolitarum. Revera si solummodo attendimus ad actiones læsas, regula illa pateretur exceptionem in Apoplexia ad animi deliquium: sed tunc intelligimus, si fiat ab eadem causa aucta, vel pluribus causis accedentibus. Examinanda igitur in utrisque est causa læsas functiones inferens. In Apoplexia læsa est functio animalis, ex cuius læsione non est opus, ut mutetur functio vitalis. In animi deliquio læsa est functio vitalis impediens sanguinis fluxum ad organum animale, quam ob rem etiam actiones Animales propter deficientem spirituum animalium fluxum subsistere debent. Cardio igitur rei versatur in perquisitione naturæ harum functionum, si motus animales & sensus a morbosa causa, intacta functione vitali, extingui & mutari possunt, ut actio vitalis, equidem apoplexia minus periculosa esset, quam animi deliquium: sed si actio vitalis ex minima causa potest sisti, ut ita simul sistatur actio animalis, & actio animalis semper exigit causam vehementem, necesse erit apoplexiam periculosiorem censere. Perscrutemur igitur magnitudinem harum causarum. Tantam invenimus in Respiratione vitali & animali differentiam, ut quisque valeat sanus per respirationem animaleam omni modo mutare respirationem vitalem, hoc inhando, sorbendo, loquendo, cantando, quæ omnes actiones respiratione animali peraguntur, ita experimur, ut aliquis existimaret, respirationem vitalem nullo modo oblectari his actionibus animalibus: quare causa faciens respirationem animaleam validior, quam quæ vitalem facit. Hanc quoque differentiam observamus inter motum animaleam musculorum, & vitalem cordis, & arteriarum. Quæ enim corpori applicantur vel ingeruntur, ut & morbose causæ circulationem mutantem sæpe parvæ & sunt & vix persequendæ: sed ut oblectante voluntate in motu animali fiat motus convulsivus, vel movendi impotentia, semper fatemur, maiorem esse causam, quam ut motus vitalis a minimo stimulo applicato ab ordine suo recedat. Sed illi motus animales, qui motu vitali agitato auxiliantur, per consensum hunc facile quoque & a levi causa mutari possunt, ut in tussi, sternutamento, vomitu; non quod ipsi motus animales primo afficiantur, sed organum vitali motu donatum a levi causa movetur, & inde illa organa animalis motus contra voluntatem contrahuntur, aut moventur, ut in dictis involuntariis actionibus deregitur. Quæ levius quam pluma irritare nares? illa tamen causa valet tot musculos & tanta vi movere, ut experimur in sternutatione; cuius motus causa non querenda in motu animali, sed vitali, qui motum animaleam in consensum trahit.

III. Ex iis, quæ hucusque disputavimus, constat, quandam motum vitalem nullum consensum exercere cum motu animali, ut est pulsus cordis & arteriarum, nisi sit nimius; quandam vero motum vitalem in consensum trahere motum animaleam, ut in allegatis, & pluribus aliis. Sed inquirere nunc est, an non subsit quedam naturalis ratio ex actione vitali & animali deducenda, quæ facile patet bari potest hæc differentia. In *Exerc. 1. de motu vitali & Corp. T. 18.* demonstravimus, æquabili fluxu spirituum per nervos ad motum vitalem ex organi fabrica fieri motum alternum; sed in nervis ad motum animaleam requiri mentis voluntatem, ut in sanis hic vel ille musculus moveatur. Quoties igitur in nervo vitali paulo maior, aut minor fiat spirituum fluxus, toties quoque ille motus, dependens ab hoc influxu, vel augetur, vel minuitur; inde irritatio parva faciens per illum nervum paulo maiorem fluxum facit, ut motus vitalis organi, quod ab influxu horum spirituum movetur, perturbetur. Alio autem modo constitutum est cum motu ani-

Cur motus vitalis facilius quam animalis turbari poterit

animali, nisi enim accedit voluntas, musculus non movetur. Ergo ut ex morboſa cauſa motus animalis fiat, vel impediatur, multo major cauſa requiritur, quam ad motum vitalem turbandum.

IV. Duobus itaque modis ſiſti poteſt motus animalis a morboſa cauſa ſubito. (1) Si motus vitalis tantum minuitur, ut non ſufficiens ſanguinis quantitas feſtatur ad organum, quod ſpiritus animales ſecernit: ſed quia demonſtratum eſt eam mutationem in motu vitali fieri poſſe ex levi cauſa, indè morbus hic, qui vocatur animi deliquium; facilius abigitur. (2) Si motus animalis & ſenſus extinguitur, ut in apoplexia, magna requiritur cauſa impediens ſpiritus animalium fluxum. Igitur ex magnitudine cauſæ pronunciamus quoque periculum & difficultatem curationis. Obſtare tamen videtur Apoplexiam natam vehementem vocari, ſi ſimul motus vitalis affici incipit, quia diximus motus & ſenſus animales minus periculofa eſſe, ſi dependeat cauſa a motu vitali impedito. Verum hæc nulla eſt difficultas, nam in allegato exemplo vehementis Apoplexiæ non fiebat ſenſus, & motus extinctio affecto motu vitali; ſed quia cauſa illa magna agens in organum animale nunc tantum increſcit, ut quoque motum vitalem ſiſtat. Inde qui homo ſuperſtes potuiſſet manere in apoplexia per aliquot dies, donec motu vitali vel aliis auxiliis erat apoplexiæ cauſa ſublata vel extincta, nunc mortuus eſt. Poteſt enim ſine ſenſu & motu animali per aliquot dies vivere, modo motus vitalis permaneat; ſed ſine motu vitali nequidem per unicam horam poteſt noſtrum corpus eſſe, quin nunquam redibit motus vitalis. Quæ adferuntur exempla, homines mortuos & habitos ſepultos ad vitam rediſſe, vix credibile eſt, toto illo tempore omnino nullum adſuiſſe motum vitalem, ſed tam exiguum, ut ab adſtantibus non potuerit animadverti. Ergo conſtat ex magnitudine cauſæ nos judicare de periculo & difficultate curationis in Apoplexia. Quia vero apoplexia morbus eſt ex variis cauſis natus, non omnis æque periculofa eſt, ſed quia non eſt hujus loci omnes has diverſas cauſas rimari, ſufficiat ſolam cauſarum magnitudinem assignare.

Apoplexia cur impoſſibile, vel difficile curatur.

L I B. II. A P H. XLIII.

68. **E**X iis, qui ſtrangulantur & reſolvuntur, nondum ſunt mortui, non ſe recolligunt, quibus ſpuma circa os fuerit.

I. **A** Nequam judicium fiat de ſpuma circa os collecta, conſtare debet, qualis morbus in hoc loco ab Hipp. intelligatur. Quibus aeris ingreſſus & exitus per laryngem intercipitur, vel ab externa cauſa, ut in aqua ſubmersis, ſuſpenſis laqueo, aut compreſſione quacumque ad laryngem; vel a cauſa interna, ut Polypo, alienis laryngi illapſis, angina, aliove tumore premente, vel ſpſino hæſtes partes conſtringente, dicuntur ſtrangulari vel ſuffocari, ſi tales homines ſimul actione animali conantur fruſtra animam ducere. Talis autem homo laborans fruſtraneo conatu ſi reſolvatur, id eſt, deſinat amplius motu animali hunc edere conatum, ſimulque privetur ſenſibus, talis enim ſtatus hic per reſolutionem intelligitur, iſ ſi colligit circa os ſpumam, morietur, vel, ut Galenus interpretatur, ſere ſemper morietur. Quia vero in his locis Hipp. agit de morbis, qui ſubito corripuntur, ut animi deliquium & apoplexia, ex nexu cum prioribus in hoc loco intelligitur ſtrangulatio ſubito inducta ab aliqua morboſa cauſa impediente aeris tranſitum per laryngem vel tracheam: & quoniam addit, Reſolvuntur, καταλιννύμενοι, in talem ſtatum, ut eſt in iis, qui moriuntur, patet eam reſolutionem ſequi ſtrangulationem.

Strangulatio & reſolutio quales morbi.

II. Perſcrutanda nunc eſt cauſa ſubito inducens ſtrangulationem, quam brevi ſequitur reſolutio. Strangulantur ſeu ſuffocantur homines, ſi muſculi claudentes

Strangulationis & reſolutionis.

tionis cau-  
sa.

laryngem corripantur spasmus, ut sæpe fit in hysteris & hypochondriacis; vel quando fibræ tracheæ & bronchiorum spasmio afficiuntur, uti in Asthmate convulsivo. Spasmus in musculus laryngis cadit igitur in motu animali, quia illi musculi in voce formanda serviunt. Hic spasmus aliis in musculis vix ullum periculum infert, sæpe enim in musculis membrorum perpetuam morbosam constrictionem spasmoticam toleramus longo tempore sine periculo vitæ: sed si idem morbus hos aggreditur musculos, quorum constrictione impeditur respiratio, homo, quia tam diu sine respiratione vivere nequit, nisi brevi tempore hic dimittit spasmas, suffocata respiratione exstinguitur. Alter casus in fibris bronchiorum & tracheæ, quæ quidem habent motum, sed neque animale, neque vitalem, ut in corde & arteriis, sed speciem præparationi sanguinis in pulmonibus dicatum, qui motus requiritur, ut libere transeat sanguis per pulmones, quod asthmatici sæpe experiuntur, qui summo conamine per motum animale, convulsis his fibris, luctantur animam ducere. Hæ inquam fibræ spasmoticæ nimis diu contractæ circulationem intercipientes valent suffocare, & quia harum spasmio simul intercipitur respiratio atque circulatio, valent etiam hominem interficere. Spasmotice hæ constrictiones in musculis laryngis & fibris tracheæ & bronchiorum si non diudant, anxietatem ob suffocatam respirationem & impeditam circulationem per pulmones inducunt; sed dimissa constrictione, homo ab ea anxietate liberatur, restituta libera circulatione per pulmones; atque in ipso paroxysmo valent motu animali continuare aliquo modo respirationem & circulationem. Si vero, ut hic monet Auctor, æger Resolvitur, id est, privatur omni vitali, & animali actione, ut in moribundis, signum est, eam spasmoticam constrictionem tam validam esse, ut motu animali respirationem non possit peragi, sed ex defectu circulationis per pulmones, quia cor nihil accipit, non potest sanguis duci ad encephalon, unde ex hac causa nunc generatur syncope periculosissima, quoniam causa non hæret in motu vitali circulatorio, qui levi causa potest turbari, ut demonstravimus (Aph. 67. III.) Sed in motu animali, vel in motu speciali in pulmonis fibris, qui diutius potest continuare hanc constrictionem, quam homo sine respiratione potest vivere.

Strangulati  
& Resoluti  
non sunt  
mortui.

III. Quibus ex spasmio, quem Tetanum vocant, tam valide & diu constringuntur fauces, ut instar mortuorum decumbant, hos dicit non esse mortuos; vult enim significare, in tali homine non esse extinctam omnem potentiam, qua vivere potest, & abolitæ vitæ actiones suscitari. Experientia quoque firmatur, multos homines pro mortuis habitos ex hac causa, ad se rediisse, & diu postea vixisse. Mirum est observare in his penitus cessare omnem actionem animale & vitalem, & tamen ad se redire: nihil ergo in his restare videtur, cujus actione talis vita amissa rediret. Sed si perscrutatur hunc morbum, & comparamus huic actiones in corporibus viventibus, fieri potest, ut talis vita amissa recuperetur. Spasmus dependet ab inordinato valido & morboso influxu spirituum per nervos in dictos musculos, si superveniat Resolutio, non amplius hi spiritus feruntur per dictos nervos ad hos musculos, omnis enim spirituum animalium fluxus cessat, inde defectu influentium spirituum musculi laryngis quoque resolvuntur, qua resolutione tollitur respirandi obstaculum. Si hoc nunc tempore in tali corpore rebeat causa propellens spiritus, facile redibunt actiones vitales, quia in hoc articulo temporis actiones vitæ non peraguntur, deficiente spirituum vitalium influxu. Si in hoc casu Experimenta examino, invenio motum specialem vitalem in intestinis verbi gratia, & fibris pulmonum diu a morte adhucdum continuari in partibus his a corpore vivente separatis; atque invenio in viventibus quasdam fibras esse tensas, quæ sua contractilitate adhucdum pergunt in corpore detruncato continuare motum, quare venæ in mortuis animalibus pleniores & arteriæ evacuatæ inveniuntur, atque videmus ductum thoracicum in necato animali adhucdum sub ligatura intus-

me-

melcere. Binis his causis, remanente motu in quibusdam partibus & contractilitate in fibris per actionem vitæ extensis, existimo, stagnantem sanguinem in arteriis versus encephalum pelli sine actione cordis, atque spiritus stagnantes in canaliculis nervosis motus vitalis, eadem contractilitate vaginæ nervi, & resistente in eadem motu vitali, duci sensim ad cor & reliqua organa vitalia, quæ hoc renovato fluxu se iterum movere incipiunt, & quia sublata est causa constringens laryngem, parvus ille renovatus motus valebit renovare amissam respirationem, atque ita successive omnes actiones vitæ redeunt.

IV. De spumæ generatione circa os nescio quasnam fingunt malas causas, ut aditrerent hujus mali signi rationem: mihi autem videtur admodum simplex causa, quæ in proposito casu est assignanda. Experimentis constat, salivam & mucum tracheæ arteriæ tenacia esse, & conquassata admodum spumescere, ergo in trachea arteria & larynge solummodo est assignandus motus agitans hunc mucum, ut misceatur aeri in hoc loco hærenti, statim enim habetur spuma. Quando fauces spasmo contractæ sunt, motus specialis in membrana interna laryngis & tracheæ & forsan bronchiorum, ut continuat respirationem, mucum adhærentem exprimit, eumque miscet aeri in aperta trachea & bronchiis hærenti, ita formatur intus spuma hoc motu violento, quæ spuma majus spatium occupans, quam mucus non conquassatus, atque spasmodica constrictione angustatis bronchiis atque trachea, spuma truditur per rimam laryngis, ut impleat os & emineat. Spumæ apparitio igitur denotat motum specialem pulmonum superare non potuisse spasmus constringentem, sed ulterius fecisse majorem bronchiorum & tracheæ constrictionem, ita ut nunc tota illa via plena sit muco spumoso. Hinc constat, validam adesse suffocantem causam, quæ si tollatur per supervenientem Resolutionem, non valebit rediens actio vitæ, admodum adhuc debilis, tantum dilatare pectus in inspiratione ut ingrediens aer posset superare omnem spumam ad restaurandam respirationem, quare demum quoque cessante speciali motu pulmonum & actione ex contractilitate, nulla restat causa, qua cessantes actiones revocari potuissent. Atque ita ex tali paroxysmo interficitur æger, qui in vitam potuisset revocari; modo spuma non implevisset vasa aerea pulmonis.

Se non  
recoili-  
gunt, qui-  
bus spu-  
ma circa  
os.

## L I B. II. A P H. XLIV.

69. *Qui natura sunt valde crassi, magis subito moriuntur, quam graciles.*

I. *Quibus hominibus major est mollium partium moles secundum corporis latitudinem, quam in hominibus fanis reliquis observari naturaliter solet ejusdem stature, hi dicuntur Crassi & Obesi: istis igitur est partium mollium succulentarum major proportio ad ossa, quam in ceteris hominibus esse solet: hinc valde Crassi tales sunt, in quibus hæc differentia tanta est, ut non solum omnibus intuentibus facile pateat, sed ut ille homo, etiamsi omnes functiones exercere valeat, non multum distet a morbo. Hæc enim plenitudo seu obesitas non provenit augmento firmarum partium, sed collectione humorum in earum receptaculis & vasis, ita ut æquilibrium inter causas agentes firmarum partium & molem humorum fere sit destructum: nam si copia humorum paulo major fiat, vires agentes multitudine obruerentur; dum vero in mediocri corporis mole homo nihil damni patiatur, si aliquo modo humorum moles fiat major. Corpus ergo valde Crassum non est morbus, sed talis status sanus, qui non potest ferre aliquid augmentum humorum vel diminutionem virium, quin incidat in morbum ex destructo æquilibrio. Talis status duobus modis acquiritur, vel natura vel arte: qui enim cor-*

Qui di-  
cuntur  
natura  
valde  
crassi?

poris quiete & otio, atque opiparo victu valde crassi fiunt, hanc obesitatem dicuntur acquisivisse ex arte vel auxilio adhibito: qui autem sine his in victu mediocri, imo parciori fiunt admodum crassi, ex natura dicuntur tales esse. Etiam si ab utrisque causis eadem sit facta moles, periculosus erit ex natura talem habere habitum, quam per dietam; quia quod arte vel dieta fuit natum, contrario artificio multo facilius potest tolli, quam quod ex natura sine causis artificialibus fuit inductum; valet enim medicus imperata parciori dieta artificialem plenitudinem minuere sine damno, sed ex natura crassus huic vix obtemperat, & si durior victu minuat moles, plerumque simul in aliquem morbum incidit.

Qui graciles?

II. Quia in hoc loco Corpus Gracile opponitur Crasso, non debemus intelligere omnem corporis Extenuationem; nam qui ex morbo fiunt graciles, uti in Aridura, Atrophia, Phthisi, in periculosiore versantur statu, quam corpora crassa: neque hic intelligenda corpora labore vel inedia emaciata, sed quæ in mediocri victus genere minorem molem partium mollium circumferuntur; quæ corpora etiam si otio torpeant, & victu opiparo fruantur, æque macilentia manent. Talis macies, quæ nihil morborum continet, in qua homines æque sani degunt, ac illi qui mediocri habitu præditi sunt, multum detrahit de corporis splendore & elegantia, sed tamen est status minus periculosus, quam obesitas: nam dum additur in obesibus, simul non crescunt vires, quare multitudinem facile opprimuntur: gracilibus autem si major sit detractio, simul detrahuntur vires, & inde nullus timor, ut ex tali destructo æquilibrio, superantibus viribus agentibus quantitatem humorum, nisi sit nimis acervata detractio, quæ etiam obesibus obesseret, aliquid mali sit expectandum: Id est Corpus gracile tantum non periclitatur ablatione quadam obesum additione.

Cur crassi magis moriuntur quam graciles.

III. Non solum observatione Hippocratis constat, verum hodierna etiam experientia firmatum est, Obesos sine causa sensibili subito sæpe mori, raro autem id contingit Gracilibus: debet ergo esse in corpore crasso quædam causa subitaneam mortem inferens, quæ non invenitur in gracilibus. Subito perit æger, si interceptiatur actio cordis, cerebelli, aut pulmonum: hæ autem actiones extinguere possunt in obesibus, si sanguis majore quantitate feratur ad encephalum, ut multitudine humorum opprimatur cerebrum, ut in apoplecticis, vel & cerebellum, ut in syncope, asphyxia, & catarrho suffocativo: hanc multitudinem obruentem vereri possumus in iis, in quibus tanta est humorum abundantia, ut fere inde destruat æquilibrio, qualis est in obesibus: sed in gracilibus, qui sine detrimento facile fere possunt augmentum quantitatis, non est verendum mortem sæpe fieri posse ex abundantia.

## L I B. II. A P H. XLV.

70. **E**pileptici pueris mutationes, maxime ætatis, & regionum, & vitarum, liberationem faciunt.

**P**roponit Auctor in hoc Aph. morbum, qui raro curatur, sed plerumque ad mortem ægrotantis solet perdurare, in quo tamen quosdam ponit casus, qui si obveniunt, hominem a morbo illo terribili & pertinaci liberant. Dux adest debent conditiones, prima ut sit in Pueris: reliqui autem exponunt in juvenibus, sed quia noster Auctor Aph. 7. sect. 5. dicit, quibus epilepsie ante pubertatem contingunt, mutationem habent, Pueri potius quam Juvenis nomen retinere volui, quia illa ætas pueris competit. Secunda, ut aliquid fiat in tali epileptico puero, quod observatum fuit attulisse sanationem, nempe (1) Ætatis mutatio circa pubertatem; (2) mutatio regionis; (3) Vitarum seu victus mutatio.

Er-

Ergo hæc tria si accidunt, spem sanationis in puero epileptico præbunt, sed non in adultis.

II. Quoniam Epilepsia morbus est, qui nomen obtinuit ex iis, quæ in ægro conficiuntur, phænomenis, ille itaque ex phænomenis citatis a quovis alio morbo est distinguendus, ut inter omnes medicos constet, quum tales in ægro conficiuntur apparitiones, eum Epilepsia laborare. (1) Adesse debet invita & reciproca violentus musculorum motus voluntarii constrictionis, ut illi muscoli, qui in sanis solo imperio mentis constringebantur & dimittebantur, nunc ex causa morbosa non mediocri, sed violenta constrictione alterne contrahantur, quæ constrictionis potentia sæpe superat potentiam eorundem musculorum, quam exercere idem posset homo ex sua voluntate. (2) Multi vel omnes muscoli actionis voluntariæ ita debent agitari, quia si in quibusdam tantum obtineat, vocatur ille morbus motus convulsivus, & refertur ad species Convulsionis. (3) Cum hac invita constrictione debent simul extingui esse omnes sensus externi & interni, atque actiones ex voluntate, ita ut homo epilepsia correptus nec audiat, nec videat, nec sentiat violentissimos dolores, nec recordetur, quæ acta sunt, dum tentabatur epilepsia: nam si sensus aut motus voluntarii in tali paroxysmo exerceri possunt, imperfecta species est Epilepsia, atque ad Convulsionem refertur. (4) Illa alterna invita constrictionis vel per paroxysmos periodicos aut vagos recurrere debet, ita ut tempore intermedio æger fruatur perfecta sanitate, nisi quod ex præcedente paroxysmo aliquo modo sit delassatus: si vero interim aliquo morbo sit correptus, ut ille non sit huius convulsionis causa: qui enim tali modo ex febre corripitur convulsione, ea agitatio vocatur Convulsio febrilis: & si perpetuo durat, etiamsi reliqua omnia epilepsiæ adsint, a medicis non dicitur epilepsia, sed Convulsio, quare reductus per paroxysmos pertinet ad essentiali Epilepsiæ.

III. Qui sedulo rimatur observata physiologicorum de generatione animalium, inveniet, quo animal propius est origini, eo nervorum imperium in reliquum corpus plus valere; oritur enim animal ex vermiculo capitato seu animalculo exiguo, capitulo mole reliqui corporis majore prædito, atque carina seu cauda, quæ incrementum animali convertuntur in contenta encephali & spinæ: sensum vero reliquum corpus proportionate magis incrementum, quam id medullosum, quod in animali perfecto principium nervorum constituit: hoc inæquale incrementum durat, donec totus homo ad incrementi perfectionem venerit: & quo origini est propius animal, eo major est proportio huius medullosum seu potius nervosi ad reliquum corpus: adeo ut si minima causa hoc nervosum afficiat, tenera membra statim consentiant, & in motum perturbatum quantantur: magis autem firmata membra non tam facile ex levi causa a solitis muneribus detrahuntur: ita Infans ex dentitione, torminibus ventris, vel & quavis leviori causa in totius corporis convulsionem incidit: adultus autem non nisi ex validiore causa convellitur. Ex diètis igitur constat, adultos non nisi magna causa incidere posse in Epilepsiam, sed infantes etiam ex causa levissima; quare sæpe accidit, ut convulsiones epileptice sine multo periculo tolerentur, ut in variolarum invasione. Igitur in pueris fieri possunt Epilepsiæ curabiles & incurabiles, sed in adultis raro curantur. Inde solent quoque prædici Epilepsiam puerorum, ac si alius esset morbus, distincto titulo proponere.

IV. Ex his, quæ hucusque disputavimus, satis constat, puerorum Epilepsiam interdum oriri ex levissima causa, quæ talis esse debet, ut tolli, possit mutatione facta in ætate, regione, vel vita seu diæta: nam illa phænomena recentia, ob quorum apparitionem hic morbus vocatur Epilepsia, non tolluntur, nisi tollatur causa hæc phænomena producens: sed illa causa multiplex esse potest, ut clare constat ex *Compendio nostro* Tr. 30. Quæ omnes hæc inclusa mutatione, etiamli

Epilepsia  
definitio

Cur epilepsia facit pueris, quam adultis.

Quæ species Epilepsiam liberat mutatione ætatis regionum, vitæ etiamli

Acidum  
frequens  
est causa.

etiamsi epilepsiam in puero inducant, auferri non possunt. Quædam igitur in pueris sunt citande, quæ huic mutationi auscultant. Frequentissima Epilepsie puerorum causa, ut quoque olim demonstravit Harris, ut & multi alii, est Acrimonia *Acida*, in primis viis congesta, ibidem irritanda totum corpus in consensum trahens; hoc autem Acidum continuo circulantibus traditum, totam massam simili acedine inficit, ut tandem quoque nervorum succus aciditate infectus, forsitan frequentiores epilepticos insultus faciat, quam acidum in primis viis. Hoc autem praxi constat, medicamenta acidum curantia longo tempore adhibita in epilepsia puerorum esse arcana, ut longus ille usus tandem omnem aciditatem humorum extinguat. Qui pueri ab hac causa sunt Epileptici, dum per secatem robustiores sunt facti, sponte id acidum curant: quia acidi productio nunquam in nobis formatur, nisi ex assumtis alimentis acescentibus, quæ defectu virium permittuntur in acidum assumtis proprium commutari; sed acidum natum si non accipit suppetias, quoniam corpus viribus sensim magis pollet, sensim evanescere incipit; imo viribus valentibus extinguitur, ut experiuntur robusti acidum assumptes, nihil acidi nisi ex sua natura in aliam indolem conversa, evacuant. Quoniam vero admodum constans est virium incrementum circa pubertatem, & incrementum virium semper extinguit acrimoniam acidam, spontanea mutatione induclam, recte adjunxit Auctor *maxime*, quia reliquæ mutationes minus certe hoc acre emendant. Interim Regionum, & vicus mutatio generationi aciditatis contraria, ut & medicamenta acidum emendantia hanc puerorum Epilepsiam curare valent.

## L I B. II. A P H. XLVI.

71. **D**Uobus doloribus simul obortis, non in eodem loco, vehementior obscuratur alterum.

I. **E**TIAMSI hæc medica observatio Doloris unicuique nota sit, multos tamen naturæ perscrutatores in admirationem rapuit, sciscitantes modum & causam hujus phænomeni. Ergo veritas hujus non est multis experimentis confirmanda, sed inveniendæ est lex generalis, ad quam hoc phænomenon referri potest, nam leges naturales nobis innatæ experimentis detectæ ampliore explanatione ulterius exponi nequeunt; nisi quod a summo Opifice ita sit conditæ.

Quid sit  
Dolor.

II. Omnium primo inter medicos constare debet, quid sit Dolor, de quo superius (*Aph. 31. III.*) quoque verba fecimus, sed in hoc loco ita est definiendus, ut intelligatur cur Vehementior obscuratur alterum. Qui rogaret inodum quid sit Dolere, risum equidem moveret, quum nullus sit, quin interdum Dolorem perceperit, aut vel levi experimento in proprio suo corpore potuisset experiri. Illam tamen rem notissimam describere verbis, multis magnam præbuit difficultatem, quia voluerunt ex causa dolorem inferente definire Dolorem: quidam enim dicunt esse impeditum spirituum fluxum, alii nervorum vellicationem, alii tensionem fibræ nerveæ ruptioni imminuentis, alii iterum alia adferunt. Sed qui querit, quid sit Dolor, ponit Dolorem esse rem incognitam, quam vult habere cognitam per aliquam descriptionem rerum cognitarum, sed non querit Doloris causam. Igitur suppeditanda est alia res querenti cognita, cui Dolor est comparandus, vel multæ res cognitæ sunt conjungendæ, ut ex conjunctæ uno nomine Doloris exprimantur. Suppono itaque, querenti cognitum esse, quid sit sentire aut percipere sensum; intelligere quoque quid sit ingratum, quid molestum, quid adversum, quod evitare conatur; si possit. Qui igitur in suo corpore percipit sensum, sed solito vehementiorem, junctum cum ingratitudine, tristitia, averfatione,



ne, molestia, talis perceptio vocatur dolor. Hæc descriptio Doloris propterea non data est, ut rem incognitam exponerem, quasi nulli esset notum, quid sit Dolor; sed ut ex separatīs rebus in Dolorē concurrentibus invenirem; quæ sint præcipue in Dolorē observanda. Ita enim invenio esse sensus speciem, atque organis sensuum exerceri, quare Doloris naturam possum ex sensuum doctrina exponere: atque scio causas sensum inferentes, etiam Dolores inferre posse, sed quia Dolor est sensus vehementior, scio, sensus causas majores & validiores in Dolorē esse. Denique ex ingrata perceptione colligo, meum corpus inde aliquod damnum pati posse, aut in parte dolente aliquid interitum minari.

III. Unus Dolor, inquit, obscurat alterum, quod denotat Dolorem mitiorem non curari, vel tolli, sed minus sentiri, si levior Dolor aliam partem infestat, ne decipiamur in judicio, ac si ob vehementiam Doloris causa alterius mitioris doloris minueretur, sed quia vivida Doloris perceptio solummodo obscuratur. Hi duo Dolores possunt esse in eodem membro, vel parte, sed tunc potuisset compressio nervi per Dolorem vehementiorem minui sensus Doloris mitioris; sed observavit, obscurari quocumque Dolorem in quacumque alia corporis parte per Dolorem vehementiorem, ubi nulla potest esse suspicio obscurationis ex nervo compresso. Hinc per Dolorem vehementiorem debet aliquid fieri in corpore, quod vividam perceptionem in quacumque alia corporis parte obscurat. Hæc observatio generalis est ex sensuum exercitatione deducenda, in qua experimur, unum sensum obscurare non solum alterum, sed inter omnes actiones voluntarias hoc observatur vinculum & necessitudo, ita profunde cogitans imperfectius exercere potest sensus externos & motum voluntarium: sensum externum cum studio exercens minus valet sensum internum & motum voluntarium exercere. Qui vero motum voluntarium exercet, minus attente operatur sensibus externis & internis. Omnia hæc exemplis vel experimentis illustrare, nimis longum foret: unusquisque hoc in semetipso experiri potest, nisi arte vel consuetudine didicit, duas tresve actiones voluntarias exercere simul, experietur; non omnes perfecte fieri. Itaque Dolor quia est species sensus, has quoque leges generales sequitur, nihilque arcani hæc observatio complectitur. Hoc autem boni suggerit, quod liberet nos a perverso judicio de Doloris ablatione, dum propter Dolorem vehementiorem in quavis alia parte videatur evanescere. Quare semper in Doloris mitigatione attendendum, num mitigetur obscuratio, vel diminutio causæ.

Cur dolor  
vehementior  
obscurat  
alterum.

L I B. II. A P H. XLVII.

72. **C**irca puris generationes dolores, & febres magis accidunt, quam ipso facto.

I. **I**N corpore sano nunquam Pus reperitur, est ergo semper morbosus humor, sive maneat in corpore; sive exeat; estque productum actionis vitalis, quia in cadavere nunquam formatur, aut ulla arte chemica generari potest: nullus enim chemicorum ullo artificio ex quovis humore nostri corporis Pus facere potuit. Et in nobis observatur solummodo formari in loco quodam clauso: nam si ulcus aeri aperto exponitur, in superficie format crustam, sub qua pus confectum colligitur, aut si ulcus emplastro vel alio operculo tegitur, sine crusta locus ille pure repletur. Ipsa autem medicamenta non conficiunt Pus, quoniam sine medicamentis tamen in nobis formatur: sed si quædam sunt in nobis impedimenta, iis impedimentis sublati promouetur Suppuratio. Operæ pretium erit rimari actionem vitæ pus facientem, & materiam, ex qua formatur pus. In viventibus duæ actiones inveniuntur; una vitalis, qua ex assumtis alimentis conficitur sanguis;

guis; atque ex eo reliqui boni & servientes liquores, partesque firmæ, quæ etiam inutile factum, vel quod subigi nequit, adaptatur evacuationi, & actu expellitur; altera est automatica, ut corruptio, fermentatio, putredo, effervescencia, quorum effectus Chemicus norit artificio suo imitari. Sed neque actione vitali, neque automatica conficitur pus: quod in nobis producitur actione automatica, est corruptum aliquid, minime autem Pus. Invenimus quoque hoc interesse inter Pus & Corruptum liquorem; Pus habere majorem quam aqua pura specificam gravitatem, in aqua enim dimissum fundum petit, ut nostri humores boni circulatorii; sed Corruptus humor supernatat, uti nostri humores excrementitii. Propterea non inepte dixit Galenus in hoc Aph. Pus esse humorem femicorruptum, quia notas non habet boni & corrupti humoris, sed de utrisque participat, neque productum esse motu automatico corrumpente, neque motu vitali moderato: atque puris generationem inter bonas mutationes censeri, non tamen esse commutationem in humorem nutrientem; sed humoris degenerationem per corruptionem semper esse malum.

Que actio  
vitæ gene-  
rat pus.

II. Constat perpetua observatione solis in viventibus formari Pus: sed actio illa in sanis hoc nunquam facit, ergo hoc fieri debet, si actio vitæ aliquo modo ab ordine solito recesserit. Experimenta in viventibus, & morbi docent, post majorem circulationem vel in toto corpore, vel in quadam speciali parte pus prodire: nam post febres ardentes & morbos acutos sæpe magna copia puris emittitur, aut alicubi in parte speciali deponitur sine prægressa inflammatione istius partis: vel post inflammationem particularem pars antea inflammata abscessum purulentum format: imo pars sana vulnerata, vel læsa, ut inde inflammationem concipiat, pus in loco læso post aliquod tempus colligit. His omnibus constat, circulationem seu motum vitalem per totum corpus vel in speciali parte formare pus. Sed hoc quoque experimur, eum motum nimis validum non formare Pus, sed abire in corruptionem, quam sphacelum vel gangrenam vocant. Hinc actio vitæ moderata dicitur Cœlio faciens humores nutrientes; actio validior autem Cœlio materiæ morbi in purulentiam; actio validissima tendit in destructionem seu corruptelam per nimium motum vitalem: sed actio minor quam in sanis, permittit corruptionem automaticam. Hinc intelligitur, quantum debet augeri vel minui motus vitalis in acutis, quam optima mutatio fiat in Pus, instigandus est motus vitalis, si torpeat; sed sedandus, si nimis intensus sit, ut paulo majore circulatione humor mutetur in Pus.

Ex qua  
materia  
formatur  
pus.

III. In corpore sano nullum alienum morbosum humorem continente instigatur vulnus, eo in loco formatur pus, ergo materia illa, ex qua formatur, est humor nutritivus ex assumtis, vel excrementitius, vel bonus, qui corpori est utilis. Ex tribus his per colorem album decepti existimant nonnulli, Chylum commutari in pus, sed in chylo deficit illa naturalis major gravitas, quæ in pure observatur, atque post longam in diem tamen formatur, etiam si nihil chylosi restet in corpore: neque excrementitius humor hanc mutationem subire valet, cum corporis actione ad eam specificam levitatem ductus, non patitur tantum compingi, ut hanc acquirat puris gravitatem: Quare verisimile mihi videtur, materiam gelatinosam humorum & concrevisibilem motu majore vitali commutari in pus.

Cur circa  
puris gene-  
rationes  
Colores  
& febres  
magis ac-  
cident,  
quam ipso  
facto?

IV. In morbis inflammatoriis internis & inflammationibus externis particularibus, egregia est observatio medica practica, sensim intendi, ut his dolores & febres, donec pus sit natum, sed eo facto sensim leniri dolorem & miscere febrem, quia inde nobis constat, minui posse inflammationis symptomata, etiam si non sit curatus morbus, sed transit in suppurationem. Atque inde cognoscimus, num morbus adhuc dum versetur in inflammatione, vel commutatus fuerit in morbum suppurationis: ut ita valeat quoque medicus suam simul mutare medendi metho-

дум.

dum. Huius mutationis hæc mihi videtur causa. Dura pars quædam corporis vel a causa mechanica vel stimulo inflammatorio infigitur, sensum motus ex stimulo magis magisque intenditur, ut experimur in parte quacunque irritata, si maneat stimulus causa, partes ita sensum magis agitata, sensum quoque magis calere & dolere incipiunt: hoc si fiat per universum corpus, vocatur febris calida vel ardens, & in parte speciali Inflammatio localis. Ablato autem stimulo sensum quoque incipit ille motus ex stimulo maior compesci, atque Dolor ex eo motu & stimulo natus mitigari. Ita Pus ex hoc aucto motu natum, collectum inter causam stimulantem & partem vitalem, facit, ut stimulus causa non amplius eam partem tangat, quare obvoluto stimulo per pus natum, quietem concedit his partibus stimulo agitati: quare hoc tempore sensum majore copia puris interposita, & quia sensum quoque instigatus motus compescitur, Dolor & febris ex hoc instigato motu nata minui incipiunt, & ita loco Inflammationis habetur morbus purulentus. Quando ob stimulum minorem minor Calor, Dolor, & Febris observantur.

## LIB. II. APH. XLVIII.

73. **I**N omni corporis motu, quando dolere corporis, interquiescere statim lassitudinem curat.

**I**N physiologicis demonstratum assumo, nam nimis longum foret hic proponere, motum voluntarium fieri alterno & copiosiore spirituum influxu per nervos in istos musculos, qui voluntatis actione exercentur, atque hoc alterno motu, præprimis si vel nimis diu duret, vel nimis fortis sit, fibras musculares agitas simili fere modo affectas esse, uti a levi contusione, vel frictione unius partis ad aliam, cum muscoli alterne non possint contrahi, quin simul una fibra musculi terat aliquo modo alteram, ob quem attritum nimium evitandum Deus posuit inter fibras musculares pinguetudinem, quæ motu continuato sensum consumitur, ut tandem circa finem una fibra alteram magis terat. Cum vero ille motus voluntarius diutius continuatus fuerit, spiritus sensum deficere incipiunt inserviendo: ex hac denique penuria spirituum formatur ad motum ineptitudo, seu impotentia, quæ ex motu musculari nata vocatur *Lassitudo*. Et quoniam continuato illo attritu fibrarum inducitur levis inflammatio, quæ conjunctum Dolorem habet, inde pars illa præ ceteris agitata quoque dolet: ut omnes homines experiuntur, qui sua corpora diutius & validius exercent. Hoc quia omnibus constat hominibus, existimantur Interpretes nonnulli, hanc sententiam Hippocrate indignam esse, quasi nil nisi arcana debuisset noster Auditor proferre. Ego autem existimo, eum, qui fundamenta artis studet condere, oportere notissimas res quoque proferre, ut istis demonstratis possit uti ad obscuriora explicanda, quemadmodum in sequentibus constabit.

11. Qui post tamdiu toleratos labores suum corpus ad quietem componit, huic non amplius tanta copia spirituum fertur ad musculos, neque fibræ musculares amplius fricantur: sentit tunc quidem ex spiritibus consumtis ineptitudinem ad motum, & molestum sensum in contritis fibris levi inflammatione affectis; sed quia cessat causa duo illa producens, inde corporis actio vitalis ex reliquis humoribus præparat materiem spiritibus suppeditandis aptam, præprimis si superdormiat; quare post aliquod tempus restaurata materia spirituum, corpus iterum fit agile, ut antea. Levis quoque inducitur inflammatio sensum iterum evanescit, ut si pars ex frictione rubet, cessante frictione ad naturalem colorem redit sensum, ita quoque in his musculis agitati inducitur lenis inflammatio evanescit: atque consum-

Corporis motus dolorem & lassitudinem facit.

Quies curat lassitudinem & dolorem ex labore.

sumta pinguetudo per continuatum motum, nunc per quietem restauratur, ut ita ea pars similis fiat, ut erat ante exercitationem. Hæc autem ipso momento quietis non restaurantur, ut nonnulli ex hoc Aph. colligere conantur, hoc nimis obesset quotidianæ experientiæ, quam ut hoc nescivisset Hipp. Quare ut sensus constet, hoc modo legendus est hic Aph. *In omni corporis motu quando dolere corporis, interquiescere statim, lassitudinem curat.* Monet igitur Hipp. nos non debere continuare illum corporis motum, si Dolorem aut Lassitudinem induxerit, ut multi conantur, ut per motum continuatum superent eum Dolorem & Lassitudinem; sed vult, ut talis homo statim quiescat, quoniam quies multo melius curabit Lassitudinem & Dolorem, quam motus continuatus.

## L I B. II. A P H. XLIX.

74. **C**onsueti solitos labores ferre, etiamsi fuerint debiles aut senes, insueti, robusti licet & juvenibus, facilius ferunt.

I. **M**ultum valere Consuetudinem in capiendis alimentis, superius (Aph. 16. IV. Aph. 17., IV.) notavimus, in hoc autem loco sermo habendus, quid valeat consuetudo in corporis exercitiis, de quibus prædicat Auctor tantum valere, ut sæpe superet innatam potentiam: sine Consuetudine enim juvenes & robusti facilius tolerant labores, quam senes & debiles, dum tamen contendit, contrarium fieri posse ex Consuetudine. Duæ itaque res in hoc loco examinandæ veniunt: (1) an illa veritas experimentis sit firmata: (2) quali modo nostrum corpus Consuetudine laboris firmatur, ut facilius toleret labores. Monuerat in præcedente, quamdiu labores erant tolerandi, ut conservetur sanitas generaliter in omnibus hominibus tam assuetis quam insuetis. Hoc autem loco indicare vult, quod si aliquis multos & graviores velit ferre labores, eum non oportere se statim accingere, sed comparare sibi aliquam consuetudinem.

Consueti  
facilius  
tolerant  
labores.

II. Qui manuum pedumque opera totam vitam assueti fuere victum querere, vel qui gladio, saltu, quavisque corporis exercitatione suum corpus fatigantur, a duriori illo labore vix fatigantur: nos vero otiosam vitam ducere consueti, literisque dare operam, interdum levi ambulatione non solum corpus statim sentimus lassum & ad ulteriorem motum ineptum, atque dolens; sed si obnoxie contendimus cum assuetis licet viribus minus valente, continuare labores, nostrum corpus veluti comminutum sentitur, ita ut longo tempore egeat, antequam restauratur. Illi vero e contra severiore studio brevi habescunt, imo ad ætatis constantiam pervenientes ad studia excolenda se sentiunt idoneos, dum vero literis assueti etiam in senectute ulterius discere valeant. Tantum valeat Consuetudo in nobis, ut non solum corporis actiones obstringunt, sed & nostra mens immortalis ingenii exercitatione firmetur. An vero certo generi laboris assuetus minus defatigetur in diverso genere laboris, quam qui omnino otiose vixit, hoc generali observatione in hominibus est assequendum. Experimur ab insolis laboribus magis defatigari quam a solitis, sed tamen corpus laboribus assuetum ferre facilius potest quovis alios labores, quam corpus continuo otio torpens: ita qui exercuit ingenium, quavis quoque alia in scientia valebit magis, quam ille, qui nunquam literas excoluit.

Laboris  
consuetudo  
quid in  
nobis fa-  
ciat.

III. Aliam legem in nostro vivente corpore invenio, quam in ullis rebus mortuis: omnia enim corpora mortua usu deteruntur, nostrum autem corpus ab exercitiis, frictionibus & attritu occallescit, durius fit & tenacius coherens, quod non solum in cure externa manuum & pedum operariorum, verum etiam in partibus interioribus verum invenimus: hinc in iis aorta callosa, imo ossa sunt inventa, &

& callus obtegens capitulum ossis luxati non repositi: modo statim non applicetur vehementior attritus, quam cohesione fibrarum potuisset sine solutione sustentari. Ex lege generali ergo constat, fibras musculares toties exercitatas tenaciores fieri, & propterea non tam facile disrumpi posse & inflammari, quam fibræ motui inassuetæ. Ex laboribus non ita vehementibus inassuetis generabitur in manibus rubedo, vesiculæ aquosæ, & excoriatio, aut diutius ambulanti inflammabuntur pedes; quorum autem manus & pedes callo obducta sunt, ab iisdem laboribus ne minimam læsionem percipient. Ita igitur ex innata generali lege, quia fibræ musculares callosæ sunt factæ, laboribus assuetus in istis musculis minus dolebit. Ex his autem non patet, quam ob rem minus fatigantur defectu spirituum. Sed experimur quoque omnes, corpora evacuationi assueta minus lædi quam non assueta, quoniam corpus longa consuetudine quasi firmatum ad generationem maioris copię spirituum, tandem quoque maiorem aptitudinem acquirit. Ulterior hujus rei inquisitio neque utilis est, neque prodesse potest medico, debemus tandem fateri, hanc legem nostris corporibus viventibus a Deo innatam esse, quæ in æbus mortuis non invenitur: eamque observare medico sufficit, licet primas causas non attingat.

## LIB. II. APH. L.

75. **A** Multo tempore consueta, etiamsi fuerint deteriora, insuetis minus turbare solent. Oportet igitur etiam ad insolita mutare.

I. **D**um nascitur homo, nullis rebus assuetus est, at ex innata natura exigit alimenta facilis digestionis sæpe de die, atque corpus sensim increfcescens naturalem habitum & figuram acquirit sine ullo artificio. Statim vero accedit ars curatricum, cingunt ligantque membra, quasdamque corporis partes, ut pulchriorem formam, ut putant, acquirant. Ita Hipp. a, 348. narrat de quadam gente, in qua infantum capita ita cingebantur, ut prohiberetur rotunditas, sed acquireretur figura oblonga, hos macrocephalos vocat; tandem longa illa consuetudo non amplius egebat artificio, quasi natura cum consuetudine conspiraret. Hodie autem strictissime cingunt præcordia, ut graciles fiant puellæ. In aliis regionibus stringunt pedes, ut maneant parvi, tandem formantur corpora in quamcumque formam, quam decus istius gentis vel morum exigit. Hoc etiam in victu Aph. 17. IV. Laboribus tolerandis Aph. 74. & omnibus aliis in rebus verum observatur. Sed ut Consuetudo convertatur in naturam, primum est, ut instituat statim a nativitate, nam in adultioribus non facile fit: alterum est, ut longo tempore fiat, brevi enim tempore si aliquid fiat, consuetudo in habitum seu naturam non commutatur.

Consuetudinis differentia.

II. Quænam hic intelligantur per Meliora & Deteriora, exponendum est, quia si aliquis rebus quibusdam assuetus sit, omnes mutationes ipsi videbuntur deteriores. Itaque accipienda sunt homines nullis rebus assueti, quæ tunc in his observantur conservare sanitatem, nullamque molestiam afferre, dicuntur meliora; quæ autem difficilius tolerantur ab homine non consueto, dicuntur deteriora. De his nunc Deterioribus dicit Auctor, ea minus turbare vel molestare consuetos a longo tempore, quam insuetos. Ut si quis longo tempore degit in regione calida vel frigida, usus fuerit victu duro vel levi, copioso vel parco, corpus multum vel parum exercuit longo tempore, talis homo non fert mutationem, quin inde turbetur vel molestiam percipiat, quia longa illa Consuetudo quasi in naturam sit commutata, ut superius de corporis varia artificiali forma monuimus. Hoc non solum in rebus, quæ æque bonæ censentur, sed & in deterioribus, quæ cor-

Cur consuetudo deteriora insuetis minus turbare solent.

poribus nullis rebus affuetis intulissent molestiam & damnum. Qui portione spirituosâ a longo tempore deperierunt, ut unum adferam exemplum, infinita vero incurrun, hi podagra correpti, vel hydrope, vel debilitate affecti ex spirituosorum abusu, si omittant spirituosorum potionem, admodum periclitantur, etiam si genius morbi abstinendam exigeret: sæpe enim observavi spirituosos addictos, si propter doloris vehementiam, vel monitu adstantium aut amicorum vel medicorum omiserunt hanc potionem, deficiente stimulo consueto spirituosos, perissem. Tantum ægris valet Consuetudo, ut deterioribus debeamus indulgere.

An cui-  
dam gene-  
ri vitæ af-  
fue-  
scen-  
dam.

III. Inter medicos non constat, an certum & fixum vitæ genus sit eligendum ad sanitatis conservationem & longævitatē acquirendam, num vero varium & mutabile debeat vitæ genus institui. Si absolute ratiocinemur, ea sola sunt eligenda, quæ nobis non affuetudini addictis nullam adferre possunt molestiam; id est temperate vivere maxime salubre, quia omnia deteriora, etiam si propter Consuetudinem non amplius inferant molestiam, tamen sanitati & longævitati obfunt, quum intemperate viventes raro decrepitam ætatem attingant. Quia vero omnes homines inopinatis rerum fortibus subjiciuntur, ne incidamus repente in nobis insueta, satius est, inquit Galenus, omnia tentare. Atque Celsus monet, sanum hominem, beneque valentem nullis obligare se legibus debere.

Et noster Auctor, oportet etiam ad insolita mutare. Sed quæ est causa hujus mutationis, regulariter magis conducit solis melioribus uti, sed quoniam multi in his totam vitam transigere nequeunt, coguntur multa tentare, ut ex consuetudine a deterioribus nimis lædantur. Ergo deterioribus uti non est conservare vitam & sanitatem; sed quia non semper valeamus in communi vita evitare deteriora, hinc illis, qui non obstricti sunt interdum deterioribus uti, non est opus ad vitæ & sanitatis conservationem singulis mensibus vomere vel bibere ad ebrietatem, ut monet Celsus; nemo enim cogitur ex natura abuti spirituosis, aut edere vel bibere nimium.

## L I B. II. A P H. LL

76. **M**ultum, & derepente aut evacuare, aut replere, aut calefacere, aut refrigerare, aut aliter quocumque modo corpus movere, periculosum est. Nam etiam omne multum natura est inimicum. Quod vero paulatim fit, tutum est: tum alias, tum si quis ex altero ad alterum transeat.

Consue-  
ta non subito  
mutanda.

I. **D**ixerat in præcedente, nos consuetudine acquirere habitum, ut facilius toleremus deteriora, si ergo recedere volumus ab hac mala consuetudine, nunc regulam generalem suggerit, eam mutationem paulatim fieri debere, cum omnis subita mutatio non careat periculo: imo addit damnosum esse, si ve recedamus a peioribus ad meliora, vel a melioribus ad pejora, quam sententiam hi verbis complectitur, tum alias, tum si quis ex altero ad alterum transeat. Egerat enim in superiore de consuetudine deteriorum, & meliorum, quam rem hoc loco ulterius vult persequi, ut demonstraret, quali modo consueta sunt mutanda. Quæ igitur hoc loco proponuntur, ad Diata sunt perstringenda, sed minime ad omnes curationes morborum extendenda, interdum enim in periculosis morbis subitanæ mutationes sunt inducendæ ad majus malum evitandum. Hujus regulæ generalis quædam exhibet specimina.

Periculo-  
sum est  
multum &  
derepente  
evacuare.

II. Quoniam versamur in homine vel perfecte sano, vel leviter ægrotante, sententia de multa & repentina evacuatione ad talem casum est perstringenda, & quidem in homine hujusmodi evacuationi non affueto, quod si vel per venæ sectionem multum sanguinis detrahas, vel purgante vel vomitorio multum evacues & su-

& subito, talis æger facile incidit in syncopen, & forsan non revivifcet: quod si talis evacuatio instituta fuit omnium humorum abundantiam, ne quidem tunc conducit, ut monuimus *Aph.* 3. IX. Si vero sine abundantia *Aph.* 2. V. fiat, eo pejor est, quia tunc cum ablatione boni destruitur æquilibrium. In Consuetis autem minus malum, quoniam hi largiorem ferunt evacuationem sine multo detrimento: ita foeminae copiose menstruantes facilius ferunt largiorem sanguinis evacuationem, quam viri robusti sine metu leipothymizæ, quod multi mirantur: in his autem si modum excedat, uti in mensium profluvio, non raro sunt hydropicæ; quare ne quidem repentina & multa evacuatio affuetis conducit. In morbis quoque multis non est licitum talem facere morboſi humoris evacuationem, uti in hydropæ & empyemate: cavent enim omnes prudentiores Medici & Chirurghi, ne nimis cito omnem humorem evacuent. Sed in phrenitide, pleuritide, aliisque morbis, quibus subito instat summum periculum, imperamus largam evacuationem, ut præveniatur majus malum.

III. Quæ corpora magnam simul copiam alimentorum sumere sunt consueſta, etiamſi minus lædantur reliquis, ad sanitatis autem conservationem non conducit, corpus nostrum toties onere preſſum, tandem succumbit: magis autem id experietur corpus infectum; est enim in nobis nata definita actio subigens, quæ valet mediocri ingestum in bonum succum assimulare: sed si nimis ingeritur, id abundans non solum opprimit vires, ut corrumpatur, sed etiam reliquum, aliter in modocri quantitate sumtum subigendum, impedit præparari, quare omne ingestum manet crudum, & dein corruptum non carens periculo. Vide quæ disputavimus *Aph.* 5. III. & *Aph.* 42. II., III., IV. his satis constabit asserti Auctoris veritas.

IV. Duobus modis corpora nostra caleſcunt, unum genus dicitur fieri Actu, alterum Potentia. Nos enim, ut omnia corpora etiam mortua a calido applicato incaleſcimus, sive sit aer calidior, sive ignis accensus, sive collectus in aliquo corpore; de hujus Caloris communicatione nemo ambigit: fed alterum genus in viventibus solis observatur, si excipiamus incaleſcentiam putredinis, fermentationis, & effervescentiæ, qui calor dependens ab actione vitæ, augetur omnibus stimulantibus, majorem motum vitalem facientibus, & inde caleſcentibus diſtis. Ita experimur, aromaticis, vel spirituosis assumtis aut applicatis, etiamſi illa ad thermometer nullum indicium præbeant caloris, in nobis tamen calorem verum & sensibilem concitare. De utrisque nunc monet Auctor, periculum esse, si multum & repente excitetur Calor. Qui enim consuetus est in aere frigidiore versari, deſeratur in aerem admodum calidum, aut si tempeſtates subito mutantur, non solum homines magnam molestiam experiuntur, sed etiam hanc mutationem non sine periculo experiuntur. Qui partem gelu contrictam majore calore tentat degelare, partem destructam inveniet. Qui calido vapore, vel accenso alcohole conatur resolvere concretos humores, caveat, ne nimis cito nimium calorem concitet; perierunt enim nonnulli ferre non potentes tam repentinam mutationem, qui calor sensim auſtus in majori gradu sine damno potuisset tolerari. Hoc quoque consuetum est observare in Caleſcentium exhibitione, si a majore doſi inchoamus, magnam molestiam adferunt, sed a minima doſi data, sensim vero adſcendens ad majorem doſin, felicem dedit in Chronicis curationem.

V. Quod monuimus de Caleſcentibus, id quoque statuendum est de Frige-  
facientibus: sunt enim corpora actu frigida, quæ alteri corpori calidiori demunt calorem; sunt etiam quæ potentia refrigerant, ut nitrum & omnia nitroſa. Non minus in his, quam in præcedentibus datur peccandi locus. Corpora enim excaleſcæta exponere aeri frigido nihil periculofius, quæ experimenta omnibus ita sunt obvia, ut non egeamus exemplis. Sed de Refrigerantibus videtur hodie nullum periculum exſtare, quafi nemo in his, quæ antiphlogiſtica vocant, in excessu potuiffet.

Repleri.

Caleſcere.

Frigeſcere.

tuiſſet peccare, ſed ſecundum noſtrum Auctorem & experientiam conſtat, anti-phlogiſtica omnis periculi non eſſe experta, etiamſi toties non in his, quam in actu frigidiſ experimentum damnum.

Motus &  
quies cor-  
poris.

VI. Qui equos alique animalia exercere norunt, nunquam permittunt, ut equus a ſtabulo veniens ſtatim valido agitur curſu; neque ut a curſu veniens ſtatim in ſtabulo quieſcat: experientia enim didicerunt, ſi hac cautela non ſuere uſi, hæc animalia ſæpe damnum paſſa fuiſſe. Ita etiam in hominibus obſervamus, qui a longo tempore didicerunt ſuum exercere corpus, ſi dein ſe totos tradant otio, plerumque aliquo corripiuntur morbo, neque tam facile eſt vitam otioſam in validiora exercitia commutare. Lente ſemper omnis illa mutatio eſt inducenda. Quare regula generalis conſtat, omnis ſubitanea mutatio non vacat periculo.

Omne  
multum  
naturæ ini-  
micum.

VII. Hucusque cum noſtro Auctore probavimus Replere, Caleſcere, Frigeſcere, & Movere non conducere, ſi ſubito fiant, quoniam corpus conſuetum alicui rei non facile patitur ſubito ad contrarium ſtatum duci. Reſtat autem videre, multum Replere, &c. quoque periculolum eſſe, ſive corpus aſſuetum ſit, ſive non. Qui enim multum evacuat, ſive ſit bonus ſive malus humor, ſemper deſtruit æquilibrium, detrahitque naturale ſuſtentaculum: vaſa enim & fibræ noſtri corporis mediocri vel majori etiam copia humorum diſtenta, ſe nequeunt tam ſubito accurtare, ut ſatis firmiter amplectantur reliquos humores tanta copia privatos; unde vaſa non ſatis humoribus diſtenta collabuntur, & ſemi impleta iſtos minus propellunt, imo ſtagnare patiuntur. Si talis ſubito Evacuatio fiat ex cavis corporis, niſi artificiale accedat ſuſtentaculum, vaſa antea humoribus incumbentibus ſuſtentata, nunc ſuſtentaculo orbata, ultra modum tument, omneſque fere reliquos e corpore humores in ſe recipiunt, imo interdum diſrumpuntur, ut obſervavi in ſubitanea puris ex abſceſſu, vel cavo peſtoris eductione, & in paracentheſi hydropicorum. Quare ſive corpus ſit aſſuetum ſive non, ſive bonus educatur humor ſive morboſus, omnis evacuatio nimia non caret periculo. Neque Repletio modum excedens in hominibus quidem conſuetis ſanitati conducit. Multi autem exiſtimant, pari paſſu corpus nutriri cum copia ingeſtorum, judicantes inde multum lædi non poſſe. Sed ſi perpenderent, ingeſta alimenta natura diverſa eſſe ab eo, quod in nobis nutriri debet, illa actione noſtri corporis primo eſſe commutanda, quæ actio multitudine obruta niſi boni conſicit, facile intelligerent, multum ingeſtum potius inducere cruditate vel corruptelam, quam bonos nutriendos humores generare. Hoc etiam ſentiendum eſt de Calore & Frigore: nimius enim Calor etiam in corporibus aſſuetis non conducit ſanitati, quoniam nimius Calor enervat nimis, diſponit ad putredinem, & ultra modum diſſolvit humores, fervor autem coagulat humores & partes firmas criſpare facit; ſed frigus nimis inſpiſcat humores, atque tantum minuit motum vitalem, ut in nimio frigore omnino ſubſiſtat; dum verò tepor moderatus ſaluberrimus ſit corpori: quare non parum peccant medici, qui exceſſu refrigerandi vel caleſcendi conantur morbis mederi. Etiamſi in multis morbis Chronicis corporis Exercitatio ſummum ſtauat auxilium, longe vero abeſt corpus multum exercere conducere ſanitati, mediocriſ quidem membrorum agitatiō humores concoquit, ſed nimius motus bonos humores nimis vel deterit, vel convertit in lentorem: neque multum quieſcere debet homo ad ſanitatem conſervandam, quoniam omnis preparatio ſolo motu vitali eſt abſolvenda, & multi hamores in remotiſſimis vaſculis & cellulis ſtagnantes, quia ultra debitum tempus ibidem relinquantur, dum exeunt, corrupti inveniuntur. Ex his conſtat, omne multum & derepente factum tam in Conſuetis quam in Inconſuetis periculolum eſſe, etiamſi Conſuetos minus afficiat.

L.IB.



## L I B. II. A P H. LII.

77. **O**mnia secundum rationem facienti, & non secundum rationem evenienti-  
bus, non transfundum ad aliud, manente eo, quod visum ab initio.

**I.** **S**i omnes curandi modos perscrutemur, experimur his tribus modis tentari  
Curationem. (1) *Empirica* est, quæ solis vagis nititur experimentis: ut  
Curatio  
secundum  
rationem  
quænam?  
si aliquid profuerit in dolore, inappetentia, debilitate, delirio, vertigine, reli-  
quisque morbis, qui ex unico præcipuo phænomeno obtinuerunt nomen, protinus  
audito vel viso phænomeno in promptu habet appropriatum medicamentum, vel  
didicit medendi methodum, aut adhibet regimen in diæta, quibus ille morbus  
antea fuit curatus, si fideliter agit Empiricus. Nihil est, quod majus damnum  
intulit Medicinæ, quam hujusmodi arcana, quoniam idem phænomenon in sen-  
sus incurrens, ad quod solummodo attendit Empiricus, & existimat se ex arte  
agere, variis & sæpe oppositis nascitur causis, quæ suam appropriatam exigunt  
curationem. Hos morbos ex variis nasci causis, variamque postulare curationem,  
passim indicavimus in Compendio nostro. Quare non mirandum, Empiricos suis  
probatis medicamentis frustra toties tentasse curationem: & nostram scientiam,  
ad hoc usque tempus in Curatione non majorem fecisse progressum. Sperandum  
itaque esset in posterum, si quis detegit vel medicamentum, vel methodum me-  
dendi, vel quodvis aliud auxilium in curatione morbi, qui ex prævalente phæno-  
meno nomen obtinuit, ut addat simul causam hoc phænomenon producentem, quæ  
ex multis simul phænomenis collectis vel causis procatacticis prægressu colligitur:  
hæc tunc probata medicamenta & auxilia erunt constantia, eorumque usus in po-  
sterum non erit inutilis vel contrarius, ut sæpe in empiricis auxiliis evenit. Al-  
tera est *Conjecturalis*. Qui medicus curandum habet morbum multis phænomenis  
Conjectu-  
ralis eu-  
ratio.  
stipatum, incertam indicantibus latentem causam; ut sæpe fit, quia causa ita ab-  
sccondita latet, ut ne a peritissimo in Arte medica possit erui, talis tunc medicus ex  
quadam verisimilitudine conjicit de causa latente, ut aptam adhibeat medendi  
methodum: hos vituperant Empirici, sed ipse Empiricus nihil plus præstare potest,  
ille enim sibi solum maxime conspicuum proponeret phænomenon, hoc etiam va-  
leret facere medicus, qui ex conjectura tentaret curationem; sed quia novit phæ-  
nomenon hoc incertam indicare causam tollendam, reliqua quoque rimatur, an  
non possibile sit omnium apparitionum eruere causam; cum vero facilius sit in  
medicina ex multis inter se collatis latentem invenire causam, quam ex unica  
apparitione, itaque Conjecturalis illa curatio præstantior est censenda: si vero oc-  
currit morbus nomen ex causa habens, ut Inflammatio, vulnus, combustio, fra-  
ctura, in his non utitur conjectura, sed ut Empiricus probatam adhibet curatio-  
nem. Denique est *Rationalis*. Qui in Physicis, Chemicis, Anatomicis, aliisque  
Rationa-  
lis cura-  
tio.  
adminiculis, quibus erouuntur absconditæ causæ, est instructus, in phænomenis  
morborum versatus, statim sedulo examinat omnia, quæ suis sensibus possunt de-  
tegi, quæque ab ægro referuntur, cuncta inter se comparat; quod si his auxiliis  
morbi latentem detexit causam, demum examinat auxilia & methodum meden-  
di, quæ optimum successum in inventa causa habuere, istis tunc utitur. Hoc  
nunc modo agere est secundum rationem facere. Detexit enim certis indicis cau-  
sam latentem, & adhibet auxilia probatissima & experientia comprobata, nihil  
præstantius excogitari potest, si enim morbus sit curabilis, hoc solo modo cura-  
ri potest, & nullo alio meliore. Quod si valuisset semper ita eruere causam, &  
scivisset probatissima auxilia, Rationali medico nihil temere in medicina esset  
periclitandum, sed quia sæpe nimis abscondita latet causa, quam perspicacissimo  
& ex-

& expertissimo ingenio possit detegi; vel interdum defunt probata auxilia, quibus detectam causam valemus tollere, in illo cogimur sæpe uti conjectura, & in hoc facere periculum: hæc ergo conjectura & temeraria experimenta non sunt adscribenda medico, sed imperfectæ scientiæ.

Quæ secundum rationem sunt non sunt mutanda.

II. Qui medicus ex certis criteriis latentem detexit causam, vel curandum habet Morbum ex evidente causa natum, huicque adhibet auxilia, methodum mendi & dietam, quæ probatissima in tali causa & morbo fuere inventa, eum monet Auctor, etiamsi ex voto non sequitur curatio, non transeundum esse ad aliud, sed ut viarum peritum inceptam debere persequi viam, donec attingit metam. Quoties enim decedit a curatione sua ad quamcumque aliam priori contrariam, vel temeritatis, vel inconstantie, imo malevolentie potest infimulari, nam conficius ægrum a recta via curationis deflectit. Qui morbi causa cognita probatis non cedit auxiliis, incertis non est tentanda: quam primum enim Rationalis medicus conatur experimento vago tollere morbi causam, nihil differt ab idiota, & temerario, qui tentandi gratia omnia experiuntur. In Conjecturali autem causa ex juvantibus & lædentibus fieri debet curationis mutatio, quia causa est incerta. Hic autem monendum est, Auctorem nostrum nolle, nos debere semper iisdem uti medicamentis, sed si morbi genus mutatur, nostra auxilia quoque esse mutanda: si enim Inflammatio abierit in suppurationem, Auctor non docet medicum Rationalem in iisdem pergere debere auxiliis, nam hoc non est secundum rationem, sed curatio mutata cum natura morbi est secundum rationem. Ita etiam in Chronicis non debemus statim ab uno genere auxilii deflecti ad contrarium, si non satis cito sequitur curatio, sed si formata sit ex detecta causa legitima indicatio curativa, & huic appropriata fuere adhibita auxilia, in iisdem debemus perseverare, vel si natura assuescat, ut sæpe fit, medicamina sunt aliquo modo mutanda, manendo in eodem genere auxiliorum, sed non transire ad aliud contrarium. Non parum igitur Hipp. hoc monitu perstringit temerarios & fluctuantes medicos, qui omni die mutant auxilia, & periclitantur nova, ac si diceret, istos scientiæ ignaros esse, nescientes, quæ auxilia sunt adhibenda, vel temerarios experiundi gratia hominis vitam periclitantes.

## L I B. II. A P H. LIII.

78. **Q**uicumque alvos habens humidus, dum quidem juvenes sunt, melius liberantur his, qui siccas habent. Ad senectutem vero, pejus liberantur: siccantur enim ut plurimum senescentibus.

Sensus huius.

I. **S**i retineatur translatio hæc T. J. ab Almeloeven, sensus admodum esset obscurus, sed si conferatur cum Aph. 45. facile erit veram sententiam Hippocratis concipere: ibi enim posuit mutationes naturales in duobus juvenibus, uno alvo conspitata sicca, altero vero laxa laborante: in hoc nunc loco vult inter hos comparisonem facere, qui status sit melior censendus, ut nempe juvenis alvum humidum habentis, vel alvum siccam sit melior conditio: & concludit, qui juvenes alvum humidum habent, dum quidem juvenes sunt, melius degunt (seu juventutem melius agunt) his, qui siccam, rationem addit, ad senectutem vero pejus degunt, siccatur enim alvus ut plurimum in senescentibus. Quare alvus humida prefertur, & alvus sicca damnatur, præprimis si talis fiat ex naturali mutatione.

An alvus sicca vel humida sit præferenda?

II. Molles & modice compactas reddere alvi fæces saluberrimum est, sed paulo magis compactas vel ficiores deponere, aut paulo liquiores nostrum corpus fert sine detrimento sanitatis: si vero hæc mutatio modum excedit, ad morbos

re-

refertur, ut ad alvi fluxum, vel constipationem, de quibus hic non agit Auctor. Neque hic disputandum est, quid horum sit melius in morbis, uti fecimus in Compendio nostro T. 90. Ex iis, quæ supra exposuimus Aph. 45. VI. constat, alvum humidam juvenum propter defectum assurgentium humorum sensim commutari in siccam: ergo ratione signi est malum indicium alvum exsiccari senioribus, satius enim foret, ut mollis maneret alvus. Alterum est, si alvus sit modice humida, sine molestia deponunt feces, dum siccior sæpe multas molestias adferat. Denique in modica & humida alvi egestione non est verendum, humores excrementitios retineri in intestinis: sed si siccior sit alvus, vel omne excrementitium non deponitur in intestina, aut si deponitur, stagnans diutius & corruptum absorbetur, atque ita reliquos humores excrementitio corrupto inquinat. Auctor addit, quia magis senescentibus alvus reddi solet siccior ut tandem fiat morbus, qui alvus adstricta vocatur.

## LIB. II. APH. LIV.

79. **P**rocero corpore juventutem quidem degere liberale est, nec deforme: infanscere vero, incommodum, & parvis deterius.

I. **Q**uod olim moris fuit, hodie etiam est acceptum, Procerum corpus laudare in juvenibus, ut corpore & verbis simul imperent, atque in tam procero corpore fere omnes magnum & liberale ingenium censent contineri, adeo ut corpus procerum juvenum sit tanquam literæ commendatitiæ; quod ingenio & ætate deficere videtur, id decore corpore suppleant juvenes. At vero ad senectutem si pervenerint, gravi senili auctoritate & ingenii præstantia præditi, non amplius ex corporis statura, etiam si non sit vituperanda, honores tribuuntur: tunc magis in senibus ad vitam commodam, quam decoram respicimus. An vero Hippocratis tempore humilia magis quam corpora procera salubriter vixerunt, ignoro: his autem temporibus procera magis sana & robusta vivunt, quam humilia. Quare hic Aphorismus in hoc sensu accipi potest, Procera corpora juvenibus magis decora quam senibus: parva autem deteriora juvenibus, quam senibus.

M E D I C I N A  
H I P P O C R A T I C A ,  
E X P O N E N S  
A P H O R I S M O R U M  
H I P P O C R A T I S  
L I B R U M T E R T I U M .  
P R A E F A T I O .



*N* hoc Libro duas praecipue res agitare voluit Hippocrates, easque quodam tractare ordine, ut doceat quanti intersit scire naturales & non evitabiles Aetatum & Tempestatum mutationes. Sedulo perscrutatus est morbos his mutationibus frequentiores, ut saepe miratus fuerim ad tantum scientia fastigium eo tempore perductam fuisse Medicinam, tam exacte enim cuncta respondent bodiernis observatis, ac si omni instrumentis physicis noster Senex instructissimus fuisset, quibus hodie summo ardore & industria utantur Medici & Physici. Superest ergo, ut plura huiusmodi observata experimentis detecta in publicum commodum colligantur, & publici juris fiant. Sed ut agri inde aliquod acquirant auxilium, unusquisque non valet componere Aphorismos Medico & agro utiles, sed talem exigit hominem, qui in Physicis & Medicis est imbutus, ut possit has duas partes inter se comparare: qui enim hujus illiusque cognitione caret, crudos immaturos & manceos atque mutilos conficiet canones. Quemadmodum merus Physicus parum in arte Medica valet, ita purus Medicus hallucinabitur semper in causarum investigatione. Quae enim a Medico & Physico res pertrahantur legibus invariabilibus sunt distinctae, ut tota rerum natura certis legibus, solis experimentis assequendis, suas absolvit actiones, quas rimatur Physicus; ita Morbi in hominis corpore vivente suas proprias sequuntur leges, non nisi praxi Medica detegendas. Quam parum valet Medicus ex observatione morborum ratiocinari in rebus Physicis; tam parum quoque valet physicus in morbis, cum corpus vivens morbo corruptum in multis ab actionibus physicis in rebus mortuis recedat; imo nemo valet ex omnibus perspectis actionibus corporis sani, ejusque accuratissima cognitione Anatomica perspicere, quid faciat morbus in homine vivente, nisi sedulo rimatur simul, quae observatio practica profert; habet enim morbus, ut res physica, & corpus vivens sanum, suas proprias leges. Atque hoc non sufficit in arte Medica cognoscere morbos, eorumque omnes intelligere mutationes, & tenere actionum causarum leges, ager enim semper exigit auxilium, sine quo

quo frustra tota Medica scientia excolitur, quippe non petis a nobis cognitionem, sed curationem atque levamen. Hæc autem auxilia ratione non sunt detecta, sed multiplici experientia, quæ certa esse nequit, nisi capiasur ab eo, qui bene novit quoniam in morbo & ex qua causa nato Medicamentum fueris adhibendum.

Si ergo rem paucis contrabamus, in Physicis, Chemicis, Anatomicis, Physiologicis, sine auxilio Medico per experimenta quisque valet sibi certam comparare rerum notitiam: sed ad cognitionem morborum veram nemo pervenire potest, nisi in præcedentibus sit instructus, & adhuc multo minus pervenire ad cognitionem curationis: ea enim curatio exigit cognitionem propriæ naturæ cujuscunque morbi, & auxiliorum, quæ tali in morbi causa cum effectu suo adhibita. Inutilis ergo est omnis cognitio physiologica, inutilis est omnis empirica Medicamentorum traditio, nisi utraq; jungatur. Nam cognitio morbi sine auxilio, atque auxilium sine cognitione ægro laboranti sunt inutilia.

Quod autem his temporibus studio excolatur Physiologia, & cognitio & curatio morborum vilipendatur, laudare non possum. Noster enim senex, qui in arte Medica ad hoc usque tempus neminem habuit superiorem, non per Physiologicas speculationes ad tantum fastigium perfectionis deduxit artem Medicam, sed per propria experimenta in sanis & ægrotantibus. Qui ergo ad majorem perfectionem deducere satagit artem Medicam, id agere oportet, ut cuncta quæ in ægris observant, redigat in regulas generales, quemadmodum fecit Auctor noster. Quæ autem observanda sunt in temporibus anni & ætatibus, secundum normam in hoc libro traditam concinnari possunt.

Hic Liber specimen fuit septimum, quod Publice ventilavit sub nostro præfatio GEORGIUS ERICUS BARNSTORFF Gottingensis. Die 30. Novembris 1749.

## A P H O R. I.

80. **M**utationes anni temporum maxime pariunt Morbos : & in ipsis temporibus magna mutationes aut frigoris, aut caloris, & alia pro ratione eodem modo.

Temporis  
divisio.



**E**tiam si omnibus sit notum, annum dividi in quatuor tempora, vel facile ex calendariis possit adduci; observare tamen debemus, ab omnibus medicis hæc tempora non semper eodem modo accipi. Hippocrates enim fere semper distinguit Morbos secundum communia anni tempora, in Vernales, Æstivos, Autumnales, & Hyemales. Alii duntaxat in Æstivos, & Hyemales, quando annum dividunt in duas partes, ab uno Solstitio ad alterum. Quidam vero his adiciunt morbos solstitiales, hyemales, & æstivos; atque morbos Æquinoctiales, vernales, & autumnales. Quid autem his temporibus præmissis sit observandum, in sequentibus demonstrabitur.

Cur mutationes anni temporum maxime pariunt morbos?

**11.** Inter causas morbum inferentes non infimum tenet locum, uti in hoc loco indicatur, observatio temporum anni, dicit enim, maxime vel potissimum, quoniam omni momento aer est inspirandus, & quoniam sine ejus præsentia vivere non possumus: quoties itaque aer in natura sua est mutatus, protinus in nobis generantur morbi, imo interdum mors, ut patet in exhalationibus aeris mistis a nobis assumptis: imo bonus aer aliquoties a nobis inspiratus vitæ continuandæ sit inutilis, cum experimentis hodie constet, omne animal respirans vase quodam inclusum, si impediatur aeris renovatio, perire; hoc etiam experiuntur urinatores. Quare non solum sufficit, ut alterne dilatemus & constringamus pulmones ad continuandam circulationem, sed qui inspiratur, bonus debet esse aer, & sæpe renovatus. Ex hac observatione non obscure indicatur, respirando aliquid a nobis ex aere recipi, quod requiritur ad vitæ sustentationem, cum aliter animal potuisset facile in eodem vivere aere. Si huic observationi adjiciamus aliud experimentum animalis viventis in vase clauso, in quo hæret etiam barometrum aeris quantitatem indicans, hoc barometrum suo descensu declarat, ab animali vivente aerem consumi. Nullum itaque est dubium, quin animal vivens consumat aerem. Quod vero in sanguine circulante ne guttula aeris inveniatur, & quod non possit ingredi aer arteriam vel venam pulmonalem, ut multi contendunt, hoc non refutat experimentum certum de aeris consumptione ab animali vivente: potest enim aer unitus nostris humoribus amittere omnem vim elasticam, quemadmodum exstinguitur spirituosum in vino, si convertitur in acetum. Atque multis corporibus inesse magnam quantitatem aeris, nullum sui indicium præbentis, constat ex omni observatione combustionis, fermentationis, effervescentiæ, putredinis, congelationis, quibus modis multum aeris elicitur e corporibus, in quibus experimentis physicis aeris præsentia non potuit detegi. Ex his, quæ disputavimus, probatum est, aerem consumi ab animali vivente, & eam consumptionem perpetuam esse debere, aerem vitiatum vitæ & sanitati conservandæ ineptum esse. Ergo solummodo restaret probare, mutationibus anni temporum, mutari hanc aeris qualitatem, ut magis minusque prona sit ad producendos morbos. Verum hoc satis constare potest ex morbis, qui certis temporibus anni propullant, ut observavit præ ceteris Sydenhamius. An vero hæc mutationes inducantur vario influxu siderum, varioque eorum aspectu, ut veteres astrologi volebant, inutile est medico observare, hoc naturæ percuratoribus relinquimus. Nobis

bis fufficit obfervare, aere mutatum potentiffimam effe caufam morbos inferentem, quia nec cibus, nec potus, nec externa injuriæ, quibus noſtrum corpus eſt expoſitum, tam frequentia ſunt, quam aeris inſpiratio.

III. Quoniam non ſolum ex varietate aeris diverſis temporibus anni naturales generantur morbi, ſed etiam morbi ſunt ab aeris mutatione quocumque tempore anni, qui regulariter eo tempore non fuiſſent nati, ſatis conſtat, non oriri morbos præprimis ab influxu ſiderum, ſed ex quadam in aere nata mutatione. Ex his mutationibus ſolummodo annumerat Calorem & Frigus, & addit *alia pro ratione*: ſcilicet obſervare quoque debet Medicus, quinam morbi ſunt cælo ſereno, nubiſo, cænoſo, humido, ſecco, in ventis variis, pruina, pluvia, grandine, tonitru, aliſque meteoris apparentibus. In his obſervavit Auſtor, & poſt eum quoque omnes medici, mutationes ſubitaneas periculoſiores eſſe, quod ex iis, quæ ſupra de Conſuetudine Aph. 75. II. diſputavimus, facile intelligi poſteſt.

Aeris mutationes magis in iſtis temporibus.

## L I B. III. A P H. II.

81. **N**aturarum alia quidem ad æſtatem, alia vero ad hyemem bene aut male ſunt conſtitutæ.

I. **I**N præcedente monuerat, quænam erant exſpectanda ex variis anni temporibus, nunc vero ad illa tempora applicat varias hominum naturas, volens indicare, omnia illa anni tempora æque ſaubria & damnoſa eſſe omnibus. Ex his temporibus duo citat, Æſtatem, & Hyemem. Exiſtimo autem, Auſtoris hic nolle indicare tantum anni partem quartam pro ſingulis, ut fieri ſolet in communi diſpoſitione (Aph. 80. I.) ſed intelligere partes anni ab uno æquinoctio ad alterum, ut paſſim quoque fecit Sydenham.

Quæ tempora anni hic intelliguntur?

II. Vocabulum *Natura* tot rebus variis adhibetur, ut vix valeamus ſimplici definitione determinare, quid ſit natura. Aliud enim eſt naturæ directionem obſervare in evacuatione; Aph. 21. III. Aliud iterum morbus periculoſus naturæ diſſimilis; Aph. 69. II. Natura valde craſſi magis ſubito moriuntur quam graciles; Aph. 69. I. Hoc loco notat Habitum, Conſtitutionem, Cataſtaſin vel Temperiem corporis, ſive ſit nativum & ſive artificiale per conſuetudinem, vel morbum acquiſitum, quo quidam homines ſalubrius vel ærumnoſius vivunt hyeme aut æſtate. Hanc obſervationem veram eſſe, vita quotidiana comprobatur. Miramur autem cauſas, quare cum medicorum maxime interſit, iſtas paulo penitus rimabimur.

Natura quid denotat hoc loco?

III. Hyems regulariter habet aerem humidiores & frigidiore, ut indicant notiometra & thermometra: noſtra igitur corpora ab aeris ambiens frigidity magis frigeſcunt; humiditas per inſenſibilem perſpirationem expellenda, parcius auferitur: hoc tempore ventres eſſe calidiſſimos, ſupra Aph. 15. II. contra Hipp. reſuravimus. Frigidity hac minuitur actio vitalis, ut quadam animalia mortua jacentia non niſi accedente calore revivſcant: ſed omnia corpora mortua per frigus denſantur, id eſt in minus ſpatium contrahuntur: quod tam conſtans, ut ex denſatione certam habeamus quantitatem frigoris; Thermometra enim hac denſatione quantitatem frigoris, & expansionem per calorem, caloris gradum indicant. Ergo in nobis motus vitalis minuitur frigore, ſed augetur contractio automatica in fibris. Inde corpora gracilia, quia volumen majus proportionatum habent ad ſuperficiem, quæ ab aere frigido tangitur, magis quam corpora craſſa & proceræ ab aere frigido læduntur. Maxime vero debilia, ſive talia ſint ex nativitate vel morbo; vel quæ corpora inſueta ſunt aeri frigido, ab aere frigido hyemali magis afficiuntur, cum debiliior motus vitalis in his per nimium frigus

Quæ natura non fert hyemem?

ſere

fere totus exstinguatur; contra vero robusta ob aëlam contractilitatem in firmis partibus magis roborantur. Quibus itaque corporibus vis vitæ superatur frigore, his frigus hyemale damnosum; quibus vero non superatur, prodest. Aeris etiam humiditas, quoniam minus absorbet exhalantem humiditatem, corporibus difficile perspirantibus admodum noxia, cum perspirabile retentum varios generet morbos; quibus vero constans est perspiratio, viribus corporis valentibus expellenda, aeris humiditas minus noxia; cum corporis vires valeant id inutile expellere, etiam si per aerem sicciorē cito non auferatur.

Quæ natura nobis fert ætatem.

IV. Calor autem æstivus minuit contractilitatem in solidis, rarefacit humores, omnes motus automatici putredinis, & fermentationis sunt promptiores, sed citior quoque fit humorum exsiccatio, ut probant omnia experimenta; in nobis motus vitalis moderato calore maxime valet, sed nimio calore omnia corpora enervantur. Quæ corpora igitur prona sunt in putredinem, ab accedente calore maxime læduntur: obesa, ob defectum refrigerii nimium calorem in se concitantia, enervantur. Sed morbis chronicis, præprimis ex defectu insensibilis perspirationis natis calor & siccitas æstiva prodest. Hæc generalia delibavimus, casus particulares & compositos examinandi in sequentibus Auctor noster dabit occasionem.

### L I B. III. A P H. III.

81. **M**orborum alii ad alia ( tempora ) bene aut male se habent : & ætates quadam ad tempora, & regiones, & vietus.

Connexio. I. **E**tiam si Hipp in compositione Aphorismorum raro observat nexum, quem tamen multi Commentatores sedulo quæritant, hoc in loco facile concipitur: agit enim de variis effectibus temporum anni; hoc proposuit in varia natura & temperamento; hoc nunc loco eisdem persequitur in statu morbofo, & ætate varia. Ergo primo ponendum est, hic velle indicare Hippocratem tempora duo antea citata, ætatem nempe, & hyemem: in quibus dicit, quosdam morbos se bene & male habere. Itidem ætates variaz his temporibus se melius & pejus habent: his denique addit ad ætates pertinens, Regiones, & Vietus. Totus hic ergo Aphorismus est generalis, & inde fundamentum multorum specialium.

Morbi facile & difficile ferrentes hyemem.

II. Hoc loco duntaxat attendendum ad generalia, quæ hyeme contingunt, ut aeris humiditatem & frigiditatem, quoniam hyems si sit sicca, ventosa, calidior, si varii sunt venti, hoc suis locis est exponendum. Superius notavimus, regulariter motum vitalem minui, & contractilitatem augeri, parcioremque fieri distillationem; adeoque omnes morbi, qui conjunctam habent debilitatem virium, qui lentum habent humorem, motu vitali & calore majore solvendum, quique præprimis per insensibilem perspirationem expellere debent materiem, difficile ferunt hyemem: quales sunt omnes morbi nervorum, febris quartana, gravedo, tussis, hydrops, scrophlegmatia, vertigo, apoplexia, debilitas ex morbo relicta, cachexia, cruditas, pituita, & multi alii in particularium examine proponendi. Quibus vero morbis est motus vitalis major, putredo cum adjuncto calore, hyeme facilius illos morbos tolerant: in quo numero sunt Acuti inflammatorii, erysipelatosi & putridi, quibus, si in ætate obtineant, adhibentur antiphlogistica & refrigerantia diluentia.

Ætatem.

III. Ordo dicendi tantummodo est invertendus, nam qui morbi facile ferunt hyemem, difficile ferunt ætatem; quique difficile ferunt hyemem, facile ferunt ætatem, ut accedente calore & siccitate æstiva, sponte evanescant illi morbi, quos optimis medicamentis non potuimus expugnare.

Tempora ætates

IV. Cui ætati summus est corporis vigor, ut nimis instigatis viribus majus sit



fit periculum expectandum, quam ex virium imbecillitate, talis ætas facile fert hyemem, quæ sua frigiditate & humiditate temperat prævalentem motum vitalem, & tonum contractionis laxat seu resolvit aliquo modo, qualis ætas observatur in juvenili & virili ætate, ætate autem magis periclitantur. Cui vero ætati est naturalis infirmitas fibrarumque atonia, sive quod non satis firmatæ sint, uti in infantibus & pueris, sive quod callosæ & inertes sunt factæ, ut in senibus, hæc ætas difficile fert hyemem; & in sola ætate bene degunt, apri-  
eque loca quærun, ut refocillentur senes.

V. In Regionibus solas qualitates manifestas observare volumus, ut maneamus in generalibus. Hæc sunt sicca, frigida, humida, & calida, vel de utrisque participant. Quare ex iis, quæ supra delibavimus, facile intelligi potest, Regiones calidas & siccas pueris & senibus conducere; sed frigidas & humidas magis juvenilibus & viris, etiam si nemini salubris statuitur Regio, in qua humiditas cum frigiditate jungitur; istud tamen incommodum facilius fert constans ætas viribus pollens, quam quorum corpora sunt imbecillia ex ætate, quum vires debiliores ab his noxiis causis facile superantur, quibus facile resistere possunt robustiores.

VI. Quali sensu accipiatur Viçtus, superius Aph. 4. II. exposuimus. Hoc in loco videtur solummodo restringi ad alimentorum assumptionem, vel nutritionem: quare videndum, qualia & quanta alimenta singulæ ætati convenient. Alimenta tenuia, facilis materiæ, sæpe & parum simul ingesta pueris conducere, supra Aph. 16. III. demonstravimus. Eadem diæta ob corporis imbecillitatem senibus quoque convenit. Sed Juvenibus & Viris alimenta copiosiora sunt danda Aph. 13. I., & quæ minus facile solvuntur, quia eorum corpora valentia nimis cito subigerent & expellerent præcedentia genera alimentorum.

## LIB. III. A P H. IV.

83. **I**N temporibus, quando eadem die modo calor, modo frigus fit, autumnales morbos expectare oportet.

I. Omnes morbi, qui in Autumno aggreduuntur hominem, ex tempore illo vocantur Autumnales, hos autem Hipp. hoc loco non intelligit, quoniam dicit in temporibus, quare quoque reliqua tempora anni intelligit. (2) Illi etiam morbi nominari possunt Autumnales, qui magis in Autumno videntur, quam in aliis anni temporibus, quos in sequentibus tradit, ut sunt febres quartanæ, erronæ, lienes, hydropes, tabes, urinæ stillicidia, lienteriz, dysenteriz, ischiades, anginæ, asthmata, volvuli, epilepsiz, infanz, melancholiz, semiteritiz, continuz ex intermittentibus, rhachitides, podagra, arthritis, tusses, gravædines. Vel (3) Qui morbi aliis temporibus sævientes, typum induunt morbi autumnalis, nempe ut sint difficiliores curatu, pertinaciores, magis anomali, faciliusque recidivantes, & periculosiores, quam iidem morbi istis temporibus nati sine tali aeris frigidi & calidi vicissitudine prægressa. Utrumque mihi videtur hoc loco ab Hipp. intelligi per Morbos Autumnales: quoniam ex hac causa aliis temporibus anni nascuntur morbi, qui ordinario in autumno adoriri solebant; & si morbi istis temporibus soliti nascuntur, sunt magis pertinaces &c.

II. Nostrum corpus ex consuetudine ferre posse deteriora, & consueti non facile mutanda esse, in antecedentibus Aph. 75. & 76. exposuimus; ex quibus colligitur, nostrum corpus multum affici ab omni subita mutatione, sit in melius, sit in pejor. At vero si eodem die modo sit calor, modo frigus, plane constat, nostrum corpus vario modo affici, ut inde possimus generaliter pronunciare, vicissitudines caloris & frigoris, ut supra Aph. 80, morbos parere, præproximis si tam

magis minusque  
conveniens.

Regio ætatis  
magis minusque  
conveniens.

Viçtus ætatis  
magis minusque  
conveniens.

Qui morbi dicantur autumnales.

Cur erubescant calidi & frigidi vicissitudinis productis Autumnales?

crebrae sunt mutationes eodem die. Non vero sensus Auctoris ita est accipien-  
dus, ac si existimaret, si modo uno die haec contingeret mutatio, hoc valere ad  
morbos autumnales producendos, addit enim in *temporibus*, quae phrasis significat  
multos dies successivos. Ergo si per aliquot dies successivos jam frigus, jam cal-  
or habeatur, Morbos Autumnales expectare oportet. Hoc habuit Auctor ex  
constante observatione, atque hodie quoque idem a medicis observatur. Multi  
hac pura observatione non sunt contenti, accusantes nostrum Auctorem, eum  
nullam addidisse rationem. Ego autem existimo, non opus esse in aphoristico  
scribendi modo ubique observatis praecisus adjicere rationes; sufficit enim in A-  
phorismis generales observationes promulgare: sed qui aggreditur expositionem  
sententiarum, ad majorem fidem, usum, & faciliorem intellectum, bene agit;  
si addit rationes earum observationum, an respondeant legibus naturae. Huic  
sensum itaque in formam quaestionis commutavimus, cujus prima pars patet.  
morbos nempe generari hac aeris vicissitudine, quia in antecedentibus haec res  
fuit agitata: sed cur Autumnales fiant, nempe illi, qui in Autumno adori-  
solent, ex similitudine mutationis in aere proficiunt, quoniam dicti morbi Au-  
tumnales praecipue formantur ex aeris vicissitudine, quae nullo tempore anni  
frequentior est, quam in autumno: si igitur frigoris calorisque vicissitudo po-  
test in autumno istos morbos generare, eadem causa alio anni tempore eosdem  
quoque potest producere morbos: & quia causa est similis, morbi nati eodem  
modo decurrant, ut sint pertinaciores solito, & graviores.

Morborum  
autumnalium na-  
tura.

III. Autumnus non solum morborum ferax, sed & quos producit, observatur  
*Pertinaces*, diutius durantes, quum similis morbus in alio anni tempore: qui enim  
corripitur quartana vel tertiana, ut plurimum eadem vexari solet usque ad vernale  
tempus, cum aere varietas jam prohibendo perspirabile, jam vero retentum su-  
perveniente calore & humiditate, ( veteres autem dixerunt autumnus esse frigi-  
dum & siccum, sed notiometra nostram sententiam firmant ) in corruptelam  
convertit, & impedit exhalare, aut actione vitae concoqui; quare morbi non  
tam facile superari possunt actione vitae, quam vernali tempore, quod coctionem  
& exhalationem promovet. Et quia fere omnes morbi methodica curatione,  
id est directione virium, sunt expugnandi, ex eadem ratione data fiunt *Curatio diffi-*  
*ciles*. Si vero materia morbi subacta videtur, quia symptomata silent, retenta  
vero sensim recrudescit, vel facit *Recidivam*, vel abit in aliud genus morbi.  
Quando autem viribus vitae subigitur morbi materia & expellitur, talis sequitur  
typum regularem; sed si subigi & expelli non potest, saepe mutat morbi fa-  
ciem, pro diversa corruptela, quam subit retenta materia, inde redduntur au-  
tumnales saepe *Anomali*. Neque caret *periculo* toties vario genere morbi affli-  
gi diutius durantis,

### L I B. III. A P H. V.

84. **A** *Ustri Auditum gravantes, caliginosi, caput gravantes, segnes, dissol-*  
*ventes. Quum hic dominatum tenuerit, talia in morbis patiuntur. Si*  
*vero aequilibrium fuerit anni tempus, tussis, sauces asperae, alvi durae, urinae dif-*  
*ficultates, horrores, dolores costarum, pectorum. Quum hic dominatus fuerit, ta-*  
*lia in morbis expectare oportet.*

Ventus  
quid sit.

**L** Naturalis translatio aeris ab una telluris plaga in alteram ab omnibus vo-  
catur *ventus*, ut & aeris propulsio artificiosa folle, habello, vel quavis  
alia machina: hoc autem loco intelligitur *ventus naturalis*. Dum igitur ita trans-  
fertur aer, exhalationes atque vapores aeri mixti simul transferuntur; atque ex  
pla-

plaga calidiorē veniens simul calorem adfert, & contra verō ex frigido loco veniens frigiditatem asportat, & prout loca magis humida, vel sicca sint, ex quibus ad nos veniunt venti, simul observantur sicciores, vel humidiores. Venti corporis nostri superficiem lambentes secum ferunt atmosphæram calefactam, & novum suppeditant aerem a nobis non calefactum; quare venti semper nobis videntur inferre frigus. Thermometra autem docent, aerem vento vel folle agitatum non producere majus frigus. Quibusnam causis generantur venti varii & inconstantes, atque etelæ, non est hujus loci exagitare.

II. Quoniam venti vel motu vel qualitate nocere & prodesse possunt, quæ ex aeris motu proveniunt, generalem usum habent, sed quæ aeris qualitate producuntur, pro regionum situ admodum sunt diversa. Ex qualitatibus autem aeris generalibus, ut de humiditate & siccitate, calore & frigore, puritate & impuritate, generales possunt longa observatione constantes acquiri regulæ, sed quæ observantur in ventis, magis spectant ad singulares regiones, ubi homines habitant: quare observatio in hoc Aph. magis spectat ad morbos endemios, quam ad morbos universales.

Ventorum  
observa-  
tiones an  
omnibus  
quædeant?

III. Duos hic proponit oppositos ventos, unum ex meridie, alterum ex septentrione spirantem; ergo ille venit ex loco calidiorē in frigidiorē, hic vero ex frigidiorē in calidiorē. Non concipiendum est, nostrum Auctorem per Austrum vel Notum solum illum voluisse ventum, quem Belgice vocant *Zuiden*, sed & omnes intelligit, qui aliquid de austro participant inter Zephyrum & Eurum. Quod etiam intelligendum est de Aquilone seu Borea. Experimentis constat, aquam ab aere calido elevari, & cum aere circumferri, qui aer magis refrigeratus vapore prægnans, ad corpora frigida applicatus facit vaporem in guttulas colligi, corporique frigido adhærere, imo guttatim destillare, quod non solum in instrumentis destillatoriis quotidie experimur, sed & quovis corpore frigidiorē exposito aeri calidiori experiri potest, quare lapides & parietes frigidi, dum mutatus ventus adferat aerem calidiorē, vaporem ex eo aere colligunt, quando vulgus existimat, humorem illum ex lapide vel pariete transsudare. Regulariter igitur Austri venti sunt calidiores & humidiores, nisi mutetur diversitate regionis, per quam transit ille ventus.

Auster  
quos mor-  
bos parit?

De hoc vento pronunciat, eum *auditum gravare*, *ἄρτυναι* dicit, id est eo stante vento minus acute audire valemus, quod vel in corpore sonoro, vel aere transferente sonum, vel in ipso organo auditus latitare potest. Videtur mutatio aeri inducta aliquid in omnibus præstare. Corpora enim sonora aliquo modo humectata obtruiorem sonum edunt; atque aer vaporibus saturus, minus elasticus, tremores siccitatis minus propagat; nostræque corpora tepore & humiditate aeris enervata non tam acute sentiunt.

Ex eodem humido vapore aeri misto radii lucis non tam libere transeunt per aerem. Quo enim aer siccior, eo pellucidior; quare hi venti aerem aggravantes humiditate dicuntur *Caliginosi*, *ἀχνούσιν*, quam visus caliginem veteres experimentis physicis non satis instructi, ex alieno principio, quod non est hujus loci exagitare, deduxerunt.

Eadem aeris humiditas & enervans tepor facit in partibus firmis atoniam, minuitque humiditas distensionem corporis, quare corpora in tali udo aere adfensum fiunt graviora, & sæpe etiam ad stateram; ita enervata corpora, minus valentia firmare partes, videntur graviora: non quod ipse aer sit factus, ut indicant Baroscopica, gravior, sed quia nostrum corpus in tali aere amittit aliquid de viribus suis; inde non solum *Caput gravantes* *καρβαρίζοντι*, sed *segnes* & *Dissolventes*.

IV. Ut Auster ex loco calidiorē spirat, ita Aquilo seu Boreas ex septentrione veniens frigus inducit; in Belgio Zephyro Boreas seu Cirrus, Belg. *Noord-west* quos mor-

Aquilo  
quos mor-  
bos parit?

plerumque simul humidus est & impetuofus; fed Euro-Boreas, feu Vulturnus, Belg. *Noord-oft*, ficcior & frigidiior fere femper, qui ventus anno 1740. in principio Januarii tam urens induxit frigus, ut hydrargyrus fub fignis in thermofcopio defcenderet, feu fuperaverit 32. gradum fub figno gelu. Homines attamen vix ullo morbo in Belgio corripiebantur: fi autem Cirfius fpirat, aerque humidior eft, multi obfervantur morbi, qui ab Authore noftro citantur.

Si enim aer frigidiior & humidior ingruit, prohibens exhalationem humiditatis ex pulmonibus atque corporis ambitu, hæc materia muco tracheæ intricata, acrior, irritando *Tuffes* producit, tam diu durantes, donec vel fubacta fit, aut per excretionem, perfpirationem, vel urinam ejefta fit.

Ea quoque materia retenta in lateribus faucium, ifta tumere facit, & faucium æqualem fuperficiem exafperat, naturalique muco obliniente privat, unde vox rauca, & fauces in deglutitione & loquela, ac fi effent epithelio fuo privata, dolent, quem morbum *pharyngitis* vocant. *Aerum duriores* non tam conftanter obfervare potui in hominibus; neque *urinae difficultates*, nifi in debilibus & catarrhofis, qui in aere ficcior id acre per infenfibilem perfpirationem evacuare foliti, nunc magis ad renes ducebant, ut inde quædam nephritidis fpecies, quam lymphaticam vel catarrhofam vocant, nafceretur.

Quoniam nulla pars noftri corporis magis eft aeri expofita, quam pectus, quod non folum, ut reliquæ corporis partes, externe tangitur ab aere, fed intus fingulis refpirationibus aerem haurit, præ ceteris ab aeris mutatione afficitur, unde *Coftum* feu potius *Pleura* & *Pectoris dolor*.

V. Quemadmodum illi venti produciunt dictos morbos in hominibus fanis, ita etiam morbo aliquo decumbentes interdum iifdem infuper morbis corripuntur, qui ab aeris natura dependent, quod voluit monere Auctor, ne phenomena illa ex vento producta adfcribantur morbis, quibus jam antea ægri decumbebant.

## L I B. II. A P H. VI.

85. **Q**uam *Æftas* fit *Veri* fimilis, fudores in febribus multas expectare oportet.

*Æftas veri  
similis.*

**V**ere, quoniam ob telluris frigiditatem major eft collecta humiditas in prægreffa hyeme, per accedentem folis calorem multum vaporis ex terra elicitur, plaatis præbens nutrimentum & incrementum, quod vero fenfim in æftate evanefcit: quare ex minori altitudine folis eft tepidum, & per copiofio rem exhalationem ex tellure eft humidum ver: interdum vero vento vario, aliqua accedente alia tempeftate, ver has folitas non obtinet proprietates. *Æftas* autem per majorem folis elevationem, & continuatam exhalationem e terra facit aerem calidum & ficcum, quoniam tellus humido privata, aerem non amplius humectare poteft: interdum vero imbris cadentibus, aliifque tempeftatibus, & ventis ex feptentrione fpirantibus, naturalis conftitutio mutatur. Quando igitur Hipp. dicit, *Æftatem Veri* fimilem effe, intelligit, naturalem tepidam & humidam aeris conftitutionem haberi in æftate.

*Cur tunc  
fudores  
multos in  
febribus  
expectare  
oportet?*

II. Expectare oportet, confuetus eft Hippocratis dicendi modus, quando indicare vult, frequentiffime aliquid fieri, fed tamen non femper. Ergo quando æftate tales oriuntur febres, hæc folent finiri fudoribus. Inde valet hic Aphorifmus ad prædictionem febris in febribus; atque in curatione quoque fcimus, quid fit agendum, quamnam evacuatio eft promovenda, ut eliminetur morbi materia. Ut hæc Prognofis & Indicatio curativa firmetur, non folum experientia, ex qua nofter Auctor hunc canonem defumfit, fed etiam ratio eft confulenda. Sciendum eft,

est, corpora temperate viventia hyeme ponderosiora esse, quam æstate, quia æstas calidior & siccior id abundans per insensibilem perspirationem aufert; largiorem quoque esse dissipationem salubrem æstate quam hyeme, ut id, quod calore majore corrumpitur, magis in æstate quam hyeme hac dissipatione copiosius aufertur. Si igitur æstas sit frigidior & humidior, minuitur inde perspiratio insensibilis, atque materia, quæ debebat exhalare, colligitur in corpore. Ex hac materia sæpe generantur febres æstivæ in citata tempestate frequentiores, habentes materiem perspirabilem corruptam pro materia. Naturale igitur est & rationi conveniens, ut materia talis febrem excitans eliminetur per proprium suum organum, nempe cutim, quia huic organo magis quam aliis conveniens Aph. 21. IV. Sed quando perspirabilis humor majore copia erit, sudorem præbet; in tali febre sudoris evacuatio est critica. Potest tamen sine sudore finire, modo eadem materia minore copia insensibiliter diffusetur, quod minus frequens est, evacuatâ parte crassiore cum urina, quæ laudabile sedimentum coctum continet.

## L I B. III. A P H. VII.

86. **I**N siccitatibus febres acutæ sunt. Et, si annus quidem pro majori parte talis fuerit, qualem fecit constitutionem, ut plurimum etiam tales morbos expectare oportet.

**I**N præcedente notaverat, æstate multos expectandos esse sudores in febribus, si æstas esset veri similis; ergo nunc in hoc Aph. aliam observat aeris constitutionem, in qua excellit nimia aeris siccitas; nam αὐχμὸς magnam & nimiam siccitatem denotat, plerumque ex vehemente æstu provenientem; indicat interdum etiam siccitatem summam cum frigore, quali modo in altera parte hujus aphorismi est accipiendum; in qua non solum intelligit Auctor siccitatem æstivam ardentem, sed & siccitatem cum mitiori calore, imo cum frigore. Ergo in expositione hujus non est attendendum ad ullam aliam aeris qualitatem, quam ad solam siccitatem nimiam, seu quæ excessum facit. Experimentis constat, quo siccior est aer, eo avidius aquosum humorem imbibit, corporaque humida humiditate privat, ut docent notiometra. Quare massa liquida, partim constans volatilibus aquosis, partim fixis aeri non miscibilibus partibus, in tali aere admodum sicco, & præcipue æstivo tempore, privatur omni humiditate aquosa: & partes firmæ humidis naturaliter irrigatæ, fiunt aridæ. Ergo sanguis noster, qui torus non est volatilis & aquosus, amittit in tanta siccitate omne suum fere humidum, quare remanens magis spissum, continebitur in arteriis & venis. Membranae, fibræ, vasa, in nobis semper humida, per tantam exsiccationem fiunt arida; & quia siccando simul accurantur fibræ, partes firmæ fiunt graciliores, sicciores, magisque contractæ.

Aeris nimia siccitas quid faciat?

II. Ex hac inducitur mutatio in humoribus & partibus firmis deducendum est, cur frequentius formentur Febres Acutæ, quam in alia aeris constitutione. Si tali in corpore nunc ponatur noxium morbosum, irritans actionem vitæ, facilius nunc, quam in alia constitutione generabitur Febbris Acuta: nam partes firmæ per siccitatem admodum tensæ validius se movent, quam dum essent laxæ & humidæ, ut chorda sicca tensa si pulsatur, validius oscillat. Inde motus corporum viventium stimulo morbofo agitata validiorem actionem exercet, qua formatur summus corporis ardor, quod est summum criterion febris acutæ. Hoc motu aucto, agente in ita inspissatam sanguinem, statim formatur Lentor seu inflammatoria dispositio in sanguine, qui in sanguine magna copia humidi diluto tam cito formari nequit; inde quod restabat in sanguine fluidum; hoc motu compingitur in

Cur in siccitatibus febres acutæ?

R 2

lento-

lentorem, cui accedit cutis summa ariditas, sitis intensa, ob humidi defectum. Quæ omnia juncta si inveniuntur phænomena, uno nomine vocantur Febbris Acuta. Si vero idem noxium stimulus accessisset, sed in sanguine magis diluto, & partibus firmis laxioribus & humidioribus, nondum inde tantus calor, & siccitas esset formata.

Altera  
pars Aph.

III. Quoniam talis dispositio nata in corpore per nimiam siccitatem æstate facilius producit febres acutas, aliis etiam anni temporibus idem genus morbi inferre potest. Hinc possumus formare prædictionem, si constitutiones aeris diu fuere siccæ, expectandas esse Febres Acutas, etiam si adhucdum talis febri non sit præsens, quia hæc constitutio priorior est ad producendas Febres Acutas, quam quævis alia. Inde tamen non inferre licet, aeris siccitatem minus salubrem esse, quam ejus humiditatem: unaquæque tempestas excedens suos morbos infert, sed si respiciamus ad numerum & frequentiam, Tempestates humidæ multo plures & frequentiores inferunt morbos, quam siccitates.

### LIB. III. APH. VIII.

87. **I**N constantibus temporibus, si tempestive tempeſtiva reddantur, constantibus, & judicatu faciles sunt morbi: in inconstantibus autem, inconstantibus, & difficiles judicatu.

Tempora  
anni Con-  
stantia &  
Inconstan-  
tia.

I. Tempora anni a solis cursu pendentia (Aph. 80. I.) Constantia sunt; sed & his temporibus regularis fit quædam aeris mutatio in caliditate, frigiditate, siccitate, & humiditate. Potest etiam his temporibus alia esse aeris constitutio, ut, qualis solet esse in autumno vel vere, accidat æstate vel hyeme, & vicissim: hæc mutationes lente vel subito incidere possunt. Quando igitur unaquæque naturalis cuicumque temporis anni habetur aeris constitutio, & illa sensim ingruit manetque constans, tempestive tempeſtiva redduntur, & dicuntur Constantia. Si autem aliena & sæpe mutata aeris qualitas istis temporibus anni fiat, dicuntur tempora Inconstantia.

Constans  
& inconstans mor-  
bus.

II. Ex tempore anni, quo venit morbus, morbus dicitur Constans & Inconstans: & qui morbi autumno, vere, vel alio anni tempore venire solebant, si in alio tempore incidunt, dicuntur Inconstantes; sed suis temporibus venientes respectu temporis dicuntur Constantes: unde habentur morbi autumnales, vernaes &c. Sed & etiam morbi semel nati, si sequuntur regularem mutationem, etiam dicuntur Constantes; qui vero anomalam mutationem faciunt, jam in melius jam in deterius tendunt, variaque symptomata inferunt, dicuntur Inconstantes.

Facilis &  
difficilis  
judicatu  
morbus.

III. Quod hic dicitur judicatu facilis, in Textu est *Ἀπρὸς*, denotans purum, distinctum, ordine locatum. Intellegitur igitur morbus simplex, minime vero aliis morbis complicatus, aut anomalis symptomatibus stipatus: quare facile est judicium ferre, uti in omnibus rebus ordinatis & simplicibus, qualisnam exitus sit futurus; utque in his quoque facilius sit evacuatio critica, quam in morbo anomalo & composito, quare ex ratione tales morbi dicuntur judicatu faciles, tam quoad prognosin, quam ad curationem. Difficiles autem judicatu in Textu *δυσκρίτοι*, sunt morbi, qui admodum inordinati sunt, variis stipati symptomatibus, aut ex variis compositi, de quibus nulla certa prognosis aut curatio promitti potest, quique etiam difficilius curantur, quam tales morbi eodem nomine insigniti curari solent.

Cur morbi  
judicatu  
faciles ex  
constitu-  
tione tem-  
poris.

IV. Admodum pauci oriuntur morbi, si singula anni tempora suam naturalem constitutionem caloris, frigoris, humiditatis, & siccitatis habent, & tempeſtive, id est una constitutio non subito, sed lente alteram excipiat, quoniam tunc corpus nostrum non patitur ex subita mutatione, quæ multos morbos parit (vid. Aph.

Aph. 80. ) Si vero morbus fiat, quoniam interim corpus nihil patitur ex tempestatis instantia, vis vitæ medicatrix morborum, in sua functione non perturbata, constantem facit morbi materiæ mutationem, modo non avertatur præpostera curatione. Unde valet medicus in historiis morborum peritus prælagere naturales in eo morbo mutationes, atque auxilia adhibere multo certius, quia ælio corporis per variam tempestatem non mutatur, suum effectum fortiuntur, ut æger citius liberetur a morbo, subacta & expulsa ejus materia.

V. Si vero admodum inordinata & intempestiva est aeris constitutio, multo plures nascuntur morbi, & qui sunt propter variam hanc causam magis observantur complicati, seu plus quam uno morbo affligitur æger; quare ex confluentibus phenomenonis non tam facile erit decernere, quibusnam morbis decumbat æger; nam quædam signa characteristica unius morbi, per causam alterius extinguuntur vel invertuntur; atque morbus tunc magis irregulares facit mutationes, tum quia morbus est complicatus unus alterum perturbans, tum quod varia aeris constitutio perseverans morbi naturam aliquo modo invertat. Quare impossibile est, ut peritus etiam medicus certam prognosin formare possit ex regulari mutatione, quæ nunc omnino est irregularis. Et quoniam inde incerta sit cognitio, talis quoque sit curatio, quia vires corporis pluribus morbis pressæ non tam constanter & facile morbi materiem possunt subigere & expellere, ac si unicus morbus effet superandus. Impeditur insuper vis vitæ morbum superare per inæqualem illam constitutionem aeris, dum aliter in constitutione tempestiva juvamentum accipit.

Cur morbi  
judicatu  
difficiles  
ex consti-  
tutione  
temporis?

## L I B. III. A P H. IX.

88. **I**N autumno morbi acutissimi & perniciosissimi omnino: Ver autem saluberrimum, & minime exitiale.

I. **I**N hoc Aph. conatur Auctor describere discrimen temporis, ut medicus ex generali temporum observatione discat, quodnam tempus anni magis minusque salubre vel exitiale sit: ex istis temporibus eligit Ver & Autumnum seu tempora æquinoctialia. Pro Autumno intelligi possunt September, October, & November; & pro Vere Martius, Aprilis, Majus; quæ tempora multo facilius concipiuntur, quam ab ortu & occasu stellarum. Neque opus est tam anxie definire hæc tempora in morborum Autumnalium & Vernalium observatione; aeris enim major & minor calor his temporibus morbos Autumnales & Vernales citius & tardius oriri facit.

Scopus  
Auctoris.

II. Ut intelligatur, cur in Autumno sæpe vel omnino sunt morbi Acutissimi & Perniciosissimi, constare debet, qualis morbus his nominibus a medicis accipitur. Morbum Acutissimum idem fere semper indicare, quod Brevissimum, ex iis, quæ supra Aph. 7., I. & Aph. 24., III. exposuimus, facile colligi potest. Hunc ut servant sensum maxime laborant Interpretes in hoc Aphorismo, quoniam experiuntur Autumnales fere semper longiores esse Vernalibus morbis; febris enim tertiana & quartana intermittens, imo ipsa febris continua diutius affligit ægrum in Autumno, quam si simili febre vernali tempore corripiatur Aph. 50. Quare non credo Hipp. per morbum Acutissimum intellexisse morbum brevissimum, sed vehementissimum & acerrimum. Atque sensus hujus Aph. admodum est planus, si per morbum acutissimum intelligamus morbum Acrem, Vehementem, multos labores & molestias inferentem, quoniam ex practica observatione constat, morbos Autumnales pluribus & gravioribus symptomatibus stipatos esse, quam Vernales.

Quinam  
acutissimi  
morbi?

III. Triplex est morborum exitus, nempe in sanitatem, alium morbum, &

Quinam  
pernici-  
mor-

Estimi  
morbi?

134

MEDICINA HIPPOCRATICA Aph. 82.

Cur in au-  
tumno  
morbi acu-  
tissimi?

mortem. Morbos Autumno natos dicit Hippocrates perniciosissimos esse, id est, propter vehementiam, magnitudinem cause, vel malignitatem, morbi Autumnales frequentius mortem minantur, quam morbi Vernales: quare Autumnus perniciorem vel mortem morborum causam generat, quam alia anni tempora.

IV. Morbum Acutissimum denotare in hoc loco Morbum Vehementem & Acrem, superius indicavimus; sed cur talis morbus frequentius in Autumno, quam aliis anni temporibus observatur, hoc loco inquirere restat. Quidam generationem morborum Acutissimorum in Autumno adscribunt fructibus tunc copiosius nascentibus & assumptis; alii aeris inæqualitati, ut jam sit calor, jam vero frigus; alii denique cutis constitutioni. Quare non satis inter Auctores constare videtur, quænam sit vera causa in Autumno horum morborum. Certe autem scio, nullum accedere Autumnum, quin præcesserit Æstas Regulari est aeris calorem Æstate majorem esse quam in Autumno; atque in æstate humores disponi ad putredinem & acrimoniam; corpusque nostrum hoc tempore largius perspirare, quo facile expellit id corruptum & acre. Si nunc mutetur aeris caliditas in frigiditatem, & siccitas in humiditatem, qualis mutatio in Autumno est naturalis; quæ corrupta fœre in telluris ambitu & auferebantur, quam diu aderat aeris calor & siccitas, nunc ob telluris remanentem calorem attolluntur, sed per aeris frigiditatem & humiditatem non auferuntur, quare miasmata corrupta ad telluris ambitum suspensa a nobis continuo hauriuntur, corporique nostro applicantur: quæ quam sint acra, aliena, & corrupta, sæpe nostrum corpus insufficiunt, & quoniam nobis admodum sunt aliena, non facile actionibus nostri corporis subigenda, pariunt morbos suæ naturæ convenientes, id est Acutissimos, vehementes, & acres; corruptio enim per calorem inducta acerrimam acrimoniam inducit. Hæc sunt ratione causæ applicatæ, sed ipsum nostrum quoque corpus hoc tempore parat morbosam materiem; nam æstivo calore humores excrementitii sunt aciores, verum quia in calore exonerantur per insensibilem perspirationem, corrupti hi & acres humores nullum possunt inferre damnum. Verum facta mutatione aeris in Autumno, minuitur perspiratio insensibilis: corruptum id non amplius evacuat, sed in corpore retentum, mora sensim acrius factum, morbum Acutissimum generat. Ex hac, vel illa, vel binis causis simul generantur morbi Acutissimi Autumnales, quæ causæ tam frequentes aliis anni temporibus non concurrunt, quare Autumno frequentius morbi Acutissimi observantur. Conf. Aph. 50. IV.

Cur perni-  
ciosissimi?

V. Homo materia morbi infectus, ut in sanitatem redeat, debet hanc materiem vel subigere actione vitæ aut medicamenti, vel expellere: si vero hoc præstare nequit, vel quia materia nimis pertinax est, vel continuo additur nova, tandem superat viribus vitæ, moritur. Ex præcedente descriptione liquet, utrumque malum in morbo Autumnali excellere: corruptum enim in aere nobis communicatum, ut & quod in nobis natum fuit per æstivum calorem, ad summam acrimoniam fuit evehum, unde magis perniciosum seu lethale, quam quod minore calore productum fuit. Atque id alienum non solum est expellendum & subigendum, verum dum æger premitur morbo, continuo nova aggeritur materia, nam haurimus interim aerem miasmatis similibus infectum, & quod in corpore receptum fuit, propter parciorem distillationem vix valeamus excutere, quare tandem detritis viribus succumbimus, vel difficulter superamus morbum. Quales morbi dicuntur lethales, & perniciosissimi, non quod semper mortem inferant, sed sæpius, quam similes morbi Vernales.

Ver salu-  
berrimum  
& mini-  
me exitia-  
le.

VI. Ut spatium trium mensium tribuitur Autumno, ita etiam Veri, hoc autem habet antecedentem Hyemem, in qua multi sunt collecti in corpore humores, sed vero multo minus ob præcedens frigus corrupti. Quare morbi Autumnales præcipue oriuntur ex vitiata qualitate, dum morbi Vernales fere semper ex abun-



abundantia proveniunt. Hæc autem abundantia per subsequenter calorem, atque largiorem perspirationem facillime tollitur, vel evacuantibus artificialibus demum potest. Quare rariores hoc tempore fiunt morbi, quam in Autumno, & qui nascuntur ex abundantia, minus sunt exitiales, quam ex vitiata indole humorum sunt, faciliusque tolluntur, quoniam nova non accedit materia, atque recepta malignitas per largiorem perspirationem facilius excutitur. Hæc autem omnia, quæ de morbis Autumnalibus & Vernalibus dicta sunt, generaliter sunt capienda; interdum enim Vere quoque observantur morbi acutissimi & perniciosissimi, dum in Autumno habentur morbi leviores; quare hæc observatio non est admittenda sine ulla exceptione; sed quod plerumque hoc observetur.

## LIB. III. APH. X.

89. **A** *Utumnus sabidis malum.*

**I**N præcedente Aph. egit Auctor de insalubritate Autumni & salubritate Veris. Commissio.  
 ris in producendis morbis acutissimis & perniciosissimis: inde hoc loco statim subnectit observationem in Chronicis, & quemadmodum ex Acutis citavit Acutissimos & perniciosissimos, ita ex Chronicis quoque maxime Chronicum & perniciosissimum proponit, nempe Tabem. Sed in oppositione hoc describerem invenitur, quod omittit vel saluberrimum & minime exitiale, quoniam Tabidi etiam vere maxime periclitantur, multi enim martio mense moriuntur. Satis ergo constat, alterum adjunctum de vere non sine judicio omissum esse. Ut autem constet sententia aphoristica, (1) Sciendum est, quid sit Tabes, & (2) cur autumnus his sit malus.

**II.** Phthisis nomine duos distinctos complectuntur morbos Medici, nempe Corporis emaciationem seu Maciem, atque Corruptionem. Qui autem hos duos morbos Tabes quid sit. mistos non admittunt, confundunt Atrophiam, & Ariduram cum Phthisi, in quibus medicus non attendit ad Corruptionem, sed solam totius corporis vel alicujus partis Extenuationem vel Maciem. Alii autem Cachexiam & Cachexiam Phthisis quoque speciem faciunt; verum in his non attendunt ad corporis extenuationem. Hinc ut morbus vocetur Tabes vel Phthisis; (1) Debet adesse summa macies; (2) Corruptio humorum vel & partium firmarum; (3) Atque hi duo morbi debent totum corpus afficere; quoniam si pars quædam particularis extenuetur & corrumpatur, manente reliquo corpore sano, talis homo non dicitur Tabes laborare. Qui igitur per nimiam quamcumque evacuationem, vel per rigidissimam inediam ad maciem fuit redactus, quamdiu non accessit corruptio, non laborat Phthisi; sed accedente corruptela, ut frequentissime fit in hujusmodi humorum defectu, Maciei nomen mutatur in Tabem. Idem morbus videtur nasci posse ex vitiata alimentorum confessione in nobis, quoniam tunc quoque corpus privatur suo pabulo; sed quoniam tanta vitiata coctio nunquam existit sine corruptione, inde talis extenuatio statim ab initio nomen Tabis meretur. Non semper est opus, ut primo habeatur extenuatio seu macies, & dein accedat Corruptela, interdum enim Corruptela prægreditur, quemadmodum in Cachexia & Cachochymia, qui homines in principio sæpe tument, & dein macie consumuntur. Quæ Tabes ab interna & veluti latente causa sine majore evacuatione vel detractione nutrimenti adoritur, ad tria genera refertur potest.

**III.** *Purulenta* vocari potest, quoties pus alicubi in corpore formatum, retentum, in putrilaginem conversum, circulantibus mistum, sanguinis & reliquorum humorum crassum ita invertit, ut fiant nutritioni inepti; frequentissime hoc fit ex Tabes Purulenta.  
 pub-

pulmonis ulcere, quare etiam auctores hanc speciem vocant *Phthifin veram*, dum maciem cum corruptione ex abscessu vel ulcere aliarum partium *Phthifin noxiam* solent vocare. Quod autem ex Pulmonis ulcere pertinacior & frequentior formetur Phthisis, ex his clare patebit. Puris generatio ex bonis humoribus, atque puris corrupti & resorpti permissione cum circulantibus, ut in reliquo corpore Abscessus, Ulcera, & Vomicæ, naturale consumit corporis pabulum, & circulantes bonos humores corrupta purulenta putrilagine inficit: sed præterea Pulmo pus formans, quia sursum contra naturalem puris gravitatem se evacuari debet, hic multo magis, quam alibi pus retentum corrumpitur & inficit. In hoc solo si confisteret differentia, vomicæ etiam viscerum internorum pari passu inducerent phthisin, quæ confectum pus non facile eliminare valent. Sed maior differentia causa accedere debet, cur Pulmonis ulcus magis quam aliorum viscerum Tabem inducit: nullum enim est in nobis organum tam præstans præparationi humorum datum, quam Pulmo, cuius functio per ulcus vel vomicam vitata, facit ut humores minus debito præparentur, quæ præparatio requiritur, ut commutetur ingestum alimentum in indigenos humores; dum vero reliquorum viscerum secretoriorum & excretoriorum vitata functione, non ita Nutritio, quam Secretio & Excretio turbatur. Hoc si adhuc insufficiens videtur, suppleri potest observando, Pulmonis Ulcus aeri magis expositum esse cum difficili puris liberatione, quam ullum aliud internum viscus; quare hic magis, quam alibi pus stagnans in corruptelam vertitur, cum aeris aditus egregie promoveat putredinem humoris, qui in alio loco clauso sine multa putredine diu potuisset conservari. Ob has igitur non evitabiles causas corruptionem & emaciationem inducentes ex pulmonis ulcere *Tabem* ex hac causa natam *Veram* vocare placuit veteribus.

**Tabes Catarrhosa.** IV. Altera species vocari potest *Tabes Catarrhosa* seu Colliquativa frigida, quæ a quibuscumque refertur ad Phthisin nervosam. Corporis scilicet emaciatum cum humorum corruptione ab interna latente causa, in qua Tabes sæpe vexantur Catarrhosis destillationibus e capite veluti provenientiibus, & in pulmones descendentibus, a quibus sæpe & vehementer tussunt, multumque expectorant phlegmatis falsi & spumosi, vix cum ulla febricula, sed potius corporis refrigeratione & rosione circa dorsi spinam: interdum autem levi phlogosi tentantur, donec omni consumto corporis pabulo cum summo pallore & marasmo, moriuntur. In qua specie mihi videtur esse tam debilis actio vitæ, ut, quæ ingesta fuere alimenta, loco commutationis in bonos humores, nunc per spontaneam corruptelam degenerent in humorem tenuem, acrem, deliquatum, ineptum nutritioni, quem humorem Veteres vocarunt Pituitam falsam.

**Tabes Colliquativa.** V. Non multum distat a præcedente, quam voco *Tabem Colliquativam*, in qua etiam sine visibili causa totum corpus consumitur Tabes lenta, cum adjuncta erratica febre, & corporis incallescencia; frequentior observatur in locis calidis quam frigidis, atque in viris præprimis post febres diu toleratas. Videntur in hac specie per supervenientem putredinem humores sani deliquescere in humorem tenuem, acrem, & calefacientem, seu speciem ichoris, quæ ingesta alimenta in simile corruptelam convertit, consumens omne corporis pabulum, pinguedinem fundens, quæ sub forma urinx oleaginose tinctæ & spumose exit, aut nomine sudoris colliquativi effluit.

**Autumnus Tabidis malus.** VI. Qualem hic intelligit Auctor Tabis speciem, non consentiunt Commentatores. Galenus dicit se conjectari non posse. Ergo autem existimo, Hipp. præcipue intelligere Tabem ex ulcere pulmonis, quoniam Hipp. & alii Medici, si morbi nomen absolute ponunt, qui morbus varias habet species, semper intelligunt speciem frequentissimam, quam veram vocant: ita Pleuritidem ab inflammatione pleuræ, Nephritidem a calculo renum intelligunt. Videbimus tamen, an non omni-

mnibus speciebus Autumnus malus sit. Contendunt, Autumnum Tabidis insaluberrimum esse frequentissima aeris variatione; sed quoniam frigus & caloris crebra etiam invenitur in aliis anni temporibus vicissitudo, hæc causa soli autumno non esset adscribenda. Verum caloris commutatio in frigus, quod corruptum in præcedente calore inhibet exhalare, quodque corporis ex ægritudine debilis motum vitalem fere totum exstinguit, nulli tempori magis quam Autumno tribui potest. In Tabescentibus igitur corporibus, sive ex pure corrupto, vel catarrho, vel deliquata materia, qua erant oppleta, in Æstate satis libere corruptum exhalantia, nunc accedente frigore autumnali, quo inhibetur corrupti diffusio, & motu vitali in his nimis languido, fere tota actio per frigus exstinguitur, unde ita accumulatur corruptum, & suffocatur vitæ actio, ut in se æger pereat.

## LIB. II. APH. XI.

90. **D**E temporibus, si quidem hyems sicca & aquilonia fuerit, ver autem pluviosum & australe, æstate necesse est febres acutas fieri, & ophthalmias, & dysenterias, maxime autem mulieribus, & viris natura humidis.

**P**RÆter morbos, qui naturalem & consuetam temporis mutationem sequuntur, alii etiam sunt, qui variam istius temporis anni sequuntur, ut ex hoc Aphorismo constat, non enim regulare est, ut Æstate fiant Ophthalmiæ, Dysenteriæ, & febres acutæ; sed si antecesserit Hyems sicca & aquilonia, & ver pluviosum & australe: & tunc non omnibus hominibus, sed maxime mulieribus, & viris natura humidis. Quare hic citatur series causarum se invicem excipientium, ex quibus collectis tandem hi morbi generari solent. Galenus existimat, Hippocratem hanc prognosin formasse ex lege naturæ, sed non ex pura observatione. Si autem inspicimus locum, ubi horum morborum reddit rationem, quem invenimus Hipp. Lib. de Aere, Aquis, & Locis, a. 342. non detego illam legem. Hæc sunt Auctoris verba, quibus probat hanc prognosin, (Quum enim Æstus de repente accedat, terra humida existente a vernis imbribus & ab Austro, necesse est, æstum duplicatum esse, & a terra irrigua ac calida, & sole urente; quum ventres in hominibus nondum constricti sint, neque cerebrum resiccatum, &c.) Nam acris humiditas potius temperat nimium calorem Thermometrum, sed nobis toleratu facit molestiorem. Quid autem per ventres nondum constrictos, & cerebrum non resiccatum sit intelligendum, tam plane non constat, ut esset ratio sufficiens ad istos morbos præfagien-los. Videtur igitur mihi, Hippocratem, cum in ejus senectute collegit aphorismos ex præcedentibus suis operibus, puras & constantes voluisse tradere observationes medicas, sive physicis istius temporis principiis congruerent, sive contrariari viderentur, modo Auctor certissime esset persuasus longa observatione medica, tales morbos fere semper secutos fuisse in humidis temperamentis post talem aeris vicissitudinem. Ex observatione hæc & multis aliis mihi non obscure patere videtur, Hippocratem sibi conscripisse Tabulas metereologicas, quæ quoque his temporibus a Medicis & Physicis conscriptæ in publicum emittuntur, ex quibus hanc prognosin practicam petiit, quæ autem Tabulæ deinceps turpiter fuere neglectæ. Sperare autem hodie possumus, aliquem inventum iri, qui ex hodiernis more Hippocratico nobis plures & utilissimas in medicina observationes ex collectionibus variis in regionibus conficiat, & publici juris faciat; nam quamdiu versamur in particulari observatione, quemadmodum ipse quoque feci a multis retro annis, licet sine his comparari non possit, medica scientia non magnum usum inde mutuatur. Quare Edenburgensium inceptum non satis laudare possum, qui hanc ingressi sunt viam.

Quid faciat hyemem sicca & æquilonia.

II. Multum tamen ad promovendam scientiam differre, sive experimenta vagantur, sive de industria instituantur, omnes Medici & Physici norunt, qui in his multum laborarunt; multo enim magis promovetur doctrina per experimenta a peritis in scientia & cum judicio instituta, quam quæ negligenter pertrahantur. Quare experimur etiam medicos in arte medica consumptos, & frequenti praxi exhaustos, non raro tamen in medendo stupidos esse, quia praxin sine ulla norma, & negligenter excoluere, multa perversa detegentes & non emendantes; vel quia praxin obiter exercent, dum reliquum tempus in physicis, anatomicis, botanicis, chemicis, vel quavis alia utili scientia impendunt; vel, quod pejus est, in colloquiis, comotationibus, reliquisque vitæ deliciis vitam transigunt. Ut ergo cum fructu instituantur experimenta, illa obiter non sunt capienda, sed sedulo & accurata attentione omnes minutiae etiam sunt notandæ, ut facit Auctor noster, qui non Veris constitutionem notat, ut prælagiat æstivos morbos futuros; sed & etiam prægressam Hyemem. In qua Ventrum & siccitatem citat, quare non sufficit, ut flet Aquilo, nam si simul adferret humiditatem, propofiti morbi non essent expectandi, sed si spirat Aquilo, aerque simul sit solito ficcior. Aquilonari vento, præ reliquis omnibus frigidus, quia ex telluris plaga venit minus a sole irradiata, & apud nos quoque marina, si jungitur siccitas, effectus in nostro corpore deduci possunt ex aeris frigiditate & siccitate; quibus junctis partes firmæ fiunt robustiores magisque contractiles, unde humores continuata hac actione fiunt densiores magisque compacti.

Quid faciat ver pluviosum & australe.

III. Austus autem ex regione calidiore delatus, si simul sit pluviosus, omnino priori oppositus præbet effectus, nam loco frigoris fit calor, & loco siccitatis fit humiditas, quare ob mutationes has generatur facilius morbi. Verum quamdum in corporibus humidis & laxis, qualem naturam hic citat Auctor, per aeris frigiditatem firmabantur solida, & compingebantur humores, hæc corpora satis sana vivebant: nunc vero accedente vernali & australi calore firmarum partium relaxatur tonus, qui magis enervatur pluviosa tempestate. Hinc quod compactum fuit, iterum liquefcit, sed quia virtus agens infirmior, tam ex propria natura ægrotantium, quam ex vento australi & humido, id liquidum, ineptum nutritioni & functionibus præstandis, tamen colligitur in corpore. Scantent igitur hujusmodi corpora materia cruda resolutis & non expulsiis humoribus nata; quam ob rem se tunc sentiunt ponderosiora, tum ob multitudinem, tum ob firmas partes relaxatas; sed quia hæc materia vix ullam hucusque acquisiverit acrimoniam, nulla febris observatur.

Cur æstus deinceps febres acutas, Ophthalmias, & Dysenterias faciat.

IV. Illa autem materia aliena evolare prohibita aeris humiditate & enervato tono solidorum in natura humidis & mulieribus, (nam corpora robusta, obstante hac causa, hanc materiem excutere per insensibilem perspirationem,) longiori mora retenta, & calore æstivo sensim in majorem acrimoniam evehitur; quidquid enim in nobis est alienum, quod etiam expelli non potest, mora & calore corrumpitur. In tali itaque æstate corpora laxa, & humida sœvent in se humorem alienum, tenuem per deliquationem, & acrem. Hic humor tandem lateribus arteriarum applicatus, in arteriarum fibris per stimulum majorem motum facit, qui cum habetur per totum corpus, vocatur febris *Acuta*. Si vero præcipue incidit Lachrymas, oculi his lachrymis continuo irrigati, & irritati, ruborem contrahunt, quem morbum vocant *Ophthalmiam* seu Lippitudinem. Interdum vero ab intestina delatus copiosior facit alvi dejectionem, & quoniam simul acris est, Tormina infert, qui morbus vocatur *Dysenteria*.

Hujus observationibus.

V. Ad Prognosin formandam instantis morbi, & curationem exigunt, si hujusmodi morbis consiliantur; quare medendi modus est exponendus præveniens instantis

ma-

malum. Facile constat, non esse in medici potestate hanc evitare tempestatam mutationem, quare medicina est dirigenda ad humanum corpus. Corripiuntur præceteris laxa & humida corpora, & propterea, quod liquatam materiem non expellant per insensibilem perspirationem. Igitur duo agenda sunt a Medico Vernali tempore, antequam nimius æstivus calor accedit, ut promoveatur insensibilis perspiratio, qua excluditur id retentum, & ut corpus firmetur roborantibus. Ergo nec venæ sectio, quia id inutile liquatum non evacuat, sed bonum sanguinem; nec Alvi ductio, sola aliena intestinorum excludens, non vero perspirabile corruptum, ad præveniendos hos morbos, ut multi faciunt, conducunt; sed promovenda est illa excretio, scilicet insensibilis perspiratio, cujus materia retenta dictos morbos infert. Si autem nimis fero vocetur medicus, dum scilicet materies sit acris facta, & febrem Acutam, Ophthalmiam, vel Dysenteriam induxerit, morbi genus primo est inquirendum. Hodie febrem Acutam & Ophthalmiam deducere fere omnes Medici ex Inflammatione, aggredierentur hos morbos sanguinis missione, nitrosis, diluentibus, laxantibus, aliisque auxiliis Inflammationi appropriatis, expectarentque in urina critica signa. Qui autem sedulo attendit subiectum, corpora scilicet humida laxa, materiem corruptam tenuem esse causam, sæpe copiosam fieri alvi dejectionem cum torminibus, facile persuaderi potest, dicta non convenire Inflammationi, corporibus robustis & siccis frequentiori morbo, eamque conjunctam semper habere summam siccitatem & densitatem humorum. Unde non mirum alicui videri potest, hos morbos curari non posse solita methodo Inflammationis, sed nos debere antisepticis Diaphoreticis internis, qualia in putredine calida præscribi solent, tentare materię emendationem & expulsionem per insensibilem perspirationem, quia hujus organi materia retenta acrior facta, hos morbos producit, quæ non patitur per alienum organum, puta alvum, vel urinam, tam facile eliminari, quoniam observanda est naturæ directio, *Apb. 21.* III. Oculis interim applicari possunt, si Ophthalmia vexat, refrigerantia & leniter adstringentia: atque in Dysentericis parva dosi Rhabarbari sæpe repitita alvus servanda aperta, ne acris in intestinis effusus humor diutius stagnans exulceret intestina, dum interim maxima humorum colluvies educatur per cutim. Post evacuatam acrem humorem corporis remanens debilitas roborantibus cardiacis est curanda.

LIB. III. APH. XII.

91. **S**I vero hyems australis & pluviosa, & tranquilla sit, ver autem siccum & æquilonium, mulieres quidem, quibus partus in ver incidit, ex omni occasione abortiunt: quæ vero pepererint, infirmos & morbosos parvum pueros, ita ut vel statim illi pereant, vel tenues & morbosos vivant. Ceteris vero mortalibus dysentericæ, & ophthalmicæ siccæ fiunt: senioribus autem catarrhi brevi perimentes.

I. **B**ipartita scilicet quia faciliorem huic Aph. præbebit intellectum, qui a Commentatoribus vario modo accipitur, magis est observanda, quam in aliis. (1) Proponitur causa generalis morbos inferens, consista in aeris & ventorum mutatione Hyeme & Vere. (2) Illa deinceps mutatio examinatur, quid faciat in gravidis, infantibus, pituitosis, biliosis, & senibus.

II. Aeris hæc constitutio plane opposita est præcedenti, nisi quod additum sit Tranquilla, Clemens vel Placida, quia a multis, uti a Celso Lib. 1. cap. 1. Si vero auster pluvique hyemem occuparunt, omittitur, & ab aliis adstruitur, addi non oportere, quoniam oppositum non invenitur in prægresso Aphorismo. Quare vero Hipp. Lib. de Aeribus, aquis & locis H, a, 345. huic sententiæ addat

Divisio.

Quid faciat hyems australis & pluviosa & tranquilla.

Æthæ, nullus est dubitandi locus, quin sit verus sensus nostri auctoris. Si ergo consuetudo frigida & tempestuosa Hyemis constitutio mutetur in Australem Humidam, & Tranquillam, seu clementem & placidam, id est magis tepidam & minus ventosam constitutionem, corpora sana in partibus firmis manent laxiora, humoresque manent tenuiores magisque prout ad corruptionem, atque propter aeris humiditatem perspirabile magis retinetur in corpore, quæ omnia amplius disputata sunt & exposita in *Lib. de insensibili perspiratione*.

Quid faciat deinceps verum siccum & aquilinum.

III. Si vere accedente aeris humiditas convertatur in siccitatem, id quod præcedente hyeme per aeris humiditatem fuit retentum, exhalaret, si simul adesset aeris calor, verum Ventus aquilonaris frigidus corporibus applicatus hanc liberam exhalationem immoratur: quare id quod exhalare debuit, ab aere sicco & frigido partium firmarum contractilitatem augente fortius agitur. Humores crudi hucusque non satis sublatis, per validiorem firmarum partium agitationem assimilantur in bonos humores, sed humores evacuationi destinati, qui non patiuntur actione corporis validiore assimilari, eadem actione magis degenerant a proba indole; quod si corpus posset, obstante aeris frigiditate aquilonia, se liberare ab hac inutili materia, perfecta sanitate frueretur; sed si expellere eam materiem non valet, actione corporis ultra modum agitata, sui generis Infect morbos, qui a priore non possunt ex natura materiz definiri, quoniam differt pro natura corporis & humorum, qui in tali tempestate Vernali agitantur: propterea experientia est consulenda in subiectis variis, in quales morbos hæc materia Hyeme retenta & Vere agitata erumpere solet.

Cur in tali vere frequentior abortus?

IV. Mulieres in præcedente Hyeme gestantes utero, quoniam aer est solito humidior & calidior, laxans firmarum partium tonum, in suo corpore minus præparant humores, sed colligunt in se abundantiam crudorum indigestorum materiz perspirabilis: laborant itaque duplici cruditate, scilicet ex alimentis non satis subactis, & materia excrementitia nondum expulsa. Vere nunc accedente frigido & sicco partes firmas contrahentes, modo minima accedat causa ad Abortum disponens, quare dicit Auctor *ex omni occasione*, foetus crudo nutrimento nutritus, debilis, impetu humorum aucto ad uterum, facile eluditur, depulsa placenta ab adhærente utero. Talem instantem Abortum melius Hyeme quam Vere prævenire valet ars medica; si enim gravidarum corpus tanta copia crudorum sit onustum, non facile erit brevi tempore, dum mutatur aeris constitutio, istud ab his impuritatibus liberare, ut præveniatur Abortus: sed in tali constitutione Hyemali siccantibus, roborantibus, stomachicis, & diaphoreticis curandum est, ne generetur in gravidis crudorum cumulus, ne forsan aeris mutatio, quam nemo præfigere valet, Abortus ansam præbeat.

Cur infantes nascuntur infirmi?

V. Ut fortes creantur fortibus, ita ex infirmis & valetudinariis nati Infantes asportant non raro parentum infirmitatem, morbisque ex hæreditate natis luctantur, quemadmodum in his regionibus sæpe in rhachiticis infantibus experimur, sive quod Maritus crudum & indigestum vel morbosum præbuit semen, vel Mater valetudinaria immaturam vel corruptum continuo præbuit nutrimentum foetui tenello: ita enutritus foetus & ex immaturo semine natus nequit in firmum & validum adolefcere infantem & puerum; infans enim debilis natus a matre separatus sua propria coactus deinceps præparare alimenta, vel succumbit impotens, vel diu luctatur valetudinarius. Hoc ergo loco solummodo adstruendum, prædictam aeris constitutionem præbere humorem nutritioni tenello foetui ineptum, vel non satis idoneum. Constat autem ex iis, quæ hucusque disputavimus, gravidam feminam duplici crudo onustam esse, quem crudum humorem foetus in tenello suo & debili corpore acceptum non valet in probum nutrimentum & incrementum suum convertere; quare solito pumiliores & infirmiores nascuntur, vel

vel brevi a partu moriuntur, quod malum eadem methodo, in abortu præveni-  
niendo tradita, præveniri potuisset.

VI. Hippocratem intellexisse Dysenterias fieri in Pituitosis, liquet ex ejus al-  
legato textu de *Aere, aquis & Locis*, ubi diserte dicit, *Pituitosis igitur Dysen-*  
*terias fieri verisimile est, & mulieribus, pituita de cerebro defluente propter natu-*  
*ra humiditatem.* Mutatio recensita ergo est applicanda ad homines pituitosos, hu-  
midos & laxos, dum vero sine interpretatione hac ipsius Auctoris sententia non  
esset sine dubio, an hic esset intelligenda Dysenteria sicca vel humida, quoniam  
statim subdit *Ophthalmia sicca*. Dum igitur in tali Hyemali constitutione corpo-  
ra natura humida & pituitosa humoribus crudis scateant, accedente frigore bo-  
reali superante eorum corporum vires vitales, sed tamen aucta contrachilitate so-  
lidiorum per frigus, contenti humores ad quæcumque excretoria urgentur; sed  
quia frigus magis afficit cutem, quam lambit & tangit, ac intestina nunc laxio-  
ra, verisimile est, minui insensibilem perspirationem per cutim, sed humores se  
exonerare per alvum laxiorem; quod si in tam diu collecto humore quædam ad-  
sit acrimonia, ille transeundo rodens intestina, defectionem copiosam facit cum  
dolor, quem morbum Dysenteriam soliti sunt medici vocare. Qui ergo in pi-  
tuitosis prævenire satagit instantem Dysenteriam vernalem, id agere oportet, ut  
roborantibus, stomachicis, & discutientibus hyemali tempore corpus liberetur ab  
abundanti pituita: sed si Dysenteria ex tali constitutione sit nata, primo pur-  
gante Rhabarbarino confluxus & acres humores ex intestinis exturbare debet,  
sed fluxum ulterius crudorum ab intestinis derivare ad cutim, viam naturalem  
exonerantem, quod ex prohibita perspiratione fuit retentum, ubi facilius & mi-  
nori molestia id crudum acre & corruptum potest evacuari, quam per intestina,  
quæ bonos & morbosos humores una evacuant, & propterea majorem debilitatem  
& imperfectiorem depurationem faciunt.

VII. Ex allegato loco Auctoris constat, Hippocratem intelligere Ophthalmias  
in biliosis, quia etiam rationem addit, nempe *propter carnis caliditatem ac siccita-*  
*tatem* Missa sententia nostri Auctoris, videbimus cur illa tempestatum mutatio  
in Biliosis sæpe Ophthalmias inferat. Biliiosi statuuntur, qui in suo corpore  
habent vel facile generant humorem tenuem acrem calorem inducentem. His  
in hyeme australi & pluviosa quoque parcius fit difflatio; sed quando accedit ver  
siccum & aquilonium, id tenue propter calorem majorem corporis naturalem  
facile excutitur aquosum, verum pinguitudo retenta & corrupta præcedente  
hyeme, tam facile excuti nequit, privata parte meabili & aquosa, magis adhe-  
rens lateribus vasorum, calidas biliosas & erysipelatosas ægritudines parit, quæ  
videntur ex observatione prædicta cum lachrymis ad oculos delatæ, in albo oculo-  
rum proritare rubedinem, refrigerantibus & adstringentibus antisepticis tem-  
perandam, & mucilaginosam obvolvendam; atque derivantibus per alvum vel  
cutim per antiphlogistica diaphoretica evacuandam, quum relicta in corpore  
materia illa tenuis & acris, longiore mora, sensim reddatur acrior.

VIII. Denique assequitur morbos ex eadem tempestatum mutatione in valde  
senibus, de quibus allegato loco, *valde autem senibus defluxiones propter rarita-*  
*tem venarum, adeo ut aliqui repente pereant, aliqui vero semi-fiderati fiant.* Er-  
go constat, Hippocratem voluisse valde senes, & non omnes repente perire,  
sed & quosdam etiam hemiplecticos fieri, quod non satis ex ipso Aph. liquebat.  
Valde autem Senes, pituitæ productioni pronos, non est mirum in humida tem-  
pestate cruditatibus scaterere, quæ tempestas etiam in robustioribus faciebat crudo-  
rum abundantiam: sed quando tunc accedit Ver boreale & siccum, hæc pituita  
tam diu in aere humido & tepido fluxilis, nunc incipit concrelescere & veluti coa-  
gulari, seu abit, ut loquuntur veteres, in pituitam vitream. Quia vero corpora  
seui-

Cur pi-  
tuitosis  
sunt Dy-  
senteria?

Cur bilio-  
si oph-  
thalmias  
siccas?

Cur senio-  
ribus ca-  
tarrhi?

senilia debilissima non valent pituitosum crudum viribus vitæ servare solum, facile in locis quibusdam subsistens concrevit; quod si fiat inencephalo, spinali medulla, gangliis nervorum, pulmonibus, ubi maximus est humoris pituitosi proventus, aut comprimendo nervos apoplexiam pituitosam, hemiplexiam, vel alios morbos periculosos, ut & mortem producit ex pituitæ abundantia & concretionem; vel ita opplet bronchia pulmonum, ut omnis intercipiatur respiratio. Hos autem morbos in valde senibus prævenire vix valet ars medica, cum senibus novas addere vires nesciat medicina, Vinum malvaticum, Stryax, Benzoin, Balsamum peruvianum, & similia nervina calefacientia sunt præcipua hyemali tempore propinanda, antequam vernale frigus & siccitas ingruat.

## L I B. III. A P H. XIII.

92. *Si vero æstas sicca & aquilonia fiat, autumnus autem pluviosus & australis, capitis dolores ad hyemem fiunt, & susses, & rucedines, & gravedines: quibusdam vero etiam tabes.*

I. **E**X quatuor anni temporibus solummodo observat duo recedere a solita sua constitutione, ut ver & hyems consuetam constitutionem servant, sed Æstas & Autumnus descripto modo sint mutata: sed ulterius non determinat, in quo temperamento corporis illi morbi sequenti hyeme sunt expectandi, ut fecerat in præcedente Aph., neque tradit morbos autumnales ex tali mutatione tempestatum, non quod nulli fiant, sed quod solum scopum habeat præagire morbos Hyemales post has observatas temporum mutationes. Haud credo Hippocratem hos morbos deduxisse ex rationibus, aut necessitate rei, sed hos invenisse morbos frequentiores observatos fuisse & notatos in suis tabulis observationum post Æstatem & Autumnum talem prægressum. Hæc igitur pura observatio sine ulla addita ratione satis esset firma & constans. Utinam vero etiam nostris temporibus ulterius sedulo excoleretur, ad firmanda a veteribus prolata, & adderentur plura alia scientiæ medicæ promovendæ, & sanitati conservandæ utilissima.

Æstas sic-  
ca & A-  
quilonia  
quid fa-  
ciat.

II. Aquilonem commutare naturalem Æstivi aeris teporem in frigus, constans est observatio, huic si addit aeris siccitas, ratione frigoris minuitur perspiratio, sed ratione siccitatis promovetur, quare in perspirationis quantitate non videtur fieri magna differentia ad aerem calidiorem, sed humidum. Verum ab utrisque his partes firmæ majori contractilitate operantur, cum & frigus aquilonare & siccitas aeris intendat automaticam firmarum partium constrictionem: unde humores transfluentes magis sunt compacti, & humido tenui spoliati, tam validiore expulsiōne per constrictionem auctam, quam aere sicciorē absorbente. Ad finem igitur huiusmodi Æstatis solida sunt contracta & sicca, humores vero compacti & densi.

Quid de-  
inceps Au-  
tumnus  
pluviosus  
& Australis  
faciat.

III. Si corpori ita prædisposito applicatur aer humidus & tepidus, qualis fit in Autumno spirante Austro, laxantur tunc solida contracta, humores compacti liquefunt, sed propter aeris humiditatem minus exhalantes, talia corpora hinc oppleta humoribus crudis, provenientibus ex liquatis bonis absoluto munere, non satis per insensibilem perspirationem expulsi. Sed quoniam in Autumno non tantus est calor, quam si talis tempestas fuisset in æstate, hi humores liquefacti & retenti cum solidorum atonia, minorem acrimoniam habent, quam si in æstate fuissent retenti.

Cur tunc  
Capitis  
dolores  
hyeme?

IV. Supponit nunc Auctor post talem Autumnum sequi Hyemem naturalem frigidam & humidam, in qua corpus crudo succo plenum in partibus firmis majorem acquirit per frigus superveniens contractilitatem; sed quia in hac tempe-

state



state tamen manet parca distatio, id crudum copia majore atque vitiatu qualitate afficit caput, unde partim distensio vasorum meningum & cerebri, partim a cruditate acri caput dolore vexatur. Qui ergo vellet hunc instantem prævenire dolorem, id agendum haberet, ut in autumno prægresso roborantibus & stomachicis prepararetur retenta materies ad expulsiorem; & firmaret corpus autumno relaxatum; atque siccantibus discutientibus & diaphoreticis liberaret corpus ab abundante & nunc præparata materia, ut superveniens frigus hyemale non inveniret corpus crudo & acri succo onustum, quo deinceps generatur capitis dolor. Sed si sine hac cautela homo ab hac causa in capitis dolore incidit, non tam facile erit eum curare. Alvi ductio enim & sanguinis missio quidem demendo quantitatem, & minuendo impetum, leniunt dolorem, sed non valent id acre & crudum emendare. Sudorifera & Diaphoretica calida crudum expellere & concoquentia non ferunt ægri, quia aucto motu dolorem exasperant. Diuretica raro medentur capitis morbis. Quare satius erit Autumno hos prævenire Dolores, quam eorum curationem in Hyeme agredi.

V. Ex iis, quæ hucusque disputavimus, colligere possumus, istos homines ad finem autumnii scaterere humore crudo & utrumque acri, accedens frigus, quia præ ceteris applicatur laryngi, tracheæ, & pulmonibus, atque membranæ pituitariæ, quas partes respirando semper lambit transiens aer; illas itaque partes contrahit, & si quos habent in se pituitosos humores, in suis vasculis, glandulis & cryptis colligit, atque ab aere transeunte frigido & sicco subsistere & condensari permittit. Mucus igitur seu Pituita naturalis harum partium, etiam in sanitatis satis copiosus, aeris caliditate & humiditate in Autumno servabatur fluidus, sed nunc accedente frigore inspissatur; & qui antea vel circulantibus permisceri potuit, vel libere expectorari, vel emungi, ita fit tenax & coherens, ut ex cryptis suis excuti nequeat. Quoniam autem humores retenti non carent acrimonia cruda, ex tali succo nati, in Trachea, & Larynge mucus tenax has partes stimulat, qualis stimulus semper Tussim adjunctam habet. Membrana rimulam glottidis vestiens, majore mucii crassioris copia tumens, æquabilem glottidis superficiem mutat, quæ vox formata per talem glottidem fit Rauca. Atque ab eodem mucio crassiore in Pituitaria membrana hærente, investiente nares adjectosque sinus, eum parit morbum, quem Gravedinem seu Coryzam vocamus. Qui morbi laudata methodo maxima ex parte præveniri potuissent, ad minimum brevioris fuissent durationis, cum minor crudorum copia in corpore tam multas suppetias non tulisset his morbis continuandis.

VI. Ex Textu facile colligi potest, minus frequentem generari Tabem ab hyeme superveniente talem constitutionem Autumnalem, quia addit *Quibusdam vero Tabes*. Hinc Commentatores fere omnes quesiverunt causam in variate subiecti, quod ab Hippocrate describitur pronum esse in Phthisin seu potius Hæmophthysin. Fateor equidem, quibus ex nativitate sunt pulmones debiles, his quoque facilius generari phthisin: sed dubito vehementer, an in hoc loco talis Tabes sit intelligenda, quæ ex ulcere pulmonis post hæmoptoen in juvenibus est frequentior: potius crederem hic intelligi debere *Tabem Catarrhalem* superius (Aph. 80. IV.) traditam, cum hic nulla sit suspicio morbi inflammatorii, sed catarrhosi & crudi: frequens enim est tussis & coryza in aliiis; quare verisimile est istos morbos in quibusdam tam sævos esse, ut ipsam Tabem inferant in omni subiecto, in quo generatur Tussis, Coryza, & Dolor Capitis, sed ex majori vehementia causæ morbosæ in tali constitutione natæ. Quod ut plane constet, corpus in Autumno crudum & acre colligens ad Hyemem veniens, præcipue hanc materiem colligens in pulmonis aeris vasis, in principio quidem crassitudinem habet humor, at diuturniore mora liquefens abit in humorem acrem & rodentem, quem

Cur tunc  
Tusses,  
Raucedi-  
nes, &  
Gravedi-  
nes?

Cur qui-  
busdam  
Tabes?

veteres vocant Pituitam falfam, natam ex pituita crassa, fuperueniente deliquante corruptione folutam. Hæc irritando perpetuam concitat Tuffim, quæ invertendo laudabilem pulmonis actionem intercipit humorum in nutritium commutationem; bonos huc affluentes fimili corruptela liquefacit: unde tandem confumto corporis nutriente pabulo, tuffiundo, & ejiciendo multum fputi pallidi & fpumofi pituitofî, minime purulenti, corpus lenta Tabe confumitur. Utinam æque confatet quibus auxiliis medicina valeret hanc incipientem curare Tabem? pectoralia enim omnia mollia, inducendo majorem pulmonibus debilitatem, pituitofî proventum augment: acriora exafperant tuffim; quare pauca in Phthifi fpecifica hoc conferunt. Hunc tamen morbum non effe incurabilem, nifi corpus ad marafmum fit redactum, experientia prædica me docuit: fumo aromatico, ex ftyrace, maflice, olibano, candenti præparæ injectis, fufcitato, cum aere infpirato, roborando pulmonis aerea vafa, fimulque iifdem & aliis refinofis atque balfamicis, refolventibus internis præveni novam pituitæ generationem in pulmonibus, atque ejus colligationem impediui antifepticis. Ita fenfum & lente miticebat tuffis, minuebatur fpumofi expectoratio, atque denique recuperatis viribus liberabantur a phthifi, & illa debili febre hectica.

## L I B. III. A P H. XIV.

93. *SI vero aquilonius & fine pluviiis ( autumnus ) fueris, iis quidem, qui natura funt humidi, & mulieribus commodus erit: reliquis vero erunt ophthalmiæ ficcæ, & febres acutæ, & gravedines diuturnæ: nonnullis vero etiam melancholiæ.*

I. **UT** fenfus hujus Aph. fiat perfpicuus, accipiendus eft, ut pars altera vel continuatio præcedentis, in quo fupponitur antecelfiffe Æftatem Siccam & Aquiloniam, & dein fequitur etiam Autumnus ficcus & aquilonius, quales tunc expectamus morbos Hyeme. Verum in præcedente complexus eft generalem prognofin in quovis fubjecto, hic autem facit fubjectorum diftinctionem, ut Pituitofis & humidis fit commodum: Biliofis autem infeftiffimum, quibus fierent Ophthalmiæ ficcæ & Febres Acutæ ac Diuturnæ, & aliquibus Melancholiæ, ut videre eft *Lib. de Aer. Ag. & Loc. H. a 344.*

Quid Autumni  
Siccus &  
aquilonius  
faciat  
post simi-  
lem æftatem.

Cur humidis  
& mulieribus  
post similem  
commo-  
dus?

Quid Biliofis  
& ficcis fa-  
ciat.

II. Si per æktivum aerem ficcum & frigidum partes firmæ fuere magis conftrictæ & humores compacti (*Aph. 92. II.*) permanente eadem conftitutione in autumno, effectus igitur funt majores per continuatam caufam, quare in corporibus temperatis ad Hyemem nimia obtinebit folidorum contractilitas, & in fluentibus nimia infiffatio & compactura: quare talia corpora magis difpofita tunc funt ad fufcipiendum Inflammatorium morbum, & Rheumatifmum.

III. Quæ autem corpora firmarum partium atonia & humiditatis abundantia fua natura funt prædita, tali aeris conftitutione, qua humidis abundantia tollitur, & invigorantur partes firmæ ad mediocrem & falubrem corporis habitum rediguntur; quare tales mulieres atque viri natura humidis bene degunt, imo melius quam quæ corpora aliter funt bene temperata.

IV. Quibus autem corporibus effe naturalis ficcitas & compactura humorum, hac continuata conftitutione in morbofam difpofitionem excedentem convertuntur. In Aph. tantum habet, *reliquis vero*, fed in *Lib. de Aer. & Loc. diferte dicitur, Biliofis autem infeftiffimum hoc tempus exiftit.* Sibi etiam appofitam addit rationem, fcilicet quod liquidiffimum ac aquofiffimum in bile eft confumitur, deniffimum vero et acerrimum relinquitur. Materia enim veteribus biliofa & aquofa non habet fimilem naturam; Aquofa non patitur compingi, fed manet femp

fluxi-

fluxilis & volatilis: verum materia Biliofa, quæ ipsis duplex est, nempe bilis ipsa oleofa & pinguetudo nostri corporis corrupta acris & calida facta veteribus est eadem materia, quæ non facile avolat, sed longa agitatione sensim redditur acrior; hæc vero humiditati mista & una macerata liquefcit, atque ita humido illo vehiculo absumitur, nisi longiori mora nimis oleofa & acris sit facta, amissa omni saponacitate, renuens cum aquosis unionem. Altera materia biliofa est pars magis nigra & terrestris, minus oleofa, sed magis glutinofa, potius ex sanguinis rubri parte compacta, quando raber color in nigredinem convertitur, quæ ipsis Melancholia audit. Hæc quoque difficile redditur compingendo volatilis, sed humiditati mista liquefcit. In utroque igitur temperamento, Biliofo nempe & Melancholico, Autumnus materiem præcedente Æstate compactam, ulterius sua siccitate & compactura majore compingit, nullumque concedit tempus liquefcendi & volatilizandi, unde tandem utrique hi humores incipiunt abundare, & in qualitate admodum degenerare, quod infestissimum est.

V. Superius Aph. 91. VII. observavimus, Ver siccum & aequilium generare etiam Ophthalmiam siccam, post Hyemem australem & pluviosam; videtur ergo hic fieri non posse eundem morbum, cum antecesserit Æstas & Autumnus siccus & aequilonaris. Hoc quoque credo. Sed hic habetur quidem idem nomen morbi. Ophthalmia sicca, id est oculorum inflammatio, rubedo, dolor cum adjuncta siccitate, sed propterea non est eadem causa hæc phænomena inducens. In præcedente iudicavimus dictum morbum naturam Erysipelatis sortiri, quia humor biliofus erat tenuis, acris & calidus: verum quia eadem quoque phænomena oriuntur ab Inflammatoria diathesi, verisimile mihi videtur, hanc Ophthalmiam potius ex Inflammatoria dispositione provenire; quare non dubitarem in hoc casu sanguinem mittere, alvum ducere, antiphlogistica præscribere, emollientia & laxantia oculis applicare, quæ curatio præcedenti speciei Ophthalmiæ siccæ minus conveniebat, cui adhibebimus simul adstringentia refrigerantia.

Cur Ophthalmia sicca?

VI. Si vero id pingue biliosum, longa compactura per ætatem & sequentem autumnum perducum fuerit in Hyemem, nunc ex sua consueta natura magis humidam, aliquo modo liquefcere incipit; id compactum, tam diu retentum, nunc liquefcens, non carebit acrimonia, & quia Hyems quoque parcam habet perspirationem, corpus illo alieno liquefacto & acri non facile liberabitur, sed diu cum ceteris humoribus circumductum, sensim in majorem acrimoniam evehitur, quod tandem succum forsan arteriarum inficiens, arterias in majorem motum irritat, seu febrem Acutam, id est vehementem & calidissimam, in hoc loco, excitat, atque diu durantem, (in Lib. citato habetur, *febris Acuta, a: Diuturna*,) quoniam materia illa irritans, longa mora facta, non patitur actione febrili cito subigi & expelli. Conduceret ergo in tali autumno corporibus siccis venam secare, alvum ducere, & uti humectantibus, ut promoveretur Lentoris solutio & expulsio. Sed si talis febris nata sit, tentanda est hujus materiæ commutatio in suppurationem, ut materia sub forma puris, vel per urinam, vel per abscessum, si aliter fieri non possit, eliminetur. In hujusmodi febribus acutis criticis dies observabiles esse confido; minus autem in iis, quæ ex præcedente, Aph. 91. constitutione nascuntur, observari criticas mutationes.

Cur febris acuta?

VII. In hoc loco variam invenio lectionem. In citato lib. coryzum non invenio; multi omittunt *χρυσίαν*, sed quoniam scopus non est omnia rimari exemplaria, ut vera habeatur lectio, sed ut perspiciamus rem ipsam, quæcumque lectio admitti potest, cum Hippocratis verba non majorem quam aliorum fidelium Observatorum auctoritatem habeant. Quare solummodo examinaturi, an, & quomodo præcedens aeris constitutio inducat, & qualem Gravedinem. Ex materia in Bilem vel Lentorem commutabili nostrorum humorum non concipio in hyeme forma-

Cur Gravedines diuturnæ?

ri tunc posse gravedinem: sed quando humorum pars, in pituitam lentam commutabilis, nimis compacta fuit, tandem accedente Hyeme colligatur in Membrana pituitaria, mihi verisimile videtur coryzam generare: quæ pituita veteribus Gypsea & lenta tenax, tam longo tempore confecta, hanc partem occupat, non videtur verisimile Coryzam brevi cessaturam. Quamobrem rei magis conveniens videtur legere, *Gravedines diurnas*: & quoque omitti posse hæc verba, si nolumus respicere ad morbos in hac constitutione ex Pituita provenientes.

Cur non-  
nullis  
Melan-  
cholicis?

VIII. Ex Aphorismi sensu & loco citato plane constat, Melancholiam post talem Autumnalem constitutionem non tam frequenter generari, quam morbos præcedentes. Hoc potuisset desumi ex minori numero Melancholicorum temperamentorum; sed tunc non credo Auctorem tantam in observationibus detexisse differentiam, ut hos morbos a præcedentibus distingueret. Credere malo Atrabiliaris ex natura per hanc constitutionem non semper ita affici, sed interdum materiem tenacem & terrestrem sanguinis continuata aeris siccitate & frigiditate resolvi & expelli, interdum vero compingi; quando vero materia hæc Melancholica compacta fuerit, verisimile est, ab hyemis clementia & humiditate resolvi, & circulantibus mista, ad cerebrum delata, cogitationes perturbare, & tale Delirium inducere cum tristitia, quod solum Melancholiam vocare.

### L I B. III. A P H. XV.

94. **E**X anni vero constitutionibus, in universum quidem, siccitates pluviosis sunt salubriores & minus lethales.

I. **V**arios morbos ex aeris humiditate & siccitate se invicem excipientibus hucusque agitavit, in hoc loco suggerit generalem observationem comparativam inter has duas constitutiones, & pronunciat siccitates salubriores & minus lethales esse pluviosis. De duplici hac prognosi multi intelligunt eandem esse sententiam; alii existimant differentiam esse pertinentem unam ad quantitatem, alteram ad qualitatem. Verum existimo constitutionem pertinere ad statum sanum, ut siccitates pauciores inferant morbos, & pluviosos plures; & propterea siccitates sanis salubriores esse. At minus Lethales perfringi puto ad morbis correptos, ut morbi ex siccitate nati pauciores interficiant homines; sed qui ex nimia humiditate nascuntur morbi, plures homines interimere. Intelligitur in utraque constitutione excessus, tam humiditatis quam siccitatis; cum mediocritas sit saluberrima; videndum igitur erit quali modo dictæ constitutiones inferant morbos, tam quoad frequentiam, quam ad difficultatem curationis, ut ex his observatis legitima comparatio possit elici generalis.

Quid fa-  
ciat ni-  
mia aeris  
siccitas in  
sanis.

II. In hoc loco, quia determinati sumus ad generalem observationem, non debemus nobis proponere subiectum aliquo temperamento præditum: nam si respiciamus ad temperamenta humida, Tempestates siccae salubriores essent ipsa modica aeris constitutione; e contra vero in aliis temperamentis bona & mala potest dici Tempestas sicca. Quare consideremus Temperamenta, ut vocant, Temperata, in quibus Tempestas tam sicca quam humida in excessu morbos inferre potest. Aer itaque siccior nos ambiens; & a nobis inspiratus, ratione humoris liquidissimum absorbit, crassius relinquit; ratione partium firmarum, istas magis contrahere facit, ut exsiccatio solidorum accurationem facit. His ita mutatis humidum, quod remanet in corpore, ultra modum compingit. Præcipuam humiditatem per insensibilem perspirationem auferit; quare inducit morbos ex nimia perspiratione, densitate humorum, & constrictis solidis. Si vero assequimur exitum horum morborum, & curationis difficultatem, experiemus hos morbos non admo-

admodum exitiales esse vel curatu difficiles. Quam primum enim aliquis ex hac causa in morborum incidit, statim quoque incipiunt partes firmæ, oborta debilitate, se dimittere & relaxari; vel si hoc non satis cito veniat, promoveri potest instituta venæ sectione, & adhibitis humectantibus, quibus emendantur nimium compacti humores, & humectantur siccatæ & constricta solida; atque ipsa debilitate, per morbum iuducta, non amplius compinguntur humores, sed minus compacti liquefunt. Quare hi morbi non admodum inveniuntur exitiales & curatu difficiles.

III. Si autem aer ambiens nimis diu fuerit humidus, morbitur insensibilem perspirationem, colligitur id excrementitium in pulmonibus & reliquo corpore; solida sunt ad humiditatem laxiora; humores minus compacti: quare in sanis corporibus per nimiam humiditatem generantur morbi retento excrementitio perspirabili, humoribus minus iusto præparatis & compactis, solidorum laxitate & humiditate. Isti morbi nati non tam facile per se vel auxilio medicamentorum abiguntur; nam accedente morbo, qui vires minuit, magis augentur hæc omnia mala, & crudum, tam diu retentum, solida uliginosa & laxa, humores crudiores, difficillime Medicamentis emendari possunt: imo non raro ægri his morbis diu vexati rapiuntur.

IV. Si nunc comparemus has duas constitutiones inter se, luce meridiana clarius patet, generaliter siccitates pauciores & facilius curatu morbos inferre, quam humiditates. Quare homines ad sanitatem conservandam non sine ratione querunt loca sicca, elevata, arenosa; evitant autem loca humida, depressa, uliginosa, minus propterea salubria. Unum præterea est morbi genus, quod temperatam humidam insectam facit, prompta nempe degeneratio in putredinem seu corruptionem, quare humiditas a quibusdam dicatur mater putredinis. Quæ enim corpora diu sine corruptione potuerunt servari siccatæ, accedente humiditate in corruptelam deliquefunt prompte. Quam difficile sit morbos ex putredine vel spontanea corruptione natos curare, norunt illi, qui sedulo exercuerunt aliquamdiu praxin medicam. Si modo hoc solo genere morbi aeris constitutio humida differret a tempestate sicca, satis esset hominibus insecta, cum vix ullum sit morbi genus difficilior curatu, & sæpius interficiens.

Quid faciat nimia aeris humiditas in sanis.

Siccitates pluviosæ sunt salubriores & minus lethales.

## LIB. III. APH. XVI.

95. **M**orbi autem in pluviosis quidem plerumque sunt, & febres longæ, & alvi fluxiones, & putredines, & epileptici, & apoplectici, & angina. In siccitatibus vero, sabidi, opthalmia, arthritides, stranguria, & dysenteria.

I. **G**eneralem regulam de Aeris Siccitate & Humiditate in hoc Aph. exemplis particularibus conatur Auctor adstruere: quare ad sequentium morborum frequentiam, & faciliorem vel difficiliorem curationem debemus attendere, ut constet, quænam aeris constitutio humida sit sicca sit, magis, minusque salubris aut lethalis.

II. Quid Pluviosum Ver (Aph. 90. III.) Hyems (Aph. 91. I.) & Autumnus (Aph. 92. III.) faciat, retro observavimus, prout una alteram excipiebat aeris constitutio: hoc loco generalis est habenda observatio de iis morbis, qui plerumque sunt omni anni tempore, modo Tempestas sit humida & pluviosa. Quid autem generaliter faciat Aer humidior & pluviosus in corporibus ceteroquin sanis, nulla idiosyncrasia vel temperamento particulari præditis, recensuimus supra, (Aph. 94. III.) Quare hoc loco videndum, cur producat febres longas frequentius & curatu difficiliore. Frequenter nulla est causa febrem inducens, quam

In pluviosis febres longæ.

perspirabile excrementitum retentum : hæc enim evacuatio præstantissima & perpetua corpus nostrum liberat ab omni inutili excrementitio magis , quam per omnes sensibiles evacuationes simul , ut nos docuere experimenta statica ( *Persp.* Cap. 12. XXXIX. ) Hoc retentum in Acrimoniam converti , etiam ( *Persp.* 12. XLVI. ) demonstravimus . Acce istud organum motus vitalis applicatum suo stimulo febrem excitat , quæ durabit , donec id alienum vel sit subactum vel expulsum . Quia vero corpora tempestate pluviosa sunt enervata , & manente aeris humiditate parcius perspirant , non facile erit eam materiem subigere & expellere : imo dubito , an subactio sit possibilis , cum materia perspirabilis actione vitæ inutilis facta haud possit eadem actione assimilari , aliud vero crudum facilius posse subigi , credere malo . Inde ex hac causa non solum febris frequentior , sed & diuturnior & periculosior generatur . Præstantissimum ergo esset ad præveniendas has febres uti Diaphoreticis roborantibus ; sed si nata sit , amaris sudoriferis & calefacientibus diu adhibitis hujus materie præparatio & expulsio est tentanda , cum id alienum , quod exire fuit cohibitum unica vice excutere non valeamus .

Alvi Rationes.

III. Materiem perspirabilem retentam ex tali aeris constitutione , interdum ferri ad intestina , facientem alvi fluxionem , olim ( *Persp.* 12. LVII. ) quoque observavimus . Sed quoniam quivis humor suo appropriato organo est secerendus & evacuandus ( *Aph.* 21. III. & IV. ) quod deponitur , minuit quidem copiam generalem , minime vero id speciale , quod prohibita perspiratione fuit retentum . Manet ergo alvi fluxus diu , sed sine levamine , cum morbi materiam hac via eliminare non valeat . Ut talem sistamus alvi fluxum , humor morbosus est ad cutim ducendus , & eo evacuandus , quod in permanente aeris humiditate difficulter obtineri potest , quare hic etiam morbus curatu est difficilis , & non caret periculo . Præveniendus autem erat laudata methodo .

Putredines.

IV. Pluviosi dies multis modis inducunt morbos Putridos , & frequentes , & curatu difficiles . Corpora enim corruptibilia , quæ sicca potuissent ad longum tempus asservari , si humectantur , brevi putrescunt . Qui humores accentur a corruptione modica actione vitali in nobis viventibus , debilitata hac actione , ut fit in enervatione virium , per aerem continuo humidum , sponte sensim incipiunt corrumpi & putrescere . Quod absolvit munus , nobisque inutile est factum , evacuatione destinatum , si retinetur in corpore , ut fit ab aere humido inhibente perspirationem insensibilem , functionibus obeundis impar , tandem in putrilaginem convertitur . Imo aer in continuis pluviis , miasmatis putridis ex tellure asurgens mistus a nobis haustus , egregie vel in sanissimis corporibus putredinem inducit . Sed si morbus Putridus sit natus , eum difficile curari posse , diu durare , & non carere periculo , constans est observatio practica . His in casibus non solum cogimur antisepticis uti , sed quæ etiam absorbendo abliguriunt omnem humiditatem , ut ulterior progressus putredinis ablato humido impediatur .

Epileptici.

V. Quid sit Epilepsia , superius ( *Aph.* 70. II. ) definivimus , simulque demonstravimus . acce quodvis partibus nervosis applicatum hunc motum validum & inordinatum concitare posse : ergo demonstrare restat , ab aere humido & pluvioso generari posse acrimoniam , quod cum satis in præcedentibus sit demonstratum , non eget ulteriore sermone . Observatio etiam practica constanter affirmat , passionem hysterica & hypocondriacam multo frequentiores hujusmodi aeris constitutione facere paroxysmos , atque homines mobilitate laborantes convulsionibus tentari , quam temporibus serenis : Quia id acre , quod solent per insensibilem perspirationem evacuare , retentum , & nervis applicatum motum convulsivum hunc excitat . Quare hujusmodi species Epilepsie volatilibus , & diaphoreticis , nisi nimis altas egerint radices , subtilissimus omni male exhibitis ad promovendam perspirationem .

VI.

VI. Apoplexiam superius ( Aph. 67. I. ) definivimus, eam generari posse ex omni abundantia humorum cerebrum comprimente, ita cuius notum est, ut vix mereatur probationem, eamque esse morbum periculosissimum, demonstravimus ( Aph. 67. IV. ) Ergo hic solummodo notandum venit, in aere Pluvioso generari humorum abundantiam, quæ obruens cerebrum, Apoplexiam infert: verum minuta perspiratio & solidorum laxitas hanc causam satis arguunt; quam ob rem frequentius expectamus in hac quam alia tempestate Apoplexiam. Quæ subitaneam sanguinis missionem & alvi ductionem exigit, ut minuatur humorum abundantia cerebrum opprimens, dein vero nova accumulatio est prævenienda, & partes laxiores roborandæ, evitando omne, quod humefcat, sed adhibendo, quod roborando exsiccat.

VII. Difficilis respiratio vel deglutitio nata ex causa afficiente Laryngem vel Pharyngem, vel utraque partes simul, a medicis generali nomine Angina vocatur: propterea quod sunt morbi varii has partes afficientes, ut inde impediatur vel molestior fiat Respiratio & Deglutitio, vel unum ex his, tot sunt varæ species Anginæ. Ex his speciebus solent Anginam veram vocare, quæ ab inflammatione his partibus oritur. An vero Hippocrates in hoc loco intelligat Anginam veram, vehementer dubito, quoniam dies pluviosi non inferunt Inflammationes, sed potius tumores œdematosos & catarrhosos. Ex hac ratione judicarem, Anginam nunc fieri ex tumefacta membrana faucium & Laryngis, angustante viam pro cibi & aeris transitu. Causa hæc etiam si levissima in aliis partibus corporis, hic vero summum periculum portendit, nam si pergat tumor occludens aeris transitum, homo suffocatus perit. Prompta igitur sunt adhibenda auxilia, quæ tumorem hunc laxum, œdematosum, seu pituitosum solvant & discutiant, gargarizando, manducando, fovendo iis, quæ experti sumus sine tumefactione huiusmodi tumores discutere.

VIII. Quoniam auditor agit de constitutionibus morbum inferentibus, facile in telligitur, in hoc loco non concipiendum esse mediocrem sed excedentem siccitatem ( Aph. 86. I. Aph. 94. II. ) quæ morbum producere potest; de hac autem dicit salubriorem esse, id est minus frequentes morbos producere & minus lethales. In pluviosis numeravit sex diversos morbos; in siccitatibus autem quinque, ergo hoc non facit tantam differentiam, ut inde major & minor salubritas poruisset deduci. At vero qui sequuntur morbi, multo rarius ingruunt, quam præcedentes in humiditate. Ex hac ergo ratione potest siccitas dici salubrior. An vero minus Lethales sint, facile constabit, si difficultatem curationum in sequentibus conferamus cum curationibus præcedentium. Primus morbus citatus est Tabes, de cuius significatione non consentiunt Commentatores, & ipse Galenus existimat, hanc vocem pertinere ad Ophthalmiam, ut denotaret extabescientiam oculorum. Sed quid juvat auctoritatibus litigare? nonne his etiam temporibus valentius observationibus determinare, num Phthisis purulenta ex Pulmonis ulcere nascatur ex aeris siccitate? non experimur autem sicciozem, modo absit nimius calor, generare Tabem, quare potius substituerem emaciationem, morbum corpulentæ oppositum, quia aer siccior nimis absorbit humiditatem corporis. Sed si fiat oppositio inter Emaciationem per siccitatem, & Intumescientiam ex Humiditate, magna invenietur differentia, forsitan decies occurret Intumescencia aquosa, dum ne semel accidat emaciatio. Atque Aer siccior per vaporem exhalantem facillime humefcari potest: verum ad aerem liberandum a vapore humido vix ulla habemus auxilia.

IX. Oculorum tunica adnata & cornea quia lachrymis continuo est irriganda, ex earum defectu non mirum, has membranas exarescere, ut fit ex nimia ablatione humiditatis per aerem sicciozem; hæc membrana aridiores facit aliquo modo inflammari incipiunt, sed si oculi foveantur liquido molli & humefcante, similique instillantur

Aph. 10. Sici.

Anginæ.

In Siccitatibus Tabidi.

Ophthalmia.

collyria; nulla est Ophthalmiæ species; quæ faciliorem curationem admittat.

*Arthriti-  
des.*

X. Si auctor indicaret dolorem vagum articulorum, vel Podagram, omnino erraret, quum hi morbi multo frequentiores sunt in aere pluvioso, quam sicco: sed si quemcumque dolorem articulorum, verbi gratia ex mucii articulorum defectu & rigiditate ligamentorum, quibus articulus cum dolore movetur, indicaret, assentior; verum talis morbus ex hac causa raro occurrit; & natus foru & potu humectante facie tolleretur.

*Strangu-  
ria.*

XI. Urina duplici constat materia, una est urinæ propria, quæ non patitur per alia organa excerni; altera est communis, augeat, si cum priori exit, urinæ quantitatem, sed & potest etiam per Diaphoresin atque alvum evacuari: hæc est magis aquosa diluens & lenis. Quo urina de hac materia majorem copiam admistam habet, eo minus observatur acris: ea autem privata redditur acrior & saponacea. Quoties vero aeris nimia siccitas omnem fere humiditatem abstulit per cutim & pulmones, non solum generatur urina parcior, sed & simul acrior & magis saponacea abstergens. Illa transeundo per urethram, mucum naturalem abstergens, tangit urethræ nuda latera, quæ irritata urethram toties constringunt, quoties urina per eam descendit, id est guttatim & cum molestia emitti potest urina. Fit quidem ab hac causa interdum stranguria, sed tamen frequentius ab humorum acrimonia. Unde hic morbus quoque minus frequens, quam præcedentes ex aeris humiditate. Atque hujusmodi stranguriæ curatio esset facile superanda largiori hydrogalactis potatione.

*Dysente-  
ria.*

XII. Quod monuimus de Urinæ difficultate, etiam ad Dysenteriam applicari potest, ut defectu humiditatis in alve excrementis, reliqua fiant acriora, intestina stimulantia, atque ita non solum dolorem seu Tormina ventris inferentia, sed etiam frequentem dejectionem statuum, loco excrementorum faciant, quam speciem hodie vocarent Dysenteriam siccam. Morbus equidem ex hac causa rarissimus, & qui portione molli copiosiori facile cederet, vel injectione in intestinum colon ex similibus facta facile obtemperaret. Veritas igitur præcedentis Aphorismi his adductis exemplis plane constat, morbos ex humiditate aeris natos frequentiores esse & magis lethales.

### L I B. III. A P H. XVII.

96. **Q**uotidiane autem constitutiones, aquilonie quidem, corpora compingunt, & robusta, & facile mobilia, & bene colorata, & melius audientia faciunt, & alvos siccant, & oculos mordent, & dolorem circa thoracem, si quis præexistat, majorem faciunt. Austrina vero corpora dissolvunt, & humectant, & auditus graves, & capitis gravitates faciunt, & vertigines in oculis, & corporibus motum difficilem, & alvos humectant.

*Aphorismi  
sentus.*

I. **B**ipartito hoc Aph. conatur Auctor ulterius adstruere, Siccitates Pluviosas salubriores & minus lethales esse, & ut in priore solas mutationes humiditatis & siccitatis agitavit, in hoc Aph. siccitatem jungit frigori & humiditatem calori: agit enim de Aquilone & Austro, qui venti his qualitatibus sunt præditi (*Apb. 84.*) De iisdem quoque egit supra (*Apb. 84.*), ubi recitat morbos duntaxat si talis ventus dominatus fuerit: hoc autem loco bona & mala annumerat, quæ profluunt ex quotidiana eorum ventorum constitutione, ut probet siccitates cum frigidityte salubriores esse & minus lethales, quam humiditates cum calore: quam sententiam non potuit præcedente (*Apb. 84.*) affirmare, in quo sola mala minime vero bona proponuntur: hinc necesse erat novam proferre sententiam. Quam ob rem vero hic primo proponit Aquilonem, & dein Austrum, dum contrarium fecerat in præcedente, non video aliquid involvere arca-

ni,



ni, potuisset enim æque ab Aquilone quam Austro incepisse. In hoc autem pendendum est, quid boni & mali faciat Aquilo seu Aer siccus & frigidus, quid Austro seu Aer calidus & humidus, ut constet, aquilonem esse salubriorem & minus lethalem. Hic autem non intelligitur mutatio unius venti in alterum, sed si hi venti sint quotidiani in quovis fere anni tempore, ut si per totum annum vel Aquilo, vel Austro multum spiraret.

II. Quæ causæ duo corpora laxè coherentia ita uniunt, ut acquirant maiorem coherendi firmitatem, compingentes dicuntur: in partibus itaque solidis nostri corporis per Aquilonem fieri debet firmior nexus: & in fluentibus, partes liquorem componentes maiorem cohesionem acquirere debent. Per Aquilonem intelligit aerem sicciorem & frigidiorē; nostras autem solidas partes modica exsiccatione, qua humidum partibus elementaribus partium fibrarum mistum auferatur, magis fieri coherentes & tenaces, experimenta physica omnia comprobant, ita membrana, & chorda humida per modicam exsiccationem fit tenacior & firmius coherens. Atque frigus etiam, nisi modum superet, quando transit in fragilitatem, omnes membranas & fibras magis coherentes facit. Binæ itaque causæ junctæ admodum compingunt partes firmas nostri corporis. Ita etiam in liquidis seu fluentibus fit, nam exsiccatione ablata pars aquosa ex reliquis magis concreviscibilibus facit, ut massa remanens magis sit compacta: atque frigus in omnibus liquidis ita augeat cohesionem, ut calor dissolvit. Quod igitur olim observavit Auctior, hodie experimentis physicis confirmatur.

Aquilonis  
corpora  
compingunt.

III. Robur hoc loco duplici sensu accipi potest. Primo, corpora, quæ, ab externis injuriis non facile læduntur dicitur robusta, qualia inveniuntur in regionibus septentrionalibus, cum aquilonis frigiditate & siccitate non solum solida magis fiant compacta & tenaciora, sed & potentiorē contraditionem exerceant, quare non tam facile tonum per causas externas amittunt. Secundo, fibræ musculares, quo sunt magis contractiles, eo ab eodem spirituum influxu fortiorē & constantiorē exercere possunt actionem, quæ actio validior & constantior quoque vocatur Robur.

Robusta  
faciunt.

IV. Facile mobilia corpora videntur opposita austri compacturæ, sed nomen, quo utitur Auctior, denotat agilitatem & mobilitatem, nempe talia corpora, quæ facile exercere possunt motum muscularem: tunc autem omnino congruit præcedentibus, nam solida compacta & robusta simul fiunt agilia, quoniam talia organa muscularia a spiritibus influentibus promptius & majori vigore moveri possunt, dum vero corpora majore calore & humiditate redduntur segnia & laxa. Forsan frigus junctum siccitati puriores facit in nostro corpore preparari spiritus minusque exhalantes. Invenimus enim, in hyeme sicca non solum motum muscularem expeditiorē fieri, sed etiam viscera chylicationis promptius & facilius subigere alimenta: ex quibus constat, omnes actiones tunc fieri validiores.

Facile  
mobilia.

V. Color partium firmarum nullus potest dici, quia omnis color varius in nobis dependet a calore liquoris transluentis, imo nigrum colorem Æthiopum & in oculis demonstrant fieri a pigmento nigro partibus firmis adhærente, cum solida nostri corporis omnia ab omni humiditate privata sint candida vel pallida. Coloris igitur mutatio præprimis in facie, quoniam ad huius partis colorem attendit Auctior, declarat varium humorum transluentium statum. Quod si sanguis noster constet colore eleganti rubro & lymphæ pellucida, faciei color est ruber vel roseus, qualis ab omnibus statuitur optimus, quia talis est sanguinis bene preparati color naturalis: quoties vero quantitas rubri sanguinis minuitur, facies pallet: si lymphæ autem corrumpitur & flavescit, faciei color fit luridus, & ut hodie vocamus, cachecticus. Ille autem color constans esse debet minime fugax, uti in phlogosi & pudore. Hipp. dicit corpora ab Aquilone fieri Colorata,

Bene eo-  
lorata.

ta, intelligit ergo Aquilonem plures facere globulos rubros in sanguine, & servare lympham ab omni corruptela. Globulos autem rubros valida actione circulationis fieri, ex iis quæ in *Comp. T. 31.*, XII. ad XXIII. adduximus, colligi potest. Humores quoque in tali vento sicco & frigido minus corrumpi, sed perfectius præparari ex antecedentibus deduci potest. Et quoniam in hoc loco comprobavimus actionem corporis vegetiorem fieri, nullum restat dubium, quia veram observationem protulerit Auctor, quæ etiam constanti observatione hodierna ulterius adstruitur.

Melius  
audien-  
tia.

VI. Duobus modis per aeris mutationem Auditus fit melior, id est, idem sonus ex corpore sonoro emanans facilius vel & ad majorem distantiam potest audiri. Primo si aer sonum transferens omni humiditate sit liberatus; quo enim aer est magis vaporosus & nebulosus, eo magis a vapore minus elasticus, quam est purus aer, obtunditur tremulus motus soni, quare a nobis tam facile audiri nequit. Dein aer siccus & frigidus tendendo partes firmas nostri corporis facit, ut membrana tympani facilius contremisceat, ut inde melius sonum percipere possimus. Tot bona ex Aquilone profluunt, quare auctor concludere potest, Aquilonem esse salubrem. Alterum nunc est demonstrandum, minime esse Lethalem.

Alvos sic-  
cant.

VII. An alvus siccior inter bona vel mala signa sit numeranda ambigo: eam autem exsiccare non recedit a ratione, quamvis ego hoc in ægris non satis constanter observare potui (*Aph. 84. IV.*) Major utique actio per aerem frigidiorē & sicciorē potest promtiorē & perfectiorē facere ex intestinis absorptiorē, unde feces fiunt magis compactæ, modo continetur satis larga perspiratio: sed si aeris frigiditate parciore fiat in quibusdam perspiratio, alvus redditur laxior; quæ forsitan fuit causa, quod minus constantem hunc effectum observaverim.

Oculos  
mordent.

VIII. Aer autem siccus frigidus magis operatur in partibus nudis, quas tangit, ut in oculis, hi ab aere frigido & sicco nimis contringuntur, & suppressa secretio smegmatis oblinientis facit, ut oculi nimis siccati, contracti, in suis membranis, & sinegmate privati aliquo modo doleant. Ille autem morbus curatu est multo facilius, quam præcedentis dolores ex ophthalmia, (*Aph. 90. IV. Aph. 91. VII. Aph. 93. V. & Aph. 95. IX.*) nam si tegantur oculi molli fomento, brevi evanescit hic morbus.

Dolorem  
pectoris  
augent.

IX. Quod statim observavimus in morfu oculorum, id quoque in Pectoris dolore verum est: nulla enim pars magis est aeri exposita quam pectus, intus enim per totam pulmonis compagem singulis inspirationibus distribuitur inspiratus aer, qui frigidior & siccior fibras pulmonum & pectoris magis constringere facit; in quibus si præcesserit dolor, ab hac constrictione augetur. Sed incrementum huiusmodi doloris, quia vapore calido facile lenitur, non potest inter morbos lethales numerari, qui erat probationis scopus ab Auctore, quo hos omnes effectus constitutionis Aquilonaris adduxit.

Austrina  
corpora  
dissol-  
vunt &c.

X. Nunc tandem aggregitur alteram partem, ut constet aerem calidum & humidum minus salubrem esse & magis Lethalem: & dicit Austrinas quotidianas constitutiones Corpora dissolvere, auditum graviorem facere, & capitis gravitatem producere, ut supra *Aph. 84. III.* Videretur igitur inutilis repetitio: sed si perpendimus scopum, non erit ejusdem repetitio inutilis. Superius enim solummodo numeravit morbos ex Austrina constitutione provenire solitos: hic autem demonstrare vult, hanc quotidianam constitutionem minus salubrem esse & magis lethalem: quare necesse erat ut proferret morbos frequentiores & magis lethales ex hac quam ex Aquilonia constitutione. Qui nunc examinat frequentiam horum morborum & difficultatem curationis cum morbis & effectibus ex aquilonia provenientibus, facile perspiciet, Hippocratem veritatem dixisse. Corpora dissolvere hoc loco notat laxare, segnia & inertia facere, unde etiam in oculis &

cor.

corporibus fit motus difficilis; id est, membra moventur majore difficultate, quasi facta essent ponderosiora, quando ægri accusant aeris gravitatem.

XI. Hæc sufficere potuissent ad generalem intellectum, sed quoniam invenio variam lectionem, & quia varia commentata sunt de Vertigine, hæc pauca clarioris intelligentiæ ergo adjicere volui. In Editione *Ab Almelooven*, quam sequor, habetur *Vertigines in oculis*; ita etiam in *Lindeni* Editione. *Foesius* autem, & *Vertigines afferunt, oculis & corporibus*, &c. *Mercurialis*, *Tozzus*, *Sorbaix*, *Heurnius*, & fere omnes sequuntur *Foesium*, utpote rei magis convenientis, nam sufficit dicere Vertigine laborare brevitati studendo, ut noster Auctor, ut non opus addere in oculis. Sed quod majoris momenti est, non satis exponunt modum, quo Aultrina constitutiones inducant Vertiginem frequentiore & curatu haud facilem; quod hic requiritur ex scopo Auctoris nostri. Quid sit vertigo, facile concipitur, si modo attendamus ad mutationem inductam in nervo optico in oculi fundo locato, quando revera videmus corpora in gyrum vel vorticem agitari. Imagines pictæ tunc successive in oculi fundo supra pulpam nervi optici mutant situm: quamdiu talis imaginis mutatio motu rerum extra oculum positarum producitur, intelligimus ea corpora moveri; si vero motu inordinato vel musculorum vel fibrarum in tunicis oculorum, vel ligamento ciliari, vel etiam in capsula nervi optici, ita inordinate movetur oculus, ut incidentes imagines rerum externarum situm mutant inordinata agitatione oculi; hæc representata imaginis motio vel circumgyratio est morbus, quem Vertiginem vocamus. Agnoscit igitur omnes causas, quæ distas partes inordinate movere possunt, vel ipsum cerebrum agitare ad originem nervorum opticorum; quæ causæ multiplices esse possunt, quarum quædam generari possunt a constitutione Aultrali, nam si modo propter aeris calorem & humiditatem putrefactum ducitur ad cerebrum, vertigo generatur frequenter recurrens & non facilis curatu: in quo casu siccantia absorbentia forma epithematis capiti applicata magni sunt usus, ut id tenue & acre stimulum motum inordinatum inducens auferatur.

Vertigines  
faciunt.

### L I B. III. A P H. XVIII.

99. *Secundum tempora autem, vere quidem & prima æstate, pueri & bis ætate proximi optime degunt, & maxime sani sunt. Æstate vero, & autumno ad aliquam quidem partem, senes. Reliqua autem Autumno, & hyeme, qui medii sunt ætate.*

I. IN superioribus observaverat Hipp. (*Aph. 82. IV.*) quibus temporibus anni ætates magis minusque erant convenientes generaliter; hoc autem loco speciatim agit. Ætatem in tria tempora distinguit: (1) tempus Incrementi, per hæc verba *Pueri, & bi ætate proximi*. (2) Decrementi, nempe *Senes*. (3) Status seu vigor vitæ, scilicet *Media ætas*. Itidem dividit annum in tres partes inæquales, ut pro Vere & Autumno intelligat quartam singuli anni partem, sed pro Hyeme anni partem dimidiam: veris initium mihi videtur ponere circa æquinoctium vernale, & continuare ad solstitium æstivum, quam ob rem dicit *Vere, & prima æstate*: ponens initium æstatis circa solstitium æstivum, & extendens ad æquinoctium autumnale, sed pro reliquo tempore accipit spatium temporis ab uno æquinoctio per hyemem ad alterum æquinoctium. Hæc Temporis divisio omnino quadrat divisioni Ætatis; ut Ver ponatur pro ætatis incremento; Æstas, reliqua pars Autumni pro Ætatis decremento seu senectute; denique ut dimidia pars anni tribuitur Hyemi, ita etiam dimidium Vitæ tempus concedatur Ætati mediæ. Secundum hanc divisionem Temporis & Ætatis videndum erit, quomodo possit dici corpora optime degere & maxime sana esse.

Scopus  
Auctoris.

Puerorum  
& veris  
naturalis  
convenien-  
tia.

II. Per Pueritiam hic cum Auctore non intelligo strictum tempus puerili ætati datum, sed totum tempus a nativitate usque dum corpus non amplius increfcit ad vigefimum, vel vigefimum quintum ætatis annum. Toto hoc tempore corporis vires non fatis sunt firmatæ, sed quo minus distat ætas a nativitate, eo vires sunt minus firmatæ, non potentes ferre externas injurias, egentes auxiliis rerum externarum, donec fatis confirmatæ sint. Viciffim autem constitutum est cum anni Tempestate, ab æquinoctio vernali ad solstitium æstivum sensim fit majus fructificationis incrementum, quare etiam corpora animalium fere eodem modo ut vegetantia facilius acquirunt incrementum: in plantis hoc certo constat experimento, Vernali tempore ceteris paribus semina terræ commissa melius progeminare quam post solstitium æstivum: hoc etiam Hippocratem sedula observatione in nostris corporibus incrementibus detexisse, quod manifeste in plantis observatur, non est sine ratione. Inde ver non solum omnibus saluberrimum (*Aph. 88. VI.*) sed maxime Pueris ex allegata ratione. Principium autem veris maxime conveniens videtur infantibus, sed finis veris adultioribus.

Sanum &  
Ætatis  
naturalis  
convenien-  
tia.

III. Post constantem autem ætatem si vires nostri corporis sensim magis languere incipiunt, hoc tempore nulla spes est Vernali tempore ut in pueris novas recuperari posse vires, sed quod viribus languentibus non potest concoqui, res externas exigit coctione promoventes. Senes defectu coctionis præprimis laborare, superius (*Aph. 65. V.*) & egere calefacientibus (*Aph. 14. V.*) observavimus: quomobrem istud anni tempus, quod fructus crudos maxime ad maturitatem concoquit, ut tempus anni a solstitio æstivo ad æquinoctium autumnale, admodum conducit senibus. Sed quod observavimus supra de Incremento ætatis contra incrementum anni, id quoque hic locum habet: nam circa solstitium decrepita senectus optime degit, sed crudior senectus facilius fert æquinoctium autumnale.

Medic  
tatis &  
hyemis  
naturalis  
convenien-  
tia.

IV. Media autem & constans Ætas per se satis valens ingesta præparare, & expellere aliena, viribus pollens, plus periculi ex nimis instigatis quam debilitatis viribus expectat, quare a solstitio vernali ad solstitium autumnale sæpe incidunt in Hæmorrhagias, Inflammationes & morbos acutos calidos, quod tempus anni calore luxurians nimis intendat eorum corporum actiones. Hyemalis autem frigiditas temperans hunc nimium motum facit, ut talia corpora rarius corripiantur morbis. Ex his igitur constat, quibusnam in corporibus ad sanitatem conservandam instituire Dietam debemus calefacientem aut refrigerantem: scilicet calefacientem conducere pueris, sed maxime senibus; sed refrigerantem constanti ætati & robustis.

# *L I B. III. A P H. XIX.*

98. *M*Orbi autem omnes quidem in omnibus temporibus sunt & nonnulli vero in quibusdam ipsorum magis & sunt, & exacerbantur.

I. *A* Principio hujus sectionis seu *Aph. 80.* proposuit morbos ex anni temporibus, tempestatibus, & ætate vario modo inter se mixtis; nunc vero ulterius tradit regulas observationum in quatuor anni temporibus, & dein in ætate varia: ne igitur aliquis judicaret hæc omnia absolute poni, hunc Aphorismum interponere voluit, ut cuilibet constaret, dictas observationes non ita constantes esse, ut quoque lidem morbi non potuissent fieri aliis anni temporibus; inde enim præcipit, omnes morbos quidem in omnibus temporibus fieri, sed tamen istis temporibus frequentius generari & magis exacerbari. Duo in hoc Aph. sunt exponenda, primo omnes morbos omni tempore fieri posse, & dein si fiant morbi, temporibus conspirantibus magis exacerbari, & frequentiores esse.

II. Si

II. Si sola anni mutatione in nobis generantur morbi, necesse foret, ut istis temporibus quoque haberentur iidem morbi; sed & sunt præterea multo plures classes causarum morbos inferentium sibi proprios; ita enim supra observavit ætatis mutationem certa genera morborum inferre, ita ventus, atque varia aeris tempestas, non raro in victu commissus error, vel quævis res externa omnibus temporibus morbos inferre solet. Morbi Endemici & Epidemici ab aere infecto non ita constanter sequuntur anni tempora. Quare etiam in Æstate conspicitur Hydrops, Vere febris quartana, Hyeme febris Ardens, & morbi biliosi, cum accedentes causæ alieno anni tempore insolitis istis temporibus morbos inferant.

Morbi omnes  
omni anni  
tempore  
feri  
possunt.

III. Quoniam vero omnes causæ morbum inferentes omni tempore incidere possunt, qui morbi favens habent simul anni tempus, necesse est, ut hoc tempore frequentius fiat: sæpe enim causæ solitariae, nisi cooperans habent anni tempus, non producerent morbum, imo sola anni mutatio certum genus morbi cum levissima morbosa causa generare potest; unde his temporibus morbi temporales sunt frequentiores: raro enim vere & principio ætatis sunt morbi ex prohibita perspiratione; & hyeme morbi putridi, quoniam aeris naturalis mutatio his temporibus parum favet generationi horum morborum. Qui autem dictis temporibus corripuntur morbo, de iis dicit magis exacerbari, id est, graviores paroxysmos faciunt, & medicamentis, vel benignitate naturæ curati frequentius recidunt: ut experimur in Hydrope, & febre quartana autumnali tempore. Huic sententiæ obviare videtur, quod dixit Auctor Aph. 50. V. sed si accipitur morbus tempori magis similis, ut ibidem interpretati sumus, nulla restabit differentia.

Morbi  
magis  
sunt suis  
temperi-  
bus &  
magis ex-  
acerbantur.

## L I B. III. A P H. XX.

99. **N**am vere quidem insania & melancholia, & epilepsia, & sanguinis fluxiones, & angina, & gravedines, & raucedines, & tuæ, & lepræ, impetigines, & vitiligines, & pustula ulceroſa plurimæ, & tubercula, & articularum dolores.

I. **U**T probet, quod posuit in præcedente, morbos omnes omni tempore fieri, initium facit ab iis, qui Vere interdum fiunt, & tamen ad morbos aliorum temporum potius pertinent; ut insania, epilepsia, melancholia, angina potius referuntur ad morbos Autumnales; grævedo autem, raucedo, tussis ad Hyemales; hæmorrhagiæ, pustula ulceroſa ad morbos Ætivos. Ex quibus constat, hos morbos plerumque fieri aliis temporibus anni, sed & etiam Vere observari provenientes ex causis aliis quam a naturali mutatione aeris. Hoc certissime constat in iis citatis morbis, qui nomen habent ex causa. Sed in aliis, qui ex phænomeno, ut insania, epilepsia, angina &c. nominantur, admittentes causas varias, non est opus præter naturalem temporis mutationem aliam assignare causam, cum tales morbi æque ex causa hyeme, æstate &c. nata quam quæ vere generatur, produci possunt: ita alia est Angina Inflammatoria, Erysipelatoſa, Pituitoria, Convulsoria, etiamſi morbus generaliter vocetur Angina, quod etiam de ceteris est intelligendum.

II. Demonstravimus superius (Aph. 88. VI.) Ver esse saluberrimum; videtur autem obſtare, hic tam multos citari morbos etiam curatu difficiles & periculosos. Si vero attendimus ad scopum huius Aphorismi, nulla erit difficultas. Nam in superioribus demonstratum fuit, Ver saluberrimum esse & minime exitiale, quoniam naturalis aeris mutatio conducit ad sanitatis conservationem & curationem morborum, quod quoque in hoc loco adſtruitur: sed etiamſi anni tempus sit admodum favens, aliena hoc tempore tempestas, vel & reliquæ causæ morbum

Ver quæ  
lis mor-  
bos pro-  
ducit.

bum inferentes possunt tamen Vere generare morbos, quod in hoc Aporismo adstruere vult. Imo ipsum saluberrimum Ver, uti dicit Galenus, corporibus impuris morbos parit, sed puris est saluberrimum. Ut cum fructu sequentes morbi deducantur ex naturali aeris mutatione vernali tempore, in memoriam revocandum est, antecessisse hyemem, in qua minor fuit facta perspiratio, collectio humorum tam sanorum, quam excrementitiorum & morborum, qui vere accedente debebant diffiliari: si autem illa collecta materia evacuationi inepta actu non evacuarur, quæ in frigore mansisset quæta, nunc ab accedente calore magis maturefcit, tam in malam, quam bonam indolem; & quæ in malignitatem commutata fuit, nunc magis quam præcedente hyeme sævit, quamvis puris corporibus Ver sit saluberrimum.

Infans  
& Melan-  
cholicus.

III. Infans seu *Mania* vocatur omnis morbus, in quo observatur mentis aberratio vehemens cum furore, & sine febre; nam quoties febris adest, Phrenitis vocatur; sed si sit sine febre, verum cum tristitia & timore, Melancholia vocatur; quare in sequentibus indicabitur, Infaniam interdum solvi fluxu hæmorrhoidum, quando est Delirium ex atra bile: si vero absit furor, & febris, sed fiat delirium cum mansuetudine, dicitur Fatuitas. In hoc loco citat Auctor Maniam & Melancholiam, videntur hi morbi utrique ex eadem materia hyeme collecta, & vere acriore facta generari. Quando enim antecedente hyeme materia tenacior, coloris nigri, quam veteres vocant humorem atrabiliarium seu melancholicum, in vena portarum præcipue fuit retenta, ab accedente solis calore vernali tempore incipit solvi, & acrior fieri, sanguini venæ cavæ tradita fertur ad cerebrum, ita cerebri actionem perturbat, ut homo mentis impos fiat, generatur inde varia species insipientiæ, prout magis minusque fuerit exaltata & degenerata, ut inde fiat Delirium sine febre, sed cum furore, vel cum tristitia & timore. Qualis autem sit propria hic mutatio produciens Maniam vel Melancholiam, determinare non valeo; neque in prædictione aut curatione ullam parit differentiam, sufficit enim scire, hominem Vere deliraturum: & in utrisque id agendum est, ut eo tempore, antequam melancholica liquata materia tradita fuerit sanguini venæ cavæ, educatur per viam huic materia naturalem, vel per venas hæmorrhoidales, vel per alvi ductionem, ut forsan rami venæ portæ, quæ mesentericæ venæ dicuntur, se exonerent in intestina, vel forsan per ductum choledochum exoneretur; quare alvi laxantia melanagoga dicta in principio Veris data, & aliquandiu continuata, Maniam & Melancholiam prævenient & natam compescunt, citiusque cessare facient.

Epilep-  
sia.

IV. Epilepsiam superius (*Aph. 70. II.*) definitam variis causis oriri posse, citato loco indicavimus, inter quas frequentissima est causa humor crudus tempore hyemali collectus, & vernali tempore liquatus, acrior factus, nervis applicatus, quo attactu partes inordinate & cum vehementia contriunguntur. Hujusmodi Epilepsiæ species, quæ satis commode ad Mobilitatem vel Passionem Hystericam aut Hypochondriacam potest referri, non est impossibilis curatu: qui enim stomachicis & anticaëdiciis hyeme prævenit cruditatis generationem, & instante Vere Diureticis & Diaphoreticis, id quod assimilari non potuit, evacuat, interim condit humores Resinosos, Balsamicos; ne formetur corruptela chronica, instantem Epilepsiam non solum præveniet, sed & multos alios morbos ex tali corruptione nascentes.

Sanguinis  
fluxiones.

V. Nullus morbus frequentior Vere, quam Sanguinis fluxiones qualescunque, cum hyeme confectus sanguis a vernali calore magis expanditur, & partes firmæ eodem calore relaxantur, magisque moventur, facile generatur ex hac abundantia & minori coherendi potentia in solidis ruptio vel dilatatio vasorum, & effusio contenti sanguinis: quare hæmoptoici hoc tempore maxime periclitantur, nisi instituta venæ sectione prius tollatur id abundans. Hæc evacuatio nisi modum excedat, modo non fiat ex pulmonibus, salubris solet esse, sed quo.

quoniam plerumque modum excedit, in hoc Aphor. inter morbos recensetur.

VI. Quod medici vocant Anginam ( Aph. 95. VII. ) varias agnoscit causas, Angi quare necesse erit perferutari, quoniam sit primaria causa Vernali tempore anginam inferens. Si Ver generalem suam habet aeris constitutionem, debet esse Angina sanguinea, seu quæ ex sanguinis abundantia generatur: sed quoniam interdum varia est aeris tempestas, & hoc quoque tempore variz possunt incidere Anginam producentes cause, tunc magis investigandæ cause, quam naturalis constitutio Vernalis, ut inveniatur proxima Anginæ causa.

VII. Quid per Gravedines vel Corvæ sit intelligendum, exposuimus ( Aph. Gravedi- 65. III. ): istas Vere etiam fieri posse, modo habeat tempestatem inæqualem, nes. ex iis, quæ supra ( Aph. 92. V. & Aph. 63. VIII. ) disputavimus, facile colligi potest: sed si corpus sit purum, & Ver solitam mutationem sequatur, raro observantur Gravedines. Unde patet, nostrum Auctorem voluisse adducere hos morbos, ut probet generale monitum ( Aph. 98. ) morbos omnes in omnibus quidem temporibus fieri posse.

VIII. Eodem etiam modo Raucedines ( Aph. 65. II. ) & Tusses, quæ irri- Raucedines & Tusses. unt quidem Vere incidere, sed ex naturali veris constitutione non prosiliunt.

IX. Ad morborum cognitionem & curationem nihil magis obest, quam eodem nomine varium intelligere morbum, & eundem morbum multis nominibus insignire, quæ interdum alium quoque morbum expriment: nam morbus est res ab omni alia distincta, sæpe habens multas proprietates, quas omnes concipimus intelligi eodem nomine; si ergo unus medicus per aliquod nomen alium morbum intelligat, quam alter, hinc maxima confusio, uti patet in Lepra; qui hanc Lep- Lepras. ram eandem faciat cum Lepra Arabum, turpiter erraret. Celsus videtur Lepram referre ad primam speciem Imperiginis. Hodie ille morbus haberetur species Scabiei, vel Herpetis, vel Porriginis. Necesse est igitur, ut recitemus notiones, quæ præsentiam hujus morbi declarant. (1) Adeste debet pruritus, (2) secessus squamularum, nam si furfures secedunt, Psora vocatur, (3) cutis aspera & arida, & durior, ejusque seeditas. Accusat Hipp. in uno loco pituitam, in alio autem Melancholiam. Hic morbus quoque interdum infestat vesicam urinariam, qui nomine scabiei a Ruyschio describitur, inveniens vesicam admodum durum & crassam, intus squamulis obfessam. Ex crescentibus & sæpe renovatis squamulis patet, hunc humorem esse tenacem & semivolatilem, ut fluidus maneat usque in cutis superficiem, sed ibidem subsistens exhalante parte volatili in squamulas con- crescit: habet præterea acrimoniam, quæ pruritus excitat. His temporibus si vere duntaxat oritur, facile cederet alvi ductione cum mercurio dulci, & abstergente & mercuriali linimento aut lavamento facile sanaretur, præcipue si supersuper diebus a purgatione vacuis æger biberet apozema diaphoreticum resolvens.

X. Imperigines in Textu dicuntur Leichenes, sed quoniam Imperiginis nomine Imperigi- a Celfo alius intelligitur morbus, & Leichenes Græcorum magis Quadrant Celsi nes. Papulis, in cognitione & descriptione multum variant auctores. Græci & in hoc loco Hipp. per Leichenes intelligunt talem cutis sedationem, in qua summa cutis pustulis siccis admodum prurientibus exasperatur: qui morbus sæpe Vere conspicitur, sed & aliis quoque temporibus, cum materia evacuanda per cutim præcedente hyeme retenta, nunc vernali calore ad cutim delata acrior facta, in cutis poris subsistens pruritus excitat; sed quia humor totus fere volatilis est, non relinquit squamas, ut lepra, neque furfures, ut psora, sed siccam & asperam pustulosam cutim, qui morbus leni abstergente antiseptico facile sanatur, quo residuum cuti inhærens auferitur.

XI. Celsus Lib. 5. Cap. 28. tres species Vitiliginis numerat: *ἀσπὸς* vocatur, ubi Vitilig- color nes.

color albus est, fere subasper & non continuus, ut quedam quasi guttae dispersæ esse videantur. Interdum etiam latius & cum quibuldam intermissionibus serpit. *Μήλας* & *ἀλόνι* sunt præterea Celso duæ reliquæ species Vitiliginis: quare facile constat, quia Hipp. scribit *ἀλόνι*, qualem speciem hic debemus intelligere, scilicet vitium cutaneum, ut duo priora, sed quod neque squamas, neque pustulas siccas, aut duram asperitatem facit, sed relinquit cutim fere æqualem, verum ejus colorem immutat in sortem albedinem. In hac specie quoque videtur adesse humor lentescens hyemali tempore confectus, calore vernali ad cutim delatus, sed sine acrimonia lentescens in minimis vasculis cutaneis subsistens explicatus. Hujus igitur curatio solis abstergentibus & diaphoreticis absolvi potest, non ita egens antiseptici, ut priora duo genera; hanc speciem facilem curationem admittere, novit quoque antiquitas.

Pustulas  
ulcerosas.

XII. Hipp. habet *ἑλκιδόσις ἰκκιδόσις*, seu Efflorescentias ulcerosas, quali modo nostris temporibus conspiciuntur Variolæ; verum quia præcedentia vitia sunt sine prægressa febre, non potest hæc species morborum cutaneorum a præcedentibus avelli, ut demonstraret morbum nostris variolis similem, præcipue quia his etiam temporibus hujusmodi efflorescentiæ vernali tempore sæpissime in juvenibus observantur, quæ in parva ulcuscula degenerant. Materia quoque hæc præcedente hyeme collecta, Vere ad cutim delata, lentoris naturam habere videtur; illa in poris cutaneis subsistens; stimulo suo parit pustulosas inflammationes, quæ in abscessulos, dein ulcusculos degenerant. Ut hujusmodi pustulæ præveniantur conducit primo Vere mittere sanguinem, & ducere alvum antiphlogisticis, quibus etiam si nata fuere pustulæ, curantur; & si non facile cedunt, ablutione per lavamentum saponaceum accensens, & dein refrigerans, & leniter adstringens facile evanescunt.

T. ber-  
cia.

XIII. Tubercula seu *φύματα* a pustulis magnitudine differunt, sunt etiam tumores inflammatorii pustules majores, qui interdum ovi gallinæ magnitudinem habent, uti phlegmone, furunculus, & similia tubercula limitata, quorum contenta materia in pus, vel lentam tenacem albam, vel flavam, vel subnigram materiem tandem convertitur. Ex eadem materia, qua pustulæ nasci videntur, sed majori copia in folliculis vel glandulis cutaneis collecta, Tubercula generantur: prout natura est materiæ collectæ, ita etiam est diversus Tuberculorum exitus, generale hoc habent, quod simili modo præveniri debeant, ut Pustulæ, sed nata Tubercula fortioribus suppurantibus sunt maturanda, & fortioribus abstergentibus sunt depuranda.

Articulo-  
rum dolo-  
res.

XIV. Num Hipp. hoc loco intelligat quemcumque Articulorum dolorem, quæm dicat *ἀρθρίτις*, vel specialem morbum, quem hodie vocant Podagram, non satis constat ex nominis significatione. Celsus hunc locum clare exponit Lib. 2. Cap. 1. his verbis. Hi quoque morbi, qui in articulis nervisque modo urgent, modo quiescunt, tum maxime & inchoantur & repetunt. Podagram vernali tempore præcipue paroxysmum facere constans est observatio, sed & etiam aliis anni temporibus aggreditur, quare vera est quoque Auctoris nostri observatio generalis ex hoc morbo, ubi statuit, morbos omnes quidem in omnibus temporibus fieri, etiam si magis uno quam alio tempore anni observentur.

### L I B. III. A P H. XXI.

100. **Æ** State vero & horum nonnulli, & febres continue, & ardentes, & tertiane plurimæ, & quartane, & vomitus, & alvi fluxus, & ophthalmiæ, & aurium dolores, & oris exulcerationes, & pudendorum putredines, & sudamina.

Æ State  
cur non-  
nulli sunt  
morbi ver-  
nales?

I. **Æ** Statem sequi ver, omnibus notum est, quando igitur omnis morbi materia vere non fuit expulsa, vel quod tenacior fuerit, vel ver solito frigidius fuerit, regulare est, ut prima æstate similes fiant morbi, qui vere ob-

ser-



servari solent, præprimis si Æstas sit Veri similis Aph. 85. I. aut si ver nimis diu continuare fecit hyemale frigus.

II. Multiplices species febrium ex invasionis modo commode distingui possunt in febres Continuas, & Intermittentes, illa quæ unico paroxysmo absolvitur, hæc vero quæ iteratis paroxysmis tandem finitur relinquens inter paroxysmos inducias, quas tempus apyrexia vocant Medici. Videtur autem unum genus febrium Remittentium omnifium, verum hæc species partim referri potest ad Intermittentes, partim ad Continuas: nam cujus febris intermittens paroxysmi ita prolongantur, ut nullum tempus supersit apyrexia, manet tamen febris intermittens in sua natura, etiam si videatur continua, sequaturque curationem intermittentium, sed ob protractos paroxysmos facta sit periculosa. Quæ vero Continua febris multas habet exacerbationes, uti febres putridæ & hemitritæ, propterea non patiuntur e classe continuarum expungi, cum hæ exacerbationes accipi possunt tamquam recidivæ, quæ etiam si fiant, non constituunt propterea aliud genus morbi. Ex his febribus duas species citat in utroque genere, nempe febrem Continuum, & febrem Ardentem in priore genere. Quod si voluisset Auctor eandem intelligere febrem per Continuum & Ardentem, non interpoluisset particulam &, sed dixisset febrem continuum ardentem: quare mihi videtur hic indicari duplicem speciem. Omnis febris, quæ unico paroxysmo absolvitur, vel per recidivas, ut monuimus, vocari potest Continua, ut sæpe observatur in febribus putridis & erysipelatosi: sed constans febris ex Inflammatione ob summum fervorem vocatur speciali nomine febris Ardens: unde non sine ratione hic citat duas distinctas febres, Continuas scilicet, & Ardentes. Quare autem hæ febres præcipue æstate regnant, paucis videndum. Æstas regulariter habet majorem aeris calorem, qui si jungitur humiditati, producit febrem non solum calidam, sed & simul putridam remittentem, quod satis patere potest ex iis, quæ supra (Aph. 90. IV., & Aph. 94. III.) disputavimus; hujusmodi febris non est perfecta continua sed remittens, quæ ab Auctore dicitur *contingens*, quod nomen ob variam significationem multis difficultatem parit: nam notat febrem, quæ eodem tenore sine ulla remissione a principio ad finem durat, sed a recentioribus, ut inquit Galenus, vocatur *εὐρύστης*, nobis Continua. Notat etiam febrem Remittentem seu Continentem, quæ non plane dimittit ægrem, sed tamen per intervalla exacerbatur, uti omnes febres putridæ, quales hic intelliguntur: imo febris intermittens prolongata, ut nullam apyrexiam faciat, eodem hoc nomine intelligitur. In posterum autem semper faciemus differentiationem inter Continuas, Remittentes, & Intermittentes. Quæ febris hic vocatur Ardens, non videri mihi confundendam esse Febri Remittenti, sed esse aliam febri speciem, quæ Continua est vocanda, proveniens ex Inflammatoria dispositione, & propterea alio nomine ab auctore insignita, ut hanc febrem Continuum distinguat a præcedente Remittente. Quando itaque aeris calor æstivus jungatur siccitati, non oriuntur febres Remittentes Putridæ, sed Continuas Inflammatorias (vid. Aph. 86. II.)

III. Variam hic invenio lectionem: in Editione Ab Almelooveen, quam sequor, habetur *Tertianæ plurimæ & Quartanæ*; in aliis autem invenio *Tertianæ febres & quartanæ*. Celsus Lib. 2. Cap. 1. solummodo citat *Tertianas*. Fateor, Litteratoribus emendandi & disputandi hic egregius invenitur locus, nos autem, magis attendentes ad rem ipsam exponendam, quam emendationem variorum lectionum, contenti erimus, si veritatem prædicam erueri valeamus. Si dicta a nostro Auctore confirmamus observationibus medicis, non erit difficile, quid sit sentiendum, invenire. Auctor posuit duo genera febrium continuarum, nempe Remittentem, & Continuum; persequitur sermonem in Intermittentibus, ex quibus etiam Tertianam & Quartanam adducit: quod autem Celsus & alii omiserunt Quartanam, hoc adscriberem hypothese, quia stantebant quartanam febrem nosci ex Melancholia, quæ

Cur febres continuæ & ardentes?

Cur Tertianæ & Quartanæ?

Ætate generari non potuit: sed qualiscumque prævaleat opinio, experimur tamen in praxi Ætate & Vere etiam generari Quartanas, sed breviores (Aph. 90. III.) Tertianæ autem frequentiores observantur. Inde non inutile est, ut Hipp. dicat, *Tertianæ plurimæ & Quartanæ*, quoniam indicare voluit, raro fieri Quartanas, sed Tertianas frequentes. Judicarem, si æstas sit calidior & humidior, frequentiores observari Tertianas, in quibus fere semper bilis corruptæ adfuit symptomata: si vero æstas sit frigida magis & humida, habens constitutionem Autumnalem, frequentius generari Quartanas.

Vomit.

IV. Experimentis conitat, nullam causam fætidum, nauseam, & vomitum magis concitare, quam si putridum vel ingeritur vel colligitur in stomacho: hoc putrefactum quoniam promovetur calore Æstivo magis quam ullo alio tempore, frequens est Vomitus causa; præprimis quia Bilis in ventriculum conflens ad famem concitandam, præ ceteris humoribus corrumpitur, quum non volatilis sit, ut reliqui humores, qui corrupti facilius evanescent, sed & maneat in corpore, sensim magis corruptæ tandem ventriculum ad vomendum instigat. Ex hac observatione colligere itaque possumus, hunc vomitum non esse sedandum per narcotica, sed promovendum diluentibus, abstergentibus, & saponaceis acescentibus, ut corpus liberetur ab hac corrupta bile; dein saponaceis acescentibus stomachicis præveniendum, ne nova fiat bilis corruptæ generatio & collectio in ventriculo.

Alvi fluxus.

V. Contrarium hoc loco videtur statui, quam quod superius (Aph. 95. III.) fuit observatum, augeri scilicet alvi fluxum minuta perspiratione, quoniam æstate omnium largissima habeatur perspiratio. Sed eo in loco non statuimus sola minuta perspiratione fieri alvi fluxum, verum inter frequentissimas recenseri causas. Putredo præprimis Bilis, quæ copiosius generatur æstate, non raro est alvi fluxus causa: illa enim sua acrimonia stimulat intestina ad egerendum, & sua putrefaciendi virtute omnes confluentes etiam humores in liquamen convertit, præcipue si æstas calidior simul sit humida, quando non solum sunt Diarrhæe, sed etiam Cholerae, de quibus testantur Observatores præfici, istas fere semper inter Augusti limites contineri.

Ophthalm.

VI. Ætatem generare Ophthalmias notavimus (Aph. 90. IV.) an vero sicca vel humida hic sit intelligenda Ophthalmia, ambigunt Commentatores: existimo utramque speciem intelligi posse. Nam si æstas sit humidior putrefaciens humores, lachrymæ copiosiores & acriores (Aph. 90. IV.) generatur Ophthalmia humida: si vero sit solito siccior (Aph. 95. IX.) producit Ophthalmia sicca.

Aurium dolores.

VII. Quod diximus de ophthalmia, applicari quoque potest ad Aurium dolores: nam humores acres, qui delati ad oculos dolore movent, iidem ad Aures depositi simili modo excitant dolores, & quidem atrocissimos interdum, quoniam membrana meatum auditorium cingens acutissimo sensu est prædita, atque cerumen auris acutius fæctum doloris causa esse potest. Veteres autem ex smegmatis amarore & flavedine existimarunt, morbos biliosos, qui maxime observantur ætate, præcipue efficere aures: an hæc sit vera observatio practica, infra examinabitur.

Oris exulcerationes.

VIII. In sequentibus trium partium affectiones annumerat; nempe Oris exulcerationes; Pudendorum putredinis; & Cutis sudamina, qui tres morbi diverſi ab eadem tamen causa oriuntur, quamobrem horum morborum diversitas ex natura partium est deducenda. Primo occurrit Oris exulcerationes, si saliva in os conflens acrior, epithelium oris corrodens, ulcus apertum faciat, quod leniter adstringentibus, acidis, antisepticis est curandum.

Pudendo- rum putredines.

IX. Cum vero maxima pars excrementorum, quæ putredini magis obnoxia sunt, ano & pudendis redduntur, quæque partes simul sunt etiam dicuntur obſcena, hæc ergo confluentes humores ætate ab aere calidiore præcipue putredini tentantur, factoremque contrahunt, quæ frequentiore ablutione per antisepticum

cum adstringens calefaciens lenē, & antisepticum curatur, cum pudenda minus ferant refrigerantia quam oris exulcerationes.

X. Galenus *Idpota* dicit esse pustulas in summa cute; Celsus autem inquit, quidquid sudore hominem resolvit, ubi huic aphorismum in Latinam linguam venit: utraque interpretatio admitti potest: nam *Æstate* frequentiores generantur pustulæ exigue prurientes, atque sudoribus copiosioribus enervantur corpora: verum curationes horum morborum inter se differunt, quum sudamina indicent acrimoniā calidā prurientem, quæ est temperanda; verum sudor copiosior deliquationis est indicium antiseptici præveniendum.

## L I B. III. A P H. XXII.

101. **A** *Autumno autem, & multi ex æstivis, & febres quartanæ, & erronæ; & lienes, & hydropes, & tabes, & urinae stillicidia, & lienteria, & dysenteria, & coxæ dolores, & angina, & asibmata, & volvuli, & epilepsia, & insania, & melancholia.*

I. **A** *Autumnus morborum feracem esse (Aph. 83. I.) morbosque producere curatu difficiles, pertinaces, anomalos, recidivantes, periculosos, (Aph. 83. III.) acutissimos, & perniciosissimos, (Aph. 88. IV. & V.) quoniam aer calidus & siccus mutatur in frigidum & humidum, quo humores in calore corrupti deinceps retenti morbos pariunt, observavimus: hoc nunc loco videre est, retentam eam materiem, prout origine differt, variamque subit corruptelam, diversos producere morbos.*

II. In præcedente *Aph. 100.* dixerat, nonnullos morbos vernaes observari æstate; hic autem dicit, multos morbos fieri Autumno ex *Æstivis*, quo indicare voluit morbos æstivos plures extendi per Autumnus, quam vernaes per æstatem, quod non est sine ratione: quæ enim morbi materia vere excitaverat morbum, sæpe sequente calore & siccitate aeris æstivi reddebatur volatilis & evolabat; quæ autem in æstate peperit morbum, accedente Autumno frigidiore, & humidiori, pertinaciter retinetur, vel continuat morbum præcedentem, vel degenerans in aliam malignitatem, producit ex eadem sed mutata materia morbos Autumno magis proprios.

Autumno  
multi  
mori ex  
æstivis.

III. Quenam dicatur Febris Quartana traditum est (*Aph. 50. II.*), eamque vere breviorē (*Aph. 50. III.*) Autumno longiorē observari (*Aph. 50. IV.*) demonstravimus. Quod autem hoc tempore frequentissime generetur Quartana, id speciali humoris generationi est adscribendum, vel speciali mutationi in morbosa materia præcedente æstate mota, & nunc in morbum erumpere. Veteres contenti erant dicere, autumno generari melancholiam, & eam materiam formare Quartanam: ego autem judicarem, quoniam præcedens *Æstas* suo calore frequentiorē induxit corruptelam, quæ tamen materies, quam diu manet æstivus calor, exhalat, Autumnus sua propria aeris commutatione hanc corruptam materiem retinere, & in talem commutare indolem, quæ in corpore vivente omni quarto die parit paroxysmum, quo hæc materia subigitur & expellitur pro maxima parte per sudorem & urinam, sed ut mala herba relinquitur semina intra biduum vel triduum maturanda. Si quis querat expositionem hujus causæ, fateor me nescire, sed hanc vidisse mutationem fieri, ut invenio post fermentationem generari vel vinum vel acetum, & post putrefactionem oleum fixens cum alcali volatili; quoniam autem motu automatico vel intestino in hujusmodi corporibus hæc mutationes fiant, nemo chemicorum determinare ausus est, solummodo observavit hoc vel illud corpus fermentare & putrescere posse, istasque actiones qui-

Febres  
Quarta-  
næ.

busdam auxiliis promoveri & retardari posse. Idem quoque sed non amplius perspicere valeo in materia febris Quartanæ generatione: invenio enim materiam æstate corruptam, autumno retentam, speciali aeris mutatione commutari in materiem producentem febrem Quartanam, ut invenit chemicus produci viscosum, acetum, oleum fœtens, alcali volatile. Ex quibus constat, quod generationem materię febris Quartanæ plus exigi non posse aut debere, quam datatur in aliis rebus, quæ manu tractari possunt. Etiam si ulterior non datur accessus, id tamen lucri habemus in curatione, quod valeamus continuando materię corruptę, circa finem æstatis, vel principio Autumni, expulsiōnem, prævenire hujus febris originem, cum in nostra potestate non si immutare naturalem aeris mutationem in autumno, vel dando aliquid, quod hanc commutationem intercipit, aut chemici adjectis quibusdam præveniunt fermentationem & putredinem: hoc autem experientia est inveniendum, ut fecerunt in arte sua chemici.

Erronem.

IV. Febris Erraticæ seu incertæ ita vocantur ex inordinato reditu paroxysmorum, vel inconstanti symptomatum, ut jam leviores jam vero graviore fiant febres, atque inconstantem moliantur crisi. Quod facile in Autumno contingere potest; si enim multiplex materia retinetur, atque in morbosam indolem convertitur, variæ hæc inter se agentes cause non possunt constantibus temporibus aequalia generare symptomata: imo, modo simplex formetur inde putrefactum, febris ex omni putredine est incerta & vaga. Inde constat, cur febres Erraticæ Autumnales minus solent obtemperare antidoto quam febres legitimæ quartanæ, cum aliam sæpe foveant causam, quæ antidoto exstingui non potest.

Lienis.

V. Lienis fabrica, situs & usus ex anatomicis & physiologicis peti debet, quia non est hujus loci omnia dubia, quæ de hoc viscere moventur, agitare, num sit viscus utile vel inutile, num excindi possit nec ne, num atram bilem conficiat vel alium humorem, & centena hujusmodi farinæ. Sufficit observare σπλῆνις apud Hipp. indicare morbum vel morbos Lienis, præcipue autem ejus tumorem & indurationem. Hos itaque morbos Autumno sæpe occupare Lienem in hoc Aph. statuit. Ex antea discurtis assumo, in præcedente æstate magnam fuisse scitæ tenuium exhalationem, reliquam massam in partibus firmis per calorem enervatis, quamdiu manebat aeris calor, circumduci, sed accedente frigiditate autumnali, magis lenescere, quasi massa fermentans abiret interdum in vappam temescam & glutinosam. Tali glutinosa materia vix acri si corpus sit oppletum, accedente Autumnali frigore omnium facillime subsistere potest, ubi omnium minime agitur motu vitali, & ubi habetur tardissima circulatio: quæ enim materia actione vitæ satis valente potuit retineri fluida & mobilis, huc vero appellens, subsistit, eamque partem implet & infarcit. Nihil ergo exponere & probare restat, quam ut demonstretur, lienem esse viscus intricatissimum, parvo motu vitali donatum atque tardissimam habere circulationem, suum sanguinem exonerare in venam portarum, quæ sanguinem nequit in venam cavam, nisi superatis angustis arterię portarum in hepate, exonerare, & inde hic magis quam alibi pati remoram. Hæc autem omnia tam plana sunt & evidentissime demonstrata ab hodiernis physiologis, ut actum agerem, si hæc repetere vellem. Ex his autem inter se collatis evidentissimum est, si autumnus vappam tenacem format, generari debere splenes. Sed & egregium inde habemus, quod possimus circa finem æstatis usu medicamentorum resolventium & moventium, corporisque exercitatione frequente & modica, in principio Autumni talem prævenire morbum, præveniendū hujus lentæ materię concretionem & collectionem ad viscus, tardiorē circulationem habens.

Hydopes.

VI. Quoniam auctor dicit in plurali Hydropses, non obscure declarat, se non intelligere simplicem Hydropsis speciem, sed & ejus species varias, tam ratione humoris retenti pituitosi, lymphatici & cacochymici, quam ratione variarum partium

tium

tium in ambitu corporis, quando Leucophlegmatia vocatur, vel quando colligitur in quadam particulari parte. Omnes hæ species frequentissime generantur Autumno, præmissis si sit solito humidior; corpora enim calore æstivo enervata, frigore Autumnali pressa, parciorem perspirationem habent, quæ humiditas collecta, vel ob frigus minus fluxilis facta, facile hæere potest in vasis lymphaticis & cellulis pinguedinis relaxatis. Qui igitur morbus prævenirentur, si circa æstatis finem, & principium Autumni talis homo usus fuisset roborantibus siccantibus: nam si Latex vel pituita collecta fuit, non tam facile erit corpus ab hac sarcina liberare, quoniam fibræ collectæ lymphæ prolongatæ & atonæ factæ, accedente autumnali frigidityte & humiditate, in pristinum tonum difficulter redigi possunt.

VII. Qualem Tabem hic intelligit Auctor; & quomodo generatur præcipue Tabes:  
Autumno, utcumque ex supra dictis (Aph. 89.) intelligi potest: omnes citatæ species in Autumno augentur, cum colibeatur humoris corrupti exhalatio: Phthisis autem ex Hemophthysi hoc tempore raro incipit, cum corpora vere & æstate in Hemophthysi sunt prona, sed si inde nata sit phthisis, quam maxime promovetur majore inducta corruptione pure in pulmonibus contento.

VIII. Cum in autumno semper accusamus aeris majorem frigiditatem & humiditatem, illa causa non videtur inferre posse stranguriam, quia in superioribus (Aph. 95. XI.) demonstravimus, siccitatibus generari stranguriam. Verum non semper est unica causa, quæ generat morbum, sæpe enim morbus nomine idem ex contrariis generatur causis: ita quoque stranguria generatur, quoties in siccitatibus detrahatur commune vehiculum liquidum: sed & urinæ stillicidium inferre valet corruptela humoribus inducta & acris, quæ cohibita evacuari per insensibilem perspirationem, mandatur renibus. Ita urina ex hac materia acriore & corrupta, impedita exhalare, infecta, transiens per urethram inducere potest stranguriam. Vel etiam materia catarrhosa, in succum, oblinentem interna latera urethræ, deposita, stranguriæ causa esse potest. In utroque hoc casu constat, optimum esse auxilium, derivare a viis urinæ id acce ad cutim per Diaphoretica.

IX. Lienteriam, Celsus alvi Laxitatem, indicare nimis citam assumptorum alimentorum & confectorum in ventriculo per intestina transitum & egestionem ex ano, indicavimus *Comp. T. 90. XIV.*, & hujus morbi causas *Comp. T. 90. XXI. ad XL.*; sed quomodo autumnus talem morbum inferre potest, non tam plane constat. Si vero observamus, æstatem præcedentem relaxavisse partes firmas, sequentem vero Autunnum fittere solitam perspirationem, quo major copia humorum fertur ad intestina; aut quod magis veritati convenit, humores æstatis calore solubiles si autumnii frigidityte glutinescent, ita ut mucus intestinorum tenacior factus, assumptorum introitum in vasa lactea interceptat, potest cibus assumptus in ventriculo præparatus, sed defectu absorptionis intestinorum, quæ mucos obfessa, ut os interdum Aphthis, introitum denegans chylo, per ita lævigata intestina cito duci ad colon & rectum, & ita exonerari. Quo in casu requiritur resolutio & absterfus hujus muci, ut referentur oscula lacteorum: quæ methodus mihi sæpe in hoc morbo felicem præbuit curationem.

X. Quoties vero autumnali frigore humores ad intestina devoluti simul habent acrimoniam, vel eam acquisiverunt, antequam ad intestina ferantur, vel stagnando in intestinis corrumpuntur: vel quia acce nidulerunt in mæco intestinorum internam superficiem tegente, perpetuo hoc stimulo non solum urgentur ad frequentiores egestionem, sed simul acris hic humor multa inferunt tormina ventris: qui morbus non facilius ex hac causa natus curatur, quam levi purgante educata materia, quæ in intestina confusæ, per sudorifera vel diaphoretica humorem illum acrem derivare ad cutim.

XI. Qui morbus Hippocrati vocatur Ischias, Celsus est Coxæ dolor. Videtur Coxæ de-  
Quilores.

quibusdam species Podagra; aliis autem ad Arthritidem refertur; aliis iterum species Rheumatismi habetur: cum omnibus his maximam servat analogiam, sed in quibusdam ab omnibus distat, quare ut specialis morbus solet pertractari, quod non est hujus loci agitare: sufficit hunc dolorem generari ab acrimonia, quare in succo hujus articuli magis quam aliorum articulorum nidulatur: & nos inde intelligere, ea, quæ in Autumnio corpora servant perspirabilia, egregie hunc morbum prævenire posse.

*Angina.* XII. Superius demonstravimus (*Aph. 95. VII.*) quid Medici per Anginam intelligant. Antea observavit in Pluviosis & Vere (*Aph. 99. VI.*) nasci, nunc vero dicit generari Autumnio; num vero sit Angina cum vel sine signis externis, laryngem vel pharyngem magis afficiens, qualem veteres faciunt distinctionem, magis Prognosis quam Curationis exhibentem differentiam, determinare nequeo, cum utraque hæ partes a materia perspirabili Autumnio retenta affici possint. Ut eliciamus diversam causam Anginæ autumnio natam, præscire debemus, qualis antecesserit Æstas, & qualis nunc sit Autumnus magis minusque frigidus, calidus, humidus, vel siccus; quamobrem ad firmam curationem hæc generalis observatio non multum præstat.

*Asthma.* XIII. Respiratio difficilis anhelosa, ut plurimum cum sono aut sibilo, quæ vehementior est (inquit Celsus), dyspnœa, ut æger spirare non possit sine sono & anhelatione, sine febre, seu quæ ex paroxysmo febrili non producitur, neque oritur ex majori cursu, sed a causa interna morboſa, in qua respiratione æger debet aerem haurire motu musculorum actioni animali interservientem, vocatur Asthma, dum vero reliquæ difficiles respirationes hoc speciale nomen non habent. Asthmatis causæ multæ sunt, ut in sequentibus demonstrabitur. Cur autem frequens sit Autumnio, facile intelligitur, cum mucus bronchiorum antea fluxilis per aeris Autumnalis frigiditatem compactus, lentescens, bronchia & vesiculas pulmonales ita oppleat, ut non sint satis capaces ad aerem recipiendum, nisi vi majore per actionem animalem dilatentur. Quare in Asthmate Autumnali conducunt Expectorantia resolventia magis, quam alia mucilaginosa.

*Volvuli.* XIV. Qui morbus ab Hippocrate vocatur *αἰσὶς*, Celsus est Tenuioris intestini morbus, quoties vehemens dolor occupat ventrem in eo loco, ubi heret Intestinum tenue ileon dictum, qui hodie communi nomine Colicæ passionis recipitur: sed est ex Colicæ affectionis specie gravissimus & vehementissimus dolor, cui sæpe adjungitur vomitus contentorum ex intestinis, cum alvo conspiciata pertinacissima, & ano ita sæpe contracto, ut non admittat suppositorium. Quia vero ille dolor generari potest ab omni acrimonia, quæ in autumnio acerrima generatur, maximeque determinatur propter minutam perspirationem versus intestina, hoc tempore frequentius quam aliis generari potest Volvulus.

*Epilepsia.* XV. Quoniam Epilepsiam (*Aph. 70. II.*) generari pluviosis tempestatibus (*Aph. 95. V.*) demonstravimus, quod acre exhalare solitum, nunc retentum & magis corruptum, applicatum partibus nervosis hunc motum inordinatum & validum concitet, facile liquet, idem quoque frequentius fieri Autumnio, cum autumnalis aer frigidior & humidior humoris acris exhalationem quoque inhibeat, quod acre retentum quoque frequentiore paroxysmum Epilepsiæ producit. Scimus inde, medicamentis Diaphoreticis utiliter præveniri posse hanc speciem Epilepsiæ, quæ autem in reliquis speciebus minus valeret.

*Infaniæ & Melancholiæ.* XVI. Ut Ver (*Aph. 99. III.*) contentum humorem facit acrem, turbantem æquabilem cerebri motum, ita Autumnus retinendo acre, quod exhalare debebat, ad cerebrum quoque delatum simili modo mentem turbat, quoque Autumnio & Vere moventur Infaniæ, quæ in Autumnio præveniuntur conservata perspiratione insensibili. Ex eadem quoque causa sæpe corripiuntur Melancholia, quæ magis exigit alvi ductionem, cum atra bilis hac via commodissime evactari possit.

## L I B. III. A P H. XXIII.

102. **H**yme vero pleuritides, peripneumoniae, lethargi, gravedines, raucedines, tusses, dolores pectorum & laterum, & lumborum, & capitis dolores, vertigines, apoplexie.

I. Superius specialem constitutionem hyemalem (\*Aph. 90. II. & Aph. 91. II.) Hyems quid faciat. Notavimus, hoc nunc loco videndum, quid Hyems generale faciat ad morbos producendos. Hyeme regulari est, ut sit frigus majus, aerque minus exsiccans, quam aliis anni temporibus: unde partes firmæ magis contractiles & humores spissiores, ex quibus deduximus, Ventres hyeme esse calidissimos (Aph. 15. II.) corporaque facile ferre alimenta (Aph. 18. IV.). At morbi hoc tempore producti, pro naturarum in hominibus differentia, admodum possunt esse dissimiles, ut in sequentibus constabit.

II. Quibus hominibus est corporis & ætatis vigor, sanguis a frigore hyemali magis compingitur, & partes firmæ admodum tensæ hoc tempore facile incidere possunt in morbum inflammatorium, præcipue autem in Pulmonibus & membrana Pleura, quoniam nulla pars est in nostro corpore ita aeri exposita, quam partes hæ: exterius enim non solum pectus, ut ceteræ partes, tangitur ab aere, sed etiam idem aer omnes pulmonis latebras permeans, si solito sit frigidior, quibusdam in vasculis ita cogere potest sanguinem vel lympham, ut subsistat. Quæ obstructio facta in corpore ita valente, & sanguine denso præditi, sua irritatione his in partibus suscitatur inflammationem: quæ promptam & repetitam exigit sanguinis missionem, medicamentaque pectoralia laxantia & humectantia: quibus mature adhibitis sæpe resolvitur morbus sine subsequente suppuratione.

III. Quibus vero corporibus id excrementitium, quod exhalare debebat, retinetur in corpore per frigus hyemale, in humorem acrem tenuem & calefacientem conversum, ad cerebrum delatum, quod opprimit, producit ex cerebri compressione soporem cum oblivione, ex quo resuscitati statim relabuntur cum leni, sed continua vel circa vesperam aggravante febre, sæpe tussim, salivamque liquidam & multam educunt, cum summa impotentia, si tenuis acer ille humor simul feratur ad pulmones. Si id liquidum feratur ad alvum, plerumque moriuntur. Hipp. monet curandum esse ut plurimum spuat, & calefiat, & a vino abtineat: si vero effugerit, suppuratus fit H. b. 99. Quibus constat, hunc morbum non esse inflammatorium, sed prope accedentem ad Erysipelas.

IV. Gravedinem (Aph. 65. III.) Raucedines (Aph. 65. II.) & Tusses sæpe generari a materia perspirabili retenta hyeme, ad pulmones delata, superius (Aph. 92. V.) quoniam demonstravimus, non erit opus eadem hic repetere.

V. Quæ autem corpora sunt debiliora, generantia in se acrimoniam crudam nitrosam, quam tamen largiore perspiratione exonerant, per frigus hyemale id acre in suo corpore retinent, quod ad partes membranosas & nervosas applicatum infert dolores. Inde forsitan noster Auctor distinguere voluit Pleuritidem a Pectoris dolore, etiamsi a multis idem censeatur morbus, cum viderit hujusmodi pectoris & lateris atque lumborum dolores, quos hodie præctici vocarent Dolores Lymphaticos, admodum differre a pleuritide vera inflammatoria & Erysipelatosa. Quali modo hi Dolores generantur, cognoscuntur & curantur, exposuimus Perspir. Cap. 7. XXII. ad XXV. Ex quibus, & quæ notavimus Comp T. 45. LIX. satis constat, non solum dictas partes dolere posse, sed & multas alias.

VI. Quum Hippocrates non persequitur annumerationem partium, quæ dolere pertentantur, sed hic ponit Cephalalgiam, videtur mihi indicare velle, caput hye.

Pleuritides & Peripneumonias.

Lethargum.

Gravedines Raucedines & Tusses.

Dolores pectorum & laterum & lumborum.

Cephalalgiam.

hyeme non unico genere doloris corripi posse, sed a diversâ superius recensita materia Inflammatoria, Erysipelatosa, & Catarrhosa.

*Vertigo, apoplexia.* VII. Ex iisdem causis nervo oprico applicatis Vertiginem generari posse, (*Apb. 96. XI.*) non inficior; sed quoniam statim subnequit Apoplexiam, quæ hyeme potius a Pituita comprimente cerebrum generatur, & quia Vertigines plerumque præcedunt Apoplexiam, judicarem Hippocratem hic intelligere velle collectionem pituitæ, quæ produceret Vertiginem & Apoplexiam.

## LIB. III. APH. XXIV.

103. **I**N *Ætatis autem talia eveniunt. Parvis quidem & recens natis pueris aphoræ, vomitus, tussis, vigilia, pavores, umbilici inflammationes, aurium humiditates.*

I. **G**eneralem divisionem fecerat Auctor noster (*Apb. 82.*) in morbos Temporum & Ætatum, de quibus dixit, alios morbos ad alia Tempora bene aut male se habere, quod huc usque persecutus est: nunc vero examinat morbos Ætati- bus frequentiores quam in alia ætate. Unde colligere possumus, certa Ætate generari causam huic vel illi morbo faventem. Hanc itaque mutationem naturalem perscrutabimur, licet propositus morbus possit etiam a variis aliis causis generari.

*Ætatis  
divisio.*

II. Tota Ætas a nobis in tria tempora divisa fuit (*Apb. 97. I.*) in Incrementum, Statum, & Decrementum. Hic vero Incrementum subdividitur; (1) in parvis seu recens natis; (2) ad Dentitionem accedentibus, (3) qui sunt ætate majores, (4) ad pubertatem accedentibus, (5) juvenibus. Deinceps agit de morbis constanti ætati contingentibus; & ultimo de morbis senum. Quoniam veteribus perplacuit numerus septenarius, & quoniam his temporibus quoque maxime observantur in corporibus mutationes, ut Cl. Hoffmannus quoque observavit, non erit inutile tempora Ætatis secundum numerum septenarium dividere. Ut Hipp. fecit, citat (1) morbos primi septem diebus a partu, & qui primis septem hebdomadis contingunt usque ad septimum mensem. (2) A septimo mense usque ad mensem decimum quartum, quod est naturale Dentitionis tempus. (3) Qui sunt ætate majores pueri intelligi potest tempus a 14. mense ad septimum annum, quando dentes renovari solent. (4) Dein ab hoc tempore annum decimum quartum: (5) A 14. anno autem ad 21. vel & 28. annum, cujus primum tempus potest dici Adolescentiæ, posterius autem juventutis. Quænam mutationes naturales sunt his ætatibus & quales nascantur morbi, in sequentibus exponemus.

*In Parvis  
& recens  
natis  
morbi.*

III. In Parvis & recens natis Infantibus, nempe a nativitate usque ad sextum vel septimum mensem, quando dentes erumpere incipiunt, varios numerat morbos, quos in duo genera distinguemus, qui scilicet veniunt a nativitate, dum medicum fuit omne evacuatum, & umbilicus consolidatus, & qui sunt post istud tempus usque ad dentitionem, Dum enim nascitur infans, ejus os, œsophagus, ventriculus, & intestina muco sunt impleta, atque colon meconio turget; ejus abscinditur umbilicus; prima vice haurit ore lac, vel & alia alimenta; mutatur in suo corpore circulatio impedita via per vasa umbilicalia; præprimis nunc debet conficere nutrimentum; pulmones moventur & hauriunt aerem, qui pulmones huc usque quieverunt; mutatur externa pressio, antea enim undique sustentabatur corpus latice, novus aer levior premit: cuncta hæc minimo temporis spatio mutantur, unde non mirum, Infantis corpus tot & tantas mutationes subiens admodum affici, ut mirandum sit, aliquem posse manere superstitem. Omnes nunc velle recitare morbos ex his mutationibus naturalibus provenientes, integram exigeret exercitationem, quare contenti erimus istos solos assequi, qui ab Auctore proponuntur.

IV.



IV. Non quavis oris ulcera dicuntur Aphthæ, imo similis morbus interdum occupat tracheam, œsophagum, ventriculum, intestina, imo interdum pudenda seminarum, quare non obtinuit nomen ex parte, quam occupat hic morbus, sed ex quibuscumque phænomenis, quoniam hic morbus in infantibus & in fine acutorum & putridorum in adultioribus natus idem retinet nomen, etiamsi variam agnoscat causam. Si os & lingua obtegatur tenaci mucagine varii coloris, quæ collutione auferri non potest, corrodens epithelium, vocatur oris Aphthæ, unde est morbus veluti medius inter sorditatem & ulcus. Hujusmodi Aphthis recens nati infantes frequentius corripiuntur, & quidem sine morbo prægresso, dum vero in adultis raro nisi post morbum putridum conspiciuntur. Constat, totius corporis infantis superficiem rectam esse lenta mucagine, dum nascitur, quam sorditatem ablundo auferunt obstrictes, & in capite sæpe adhibere debent pinguedinem, ut primo emolliant: hæc lenta materia partim ex liquore, in quo natavit fœtus, partim vero ex proprio corpore deposita, formata lentescens, cuti adhæret, cum sæpe ablata renascatur: simili quoque modo formatur in ore, œsophago, ventriculo, & intestinis, hic vero saponacitate salivæ reliquorumque humorum saponaceorum soluta materia primis diebus cum meconio redditur. Si vero tenacior sit, vel infans saliva non sit satis saponacea, vel si uti non possit propriæ matris colostro abstergente, lenta hæc materia toti oris superficiei adhærens corrumpi incipit, quia humores, quandiu non exponuntur aeri, diu a putredine possunt servari; sed iudem aeri traditi prompte corruptelam induunt; lentescens hic & corruptus humor partibus oris adhærens, corrodens epithelium vocatur Aphthæ. Quæ quo citius, eo melius sunt auferendæ Medicamento abstergente, adstringente, & antiseptico, in forma linclii, ne diutius persistens majorem induat corruptelam.

V. Ventriculus post nativitatem non assuetus accipere alimenta, a novis istis assumptis tanquam sibi alienis, in motum inordinatum instigatur, & ita assumpta vomitu reddit: atque mucosum in ventriculo quoque hærens, assumpto lacte vel colostro fluxile redditum, ventriculi latera lambens nauseam & vomitum generat. Dein in adultioribus lac in ventriculo coagulans frequens est in infantibus vomitus causa. Hujusmodi igitur vomitus vix meretur inter morbos recenseri, cum sit nature conamen se liberam a sarcina opprimente. Quamobrem muliercula experientia edocet vomitus hos frequentes inter bona præsagia viræ recensere solent.

VI. Plures sunt causæ Tussim excitantes quam in cetera ætate, & inde Tussis quoque frequentior. Mucus enim in trachea hærens post nativitatem non expectoratus, sed acrior factus; pulmo non assuetus admittere aerem frigidum; assumta acescentia in debili hoc corpore in acidum commutata; valent in hac ætate magis quam in alia Tussim concitare.

VII. Naturale est in recens natis multum & fere assiduo dormire; ita ut si vixissimum infantem ne quartam partem diei vigilent: si vero hi tantum vigilent ut adulti, morbus erit: hic autem laudabilis somnus non raro turbatur, quia quidquid turbat æquabilem circulationem per cerebrum, id somnum interruptit, ut demonstravimus ( *Exerc. de somno* ). Infans autem suo corpore tenello facile permittit ingesta alimenta corrumpi, ex qua causa acrimonia nata in ventriculo & intestinis hærens per consensum cerebri æquabilem circulationem perturbat. Scio equidem multis in consuetudine esse hujusmodi infantes per coiaræ vel papaverina in somnum urgere, præstantius autem foret perscrutari irritantem causam, & eam tollere, quæ sublata, infans ex propria natura satis dormiet.

VIII. Sæpe quoque Infantes ex somno excitantur cum tremore & varia agitatione artuum & ejulatu, ut adulti ex re quacumque terrorem inferente, quare nonnulli existimarunt, mentem infantis agitari cogitatione terribi; quia vero hoc usque in infantibus nulla apparere indicia mentis, & corpus tunc nullum hoc ab

acri-

crimonia vellicatum in hujusmodi convulsiones facile adigitur, hujusmodi Pavores affectioni corporis, minime vero mentis adscriberem, & propterea, quod acre acidum frequens sit causa, non est sine ratione, Pavores puerorum sæpe curari terreis & alcalicis, atque reliquis medicamentis acidum corrigentibus.

IX. Primis a partu diebus frequentiores fieri Umbilici inflammationes, non eget explicatione, cum umbilicus ligatus vel abruptus, ut ceteræ læsiones, facile inflammationem suscipiat.

X. Aures in recens natis madescere tam frequens est observatio, ut nutritibus sit notissimum, quæ inde sentiunt, si aures non madescant, puerum non recte valere: hanc autem naturalem Infantibus excretionem non intelligit Auctor, quoniam inter morbos non est recensenda evacuatio: sed quoniam sæpe ad hanc partem confluit tantus humorum confluxus, ut inde partes circumquaque excoquantur, doleant, & fetorem inducant, illa major depositio humorum hic intelligitur, quæ non est adstringentibus sistenda, sed moderanda, quum evacuatio hæc moderata sanitatis conservationi admodum conducatur.

## L I B. III. A P H. XXV.

104. **A**D dentitionem vero accedentibus, gingivarum pruritus, febres, convulsiones, alui profluvia, & maxime ubi caninos dentes producant, & iis qui inter pueros sunt crassissimi, & qui alvos duras habent.

Dentitionibus quibus morbi sunt.

I. **A**Lterum stadium temporis (Aph. 103. II.) a mense septimo in Infante ad mensem decimum quartum, quo maximus numerus Dentium nasci solet, ventriculus nunc magis lacti assuetus, sensum quoque accipit alia alimenta, modo autem hæc sint facilis materiæ & lactis matris analoga, Infans ab hac mutatione non multum turbatur. Verum tunc Dentes erumpere incipiunt, qui non parvam molestiam quibusdam infantibus asserre solent; quales morbos hic recenset Auctor breviter, amplius autem de his ait in *Libro de Dentitione* H, a 390. Annumerat hoc loco quatuor morbos, quos credo ex Consensu generari; quia increfcentis Dens inferens dolorem facit in tenella ætate, ut reliqua organa in consensum trahantur.

Dentitionibus gingivarum pruritibus.

II. Ex Anatomicis observationibus constat, etiam ante nativitatem semina dentium latitare in utroque margine maxillæ, ubi postea sunt erupturi Dentes, per limam enim si abradatur maxillæ os, ex foetu vel infante edentulo desumtum, invenitur eo in loco, ubi postea hærebit dentis radix, folliculus liquore limbo pleno, qui sensim increfcentis in verum Dentem degenerat: quod si hoc tentetur in maxilla pueri, cujus dentes sunt renovandi, sub radice dentis prioris similis de-regitur folliculus, qui dein increfcentis priorem dentem sæpe extrudit, vel sibi novam format sed alienam sedem. Ut itaque prius dentes erumpat, membrana hujus folliculi, peristheum & gingivæ regentes maxillæ marginem perumpenda sunt. Quæ divulsio si incipit fieri primo, ut omnis levis attractus, parit Pruritum, sed pergens sæpe magnum Dolorem excitat. Hunc Pruritus adest demonstrant infantes, semper fricantes margines maxillarum: dein vero ejulatu, contorsione membrorum & inquietudine cum vigiliis satis declarant, Dentitionem inferre dolorem: quam ob rem nutrices semper præbent aliquid durum sed levigatum in ore, ut mordendo disrumpantur integumenta supra erumpentem dentem extensa. Quidam suadeant in graviore dolore incisionem levem in eo loco, ex quo dens est erupturus. Quia vero ab hac læsione gingivæ alimodum dolent & calent, utile est ad gingivas applicare gratum mucilaginofum refrigerans.

Febres.

III. Per irritamentum ex dentis eruptione natum motus vitalis circulatorius tandem in consensum trahitur, ut etiam sic in adultis, si pars quædam valere fuerit

rit affecla, aut si spina carni sit infixâ, eo autem magis in infantibus, quorum corpora tenella multo magis consentiunt, quam in adultis. Quo majorem autem Dentitio inferat dolorem, eo quoque gravior febris nascitur, quæ quum sit symptomatice, nullam sanationem asserere potest, neque auscultat febrifugis laudatis, sed sponte cessat facta ruptione in gingivis, & cessante dolore, quare in hujusmodi febribus præcipue conandum, ut ipse Dentitionis dolor leniatur, & præveniatur, ne nimia circulatione corpus istud tenellum nimis patiatur.

IV. Ex læsione quacumque tam in adultis quam infantibus facillime motus vitalis primo in parte læsa, deinde per totum corpus in consensum trahitur, quomobrem pars vulnerata semper incipit post paucos dies inflammari, & deinde generatur febris symptomatice: minus autem frequens est, per læsionem motum animale confectum, nisi in vulneribus & puncturis nervorum & tendinum, quando summum imminet periculum. Sed in infantibus ex multo leviori causa motus animalis in consensum trahitur; his enim ex ventris torminibus frequens convulsio, in adultis autem raro, quoniam corpora tenera facile patiuntur, ut per levissimam causam omnes turbentur actiones. Hujusmodi Convulsiones non carent periculo, quum augeant constrictionem, & non tollant mali causam. Quæ in hoc casu præscribuntur antepileptica, quæ toties valuerunt curare Convulsionem Infantum ex acido intestina vellicante, nihil præstare possunt, cum in hoc morbo leniendus sit dolor Dentitionis, minime vero exstinguenda acrimonia acida, quæ frequens est causa Epilepsie Puerorum.

V. Si vero motus naturalis, id est Peristalticus ventriculi & intestinorum in consensum ita trahitur, ut inde copiosior fiat humorum confluxus ad chyli organa, & copiosior depositio per alvum, minus tentantur Convulsionibus. *Quibus in Dentitione alvus amplius subducit, minus convelluntur, quam quibus parum.* Quibus in Dentitione febris acuta accedit, parum convelluntur. H, a, 590. Inde forsitan quia acre crudum acidum frequens convulsionis causa motu majore febrili subigatur, & alvi fluxus reddatur. Nisi autem hoc haberemus ex constante observatione practica, ex ratione a priori, ut ajunt, vix inveniri potuisset: sed cum hoc nunc constet, lucem præbere potest in curatione, nos debere lenioribus calefacientibus, si febris absit, facere febrem artificialem, atque servare alvum apertam, priusquam Dentiens infans convulsione tentatur, ut acre crudum primarum viarum subigatur & expellatur.

VI. Tres vel quatuor illi morbi citati maxime fiunt erumpentibus dentibus caninis, pueris crassioribus, & quibus alvus est dura. Constans est medicorum observatio, Dentitionis morbos plures & graviores fieri, quando *Dentes Canini* erumpere conantur, quod ex figura mucronata & acutiore magisque pungente deducunt. Maxime autem afficiuntur pueri *Crassissimi*; hi enim succo abundantes, qui fere superat actionem vitalem partium, ut observavimus (*Apb.* 69. III.) in majore versantur periculo, pluribusque cruditatibus scatent: si talia corpora itaque crassiora per Dentitionem agitantur, majore sarcina humorum onusta, se tam facile nequeunt liberare. Quibus vero *Alvus est dura* retinentibus cruda in intestinis, hi magis quam si alvus fluat; febre & convulsione tentantur, cum acre retentum junctum cum dentis irritamento, motum perturbatum admodum augeat.

L I B. III. A P H. XXVI.

105. **I**s adtem qui ætate sunt majores, consilia inflammata, ventriculi in occipio introrsum extrusiones, asthma, calculorum generationes, lumbicis rotundi, ascarides, verruce peniles, satyriasmis (strangurie) strume, et alia tubercula, maxime vero supra dicta.

**A**bsoluta dentitione Pueri non omnium morborum sunt immunes, quare præcipuos annumerare voluit istos, qui aggrediuntur pueros inter septimum & post dentitionis tempus.

Convul-  
siones.

Alvi Pro-  
fluxus.

Quibus  
illi morbi  
maxime  
fiunt.

Puerorum  
morbis  
post den-  
titionis  
de-  
tempus.

decimum quartum ætatis annum. Inter hos nullam mentionem facit morbillorum & variolarum, qui morbi his temporibus huic ætati admodum infesti sunt. Quare clare patet, Hippocratis & dein etiam Galeni temporibus hos morbos non existisse; citantur quidem exanthemata quedam ab his auctoribus, sed si tunc temporis variolæ & morbilli ita fuissent cogniti atque pueris frequentes quam nostris temporibus, nullum est dubium, quin in hoc Aphorismo invenirentur.

Tonsillæ.

II. Locum ad finem oris angustiores, postquam ampliatur iterum fauces *capio dicit* vocat Auctor, Latini Tonsillas seu porius angustias faucium. Arque hæ partes ex morbo tumentes idem retinent nomen, sive sit tumor inflammatorius, vel quivis alius. Cur autem ad ætatis decimum quartum accedentes hæ partes magis tumeant, naturalis debet esse causa. Observamus ita nostra corpora nata esse, ut ad hoc tempus accedentia pubescere incipiant, barba erumpat, vox fiat gravior. Dum ergo primo faucium partes tumere incipiunt, nova hac inducta mutatione, sæpe modum excedunt, ut nimium tumeant Tonsillæ, quare frequentissime quoque hac ætate vox solito obscurior fit. Ne autem hæ partes tumentes molestiam adferant, utile erit colluere fauces aliquoties de die refrigerantibus & adstringentibus, inter quæ præcipua nitrum, alumen, rosæ rubræ, saccharum saturni, ut coerceatur nimia intumescencia.

Vertebra  
luxatio.

III. Spondyla hic proprie denotat secundam colli vertebra, supra quam caput vertitur; hanc dicunt nonnulli intro versus tonsillas luxari, alii vero levius exponunt trudi. Hanc autem Luxationem vel Extrusionem fieri non posse per validam vim, ut ceteræ luxationes, tam planum est, ut nemo dubitare possit, cum generetur ex ætatis incremento, quare judicarem incrementum corporis hujus vertebræ, & incrementum cartilaginis Thyroidæ & Tonsillarum ab eadem pendere causa, nempe mutatione facta ab accedente pubertate.

Asthmata.

IV. Asthmatis definitionem dedimus (*Apb. 101. XII.*); hunc morbum huic ætati frequentem esse, fere omnes statuunt Commentatores, ob crudorum copiosorem ingestionem, vel pituitæ generationem. Si autem illæ causæ generent Asthma, frequentius esset infantibus & senibus. Sed Asthma deducendum est ex naturali mutatione in hac ætate. Dum enim Pueri & Puellæ ad pubertatem accedunt, sensim augentur quoque cum corporis incremento vires, sed sensim minus proportionate incrementum moles corporis. In Pueris incrementum generationis organa; in puellis menstrua purgatio incipit: partes igitur omnes magis turgent luxuriante sanguine. Hæc intumescencia naturalis, quæ etiam in puellis mammæ fororiantur, si quoque fiat in tracheæ & bronchiorum interna membrana, pulmonum vasa aerea angustans, Asthma generat, quod superveniente hæmorrhagia in pueris, & mensium fluxu in puellis levatur, quare huic succurrere possumus mittendo sanguinem, si Asthma nimis urgeat.

Calculorum  
generationes.

V. Pueros sæpe velicæ Calculo laborare, sed senes nephritide seu Calculo renali, hodierna observatio confirmat; raro enim adultis lithotomia, frequens autem pueris instituitur: in utriusque autem minor est vitæ ætio, ex qua ratione vel causa non absurdum est deducere Lithiasis originem, cum partes terrestres cum alimentis assumptæ, non satis attenuatæ, cum reliquo urinæ liquore evacuatæ, primo in sabulum, dein arenulas, postea in lapides seu calculos concrescant, quæ majore vitæ actione in ætate constante magis attenuatæ amittunt concrescendi illam potentiam: unde vitam sedentariam agentes, ac si corpus in tali otio minus valeret, frequentius tentantur calculo. Quod autem pueri sæpius Calculo velicæ, sed senes nephritide corripiantur, mira sed tamen constans est præctica observatio, quia in utrique est debiliior ætio partes terrestres dissolvens, sed in incrementum ætate organa præparantia sunt validiora, emunctoria autem debiliiora, cum corpus sensim incrementum debeat; verum ætas declinans præparatorium organorum amittit valorem, dum tamen emunctoria utcumque valeant. Renes itaque in senibus videntur debiliores, faciliusque permittentes partium terrestrium non satis attenuatarum concretionem, quam in pue-

pueris. Hæc autem ratio videtur major in infantibus quam pueris, sed & infantes quoque calculi initia sæpe habent, & antequam calculus ad fatis magnam molem increverit, septimus annus sæpe præterlapsus est. Quod autem pueri frequentius quam infantes tententur Calculo, hoc vitæ generi adscriberem in infantibus, non præbenti tantam calculo materiam, utpote infantes lacte aliisque alimentis levis materiæ sustentati, partes terrestres optime solutas assumunt, dum pueri sensim utentes cibo solidiore & magis terrestri, attamen corpus non satis valeat has partes dissolvere, Lithiasi materiæ majorem copiam suppeditat.

VI. Ex tribus vulgo vermium generibus, qui in intestinis puerorum nasci solent, solos Lumbricos rotundos seu teretes, atque Ascarides numerat, utpote frequentiores, omittens Lumbricos latos Tænias dictos, quia minus frequentes. Utraque Lumbricorum genera etiam generantur in quavis alia ætate, sed quia frequentiores sunt Pueris, in hoc loco numeri debebant. Lumbrici rotundi in colo & reliquis intestinis, imo & in ventriculo sedem habere solent; Ascarides autem minores ut plurimum ad finem intestini recti seu in ano nidulantur. Utrorumque originem putredini adscribunt veteres, sed quia hodie a physiologis demonstratum est, cuncta insecta ex suis propriis ovis excludi, sed degenerare alio nasci pabulo, veterum sententia corrui. Hoc autem verum est, per putredinem multa animalcula ex ovis insectorum excludi, quæ aliter sine accedente fori putredinis non fuissent exclusa ex suis ovulis. Quamdiu igitur actio peristaltica intestinorum valens non permittit spontaneam hanc corruptelam, hæc ova, quæ satis copiose cum alimentis & forsan cum aere inspirato assumuntur, non producent suos vermiculos: sed quando intestinorum actio debilior in pueris utentibus omni genere alimentorum, hanc putredinem permittit, animalcula ex ovulis suis excluduntur & excrescunt in lumbricos. Nimis longum foret hoc loco totam vermium generationem persequi, sufficit notare, vermes in intestinis nasci defectu actionis intestinorum, quo permittitur spontanea exclusio, quæ actione vitæ inhibebatur. Ut igitur curentur & præveniantur vermes, utile erit per calefactionem amara augere intestinorum actionem, & per antiseptica cohibere promptam putredinem: qui autem nati sunt lumbrici mitissimo medicamento mercuriali vel necantur vel expelluntur, modo lene addatur purgans aloeticum.

Lumbrici  
& Ascarides.

VII. Ex Verrucarum genere est quod Græcis dicitur *ἀποχρηδών*, Latinis Verruca penilis, id est cum gracili basi, ac si a filo penderet. Credo autem nostrum Auctorem in hoc loco amplecti velle verrucas cum lata basi, quæ sæpe in superficie finduntur, & ex similitudine vocantur Porrum, quoniam hujusmodi Verrucæ in hac ætate frequentissime conspiciuntur, manus deturpantes. Peniles verrucæ constricto filo facile auferuntur, cum ablata raro renouentur, sed Verruca sessilis & Porrum caustico sæpe renovato sunt consumenda. Sæpe etiam incrementum ætate, ut sponte fuere nata, etiam evanescent nullo relicto vestigio.

Verruca.

VIII. Satyriasmus nomen ex similitudine satyri desumptum esse, omnibus constat, sed qualem morbum hic intelligit Hipp. admodum ambigunt; quidam dicunt esse Tentiginem, seu priapismum; alii contendunt esse tumores glandularum circa aures oblongos; denique alii esse speciem verrucæ, quam minores alie cingunt. Adeoque manet nomen, rem incertam indicans, quod admodum remoratur scientiam medicam. Galenus & Celsus hoc nomen non habent. Si autem Auctoris textum inspiciamus, planè constat, esse speciem Tuberculi, nominavit verrucas, satyriasmos, strumas, & dein addit, *Et alia tubercula*: quare satyriasmos speciem Tuberculi facit. Quod autem interposita sit *Stranguria*, non exstat in omnibus exemplaribus, & credo imperite interjectum esse, sed post *Calculorum generationes* locandum esse; quoniam pueri calculosi etiam frequente stranguria laborant. Videtur ergo mihi, Satyriasmum denotare tuberculorum genus, quod faciem

Satyriasmus.

ciem præpimis dehonestat, cum æque ex faciei turpitudine quam ex tenguinie puer satyro similis evadat. Quum igitur his temporibus in pueris non invenio aliquod genus tuberculorum frequens, verisimile mihi videtur in Regione Hippocratis & istis temporibus morbum Puerorum fuisse frequentem, qui his temporibus non observatur, sed in cujus loco accepimus morbillos & variolas.

**Struma.** IX. Struma seu *χρυσάδης* sunt Tubercula duriuscula sub cute in collo, alis, & inguinibus hærentia, vix differentia a scirrho, quæ omni dolore carent, nisi vehementer tangantur, vel tandem contentus humor deliquescentis acrimoniam inducit: raro unicum tale tuberculum habetur solitarium, plerumque multa simul tactu deteguntur, nam vix faciunt eminentem in cute tumorem, sed tactu explorata, videntur tanquam nuges vel glandes mobiles majores & minores sub cute hærentes, quæ huc illucque moveri possunt, occupantes glandulas hic hærentes, quæ transmittunt vasa lymphatica. Hujusmodi Scrophulos multo frequentius observavi in Puellis quam pueris circa hanc ætatem. Videntur mihi nasci ex materia gelatinosa concreta & subsistente in glandulis, quæ vasis lymphaticis accretæ sunt. In animalibus junioribus invenimus succum gelatinosum concrescibilem copiosorem, quam in verustis; sed si animalia non satis adoleverint, hic succus vix aliquam consistentiam habet, unde ante ætatem septem annorum in hominibus, quum hic succus non satis concrescibilis generetur, minus frequentes conspiciuntur hi tumores adenosi; sed quando major copia hujus gelatinosæ materie ex naturalis ætatis mutatione generatur, frequentius hæc gelatina circa has glandulas collecta & concreta Stromas generat. Adultiores autem homines interdum etiam hi tuberculis corripiuntur, sed tunc sæpe contenta materia liquefcent, corrodens involu- crum glandulæ, parit ulcera fistulosa curatu difficilia. Priusquam aperiantur in pueris vel puellis, feliciter curari solent gummis & balsamis aromaticis, radice Bryoniæ, & Scrophulariæ, cum mitissimo mercuriali applicatis.

**Alia Tubercula.** X. Plura genera Tuberculorum (Aph. 99. XIII.) hac ætate nasci posse, ut furuncul- os, anthrax, atheroma, ceterique tumores folliculosi, & scirrhus, nullus dubitare potest, sed ex istis omnibus nulla tubercula tam frequentia in hac ætate vi- sunt, quam quæ recensuit Auctor, quamobrem hanc cautionem adicere voluit, ne aliquis existimaret reliqua Tubercula in hac ætate generari non posse.

## L I B. III. A P H. XXVII.

106. **Æ** Tate adhuc provectioribus, & ad pubertatem accedensibus, & multa ex illis, & febres diuturnæ magis, & ex naribus sanguinis fluxiones.

Adole-  
scentiæ  
tempus.

I. **G**alenus & Celsus non eodem modo interpretantur hunc Aph. Celsus enim ita Latine se exprimit, *Incipiente vero jam pube, ex ipsâ multa*. Quibus verbis exprimit tempus post annum decimum quartum, vel inchoatam pubertatem. Galenus hic intelligit annum 12. 13. & 14. & in sequente (Aph. 108.) idem Auctor Hippocratem miratur, quod intermiserit adolescentum ætatem, quæ medium obinet locum inter puberes & illos, qui consistentes ætatis vigorem habent. Ego vero existimo secundum generalem ætatis divisionem (Aph. 203. II.) hic intelligi debere tempus ætatis a decimo quarto ad vigesimum primum, quod tempus Adolescentiæ solet vocari Pubertatem, etiam si ipsius Hippocratis verba hoc tempus non satis clare expriment.

Qui morbi  
hoc tem-  
pore sunt.

II. Non omnibus hominibus idem tempus est pubertatis; quidam enim maturius, quidam vero serius pubescunt, ut viderim puellas, quæ ante vigesimum primum non conspexerant menses; & quidam adolescentes ante hoc tempus non pubescunt; quare in hoc septennio etiam multi morbi in præcedente Aphorismo notati adolescen-

tes

res infestant, præcipue istos, qui sero pubescunt. Sed præter dictos morbos insuper duos allegat, scilicet febres longas, & ex naribus sanguinis fluxiones.

III. Videtur Hipp. voluisse in utroque sexu indicare morbum frequentissimum, & primo in Puellis febrem diurnam seu Chronicam, quæ hodie vocatur Chlorosis, qui morbus in hac ætate tam frequens est, ut nullus sit qui nesciat. Primis enim vicibus menses non tam facile fluunt quam in maturiore ætate, quibus subsistentibus puellæ fere semper in talem febrem albam chronicam incidunt, cujus curatio frustra suscipitur manentibus mensibus suppressis, iis vero in ordinem redactis sponte evanescit Chlorosis.

Febres  
longæ.

IV. Adolescentibus hæmorrhagiæ narium frequentissimæ sunt: iisque enim ad decimum quartum annum magnum accipiebat corpus incrementum, ut id, quod plus conficiatur, quam requirebatur ad corporis nutritionem, per incrementum tollebat: post hoc autem tempus auctis viribus conficientibus cum corporis minori incremento, generatur sanguinis abundantia, quæ sæpe sibi viam pandit, & quoniam narium membrana est mollissima, & vasa hic maxime patula, ex istis sæpissime adolescens fundit sanguinem: quæ hæmorrhagia, nisi modum excedat, salubris est, tollens sanguinis abundantiam, sed quoniam interdum nimia quantitas profunditur, sæpe exigit medicorum auxilium: promptissimum est, turundam mollem liquore styptico ebriam indere naribus, & succenturiata venæ sectione prævenire recidivam, suæ sanguinis missio rarius & minori copia est celebranda, ne tandem adultior factus adolescens huic evacuationi nimis sit assuetus.

Sanguinis  
fluxus.

### L I B. III. A P H. XXVIII.

107. **P**lurime quidem affectiones pueris judicantur, alie in quadraginta diebus: alie in septem mensibus: alie in septem annis: alie ipsi ad pubertatem accedentibus. Quæ vero pueris permanserint, neque solutæ fuerint circa pubertatem, aut sæminis circa menstruum eruptiones, perseverare solent.

I. **Æ** Tatem in tria tempora commode distingui posse demonstravimus (Aph. 97. I.). Absolverat Auctor hucusque morbos in ætatis incremento per partes in infantibus, pueris, adolescentibus, usque ad ætatem constantem, jam ulterius vult persequi morbos in ætate reliqua. Hinc præbet primo generalem regulam, præcedentis ætatis in Incremento, qua finit sermonem morborum hujus ætatis. Totam hanc ætatem pueri nomine complectitur.

II. Medici in temporis assignatione solent initium ponere in primo die, quo incepit morbus. Hoc autem loco temporis initium est statuendum nativitas: ut si morbi fiant in quavis ætate, hi præcipue vel interficiunt puerum, vel solvuntur, seu pueri his temporibus liberantur a morbo. Quales affectiones vel acutas vel chronicas hic intelligat Auctor, facile colligitur, cum quadraginta dies ponantur pro fine acutorum, & qui diutius durant, censeantur inter Chronicos. Potest tamen Puer morbo acuto correptus quadagesimo die, vel septimo mense ætatis perire. Quare duntaxat indicare voluit Auctor, quibusnam temporibus ætatis pueri maxime periclitantur, & a morbis liberantur. Observavit Hipp. citata tempora in textu maxime observanda esse, quod quoque in præcedentibus exposuimus. Ex qua autem ratione hoc profuât, plane me latet, nisi quod hæc observatio in mera experientia sit fundata. Ut si quis quaereret, cur non æque annus septimus, vel verbi gratia quinquagesimus, sit tempus pubertatis, quam decimus quartus. Cur non etiam anno secundo, ut quibusdam animalibus, sit hominibus matura ætas? Nihil respondendum habeo, nisi quod Deo in creatione ita placuit certos hos ponere limites. Quamvis causam nesciamus, observatio tamen manet constans, multos morbos

Puerorum  
morbis  
quo tem-  
pore ju-  
dicantur.

bos puerorum circa hæc tempora periculosissimos esse, & qui diu fuere morbi conflati circa pubertatem liberari, ut demonstravimus (*Aph. 70. IV.*).

Morbi circa pubertatem aut menstruum crupiones non cessantes per severe solent

III. Si puer vel puella morbo longo vexatur, huic magna est spes cessaturum morbum, si ad pubertatem veniat: si vero ulterius continetur morbus, raro deinceps liberantur, ut hodie quemadmodum olim constans testatur experientia. Si inspicimus Celsum, qui dicit, *neque primis coitibus, neque in femina primis menstruis finita sunt, sere longa sunt*, statuendum videtur, feminis & sanguinis mensuari evacuatione liberari. Ego vero his evacuationibus, quamvis phænomenis manifestis, nollem tribuere horum morborum solutionem, sed viribus audis, quam morbus, qui non potuit hucusque incrementibus viribus superari, tam pertinacem habet causam, ut vix ulla remaneat spes, eam postea superari posse.

# LIB. III. APH. XXIX.

108. *Juvenibus autem, sanguinis sputiones, tabes, febres acutæ, epilepsia, et alii morbi, maxime vero supra nominati.*

Qualis juvenum ætas hic intelligatur.

I. Celsus hunc Aphorismum sequenti modo exponit: *Adolescentia morbis acutis item comitialibus, tabique maxime obiecta est: sereque juvenes sunt, qui sanguinem expuunt*. Quibus verbis plane constat, hic intelligendam ætatem eam, quæ inter XVIII. & XXXVI. annum continetur; etiam Galenus nostrum Audorem carpit, cum oblitus fuerit Adolescentiæ, in quo tamen temporis spatio Adolescentia & juvenus concipi potest.

Juvenibus sanguinis sputiones.

II. Naturalem hæmorrhagiæ causam in Adolescentia exposuimus (*Aph. 106. IV.*) consistere in cessante corporis incremento, dum tamen maneat conficiens abundantia causa: quando igitur ille sanguis non tollitur narium hæmorrhagiâ, non raro ex pulmonis vasculis ruptis effunditur, & una cum tussi ejicitur spumofus sanguis: præcipue si simul corpus ad hæmoptosin sit figuratum; vel juvenis abutatur spirituosius, vocemque nimis intendat. Qui vero trigessimum sextum annum ætatis superarunt, quoniam vasa sensim magis fuere confirmata, minorque generatur abundantia, rarius in sanguinis sputum incidunt, & qui eo corripunt, minus periculum subeunt.

Tabes.

III. Qualem speciem phthisis (*Aph. 89. II.*) hic intelligat Hipp. non consentiunt Commentatores; puto tamen plane constare sensum, quem statim post sanguinis sputiones ponit Tabem, quo indicare voluit eam speciem, quæ solet sanguinis sputiones sequi. Quæ species hodie quoque juvenibus est frequens, cum post sanguinis sputum ex pulmonibus ulcus relictum tandem Tabem generet. Frequentiorem Tabis generationem ex hac quam alia sanguinis evacuatione ex variis deducere causas. Nam in sputentibus sanguinem non omnis in bronchia effusus sanguis emittitur ita, ut nihil restet, sed semper, quia sursum contra naturalem sanguinis gravitatem ducendus est sanguis, quædam portio in bronchiis & vesiculis pulmonalibus restat, quæ corrupta hic format ulcus, quod quoque difficulter suum confectum pus evacuare potest, & propterea ab incumbente & corrupto pure latius sensim serpit ulcus. Hoc etiam viscus continuo motu respirationis agitur vix permittit consolidationem. Atque libero hoc aeris aditu summopere promovetur corruptela. Susceptum hoc ulcus minuens Pulmonum præparationis actionem, & corruptum pus miscens sanguinis massâ, ita corrumpit totius corporis pabulum, ut inde vera phthisis purulenta generetur.

Febres acutæ.

IV. Ex morborum acutorum genere febris Acuta est species, quare hæc phrasin non solum indicat morbum vel brevem vel vehementem, sed qui adjundam habet febrem aut continuam, remittentem, vel intermittentem, præ primis certia-



tianam, cum quotidiana & quartana febris raro vocetur febris acuta. Si huic febr jungatur Inflammatio alicujus partis, generaliter a praedictis vocatur morbus acutus vel Inflammatorius. Hujusmodi febres Acutas juvenibus frequentes esse non solum testatur experientia, sed & ratio dicitur. His enim est humorum abundantia atque corporis vigor: cum igitur morbi propter vires admodum valentes calidiores esse solent, quam in aetate alia, causa quae in alia aetate lentam induxisset febrem, in hac vero calidam & acutam: imo febrilis causa in tali aetate propter vim vitae praevialidam redditur acrior & magis calefaciens, quam materiem veteres Bilem vocare solent. In hujusmodi febribus Sanguinis missio, Alvi ductio, & Refrigerantia praestantiora sunt, minuendo quantitatem & impetum, quam in febribus reliquis: cum abundantia & vigor major admodum augeat morbi periculum.

V. An Hippocratis tempore & in ejus Regione in Juvenibus frequens fuerit Epilepsia, negare haud possum, sed nostris temporibus & in hac Regione rarum est observare, nisi aliquis a pueritia eo morbo corruptus fuerit. Si vero per Epilepsiam vult intelligere eam convulsionis speciem, quam in puellis referunt ad Passionem hysterica, omnino hujus morbi in hac aetate frequens est observatio; cum foeminae mensium suppressione, vel & profluvio laborantes, saepe tentantur insulcibus epilepticis, quem morbum hodie referunt ad suffocationem uterinam, etiamsi omnes characteres Epilepsiae (Aph. 70. II.) habeat.

VI. Tandem addit aliis quoque morbis obnoxios esse juvenes, quoniam multi in pueritia nati hac etiam in aetate continuantur; ut & aliis corripiuntur morbis, sed ex omnibus istis annumerati morbi sunt frequentissimi. Quando igitur in sequentibus citantur morbi Juvenum, hos praecipue intelligere vult.

## L I B. III. A P H. XXX.

109. **U**ltra hanc aetatem vero progressis, asthmata, pleuritides, peripneumonia, lethargi, phrenitides, febres ardentes, alvi profluvia diuturna, cholerae, dysenteriae, lienteriae, haemorrhoides.

I. **A**B anno aetatis XXXV. ad XLIX. dicitur virilis vel constans aetas, cum finis juventutis apud medicos ponatur annus XXXV. & initium crude senectutis annus XLIX. Non tamen ita stricte hoc tempus est accipiendum, quoniam in quibusdam citius, in aliis tardius venit Adulorum aetas, & finitur pro viribus corporis magis minusque valentibus: communis autem terminus virilis aetatis his quatuordecim annis continetur.

II. Ut in Incremento aetatis sensum quoque crescebant vires, & in Decremento minuuntur vires, sed in medio hoc tempore Adulorum in eodem tenore fere persistebant: ita sensim a finito corporis incremento circa XXI. aetatis annum ad XXXV. sensim minuitur humorum abundantia, ut qui morbi fiebant in adolescentibus & juvenibus ex abundantia, nunc minus infestent. Post annum igitur aetatis XXXV. tolerabilis est humorum quantitas cum valentibus viribus. Unde morbi ex corporis vigore cum mediocri humorum quantitate hac aetate prevalent.

III. Ex Asthmatis definitione (Aph. 101. XIII.) satis constat, morbum esse ex quibusdam phenomenis nominatum, & agnoscere varias causas, saepe enim fiunt Asthma Autumno (Aph. 101. XIII.) & in Pueris (Aph. 105. IV.) sed quae adoriuntur Adultos aliam agnoscunt causam. Cum Adulorum corpora robusta sanguinem admodum compactum & tenacem faciant, videtur in his generari Asthma ex sanguinis lentore, quo majori molimine per pulmones possit trajici. Quamobrem asthmata adulorum, quae ex hac aetate nascuntur, commode tolli possunt antiphlogisticis resolventibus, lentorem sanguinis minuuntibus.

## IV.

Pleuritis.  
des.

IV. Pleuritidis nomen a Pleura desumptum generaliter significat omnem dolorem in hac membrana, siue sit in hoc vel illo latere pectoris, antierius vel posterius, ad superiorem vel inferiorem partem pectoris; cum has partes omnes hæc membrana pleura interne cingens dolore correpta Pleuritidem inferat. Si vero absolute ponatur Pleuritis, ut in hoc loco ab Hipp. & aliis practicis, intelligitur Dolor Pleuræ ab Inflammatione, quæ ex signis huius Dolori iunctis innotescit, ut sit Dolor punctiorius urens, uti in omni inflammatione, sed qui externo attractu vix augeatur, cum pleura intus pectus ciogens externo attractu vix moveatur: si vero ad attractum multum augeatur dolor, aut si inflammationis signa externe in pectore conspiciuntur, hunc morbum vocant pectoris inflammationem. Huius Pleuritidis adest pulsus durus & frequens cum corporis siccitate & ardore, cum febre continua ex natura inflammationis: sed Tussis molestissima & dolorifica, Respiratio difficilis ab affecta pleura veniunt. Duo igitur genera signorum ad detegendam Pleuritidem veram requiruntur, unum, quod declarat Pleuram esse affectam, alterum, quo morbo ille dolor generatur. Et quando adjuncta signa declarant Inflammationem, talis Pleuritis dicitur Vera; sed si aliorum morborum dolorem inferentium adfuit signa, omnes illæ species Pleuritidis dicuntur nothæ. Hoc itaque loco duntaxat demonstrandum est, Adultos proniores esse in Inflammatorios morbos. Hoc loco suppono, quod alibi demonstrabitur; Inflammationem esse morum vitalem auctum in quodam ramo arteriæ, quo generatur in sanguine Lentor, & produciuntur in parte omnia signa, quibus distinguimus Inflammationem a quovis alio morbo (vid. Comp. T. 47. 1.) Hunc motum validum fieri posse in adultis, quibus est summus vigor corporis, nullus dubitare potest: atque sanguinem facile compingi jam aucto motu, qui sanguis in sanis Adultis densior est, quam in quavis alia ætate, ut fidem facit sanguinis missi exploratio, nemo incipias ire potest. Cur autem Pleura sæpius hac tenetetur Inflammatione, illi non erit mirum, qui novit, hanc membranam scætere arteriis, admodum esse tensam, valide agitari suis fibris, expositam esse aeris injuriis, cum intus a suscepto aere frigido, & externe tenuibus integumentis sit: tecta membrana. Quibus concurrentibus causis hæc membrana frequentius, quam aliæ partes, Inflammatione corripitur (Conf. Aph. 102. 11.).

Peripneumonia.

V. Quamvis Peripneumonia ut Pleuritis nomen accepit ex parte, non tamen omnes Pulmonum affectiones vocantur Peripneumonia, sed quando Pulmo vel Inflammatione vel Erysipellate corripitur, est Peripneumonia, unde non opus hunc morbum in verum & nothum distinguere. Cognoscitur etiam ex generalibus notis Inflammationis vel Erysipelatis, cum mutatis functionibus pulmonum: sed quoniam hæc functiones impeditæ etiam mutant consuetos characteres inflammationis, imprudentem medicum facile fallere possunt. Calor æstivans, siccitas, & febris continua acuta ex natura inflammationis manent. Sed pulsus fit mollior & debiliior propter impedimentum sanguinis transitum per pulmones. Dolor admodum obtusus, imo potius fit Anxietas, quia paucis nervis sensui dicatis gaudet Pulmo. Ex Pulmone affecto difficillima & laboriosissima sublimis fit Respiration, ut ægri erecti sedentes cogantur spirare, etiam si ex debilitate decumbere amant, quod Pulmo inflammatione turgens vix admittat aerem, qui si efflatur, calentibus nimis pulmonibus, fervidus sentitur. Facies phlogosi suffunditur magis quam in Pleuritide. Hunc morbum frequentior em adultis fieri ex iis, quæ supra de Pleuritide diximus, facile colligi potest. Et mirum est Peripneumoniam, cum Pulmo nudo aeri exponatur, non fieri frequentior em: forsan inde, quod suus specialis motus, quo caret pleura, & paucitas arteriarum ex Bronchialibus venientium, Inflammationis fit minus capax,

Lethargi.

VI. Ex soporoso morborum genere species est Lethargus, etiam si interdum acci-

accipiat pro omni soporoso morbo. Adeste debet somnus morbosus diuturnior & profundior, quam in hominibus sanis observatur, ita tamen ut somno possint excitari, sed excitati protinus in eundem relabuntur cum oblivione omnium rerum. Auctores non consentiunt, an ad morbos pituitosos vel biliosos Lethargus sit referendus, quare inter Coma, Carum, & Lethargum magna confusio significatio- nis. Multi Lethargum ad morbos pituitosos referunt, natum ex lenta frigidaque causa, dum autem in hoc loco ponatur inter morbos arduentes calidos, & in adul- tis, in quibus minime conveniret accusare pituitam, sed lentorem, qui cum mi- nus libere duci possit per cerebri vasa, contenta encephali comprimendo, soporem generat, quemadmodum Asthma (111.) recentium impedito fluxu per pulmones. Unde toties respiratio difficilis jungitur Lethargo, & describitur a practico Lethargus pulmonum. Signa igitur lentoris in corpore cum somno profundo oblioso Le- thargi praesentiam arguunt, talem quoque curationem exigunt. Quibus satis con- stat, quam male multi agunt, qui volatilibus & aromaticis conantur huiusmodi soporem curare. Et plane concipi potest, robustos & adultos huic morbo magis esse obnoxios, quam quavis alia aetas.

VII. Eadem causa in superioribus morbis recensita si afficiat meninges, produ- cit symptomata, quae collecta uno nomine vocantur Phrenitis; morbus enim est in- flammatorius cum febre continua, pulsu duro & frequente, atque corporis aestuante calore, sine ulla intermissione, quod etiam verum est in recensita pleuritide & pe- ripneumonia. Quando vero meninges agitantur inflammatione, subiectum cerebrum ita movetur, ut homo deliraret, & nullus concedatur somnus, sed, nimis compresso cerebro, interdum videntur dormire, dum tamen tales homines dicantur a nostro Auctore valde Phrenitici. Qui vero insaniunt ex paroxysmo febrili, non vocan- tur phrenitici. Non est opus demonstrare, Phrenitidem esse morbum Adultis fre- quentiorē, cum a praecedentibus duntaxat differat in loco inflammationis.

VIII. Ex aestuante seu fervido calore cum febre, haec species veteribus fuit vocata Causos; & quoniam febris Inflammatoria, Erysipelatosa, & Biliosa, ter- tiana intermittens vel remittens ardore vexatur, saepe omnes dicuntur Arduentes. Proprie autem febris Inflammatoria sanguinem compingens in lentorem, est Cau- sus, si nomen ponitur absolute, uti in hoc loco, ad quam ceterae species bilio- sarum februm ob urgentem calorem referuntur, in quibus tamen sanguis admi- stu bilis acris saponaceae, quamvis valide compingitur, magis manet fluidus. Haec igitur febris eandem cum praecedentibus morbis agnoscit causam, eandem- que postulat curationem. Tantum differt, quod motus arteriarum vehementior habeatur per totum corpus, dum in reliquis quaedam pars praeter reliquis magis agitabatur. Ut fit febris Ardens inflammatio generalis.

IX. Quanto cum iudicio Hipp. morbos adultis frequentiores annumerat, ex hoc Aph. constare potest. Hucusque enim citavit morbos inflammatorios primo parti- culares, dein finem imponit cum inflammatione generali seu febre ardente. Jam vero aggreditur morbos biliosos, seu qui ex bile liquefcente & corrupta, per ma- iorem motum nata, nascuntur. Bilis enim maiore motu non compingitur in hu- morem lentum, uti formatur maiore motu ex parte gelatinosa concrefcenti nostro- rum humorum, sed liquefit, fit acris & urens, ut omnia pinguia per maiorem calorem. Ita Bilis materia maiore corporis robore & motu in Adultis secreta, & deposita in intestina, ea sua vellicante acrimonia in perpetuam dejectionem sollicitat; & quoniam manet bilis scaurigo, etiamsi deponatur alvus, generari debet Alvi profluvium diuturnum; tam diu durans, ac generatur in hepate & vesica fellea bilis tenuis & acris. Haec alvi copiosior & diuturnior egestio curan- da est evacuatione & emendatione bilis acris & calidae corruptae; nam si consti- petur alvus adstringentibus, diuturniori mora in intestinis contenta bilis sensim

fit acrior & furens. Conducit igitur eam bilem eliminare purgante acéscente faponaceo, & dein compescere egestionem per acida, bilem tenuem & acrem compescens, interim interdum intermiscere purgans, ne accumuletur corrupta Bilis in Intestinis. Sic sensim & sponte in ordinem redibit alvi egestio.

*Cholera.* X. Bilis tenuis illa & acris calida iisdem causis nata, sed congregata magna copia in vesica fellea, ductuque choledochi, tandem abundans in duodenum erumpens, sua rodente solvente virulentia non solum Intestina in motum inordinatum validum & inversum concitat, sed in ventriculum per pylorum delata, totum chyli organum mirifice agitat, ut ipsa bilis, ceteraque contenta intestinorum, & in ea confluentes humores concitato hoc motu magna vi pellantur per vomitum & fecesum non sine ægri discrimine, ut hac nimia evacuatione, & valide motu perturbato interdum ægri paucis diebus moriantur.

*Dysenteria.* XI. Transiit nunc ad tertium genus humorum, quod in robustis sæpius generatur, scilicet ad humorem acrem tenuem minus biliosum, quod majori motu generatur, quodque compingi non potest, sed in rodentem & tenuem humorem convertitur, quemadmodum id acre speciale, quod podagricum dolorem infert & Rheumatismum, quale genus raro nisi in adultis & robustis habet originem; simile fere acre ad intestina depositum multa infert tormina ventris, quæ dicuntur *Dysenterix*.

*Lienteria.* XII. Si vero humores concrescibiles adultorum compinguntur in glutinosum lentescens, quod in intestina depositum interna obstitat oscula lacteorum, cuncta alimenta deglutita in ventriculo quidem præparata, ob transitum in vasa lactea denegatum, deponuntur per alvum sub chyli vel alimenti confecti forma, qualis dejectio compesci nequit, nisi faponaceis referatis lacteorum oculis, illo glutinoso obturatis.

*Hæmorrhoides.* XIII. Si Hæmorrhoids vel Hæmorrhoides pro morbo accipiuntur, quemadmodum in hoc loco, duo genera morborum significant, vel exprimunt intumescentiam venarum circa anum; vel earum disruptionem, ut sanguinem fundant. Quoniam autem hic absolute ponuntur Hæmorrhoides inter recensionem morborum in adultis, non sine ratione est conjicere, Hippocratem utrumque morbum intellexisse. Cur autem Juvenibus hæmorrhagias frequentiores, sed Adultis Hæmorrhoides, meretur attentionem. Experientia constat, sanguinis abundantiam, qualis est in juvenibus, magis petere vasa narium ex aorta provenientiam, ut arteriz sanguine turgentes sibi viam parent per extremitates arteriarum: sed in Adultis dum vires magis per ætatem sint firmatæ, minorque sensim generetur abundantia, sed sanguis reddatur magis compactus, lentior ille sanguis ob tardiorum circulationem in vena portarum facile colligitur, totamque venam portarum turgere facit, & quoniam ita lentescens nigrum sibi comparat colorem, existimarunt Veteres esse bilem atram. Collectus ita in vena portarum huiusmodi sanguis, quia hæc vena caret valvulis, istis in partibus, ubi rami portarum minus sunt suffulti, ut circa anum, primo tumere incipiunt non raro cum dolore; dein pergente impletione & distensione harum venarum, venæ tumentes ruptæ sanguinem nigrum fundunt. Quod autem seniores, quibus etiam lentus est sanguis, rarius, corripiantur hæmorrhoidibus, intellectu est facile, quoniam ad hanc collectionem sola non sufficit tenacitas ex concrezione per minorem motum, verum compactus major viribus vitæ, & quædam etiam abundantia, quæ junctæ causæ senibus raro contingunt.

110. **S**Enibus autem spirandi difficultates, catarrhi tussiculosi, strangurie: dysurie, articolorum dolores, nephritides, vertigines, apoplexie, cachexie, pruritus totius corporis, vigilie, alvi, & oculorum, & narium humiditates, visus bebedines, glaucedines, audisus gravitates.

**I**nit hunc librum cum hominis vita, seu exponit morbos, quibus ultimus vitæ terminus ex naturali ætatis mutatione est obnoxius. Divisionem senectutis in Crudam, Mediam, & Decrepitam senectutem dedimus (Aph. 65. 1.). Videtur Auctor in hoc loco tres has intelligere species, sed præcipue ultimam. Ut vires vitæ a nativitate increfcunt ad ætatem constantem, perstant dein, sic postea sensim incipiunt minui. In hac observatione nullam habemus rationem, nisi quod Deo ita placuerit omnia animalia viventia creare, & hæc ponere legem inviolabilem, non solum in hominibus, verum etiam in cunctis animalibus; quidquid garriant chemici & alii rerum naturalium percrutatores, constans tamen manet lex, tandem omnia animalia, etiamsi nullus accedat morbus, perire tamen morte senili, in quo ætatis anno ita sensim evanescent corporis vires, nullo auxilio restituerendis, ut tandem corpus fiat impar suis muneribus ad vitam continuandam peragendis, sive quod vascula minima sensim in callum conversa & obliterata; sive quod spiritus ceterique humores functionibus peragendis fiant inepti; sive quod id vitale a Deo viventibus concessum sit extinctum, determinare non audeo. Invenimus tamen pergente vita hæc tria fieri. Vitæ enim actio sensim fit infirmior; multa vascula antea aperta & mobilia sensim occluduntur, fiunt callosa & rigida, humores omnes sensim minus perfecte præparantur: quæ omnes mutationes sunt inevitabiles. Sed diverso genere vitæ hæc præmature fieri possunt, corporis validior motus citius occalescere facit vasa: intemperantia citius consumit actionem vitæ: quare non sunt excusandi, qui immoderatis exercitiis, vel intemperantia aliquid veluti de suo vitæ curriculo detrahunt.

II. Ex sola virium diminutione difficilior fit Respiratio, cum ad eam peragendam actio vitæ requiratur. Verum etiam pulmonis ut aliarum partium fibræ rigidiores factæ & minus sequaces motus impedimenta pariunt. Hæc nulla arte sunt tollenda. Sed humorum viscositas, qua pulmo magis impletus in alia ætate satis facile tollitur, in hac autem ætate nullis pectoralibus laxantibus obtemperat, imo eadem difficiliorem inducunt spiritum: quamobrem medici experientia edocsi detexerunt vino malvatico, resinosis & balsamicis calefacientibus omnium optime senum difficilem respirationem levare.

III. Humor tenuis crudus & acer ex capitis internis partibus destillans ad ejusdem partes externas, vel fauces, pectus, aliasque partes remotiores, vocatur humor catarrhus, atque ipse descensus dicitur destillatio seu Catarrhus. Hic humor destillans in interna laryngis membrana titillando Tussim parit. Materia Catarrhus videtur in senibus esse, vel humor perspirabilis retentus huc depositus, vel materia mucosa liquefcens. Et quoniam virium defectu muci proventus est copiosior, ejusque liquatio promitior in humorem acrem stimulantem, hinc ætati senili hic morbus debet esse frequentior, ut supra observavimus (Aph. 65. IV.). Quam vero difficilis sit hujus morbi curatio, cum respuat omnia mollia bechica, & morbi senum omnes chronici ad mortem durare soleant, (Aph. 64. IV.) facile colligi potest.

IV. Ex guttatim cum crebra cupiditate mingendi, & dolore emissum lotium strangurie seu urinae stillicidii obtinuit nomen, sed varias agnoscit causas, ita supra ex siccitatibus (Aph. 95. XI.) autumno (Aph. 101. VIII.): hic vero in senibus

Senum  
naturalis  
mutatio.

Senibus  
Dyspnoea.

Catarrhi  
tussicu-  
losi.

Strangu-  
rie.

observavit Hipp frequentem fieri stranguriam. Cum aliis statuo senes calculosos sepe laborare stranguria, sed in hoc loco puto magis respici debere ad duas in senectute præcipuas causas. Observamus, corpora viventia quo magis recedunt a nativitate; eo generare in se urinam acriorem, quæ abstergens & acrior si abstulit urethræ mucum, tangens nuda urethræ latera, parit mingendi perpetuum desiderium, sed quam primum ex vesica in urethram descendit urina, urethra irritata se protinus constringens, aliquot saltem guttulas urinæ transmittit non sine dolore, manente mingendi cupiditate. Atque in senibus, quemadmodum mucus tracheæ fit acrior & ruffim parit, ita etiam mucus viarum urinæ in hac ætate acrior liquefcens, qui irritando urethram, crebram mingendi cupiditatem parit, & in transeunte urina magis ad urethram applicatus hic mucus acer, protinus quoque urethram constringi facit. Mollia quidem & diluentia temperant urinæ acrimoniam, sed resinosa, aromatica, oleosa, ut monuimus in Tussi senum, magis opitulantur stranguriæ senum ex mucæ acrimonia nata. Ex iisdem etiam facile intelliguntur, quæ de *Dysuria* dicenda sunt.

Articulo-  
rum dolo-  
res.

V. Variis generibus dolorum Articuli infestari possunt, podagra, arthritide, rheumatismo, & aliis, verum huiusmodi dolores non magis invadunt senes, quam alias ætates; unde in hoc loco quædam species doloris articulorum assignari debet, quæ frequentior est senibus. Deducere itaque hunc dolorem ex eadem materia colligativa acri, quæ deposita in laryngem producebat tussim, & in vias urinæ pariebat urinæ difficultatem: sed quando id acre colligatum miscetur smegeti naturali articulorum, tunc ligamenti articulorum inferret dolorem, præcipue si movendo articulum magis prematur acre ad illa ligamenta. Quales dolores tentare lenire balsamicis resinosis, calefacientibus, ad articulos applicatis, ut prævenire spontaneam smegetis liqutationem, & excuterem, quod in articulis erat collectum.

Nephriti-  
des.

VI. Omnes morbi Renum sepe dicuntur Nephritides, sed præcipue Dolores. Non constat inter auctores, num renum calculus, num vero Inflammatio vocanda sit nephritis vera. Quantum vero ex loco hoc colligere possum, Hipp. hic intelligere vult renum dolores, quoniam nephritidem inter dolores aliarum partium citat. Et quoniam versatur in annumeratione morborum, qui ex liquata acri lymphæ oriuntur, non facile credere possum, hic intelligi debere nephritidem calculosam vel inflammatoriam, sed Lymphaticam dictam, quam mihi quoque sepe contigit observare in senibus, quamque feliciter balsamicis, resinosis, & oleis aromaticis sustuli.

Vertigi-  
des.

VII. Si vero humor pituitosus liquatus, senibus frequens, ex meningibus secretus, ad infundibulum cerebri, unionemque nervorum opticorum collectus, hos nervos afficiens ita, ut inordinate moveantur eorum fibrillæ visui destinatæ, mens percipit eandem ideam ac si imagines in oculo supra retinam pictæ inordinate moverentur; cum mens non valeat distinguere, num nervus opticus moveatur ab imaginibus rerum externarum in oculo pictis, num vero idem nervus moveatur a causa in calvaria hærente. Inde senum vertigini medemur cephalicis, aromaticis, calefacientibus, & volatilibus, & etiam apoplegmaticis, quibus hunc humorem opticos premenem & agitantem evacuamus & discutimus.

Apople-  
xia.

VIII. Si vero Pituita major copia collecta ita opprimat cerebrum, ut ejus functiones aboleantur, generatur apoplexia (*Apb. 17. I.*) pituitosa senibus frequens & periculosissima, cum haud facile sit hanc collectam pituitam discutere, & cerebri ejus abolita functio, vel & sensum compressum cerebellum mortem adferat. Quoniam in nulla alia ætate tam copiosus est pituitæ proventus, quam in senibus, inde etiam his frequentius accedit apoplexia pituitosa quam cuivis aliæ ætati.

Cachexia

IX. Virium debilitas senibus naturalis non solum permittit humoris boni gelatinosi naturalem degenerationem in lentam pituitam, vel in humorem tamen liquatum acrem, sed etiam quæ assumuntur alimenta, minus juxta præparata in.

in tali corpore debili primo formant materiem crudam, qua quoque corpora senum scaterere solent, dein verò cruditas non emendata, sed corruptione alienata præbet humorem flavescensem, qui per corpus dispersus, transparentis luridum producit colorem, quem cachexiam vocare solemus. Nulla cachexiæ species difficiliorem promittit curationem, quam quæ generatur, cum curanda sit restauratis viribus, quas in senibus restaurare nescit medicina.

X. Sensus titillationis est Pruritus, quem ad scalpendum vel fricandum instigat, qui si major fiat, in dolorem commutatur: unde patet esse doloris causam vellicantem, sed partes sentientes tam leviter tangentem ut dolorem inferre non possit: multæ species acrimoniæ in principio, ubi leviter incipiunt operari, Pruritum inducunt. Quomohrem in hoc loco duntaxat demonstrandum est, senibus frequentius ad cutim colligi humorem acrem: Hoc autem ex antecedentibus palam fit, quoniam senum corpora debilia in producenda acrimonia spontanea per debilitatem prona sunt; hæc acrimonia ad cutim pulsa, ut cum perspirabile exhalet, propter minutam perspirationem facile in poris cutaneis hæret, & ita pruriginem excitat, quæ diaphoreticis antisepticis est corrigenda & auferenda.

Pruritus  
totius  
corporis.

XI. Non semper nomen humiditatis designat majorem copiam humorum comparative ad partes firmas in nostro corpore; sunt enim corpora macilenta admodum uliginosa quædam, dum succi plena videantur sicca: imo sanguinis missio & purgans detrahendo humoris copiam humectant. Sed si humores retinentur in laxatis & minus motis partibus firmis, ut ad visum & tactum exhibeatur humiditas & laxa frigiditas, tales partes dicuntur esse uliginosæ & humectatæ. Hoc autem maxime fit in senibus, quorum corpora effræta & inertia deficiente motu vitali frigesunt, & vix valentia excutere humores per insensibilem perspirationem, in vasculis cutaneis quasi leucoplegmatia laborant. Cur autem alvus, oculi, & nares humectatæ dicantur, videndum est. Dum corpora parcius perspirant, quemadmodum senes, id aquosum, quod aliter per cutim exhalat, nunc ad intestina depositum *Stnum humidior* facit. Eadem quoque perspiratio minor etiam in sanis oculis & nares humectare solet; præcipue si harum partium simul adsit atonia, quemadmodum in senibus jam per ætatem debilitatis. Quare lachrymæ & narium stillicidium senum veluti sunt characteres.

Alvi, oculorum, & narium humectates.

XII. Senibus ob multas concurrentes causas sunt amblyopiæ. Parcior enim & imperfectior spirituum fit confectio; oculi bulbus laxior corrigatam veluti facit corneam; tunica oculorum amittunt pelluciditatem; humores oculorum sensim fiunt pallecentes minus pellucidi, ut tandem in senectute decrepita his causis omni lumine priventur. Et quoniam turbatur aqueus humor, vel opacitas lentis casum adspicientibus præbet colorem, glaucedine cum visus diminutione, vel & perfecta cæcitate laborant.

Visus hebetudines.

XIII. Quum auditus ut visus exerceatur spirituum bonorum influxu per nervos, ex generali causa debilitante & extinctione actionis nervorum & spirituum, eodem modo ut visus redditur hebetior: atque tympani membrana relaxata, cum mucosi collectione in concha interna, & forsan etiam in labyrintho, non promovetur Barycoëcia, quæ ex his causis nata nullam capit medelam.

Glaucedines.

Auditus gravitates.

M E D I C I N A  
H I P P O C R A T I C A,  
E X P O N E N S  
A P H O R I S M O R U M  
H I P P O C R A T I S  
L I B R U M Q U A R T U M .  
P R Æ F A T I O .



*U*n in Libro præcedente multa egregia de variis temporibus Anni & Ætatis reliquis Hippocrates, ita cognitu utilissima de Purgantibus & Vomitoriis, atque Morbis Ventriculi & Intestinatorum in hoc tradidit Libro: quibus adjecit Symptomata varia Februm, bonum & malum præsagium præbentia præcipue ex sudoribus & urinis. Si quis vellet mirabilia hæc ex fonte alio quam observatione practica haurire, incassum impenderet operam. Quia vero omnes hæc detecta regula omnibus in casibus non inveniuntur absolute vera, in explicatione nostra utplurimum adjicere debuimus, quoniam in morbo tradita regula inveniatur firma: & in assignandis causis solitariis coacti fuimus alias etiam addere causas, non quod Auctor nescivisset plures causas eundem effectum visibilem facere posse, sed quoniam ex proposita morbosa causa detexit talia phenomena evenire. Quare non semper alicujus phenomeni recensentur causa omnes, neque proponuntur omnes effectus causa singularis, sed quedam horum. Talem enim descriptionem non permittit Aphorismorum brevis, sed Dogmaticam alicujus morbi compositionem requirit, cujus specimen in nostra Medicina Dogmatica nuper edita dedimus.

APHOR.



## A P H O R. I.

171. **P**regnantes purgandæ, si materia turgeat, quadrimestres, & usque ad septimum mensem: hæc vero minus. Juniores autem & seniores sævus caute vitare oportet.

I.



On sufficit in Praxi Medica simplicis casus cognitionem possidere, cum sæpe in compositis a recepta medendi methodo debeamus recedere; si ulla, hæc sane pars magno judicio eger, vixque patitur regulis generalibus completi, ut olim indicavimus (Comp. T. 54. XI.) Sed in speciali fere semper proposito casu judicium est ferendum. Egregium præbet Auctor in hoc Aph. exemplar, supponit enim foeminam gravidam, quæ si sana sit, omnem purgationem vetat, in hac supponit morbum Purgationem postulantem: quid autem sit facendum, concludit, Purgandam esse, sed non nisi gravi ratione, adeo ut leves indicationes Purgationes exigentes in gravida foemina sint omittendæ ob abortus metum. Atque magis vetat medicationes in juniore & seniore foetu. Videndum igitur, qui morbi vel causæ in gravidis postulant Medicationem; cur uno tempore graviditatis periculosiores censeantur, quam alio tempore.

Contra indicationes ægendæ diffcultatem pariunt.

II. Quæ foemina ætatis maturæ, in uteri cavo, clauso ejus orificio, continet ovum foemineum semine virili prægnatum, illudque fovet, nutrit, & incrementum præbet, donec in illo ovo, utero recepto, formetur perfectus foetus, qui finito termino certo gestationis, nisi prius abortu pereat, excluditur, ea foemina a conceptionis tempore usque ad partum vocatur Prægnans & Gravida. Regulariter toto hoc tempore os uteri clausum esse oportet, sanguisque menstruus omnis in foetus incrementum & nutritionem consumi debet. Si foetus incrementum tantum circiter consumit de naturali sanguinis abundantia, quantum in naturali menstruatione evacuari solet, foemina gravida æque sana vivere potest, quam non gravida; si vero consumitio confectioni sit impar, talis foemina ex æquilibrio destructio in morbos vel ex defectu vel abundantia sanguinis incidere potest, quod Medici gravidarum curam gerentes sedulo observare debent, ne præpostere addant vel detrahant ad præveniendos vel curandos prægnantium morbos. Regula autem aliqua generalis ex quantitate purgationis menstruæ utcumque desumi potest. Quæ enim foemina parce purgatur, ex defectu sanguinis solet abortire; quæ autem copiosius solet habere Menstrua, frequentius per abundantiam profudit foetum immaturum.

Prægnans quæ dicitur.

III. Verbum *parvitas* multiplicem significationem habens hoc loco solummodo indicat ex Galeni sententia, cui hac in re maxima habenda est fides, purgationem per alvum: quare duntaxat examinaturi sumus, qui morbi vel causæ in gravidis exigunt Purgationem. Etiam si hoc loco non monet, Prægnantes non esse purgandas, plane tamen ex hac prolata sententia colligi potest, cum moneat, purganda non esse, nisi materia turgeat, quasi diceret, tuto possumus quovis homines sanos purgare, nihil inde periculi expectandum; foeminam autem gravidam & sanam non licet purgare, nisi materia turgeat: atque in aliis hominibus morbo correptis levi ex indicatione propinamus purgans, at in gravidis tantum, si materia turgeat. Hæc autem sententia experimentis & rationibus adstrui potest, quum prægnans sana & morbo correpta a purgante forti dato facile abortiat: atque purgans concitando motum in intestinis, versus anum, sæpe adjacentem uterum in consensum trahens foetum elidit præmature. Hoc autem magis a Veterum pharmacis quam hodiernorum erat expectandum, quibus Elaterium, Scam-

Qui morbi & causæ exigunt purgationem in gravidis.

Scammonium, Helleborus, Colocynthis, Granum Gnidium, aliaque validiora erant in usu, dum vero hodie Cassia, Manna, Rhubarbaro, Senna, aliisque mitioribus vel in parva dosi datis alvum laxare conamur. Neque mitiora in Gravidis sanis, conducunt, quoniam sine urgente necessitate non sit subeundum periculum: sed si alvi ductionis urgeat indicatio, hæc mitiora præ drastis sunt eligenda. Indicatio urgens secundum Auctorem est, si *Turgeat*. Turgescentia refertur vel ad copiam majorem humorum, vel ad impetum versus aliquam partem. At nullam in his invenio indicationem in gravidis alvi ductionem suadentem præter contentorum in intestinis abundantiam. Si enim sanguinis adsit abundantia, retentis menstruis, levi purgante dato, quo magis determinatur sanguis turgens ad uteri vasa, extrahetur fetus depulsa placenta ab adhærente utero. Gravidæ autem morbo acuto laboranti cum aucta circulatione, si illie impetus per purgans determinetur magis ad alvum, facile fiet abortus. His autem in morbis tam ex turgescentia quam impetu majore conduceret sanguinis missio, quæ minuendo copiam & orgasmum humorum præveniret Abortum. Si ergo liceret contra Galenum aliosque Interpretes per *parvas* intelligere sanguinis missionem, appositæ esset Medicatio gravidarum, si materia turgeat: sed si notare debeat Alvi ductionem, nemini suaderem in gravidis hanc regulam prædicam imitari.

Quando purgandum seu potius sanguis mittendus in gravidis?

IV. Quoniam demonstravimus tam in gravida sana quam morbo correpta non conducere Alvi ductionem ad minuendam sanguinis turgescentiam, frustra esset hoc loco persequi tempus gestationis, quo magis minusque conveniret purgans: hujus itaque loco substituemus sanguinis Missionem, quæ Medicatio in juniore & seniore foetu est omittenda. Primis mensibus si concepit foemina, ex menstruo sanguine retento non tanta timenda est turgescentia, quæ urgetur sanguinis missionem, progressu autem temporis crescente embryo in foetum grandiozem, quibusdam gravidis, quibus menses solent esse copiosiores, generatur sanguinis tanta turgescentia, cum increfcentis foetus omnem sanguinis copiam insumere nequeat, ut inter quartum & septimum mensem gestationis abortus fiat, quia vasa uterina tanta copia sanguinis turgescentia detrudunt adhærentem placentam. Grandiore autem scilo foetu plus nutrimenti capax facile potest id, quod foemina naturaliter abundans in suo corpore conficit, in incrementum sui auferre, ut inde nulla tunc remaneat indicatio minuendi sanguinis copiam per sanguinis missionem. Contra hanc autem rationem his temporibus experior, invaluisse quibusdam consuetudinem mittendi sanguinem ultimis gestationis mensibus, & instante partu, proferentibus, venæ sectionem facilitare partum. An recte vel secus faciant, ex allata ratione facile erit discernere.

## L I B. IV. A P H. II.

112. **I**N purgantibus talia e corpore sunt ducenda, qualia etiam sponte prodeuntia utilia sunt: contrario autem modo prodeuntia, sistenda.

Evacuationis necessitas.

I. **N**ostrum corpus ea est lege creatum, ut actione vitæ continuo se ipsum destruat mutando humores in liquamen inutile, partesque firmas deterat: eadem autem actione ex assumtis alimentis bonos conficit humores, & refarcit firmas partes, ut maneat vita in longum tempus; sensim vero magis debilitata hac actione morte senili perit inevitabili lege. Corpus igitur perfecte sanum ex bonis tandem in se colligi inutiles humores, partesque firmas abrasas, quæ si non eliminantur, statim aliquo ex retentis corripitur morbo. Neque ita valens est nostri corporis actio, ut quævis alimentorum nomine ingesta in bonum & alibilem succum possit commutare, sed quæ restituant, non subigenda & commutanda, si

retri-

retinentur, sui generis itidem morbos inferunt. His solis ex rebus si generarentur morbi, omnes facile in duo genera potuissent discerni; quorum unum genus complecteretur morbos ex retenta materia inutili, alterum quod permitteret bonos evacuari. Præter hæc autem duo infinita est morborum series alia, cum corpus nostrum injuriis externis expositum vario modo affici possit, humoresque vel nimis moti, vel minus agitati, aut stagnantes in variam alienam convertantur naturam. Ita mutatus a sano statu liquor interdum cum levamine, interdum cum detrimento evacuat: hæc dicitur symptomatica, illa critica, cujus diversitatis cognitio sola observatione præctica detegitur. Ut si pus modica copia emittatur, evacuatio dicitur critica; Putridum autem exiens, vel evacuatio quævis immodica, sola observatione præctica æstimanda, vocatur symptomatica evacuatio, cum detrimentum adferat. Unde intelligitur in materiæ morbosæ evacuatione, eam solam esse bonam, quæ modicam quantitatem materiæ evacuationi adaptatam educit (*Apb.* 21. II.); Evacuationem vero copiosorem & crudorum, & cor-  
reptorum (*Apb.* 12. VII.) esse symptomaticam.

II. Evacuatio autem est duplex, & particularis. De generali Qualia purgantibus evacuanda. satis egimus passim; hoc loco de particulari evacuatione per alvum est agendum. Ut de hac speciali evacuatione stabilis & firma habeatur doctrina, animadvertendum est, intestina nobis esse datâ ad alimentorum confectionem, quod consilium per vasa lactea ceteraque absorbentia conceditur corporis nutritioni, huc quoque ad eundem scopum multi consunt humores. Quod autem confici non potest, & qui confluentes fucci preparando inutiles fuere facti, sensim ad anum devolvuntur & exonerantur: unde non inepte alvus a veteribus habetur emundorium primæ coctionis. Nullibi autem vel in ventriculo, vel toto intestinorum tractu invenio organum depuratorium totius massæ circulantis, sed multa quæ fecernunt bonos humores ad chyli confectionem destinatos, vel quæ intestina munire debent, ne ab alienis afficiantur, qualia multa ad intestinorum finem mucum oblinentem fecernendum destinata. Tria igitur præcipue genera inutilium vel malorum humorum hac via evacuari possunt; (1) Naturalia assumptorum crementa, & inutilis hic agendo facti humores; (2) Humores hic confluentes morbofi, & assumpta corrupta, quæ cacochylia vel cacochymia vocari potest; (3) Humores boni in generali abundantia hic copiosius depositi & evacuati. Cuncta hæc vel sponte, id est ipsa corporis actione, vel medicamenti auxilio eliminantur. De Purgantibus itaque hoc loco Auctor præcipit talia ducenda esse, qualia etiam sponte prodeuntia utilia sunt (*Apb.* 23. IV. *Apb.* 25. II.) id est, quæ evacuanda sunt, ut sanitas conservetur, vel amissa restituantur, nam quæ utilia sunt nutritioni, si evacuantur per alvum, ratione evacuationis dicentur inutilia & cruda. Ducenda ergo sunt purgantibus crementa chylificationis, si in intestinis resistunt, quod ex alvo tardior facile innotebit, & facili alvi ductione obtineri possit. Ducenda quoque cacochylia in intestinis collecta, quæ sæpe prægredientem præparationem exigit & fortior alvi ductionem. Humorum abundantia hac quoque aucta evacuatione cum levamine potest minui, cum alvi fluxus in abundantia veniens sæpe curationem attulit. Quid autem sit sentiendum de evacuatione materiæ morbosæ toti massæ mixtæ, ambigo. Omnes fere contendunt, corpus optime depurari alvi ductione, ita ut propterea tale medicamenti genus dicatur Purgans: sed quando morbi quædam materia bonis mixta sit, nemo valet medicamentis facere depurationem, sed exigit organum fecernens (*Apb.* 21. IV.) quod segregat, dum transmittit humores, malum a bono, unamque speciem humoris ab alia, ut supra quoque notavimus (*Apb.* 21. III.): adeoque si morbi quædam materia est in corpore, nemo valet ex theoreticis definire, quali organo morbosum segregari possit, num valeamus delectam morbi materiam ducere per alvum: sed observationes præctice in variis

186 *MEDICINA HIPPOCRATICA* *Aph.* 112.  
 morbis sunt consulendæ. qualisnam materia sponte & critice per alvum fuit  
 exonerata, qualia multa exempla ex Practicis collegimus in *Comp.* T. 90.

Quinam  
 alvi flu-  
 xus sile-  
 nt ?

III. Alvi fluxum interdum promovendum esse, interdum sistendum, supra (*Aph.*  
 1. XIV.) indicavimus. Hoc autem loco dicit Hipp. si alvus reddat talia, quæ spon-  
 te prodeuntia utilia sunt, talis alvi egestio est sistenda. Desumit igitur indicatio-  
 nem ducendi vel sistendi alvum ex spontanea evacuatione. Vix dici potest non so-  
 lum in alvi ductione, sed & in omni mollienda evacuatione, quantum juvet i-  
 mitari naturam: si enim vires valent morbi materiem ducere, ad organum oppor-  
 tunum solent ferre quod valet morbosum secernere a bono & utili, atque deinceps  
 evacuari, quæ tunc evacuatio minuit morbum, & erigit vires: sed si ex viribus  
 deficientibus morbi materia decumbit in aliquam partem, ibique evacuat, neque  
 levat ex ratione morbum, neque permittenda talis est evacuatio, siue fiat natura,  
 siue arte, nam qualia purgari oportet, purgentur (*Aph.* 25. II.) si vero contra-  
 ria, non confert, sed sistenda est talis evacuatio, ne majus damnum inferat.

#### L I B. IV. A P H. III.

113. *Si quidem, qualia purgari oportet, purgentur, confert, & facile ferunt: contraria vero difficulter.*

**E** Adem verba superius (*Aph.* 25.) & fere eadem sententia (*Aph.* 2.) recen-  
 sita invenietur, ut non opus sit eundem repetere sermonem. Hoc autem  
 loco ab Hipp. adducitur, ut inculcet ea, quæ a natura cum levamine solent e-  
 vacuari, non esse relinquenda, si natura sponte non meliatur evacuationem: &  
 ut sistamus spontaneam evacuationem, quæ detrimentum adferre solet.

#### L I B. IV. A P H. IV.

114. *Purgandum, æstate quidem, magis superiores ventres: Hyeme vero, inferiores.*

An magis  
 æstate  
 vomem-  
 dum?

**P**ER *perplexum* hoc loco intelligendum esse vomitorii & purgantis exhibitio-  
 nem, plane ex sequentibus constat, quoniam utilitatem utriusque in sequen-  
 tibus persequitur. Sensus igitur hujus Aph. est, *Æstate* magis, id est, non semper  
 adhibenda esse Vomitoria; Hyeme vero purgantia per alvum. An vero hæc sententia  
 observatione practica & ratione sit fundata, sedulo est indagandum, ne junior medicus  
 Auctoritate gravissimi auctoris alicujus quidquam faciat, quod ægis obesse possit.

II. An Hipp. in hac loco intelligat dimidiam partem anni, uti supra (*Aph.* 81. I.)  
 non vero unam quartam solam partem, non consentiunt Commentatores. Hoc au-  
 tem certum est, modicam temporis portionem inter utraque solstitia accipiendam  
 esse, in qua major est aeris caliditas. In hac calidiore aeris constitutione magis  
 conducere dicit Vomitorium. Hoc autem constare debet, (1) quod natura hoc  
 tempore sæpe solet vomitum cum levamine proritare, ut firmetur sententia su-  
 perior (*Aph.* 112.): (2) quod æstate plures generentur morbi vomitu tollendi: (3)  
 quod sit ex ratione, ut æstate aliquis sæpe vomat. At invenio Vomitus æstate  
 abortum (*Aph.* 100. IV.) inter morbos numerari, quare vomitus sponte abortus  
 non potest indicare vomitorium, quod fecisset, si vomitus æstate ortus tolleret mor-  
 bus æstivum. Num plures frequentioresve generentur morbi æstate, quam Hyeme  
 vomitorio curandi, facile constare potest ex comparatione morborum æstivorum (*Aph.*  
 110.) ad Hyemales (*Aph.* 102.). Generales æstate morbi sunt Inflammatorii, Bi-  
 liosi, & Putridi; ex quibus soli Biliosi Vomitoriis interdum tolluntur, sed Inflan-  
 matorii, & Putridi intenduntur. Hyemales autem multi sunt Pituitosi & Catar-  
 rhosi,

rhosi, qui vomitoriis magis auscultant, quam obrem ex hac quoque ratione non invenio Æstatem magis Vomitorium esse propinandum. Tandem Ratio hoc tempore suadere debet Vomitorium, ut præveniatur morbus æstivus. Aeris æstivi major caliditas & siccitas auget insensibilem perspirationem, humoresque in citam putredinem disponit: sed largior perspiratio non est minuenda vomitoriis, imo putrefacti exhalatio si derivetur ad ventriculum, multorum morborum est causa. Atque corpora calore dissoluta si Vomitorio urgentur, facile in ruptionem vasorum per vehementem vomitorii actionem incidunt, dum solum putrefactum in cavo ventriculi hærens, & forsan vesicula fellea vomitu elici possit, relicto corrupto in reliquo corpore. Ex quibus omnibus liquet, Æstatem non indicare Vomitorium. Quod autem homines intemperantius Ætate viventes magis quam hyeme egeant Vomitorio, quod farcinam collectam exonerat, hoc non propter æstatem, sed propter intemperantiam indicatur, quæ etiam aliis anni temporibus committi potest.

III. Ut discernatur, num alvus hyeme sit ducenda, nec non, (1) videndum est in sanis num alvi fluxus præveniat morbos. Si quis hyeme in alvi profluvium ceteroquin sanus incidit, nimis sentiet suum corpus debilitatum & refrigeratum; Vere autem, & prima æstate, quando superveniens calor ferre nequit solitum pondus humorum, cum euphoria alvi fluxus obortus fuit; quamobrem non habemus præcipientem naturam per spontaneam evacuationem (Aph. 112.). Si vero ex materia morbi hyeme concitetur alvi fluxus levamen adferens, id omni tempore bonum est, & talis evacuatio non ratione temporis, sed materia est imitanda. (2) Morbi Hyeme frequentissimi sunt, qui oriuntur ex prohibita perspiratione: eam autem materiem per alvum ducere frustra conamur, conducit eandem augere excretionem, ex cuius diminutione morbi fuere nati (Aph. 2. XII. & Aph. 21. IV.) (3) Neque ex ratione est, ut aliquis habeat Hyeme alvum laxiorem, cum Hyeme homines habeant ventres calidissimos, (Aph. 15. II.) facileque ferant alimenta, (Aph. 18. IV.) sed laborent frequentissime morbis ex prohibita perspiratione: unde regulariter non debet fieri alvi fluxus, quin sit indicium, viscera ventris esse labefacta, & materiem perspirabilem minus evacuatam, ut inde symptomatikus, minime autem criticus fiat alvi fluxus.

An Hyeme alvus ducenda.

## L I B. IV. A P H. V.

113. *Sub cane & ante canem difficiles sunt purgationes.*

I. Hoc in Aph. fatagit Hipp. demonstrare, quonam anni tempore molestiores sunt medicationes, id est alvi ductio & vomitus, cui quidam addunt sanguinis missionem: sed quoniam Auctor in Aphorismis præcipue agat de vomitorio & purgante, hæc genera medicationis hoc loco persequemur. Primo difficiles esse dicit, quare non interdicit horum usum in morbis, sed solummodo indicat, sanos hoc tempore ad præveniendos morbos non debere assumere vel purgans vel vomitorium: si vero aliquis hoc tempore aliquo laboraret morbo purgans indicante, hoc tempus non vetat purgantis usum.

II. Anxie admodum multi inquirunt hoc tempus, qui ex astrorum imperio quaerunt medicationes, mihi autem videtur, nostrum Auctorem adduxisse stellarum nomina, ut certum præberet anni tempus, quod hodie in Calendario correctio incipit XXII. Julii, & terminatur XXIII. Augusti, sed quoniam Dies Caniculares circa X. Julii incipiebant annumerare, & auctor addit *Ante Canem*, sine multo errore hoc tempus accipi potest ab initio Julii fere ad finem Augusti, quo anni tempore maxime urget aeris calor.

Quod tempus anni hic intelligitur.

III. Qui stellarum imperio multum tribuunt, responderent, a Canis ortu cor-

Cur sub  
pora cane &

an'e ca-  
nem diffi-  
ciles pur-  
gationes?

pota ita debilitari, ut non facile ferant purgantia vel vomitoria, huncque Aphorismum adducunt ad stellarum imperium probandum: sed quoniam cuncta hæc hypotheseſin ſapiunt, nulliſque experimentis firmata, nulla huic doctri-næ poteſt eſſe ſides. Quod autem hoc anni tempore quædam ſiant, id non propterea tribuendum Canis imperio, ſed quoniam hoc tempore maximus regnat cœli ardor, huic cauſæ cognita majori jure tribui poteſt diuinum purgantium & vomitorium. Obſervavimus cum Hipp. (Aph. 100.) Æſtate frequentiffimos morbos eſſe putridos, fieri Vomitus & Alvi fluxum, hos autem præcipue generari Diebus Canicularibus hodierna quoque experimenta firmant. Quum igitur hæc evacuationes ſint ſymptomaticæ, licitum non erit contra regulam generalem (Aph. 112.) alvum vel vomitus concitare, quoniam hac via non valemus depurare putrefactum a ſanis, imo ſi putrefactum ſit in corpore, ſollicitatis his emundioris non raro humores liquefacti tanta copia confluunt, ut eam ſymptomaticam evacuationem non amplius ſit in medici poteſtate compeſcere.

## L I B. IV. A P H. VI.

116. *Graciles, & facile vomentes, ſurſum purgandi, viſantes hyemem.*

Vomitoria  
vereribus  
in fre-  
quentiori  
uſu.

In gra-  
cilibus &  
facile vo-  
mentibus.

Hyeme  
magis vi-  
ſantibus  
vomito-  
rium.

I. Surſum purgare hoc loco idem ſignificare quod exhibitionem Vomitorii, clare patet, quoniam adducit facile vomentes, quibus non magis quam aliis prodeſſent expectorantia. Hippocratis tempore vomitoria in frequenti uſu eſſe, tam in ſanis hominibus quam ægrotantibus, ex ejus ſcriptis facile colligi poteſt: an vero bene fecerit vel male, non eſt huius loci agitare. Hoc autem obſervamus a prudentioribus Medicis, & qui perpendunt vomitus non eſſe evacuationem naturalem, atque ventriculum non eſſe organum excernens, ſed recipiens & præparans, vomitorium propter ſummam efficaciam & virulentiam non niſi urgente neceſſitate præſcribi (Vid. Comp. T. 89.)

II. Ne autem vomitorii frequentior uſus inferret damnum, præcipit Auctor in iſtis ſanis, qui facile vomunt, & qui ſunt Graciles (Aph. 69. II.) vomitorium exhibendum ex levi indicatione, quum facile Vomentes per minimam doſin vomere poſſint, natura quoque aſſucta ſit ſe hac via liberare. Addit inſuper Graciles, primo quoniam huiusmodi incidunt in vaſorum ruptionem per violentam vomitus actionem: & quoniam exiſtimant, iſtos bilis abundantia ſæpius laborare, quæ hac via faciliſſime exonerari poteſt. Ego autem a vehementiſſimo hoc Medicamento abſtinendum eſſe exiſtimo, niſi urgetet vomendi indicatio. Vid. Comp. T. 89. LII.

III. Quoniam Hyeme vetat ex levi indicatione Vomitorii exhibitionem, non ſine ratione aliquis concluderet, Æſtate tutum eſſe vomitorium exhibere, quod ulterius deduci poteſt ex ſuperius dictis, *Purgandum eſſe æſtate magis ſuperiores ventres*: ſed quoniam hæc ſententia a nobis (Aph. 114. II.) eſt denegata, non erit opus eandem hic repetere. Si autem vomendi indicatio urget, an non minus hyeme quam æſtate Vomitorium exhibendum, aliquis quaerere poteſt. Quoniam Hyeme corpora facilius ferunt alimenta, (Aph. 18. IV.) Æſtate autem difficilius, (Aph. 18. II.) frequentior generatur Vomitorii indicatio æſtate, quod cacochyliam collectam exonerat e ventriculo. Atque Hyeme homines ſæpius laborant prohibita perſpiratione, quod per ſpirabile retentum non eſt verſus ventriculum alliciendum, ſed ad ſolitum organum reducendum. Æſtate autem cum largior fiat diſſilatio, frequentior vero cacochyliæ collectio, ſæpius bona vomendi indicatio urget; ut inde ſæpius æſtate quam hyeme proſuerit vomitus.

## L I B. IV. A P H. VII

117. **D**ifficulter autem vomentes, & mediocriter carnosī, deorsum, vitantes æstatem.

**I.** **U**T in superiore Aphorismo desumpsit indicationes propinandi vomitorium ex corporis habitu, & anni tempore, idem quoque assequitur hoc loco ad propinandum purgans. Propterea statuit, ex levi indicatione vel ad conferendam sanitatem conducere mediocriter carnosus ducere alvum omni anni tempore, excepta æstate. Videndum igitur cur hoc ægre vomentibus & mediocriter crassis conceditur, & cur æstate præprimis interdicatur.

**II.** Sorditates primarum viarum vel per Vomitus, vel per alvum duntaxat emitti possunt, hæc igitur si abundant, vel purgans vel vomitorium est propinandum, hoc autem præcipue ventriculum ductumque choledochum exantlat, illud autem naturali sed majore motu concitato cuncta aliena præcipue intestinis contenta emungit. Si igitur vomendi & purgandi valet indicatio, præcipit Alvum ductendam esse in difficulter vomentibus, id est in iis, qui non nisi magna dosi vomitorii in vomitu adigi possunt, vel qui, dum vomunt, admodum torquentur, multamque inde percipiunt molestiam, quales sunt *duosmodi*: quippe per utramque viam potest fieri evacuatio, quæ igitur facillime exonerat, illa est sollicitanda, quasi natura monstraret viam. An vero nulla agente indicatione alvus sit ducenda, ut quibusdam placet, ad conservandam sanitatem, his assentiri nequeo, cum a nobis supra (Aph. 3.) satis disputatum sit corpus sanum nulla egere medicina.

**III.** Corpora sana in tria genera distinguuntur ratione molis, in gracilia, de quibus egimus, obesa, & mediocriter carnosā. In ultimis his, quorum corpora neque multitudine carnis nimis sunt expansa, in quibus admodum periculosa sunt vomitoria, neque propter fragilitatem defectu humorum laborant: his, inquit, admodum conducit ex levi indicatione alvum ducere. Talia mediocria corpora possunt quævis genera Medicamentorum facilius ferre, cum soleant esse robustissima, quare si minima valet alvi exonerandi indicatio, sine periculo propinari potest purgans: sed si perfecta sanitate fruantur, nemini essem auctor, purgantibus fatigare corpus sanum.

**IV.** Quod antea observatum fuit de vomitoriis & purgantibus in diebus canicularibus (Aph. 115. III.) sine multa mutatione hic conferri potest: assignatum enim tempus maximam ætatis partem conficit, quare adductæ rationes, quæ generaliter omnem evacuationem abrogant, ad hunc locum referri possunt.

## L I B. IV. A P H. VIII.

118. **T**Abidi vero, vitantes purgationes sursum.

**I.** **U**Titur Auctor vocabulo, quod denotat hominem phthisi correptum, & dispositionem ad phthisin habentem: inde vetat vomitorium in utriusque. Si igitur effectus vomitoriorum comparantur utrique, facile patere potest, Hippocratem veritatem dixisse.

**II.** Vomitoriorum generales effectus ad tria genera referri possunt (Comp. T. 89. LI.) (1) ad evacuationem ex primis viis, sed præcipue ventriculi: (2) Evacuacionem torius massæ, quod difficile fit, quoniam ventriculus non est organum secernens malum a bono, sed conficiens: (3) Motum majorem. Inde constat morbis ex abundantia in primis viis opitulari vomitoria, quæ valida concussionem egent; ceteris autem inferre damnum, dum evacuant, quod erat retinendum, & moveant, dum erat quiescendum.

III. Qui

Cur ægre vomentibus conceditur purgans?

Cur mediocriter carnosus purgans dandum?

Cur æstate purgans evitandum?

Vomitorii generales effectus.

Vomito-  
rium nocet  
phthisi  
confirmata.

III. Qui dictos effectus vomitorii conferat cum variis speciebus Phthisis (*Apb. 89.*) non difficile huic erit pendere, quam præpostere agunt, qui phthisicis præbent Vomitoria. Nam Tabes Purulenta five pus alibi in corpore five in pulmonibus habeat originem, cum levamine nunquam vomitu potest rejici. Utenim pus sanguini mistum segregetur, requiritur organum, quod creatum est ad alienorum secretionem a bona massa, seu organum excretorium, uti renes, non est enim in Medici potestate aliquid excernens fingere organum, quod non prius existat. Quod si hoc deficeret creatum organum, frustra laboret Medicus omnibus suis auxiliis facere urinæ secretionem a communi massa, sed valet Medicamentis aliquam augere vel minuire excretionem. Cum vero naturalis ventriculi actio sit secernere salivofum humorem, hucusque non constitit Medicum ventriculi actionem ita invertere potuisse, ut secernat, relicto bono sanguine, pus a communi massa. Si autem per Vomitus reddatur pus, ut interdum observatur, id confectum fuit in ipso ventriculo, vel eo per patentes vias fuit delatum, aut si ex communi massa veniat non per modum secretionis, quod fieri debet, sed colliqutionis una cum reliquis humoribus bonis huc confluit & deponitur, quando nunquam infert levamen, aut depurationem, sed debilitatem virum. Neque ulla per anatomiam vel praxim fuit detecta via ex pulmonibus in ventriculum, quæ cum levamine fuit evacuatum pus, sed pus natum in pulmonibus, rejectum fuit expectorando, aut secretum a sanguine per renes, & ita evacuatum. Imo in omnibus morbis purulentis, præcipue si pulmo ulcere sit infectus, non erit licitum tam validam concitare actionem, qualem concitat vomitorium, cum vasa femilacerata ab ulcere, facile violenti concussioni vomitorii disrumpi possunt. Neque tutum erit in Tabes Catarrhosa (*Apb. 89. IV.*) dare Vomitorium; hæc enim corpora debilia non ferunt violentam Vomitorii actionem; neque valemus materiem catarrhosam vomitu reddere; potius autem ventriculum antea liberum catarrhorum collectioni exponemus, quæ materia ducenda erat per cutis spiracula. In Tabes colliqvativa (*Apb. 89. V.*) summo cum periculo ducitur colliqvatus humor ad ventriculum, vel intestina, semel enim si tali referata sit via, non erit amplius in Medici potestate, eum sistere humorum confluxum. Recte igitur Auctor præcipit, Vomitorium in Tabes confirmata esse vitandum.

Atque  
phthisi in-  
stante.

IV. Ut Junior Medicus intelligat, qualia signa Phthisin præfigiunt, quibus apparentibus non licet propinare Vomitorium, præcipua ex iis hoc loco sunt recensenda. (1) Ex phthisicis nati sæpe si ad juventutem veniunt, in eundem morbum, etiam si temperate vivunt, incidere solent, qualis phthisis vocatur hereditaria, vix ullam capiens medelam, cum medicina non valeat naturalem habitum immutare. Videntur his hominibus cruenta pulmonum vasa tam tenera, ut si in juventute generetur sanguinis abundantia & motus major, facile rumpantur; caute itaque hi homines sunt tractandi; ne violentioribus, uti sunt Vomitoria, in sanguinis spurum, & dein Phthisi per nostram præposteram curationem incidant. (2) Ex habitu etiam phthisin præfigere valemus, qui indicat pulmones pro mole corporis esse parvos, atque aeris exitum per glottidem difficiliorem esse; ut inde tales homines in respirando & loquendo atque cantando suos pulmones magis afficiant: quemadmodum gibbosi aliaque mala figura pectoris laborantes, aut quibus pectus est planum & angustum, minus spatium pulmonibus concedens: aut quibus est collum oblongum gracile, vox acuta gracilis, glottidis angustiam arguens. Hujusmodi quoque homines frequentius in hæmoptysin incidunt, quam alii. (3) Quibus autem latens est in pulmonibus vitium, quod facile in phthisin degenerare potest, hi quoque caute tractandi, ne Vomitorii vehementia prompte in Phthisin commutetur: hoc vitium latens vel ex generalibus signis, vel pulmonibus propriis conicimus; uti habitus cachecticus, œdematosus, calor hecticus in plantis pedum, & vo-



& volis manum, inappetentia pertinax, non leve indicium præbent, pulmones affectos esse, præcipue si catarrhis sæpe tentantur: magis autem firmatur iudicium per signa pulmonis magis propria, ut spura flava, pallida, vel rufa, granulosa, sive amara, dulcia vel falsa fiat, multa phlegmatis viscosi maturina excretio, tussis frequens, angustia seu oppressio pectoris; maxime autem minatur Phthisis, si semel-tussiendo ex pulmonibus sanguinem eiecerint. Quoniam vomitorium nullam ex allatis causis tollere potest; & quoniam sua agitatione non leve adfert periculum, optimo jure Auctor verat in his omnibus Vomitorii usum.

## L I B. IV. A P H. IX.

119. **M**elancholicos autem uberius deorsum purgabis, eadem ratione contraria adhibens.

I. **P**rior bujus Aphorismi pars ab omnibus bene concipitur, nisi quod *et pro-* Sensus  
expositio.  
*pro* Vehemens, & ab aliis pro Plenius seu Uberius accipitur, quod ex infra dicendis facile deduci poterit. Altera autem pars vel non attingitur, vel refertur ad alias evacuationes. De his verbis, inquit Mercurialis, non est ita facile mentem Hippocratis ad ipsam verborum significationem accomodare. Ego autem existimo hujus sensum planum & simplicem esse Hippocratis brevitate dignum. Monet enim in parte prior, uberius alvum ducendam esse Melancholicis, sed quoniam omnia purgantia non sunt melanagoga, cum quadam potius Melancholiam, alia pituitam, alia lympham, vel bilem ducant, ex his monet talia esse purgantia propinanda, quæ causæ sunt contraria: hoc est eadem ratione contraria adhibens, quoniam scopus tibi est, monet, Melancholiam curare uberius alvi ductione, ex eadem igitur ratione adhibenda sunt Medicamenta contraria causæ, quæ scilicet Melancholiam curant & evacuant sua specifica virtute.

II. Sensu duplici accipiuntur Melancholici, vel ex animi pathemate, ut exposuimus (Aph. 99. II.) vel ex materia, quam vocant Bilem atram. Hanc dixerunt veteres esse Nutrititiam, Excrementitiam, & Morbosam: alii autem distinguunt in Humorem Melancholicum, qui ipsis mitior est, & in Melancholiam ipsam. Si autem hunc Aphorismum conferamus præcedenti de Tabidis, videtur Auctor monere velle Melancholica materia laborantes, & quorum corpora sunt prona ad hujus morbi generationem, ut est temperamentum sic dictum Melancholicum, uberius purganda esse. Ut autem paucis constet, qualis materia dicatur Melancholica, forsitan dabitur opportunitus locus deinceps de ea amplius differendi, pauca notare sufficiunt, quo intelligi possit utiliter præscribi purgantia. (1) Si sanguis ipse privatur parte sua aquosa, ut inde reddatur spissior, ejusque pars oleosa aliquo modo corrumpatur, quæ unita copiosioribus partibus terrestribus, simul exhibet materiem lentam, tenacem & nigram. (2) Si sal ammoniacalis sanguinis naturalis convertatur in salem austerrum, multorum globulorum sanguinis rubri colorem in nigrorem convertentem, præprimis si lenta simul accedat corruptela. (3) Bilis flava, privata suo sale alcalino saponaceo, lentescens, & nigrum colorem induens, etiam generat Melancholiam, quæ dein corrupta pessimum genus Melancholiz inducit, quando etiam dicitur turgens. Præter hæc etiam contendunt, formari ex Melancholia nutrititia compacta; ex Lentore morborum inflammatoriorum, imo ex Pituita vitria corrupta. Omnis autem materia ex quocunque humore nata dicitur veteribus Melancholia, quæ habet has notas; (1) Splendorem; (2) Nigredinem; (3) Tenacitatem, nisi sit soluta a superveniente corruptione; (4) Acrimoniam; (5) Majorem specificam gravitatem, quam in sanguine sano detegitur. Corpora igitur prona ad formationem hujus materiz, vel quæ talem materiem continent, dicuntur Melancholica.

III. De

Cur Me-  
lanchoſici  
uberius  
purgandi?

III. De alvum ducentibus ſatis ſuſe egimus: (Comp. T. 90.) ea copioſiorem facere alvi egeſtionem, cuique notum eſt: cur autem ita extolluntur in Melancholicis, operæ pretium eſt rimari, comparando alvi copioſiorem egeſtionem cum loco & natura materiæ Melancholicæ: Dux in materia ſunt proprietates, quæ ex naturali lege circulationis faciunt eam præprimis colligi in vena portarum ante Hepar, Pondus ſcilicet majus cum adjuncta Tenacitate. Ponderoſa autem præcipue deorſum ferri, ex fontibus ſalientibus, aliisque liquoribus fluentibus per canales quotidiana ſignat obſervatio, & a nobis (*Tractatu de Secretione* §. XIII.) demonſtratum eſt. Quia vero omnes arteriæ ſanguinem exonerantes in ramos venæ portæ ex trunco inferiora aortæ ducunt originem, ſi aliqua ſit in lege circulationis ſtatuenda gravitatis differentia, pars ponderoſior eo verſus præcipue ducetur. Hoc autem ſolum ſufficere non videtur, cum ad pedes æque quam chili organa ſimilis ducatur ſanguis, verum conjuncta Tenacitas videtur hanc Melancholicam, dein Materiem magis colligere in vena portarum: omnes enim reliquæ arteriæ ſe exonerant in venas ſeſe in cavam venam exonerantes, quæ valvulis inſtructa multum minuit reſiſtentiam fluxuro ſanguini per illas arterias, præcipue ſi motu muſculari agitentur. Sanguis vero in venam portarum delatus valvulis carentem, qui ſanguis iterum in hepate debet ſuperare anguſtias, exſtincto fere omni impetu a corde accepto, propellendus motu ſpeciali venæ portarum (*Mot. vit. LVII.*) tarde procedens, ex inſita tenacitate facile moram necit in lata hac vena, non potens facile duci per hepar, ut veniat in cavam venam. Manens hic ultra conſuetum tempus a bona indole ſenſim magis degenerans, tandem quædam portio ſtagnando liquata & corrupta, ſanguini venæ cavæ tradita, circulantem maſſam inſicit, quæ ſpecialis inſectio Delirium melancholicum inducit, ut quæcumque ſpecialia inquinantia ſua propria ſymptomata producant. Priuſquam igitur longiori mora hæc materia fuerit corrupta, ejus tentanda eſt evacuatio per eam viam, quam nobis demonſtravit natura ſalubrem fuiſſe: illa eſt vel per Hæmorrhoides, vel alvi dejectionem, raro enim per urinam, vel vomitum cum levamine hæc ſuit evacuata materia. Quoriam vero non ita eſt in Medici poteſtate concitare hæmorrhoidum fluxum, quam ducere alvum, per hanc igitur viam tentanda eſt evacuatio, non unica vice dando purgans, ſed uberius, id eſt aliquoties ducenda eſt alvus, ut continuata hæc evacuatione auferatur ex vena portarum lenteſcens materia melancholica, quemadmodum non unica hæmorrhoidum eruptione, ſed aliquoties repetita evacuatione ſanantur Melancholici. Summa hic videtur naſci difficultas, quam ad inteſtina nullum ſit organum ſecernens, quod ſegregatam atram bilem deponere poſſit, unicuique enim apertus eſt ductus choledochus, qui prope ventriculum ſe exonerat in duodenum, & propterea videretur atram bilem facilius per ventriculum quam inteſtina exantlari poſſe. Verum aliter cum ramis venæ portæ quam cavæ venæ eſt conſtitutum, illæ enim carentes valvulis oppoſito curſu a trunco ad ramos quoque derivare poſſunt ſanguinem, quoties in uno vel altero ramo tollitur ſuſtentaculum, quemadmodum experimur in hæmorrhoidum fluxu. Credibile itaque mihi videtur, Hepar eſſe organum ſecernens bilem ab allato ſanguine, minime autem valere bilem atram ſeparare, quare ſi bilis atra turgat, ducaturque per ductum choledochum in duodenum & ventriculum, tam dira excitat ſymptomata, & copioſas evacuationes ſine levamine. Quum vero radices venæ portæ ad inteſtina, ut ſit in hæmorrhoidum fluxu circa podicem, dilatantur, ut ſanguinem atra bile infectum in inteſtina deponant, homo ſimili modo per alvi egeſtionem hujus materiæ liberari poteſt, ut alter hæmorrhoidum fluxu. Hic autem non deponitur ſeretus humor, uti ſit, ſi puſ renum actione ſegregatur a reliqua bona maſſa ſanguinis, fed deponitur ſanguinis communis maſſa ex vena portarum: unde unica vice evacuari non poteſt, ſed repetitis evacuationibus ex vena portarum per dilatatas

latatas venas intestinorum, dum interim per arterias bonus sanguis ex reliquo corpore suppeditetur venæ portarum. Sic tandem sensim evacuato sanguine Melancholia infecto, ac accedente puro, qui in portarum vena remanet, magis purus fit, ut jam exigua Melancholiæ portio multitudine boni sanguinis patiat emendari. Ergo utile erit alvum servare laxiorem uberiori alvi ductione, sed non expedit forte aliquid unica vice dare purgans, ut præcipit Noster Senex. Hoc etiam faciendum videtur in Temperamento Melancholico, seu in quibus observatio Medica docuit facile generari Melancholiam, est enim in his curatio præservatoria, qua primordia atræ bilis, quæ retenta lentiora facta, veram Melancholiam induxissent, hac via protinus eliminantur.

IV. Eadem ratione, inquit, contraria adhibens, monere volens medicum in solis Alvum ducentibus acquiescere non debere, ut tantum det quodlibet purgans, sed insuper inculcet (1) alvum ducentia eligenda esse, quæ experientia docuit Melancholiam præcipue evacuare, qualia hodie dicuntur Melanagoga. (2) Eadem etiam ratione contraria adhibenda in Temperamento melancholico, priusquam morbus aggraviatus sit natus. (3) Denique eadem ratione contraria, quæ generationem bilis atræ præveniunt, uti olera, resolutiva saponacea, corporis exercitium, animi hilaritas. (4) Ultimo, quæ melancholiæ collectæ resolutionem promovent, ut ejus inde facilius fiat evacuatio. Tam multa præclara præcepta novit noster Senex sapientissimus medicorum paucis verbis complecti, sed quod dolendum est, illa nimia brevitatis non paucis summam peperit obscuritatem, non nisi versatissimo in praxi medica discutiendam. Qui autem cuncta præcepta sedulo & mente attenta rimatur, eaque cum hodiernis observatis prædictis confert, novisque detectis in anatomicis, in magnitudine ingenii quasi divini hujus Senis aperitur, qui istis temporibus potuit tam solidos & inconfusos canones prædictos condere, ut nullus posterorum eum imitari, multo minus superare poterit. Imo, si Galenum magnum illum medicum, atque Celsum huic comparo, vix puer magis a viro distabit. Unumquemque igitur alligere debent hujus viri dicta. Sincere fateor, quo nostri senis observata magis pervolvam, eo me magis instigant, atque placent, quod etiam aliis medicis placebunt, modo non obstat nimia brevitatis, & inde nata obscuritas, confido.

Eadem  
ratione  
contraria  
adhibens.

## L I B. IV. A P H. X.

120. *Purgandum in valde acutis, si surgeat materia, eadem die: morari enim in talibus malum est.*

I. **Q**ui sint Morbi acuti, ex superius dictis (Aph. 7. II. & Aph. 24. III.) facile colligi potest. De his monuit (Aph. 24.) in Acutis raro, & in principijs purgante utendum. Atque (Aph. 22.) Concocta purgare & movere oportet, non cruda, neque in principijs, nisi turgent. Plurima vero non turgent. Quæ omnia sibi invicem collata multis magnam præbuerunt difficultatem. Ergo autem existimo per hunc Aphorismum præcedentes sententias firmari. Quippe in hoc loco præcipit purgans sub quadam conditione, si scilicet materia turgat, quæ adjecta admonitione indicare voluit regulariter in principio Acutorum non esse purgandum, quod etiam demonstravimus (Aph. 24. V.). Si vero turgat, illa turgescencia detrahit generalem regulam, & indicat plane in principio invasionis, eadem scilicet die purgans exhibendum esse, & ac si illa admonitio non sufficeret, addit, *morari enim in talibus, malum est*. Non quod omisso purgante mors esset expectanda, sed quod morbus acutus invadens cum turgescencia materiæ, si non liberetur per purgans plane in principio datum, plures labores majusque periculum facere soleat.

Quando  
in valde  
acutis  
eodem die  
purgan-  
dum?

II. Turgens humor vel materia, species est abundantiae & plethoræ, ab ea tamen quibusdam in rebus diffat: nam non solum per *öpydu* denotare vult Auctor maiorem humoris copiam in corpore, quam requiritur ad ejus usum necessarium, vel qui sua multitudine opprimens sæpe inermem facit evacuationem, aut depositionem in aliquam partem debilitatam; inde Lymphæ abundantia in hydropicis non turget, neque pituita in parte oedematosa turgere dicitur; neque copiosior alvi evacuatio, vel urinæ aut sudoris profluvium cum corporis refrigeratione, etiamsi multus humor sit in corpore, ex Turgescentia deducitur: si vero cum aucto motu vitali, caloreque corporis, per vires incitatas humores ejiciuntur, ut feminis evacuatio in juvenibus post longam abstinentiam a coitu, tales evacuationes ex Turgescentia fieri dicuntur; atque hi humores ante evacuationem dicuntur Turgere. Ergo ut Turgescentia adsit, duo requiruntur, (1) copia humorum major, (2) organum eum humorem continens validum & instigatum, ut conetur contentum ejicere: quare mediocris copia, modo instigetur vires moventes, in Turgescentiam commutatur, ut illi, qui sani medicorum sanguinis quantitatem habebant, febre acuta correpti, dicuntur orgasmo humorum affecti, quando in iis expectamus salubrem hæmorrhagiam, vel imperamus sanguinis ductionem. Superius autem Auctor (*Aph.* 22. IX.) dixerat, movendum & evacuandum esse si turgat, tamquam esset regula generalis in omni Orgasmo; hic autem præcipit purgandum in valde acutis, si materia turgeat, si hoc loco cujuscumque humoris Turgescentia accipiat, præpostera in acutis ex dato purgante fieret curatio. Quando enim Turgescentia præsignis largam hæmorrhagiam, vel materia critica disposita ad sudorem turgat, si daretur purgans, perverteretur salubris hæc instans evacuatio, & ita perversa medela æger conduceretur in discrimen vitæ, ducta materia critica ad intestina, ubi evacuari non potest, cum locus debet esse conveniens evacuationi. (*Aph.* 2. XII. *Aph.* 21., III. & IV.) Ex dictis plane constat, Hipp. intellexisse Turgescentiam in intestinis, vel partibus, quæ se per alvum exonerare possunt, ergo hoc loco intelligit cacochyliam in primis viis hærentem, motu instigato intestinorum agitatam. Quibus autem signis junior medicus hanc turgescentiam dignoscere possit, alio opportuniore loco exponetur. Secundum Auctoris sententiam si concipiamus maiorem bonorum vel morboforum copiam circa intestina, quam potest æger febre acuta correptus sine damno ferre, bina inde mala nascuntur, pressus enim est morbo, atque insuper premitur multitudine materiæ, conaturque actio vitæ sine successu se ab eo onere liberare, ut inde vires perdat: sed dum ita frustra molitur, qui antea benignus & mitis erat humor, continuata hac agitatione in corruptelam convertitur, ut nunc non solum vitata quantitate opprimatur, sed & accedente malignitate in pejorem redigatur statum. Refle igitur præcipit: Morari enim in talibus malum est, nam cunctando amittit æger vires, & sibi comparat humorem corruptum, quæ mala prævenirentur dato purgante eodem die invasionis.

L I B. IV. A P H. XI.

121. *Quibus tormina, & circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neque purgante, neque aliter solvitur, in hydropem siccum firmatur.*

I. **T**orus hic Aphorismus prognosin exhibet Hydropis siccii non ex rationibus desumptam, sed frequente observatione practica, nam non ulla est hæc sententia accipienda, ac si semper post dicta phenomena in ægris detecta, si non cedant purgantibus, vel alio modo solvantur, hydrops siccus esset expectandus; quum non raro in meis ægris observaverim, hujusmodi tormina & dolores perseverant.

verantes ægros sine tympanitide ad mortem usque concomitari: sed in quibusdam tamen ante mortem generabatur hydrops ficcus. Itaque operæ pretium erit rimari causas hæc phænomena inducentes, quæ tandem Tympanitidem inferunt.

II. Hipp. tribus utitur vocabulis *σπῆρσι*, *πύρι*, & *ἀλγος* ad phænomena in ventre circa umbilicum & in lumbis exprimenda, quæ omnia variam & interdum eandem rem designant, scilicet Dolorem, unde nascitur in expositione magna difficultas: nam aliud est phænomenon, si diceretur ventris seu intestinorum cruciatus, vel tormina, umbilici dolor, & lumborum effectus, quam si simpliciter diceretur Dolor harum trium partium. Sed quoniam noster Auctor semper brevitati, studeat, mallem credere, eum voluisse etiam triplicem speciem designare; scilicet intestinorum omnium tormina seu contorfiones; sed circa umbilicum dolorem constantem, atque in lumbis aliquam simul sentiri affectionem.

III. Acriter disputant Veteres, num Tympanites seu Hydrops ficcus exstare possit, nempe an in cavo ventris possit colligi aer, ventrem illum distendens, ut tympanum aere plenum, unde hic morbus suum accepit nomen, quum nulla detur via, nisi rupto intestino, per quam ire potuisset aer in abdominis cavitatem. Verum hodierna Experimenta satis evincunt per motum automaticum præprimis putredinis, aerem liquoribus adhærentem sine virtute elastica ab iis liberari, & recuperare naturalem expandendi virtutem; unde in corporibus putrescentibus ingens copia aeris continuo eructat. Ergo sufficit, ut in ventris cavo effusus aliquis hæreat humor, qui corruptionem subit.

Hydrops  
a tormi-  
nibus &c.

IV. Dum igitur intestina patientia tormina, varioque modo agitentur, notat motum intestinorum vermicularem esse perturbatum ab irritamento instigatum, quod simul dolorem inferit circa umbilicum & lumbos constantem. Talis causa constans, non cedens purgantibus, declarat, malum non hæere in cavo intestinorum, quia hic hærens simul expelleretur; quare irritamentum hæret vel in lateribus intestinorum vel in mesenterio, quæ pars ultima hic videtur indicari, quum circa umbilicum & ad lumbos sentiuntur dolores. Quare videntur mihi hujusmodi dolores generari a tuberculo mesenterii, constantem inferente dolorem, sed tandem rupto effundente pus vel ichorem in cavum ventris; qui humores pedetentim effusi, stagnantes in loco calido, putrescentes, nullibi inveniunt exitum, tandem abdominis cavitatem aere ex putredine nato adimplent, sensimque magis distendunt incurabili incremento. Quia vero hujusmodi tubercula non semper rumpuntur, & fundunt humorem in cavum ventris, etiamsi similia inferant tormina & dolores, non est quoque constans observatio, post dicta tormina semper sequi Tympaniam.

Quomodo  
a tormi-  
nibus &c.

#### L I B. IV. A P H. XII.

122. **Q**uibus alvi sunt *Lienteria*, eos *hyeme sursum purgare, malum est*.

I. **A**limentorum in ventriculo & intestinis præparatorum citiorem ejectionem per alvum nominari *Lienteriam*, aut *Levitatem intestinorum*, superius (Aph. 101. IX.) indicavimus. Hujus morbi autem cause supponunt actionem, & ut Veteres dixerunt, facultatem concoctricem Ventriculi & Intestinorum valere, id est satis affluere humores saponaceos ad solvendam pinguedinem assumptorum; & motum peristalticum ad permiscendum valere: sed motum propulsivum versus intestinum rectum esse unum, cum absorptione per lactea & venas meseraicas parciore. In organis enim chylopoieticis particularis observatur motus, quo in sanis non solum versus anum propelluntur reliquæ, nutritio privata, sed etiam nutrientia præparantur in chylum, nulla arte imitandum, & ducuntur utilia

Lienterix  
Causa.

in oscula absorbentia. Hic autem motus sui juris est, non dependens a motu generali cordis vel arteriarum, cui tamen interdum consensit, suas proprias mutationes in morbis subit, ut sit vel languidior, vel fortior, vel inversus, vel inordinatus, uti omnes actiones a motu dependentes. Si ergo deficiat absorptio cum motu propellente majore, alimenta assumta quidem mutantur in chylum, sed confectus ejicitur. Inde quædam inveniuntur medicamenta confectiorem alimentorum promoventia, quæ dicuntur stomachica, & itidem alia, quæ actionem propellentem augent, uti purgantia. Quare tamquam certum assumi potest, in intestinis varium motum esse admittendum.

Von ito-  
rium in  
his cur  
malum?

II. Vomitorium non solum ventriculi motum vermicularem invertere, sed ut-  
unque etiam intestinum, nemo ignorare potest, quum iterato vomitu interdum  
quædam intestinum contenta reddantur, præcipue si exhibemus helleborum, quo  
uti sunt Veteres. Si ergo aliquis motu expulsivo validiore ventriculi & intesti-  
norum laborat cum deficiente absorptione, hoc novo addito stimulo, inverten-  
te motum, faciet, ut ea, quæ naturali utcumque directione ferebantur ad anum,  
nunc inverso ordine truantur sursum & reddantur per vomitum, qui motus  
inversus multo difficilius potest tolerari ab ægro quam præcedens in Lienteria;  
atque non promouet chyli absorptionem, sed facit, ut, si adhuc aliquid de  
confecto per vasa lactea in intestinis absorberetur, protinus, antequam eo ve-  
niant, per vomitum reddatur, simulque æger fiat fastidiosus, qualis sensus in  
nobis semper fit, si motus inversus habeatur in ventriculo.

Cum ma-  
xime hye-  
ma.

III. Hyeme vitandum esse Vomitorium, superius (Aph. 116. III.) demonstra-  
vimus, cur autem hoc omnino sit observandum in Lienteria, hoc loco inquire-  
re restat. Non est opus multis verbis hoc adstrui, cum per se pateat, si un indicatio  
vetat Vomitorium, ut est hyems, & accedat altera istam vetans, ut est Lienteria,  
quod gravius fiet malum, si quis contra duas indicationes quam unam exhibeat  
Vomitum. Ita egit noster Auctor, ut non solum præcipiat, quæ sunt agenda,  
sed & moneat, quæ sunt vitanda, quoniam in propria vel aliorum praxi observa-  
vit, vomitorium in tali morbo & tempore datum, malum habuisse eventum, ne  
sequentes medici in eisdem scopulos illidant, & æger ducatur in periculum vitæ.  
Præceptum est egregium in iis, qui tam prompte in quovis morbo & tempore pro-  
pinant vomitorium, ut prudentiores fiant sædula admonitione nostri Auctoris.

#### L I B. IV. A P H. XIII

123. *A*d helleboros qui non facile sursum purgantur, iis ante positionem corpora  
præbuenctanda, copiosiore alimento, & quiete.

Hellebo-  
rus quo-  
tuplex?

I. *U*t hodie in malam consuetudinem introductus fuit usus Nicotianæ, ita  
Hippocratis tempore in Græcia & Ægypto valebat usus Hellebori ad con-  
citandum vomitum: quare Hipp. integrum librum de helleboro conscripsit, ut fate-  
tur Galenus, qui Galeni tempore desiderabatur, & hodie quoque non exstat. Ille  
mos quum omnino exolevit, & in his Regionibus a remine, nisi forsitan agrytis,  
amplius ad vomendum propinatur, non erit opus sedulo omnes cautelas hellebo-  
risini rimari. Sed solummodo notare volui, quæ specie Veteres usi fuere; & deinceps  
cautiones propositas in generali Vomitoriorum usu examinare. Dux species hel-  
lebori Veteribus fuere in usu: nempe Helleborus albus, & niger. Et quoniam uti-  
turi plurali, forsam utramque speciem intelligit, maxime autem Helleborum al-  
bum, quia magis ad vomitum, sed niger ad purgandum adhibebatur. Quoniam  
vero Helleborus albus & niger non sunt species ejusdem generis, substituerunt Ve-  
raturum pro Helleboro albo. Veraturum flore subviridi H. Boerb. 1., 296., 1. Ro-  
yen.

yen. Prodr. 45., 1. Linn. H. Cliff. 468, Tourn. 272. Helleborus albus, flore subviridi. C. B. P. 186. M. H., 385. Helleborum album Matth. Diof. 2., 559. Sed hodierni Botanici fere omnes nomen Hellebori nigri tenere. Inde Helleborus niger verus. R. H. 697., 1. Helleborus scapo florifero, subnudo pedunculo communi bipartito. Rovent. Prod. 484., 3. Linn. H. Cliff. 227. Helleborus niger, flore roseo H. Boerh. 1., 297., 3. C. B. P. 186., 4., M. H. 385. Veratrum nigrum primum. Dod. 385. Ejus loco a quibusdam substituitur alia species, quæ vocatur Helleborus niger, hortensis, flore viridi C. B. P. 185. Hæc nomina sufficere reor ad invenientias has plantas ex hodiernis Botanicis, quarum radicibus usi fuere Veteres.

II In usu radicis hellebori quatuor præcepta tradit Auctor. (1) Quid sit faciendum ante exhibitionem. (2) Quid tum, dum datur. (3) Deinceps quid inter operandum. (4) Denique quæ mala ex ejus usu sint observanda; quæ omnia sequentibus Aphorismis præcipiuntur. Supponit ergo Auctor satis notam esse eo tempore potionis istius præparationem & dosin.

Ufus.

III. Dum exhibetur Vomitorium, observandum est, ne detur illi, cui omnia vomitoria obfunt (*Comp. T. 89. LIV.*). Sed in quibus permittitur Vomitorium, observare vult Auctor, ut distinguamus inter facile & difficile vomentes. In facile vomentibus non videtur præmittenda præparatio, sed in iis qui difficile vomunt. Quoniam vero vomitus non est excretio naturalis, ipsi ægri, nam sani non egent Medicina, interdum nesciunt, num facile vel difficile ab emetico dato vomant, quare tentandum esset alio leviori vomitorio, num talis æger facile vel difficile vomat. Si ergo constat vel ex ægri relatione, vel experimentis, ægrum difficile vomere; tunc monet, corpus esse præparandum ad vomitum.

Exhibet o vomitoria in non facile vomentibus.

IV. Hujusmodi in corporibus si vomitus per helleborum sit concitandus, monet, ea corpora esse præhumectanda, simulque suppeditat auxilia humectantia, nempe alimenta copiosiora, & quietem. Nos vero (*in Comp. T. 89., LVII.*) præcepimus resolutionem materię in ventriculo contentę, & ad mala præveniendā venę scissionem. Etiam si nostrę cautiones non sint exædem, nihil tamen est, quod repugnat. Noster enim scopus est vomitu rejicere aliena & morbosa contenta ex ventriculo, & prævenire mala, quæ ex violentia vomitus nasci potuerunt. Hipp. autem indulget malę consuetudini; etiam si nihil reddi debeat per vomitum, sed reddat modum, quo ægri difficile aliter vomentes per helleborum commodius vomunt. Præcipit corpora præhumectanda esse, quod ad scopum suum recte monet, nam si ventriculus admodum est humectatus, majorem copiam vomitu reddere potest, & ventriculus humectatus, quia laxior, instigatus non tanta vi convellitur, ut omnes partes laxiores. Corpora autem præhumectari copiosiore alimento, & quiete, paucis videndum.

Præparatio ante exhibitionem vomitoria.

V. Nostrium corpus tali est virtute creatum, ut actione sua se ipsum deterat, & ex assumtis alimentis conficiat succum, qui amissum resarciat, ad hoc faciendum corpus sanum nullo alio eget auxilio. Illa autem actio præparans, & abalienatorum expulsionem faciens non ita est infirma, ut quæcumque copiam alimentorum ingestam subigere possit & expellere: si ergo copiosiora alimenta ingeruntur, corpus istud oneratur multis crudis humoribus, partim non subactis, partim spontanea corruptione degeneratis. Inde major copia humiditatis in corpore est collecta quam in sanis requiritur, seu ut noster Auctor loquitur, istud corpus est præhumectatum.

Alimenta copiosiora humectata.

VI. Quo præcedens actio præparans minus exercetur, eo minus alimenta subiguntur & expelluntur inutilia; seu quod idem est, quo minus exercetur hæc actio, eo major de assumtis alimentis copia colligitur in corpore, & quoniam alimenta omnia, quæ lactea vasa intrant, sunt humida, tale corpus, præprimis si copiosiore simul utitur alimento, præhumectatur. Ergo id esset deatxat hoc loco

Quies habet.

198 *MEDICINA HIPPOCRATICA* Aph. 123.  
 eo probandum, in quiescentibus debiliorem fieri actionem. Hoc autem puro tam  
 planum, ut cuius pateat, cum in quiescentibus solo motu vitali hæc actio sit  
 absolventa, dum vero in exercitiis non solum fiat major deritus & expulso  
 motu musculari, verum in iisdem quoque circulatio sanguinis & respiratio sit  
 citior, ut constat ex calore corporis, pulsu frequentiore, & pleniore, atque  
 ex respiratione celeriore & profundiore.

*In prahu-  
 mestato  
 corpore  
 vomito-  
 rium dan-  
 dum.* VII. Tandem ad conclusionem veniens statuit Auctor, In corpore ita prahu-  
 mestato Vomitorium dandum esse, atque hoc non sine gravi ratione. (1) Hume-  
 data illa corpora vomitorii actione multum humidi evacuare possunt, & quod magis  
 est, eadem evacuatione ipsis restituitur æquilibrium, quia abundabat humidum,  
 si vero antea fuisset datum vomitorum, eadem evacuatio fecisset destructionem  
 æquilibrii, tollendo aliquid de mediocri quantitate humorum. Nunc vero illa cor-  
 pora crudis onusta & humiditate scatentia levamen percipiunt a vomitorii exhibi-  
 tione, sed præstantius foret illam abundantiam sibi non conciliare, quam natam  
 vehementi vomitorio tollere. Quia vero ægri sentiebant ex mala consuetudine post  
 ingluviem & desidiam summum ex Vomitorio levamen, istud medicamenti genus  
 multis encomiis celebrarunt. (2) Corpora quiete & pleniore cibo enervata a vo-  
 mitorii stimulo minus exagitabantur, quam quorum vires magis valebant.

#### L I B. IV. A P H. XIV.

124. *P*oto Elleboro, corpus movendum potius, quam somno tradendum, aut  
 quieti. Nam vel navigatio indicat motione turbari corpora.

*Quid fa-  
 cendum  
 post as-  
 sumtum  
 vomito-  
 rium?* I. A Gendi regulam in altero temporis articulo hoc loco præcipit Auctor, quid  
 scilicet sit agendum postquam vomitorium fuerit assumptum, dum adhuc  
 non sequatur vomitus. Inter assumptum vomitorium & vomitum sequentem ali-  
 quod tempus, unius vel alterius horæ, præterlabitur interdum; quid ergo in  
 hoc tempore sit agendum, docet, nempe corpus potius esse movendum, quam  
 somno aut quieti tradendum.

*Cur cor-  
 pus mo-  
 vendum?* II. Non præcipit Auctor corpus movendum esse, sed potius quam ut indulgeat  
 quieti & somno, quia interdum satis cito & valide operatur Helleborus, ut non  
 requiratur corporis agitatio ad vomitum promovendum; sed dum Vomitorium est  
 assumptum, & adhuc dum tempus non est, ut suam operationem exequatur, suadet  
 non sine ratione corpus potius movendum esse. Nam scopus est magnam copiam  
 humorum per vomitum elicere, quod fieri non potest, si corpus tradatur quieti  
 vel somno, in quibus compescitur ille motus, quo ducuntur humores ad ventricu-  
 lum, ut vomitum ejiciantur; imo per hanc quietem inducram compesci potuisset  
 vomitus, ut frustra fuisset datum Vomitorium. Sed potius corpus movendum,  
 quo augetur Vomitorii actio, & majore copia ad ventriculum ducta, copiosior vo-  
 mitus fieri potest. Non constat autem inter Commentatores, quo tempore a vo-  
 mitorio sumto corpus sit movendum, an statim post assumptionem vomitorii, vel  
 post aliquot horas. Si vero attendamus ad scopum, nempe copiosorem evacua-  
 tionem per vomitum, facile est invenire istud tempus. Si enim statim ab assump-  
 tione moveatur corpus, ut ejiciatur Vomitorium assumptum, quia parva inducta  
 est commotio, post ablatum Vomitorium brevi tempore compescitur motus inor-  
 dinatus inductus: sed si per horam unam vel alteram relictum sit in ventriculo  
 vomitorium, continuata agitatio tantum motum inversum induxit, qui tam cito  
 compesci non potest, & qui disposuit organa, ut ad ventriculum majorem copiam  
 humorum ducant, & ita plus per idem vomitorium evacuari potest. Quare non  
 statim moveandum corpus, neque tam diu expectandum, donec virtus vomitorii  
 omni.



omnino evanuerit. *Porius* dicit, quoniam interdum per Elleborum satis valida commotio inducitur, ut non sit necesse vomitum promovere motu corporis.

III. Ut Auctor probet generali observatione & omnibus nota, motum promovere vomitum, adducit navigationem, qua fere omnes homines redduntur nauseosi & tandem vomiturientes. Galenus dicit in quibusdam manuscriptis inveniri *contra nauseam, non vero contra navigationem*. Tunc esset sensus talis, *nam vel nausea indicat motionem turbare corpora*. Quia vero sensus magis planus est legere *navigationis nausea*, vulgatam lectionem esse retinendam puto. Quomodo autem Navigatione generatur in multis nausea & vomitus, non constat inter Auctores, quidam hoc derivant a terrore & timore navigationis, alii a falsedine aquae marinae, alii ex odore speciali. Sed quamvis illae fuissent assignatae causae verae, non tamen magis illa constaret veritas, & assignatio haec nihil lucis praeberet huic generali observationi. Comperimus quidem non solum navigationem, sed etiam unctionem praepriis adverso corpore, atque actionem in gyrum, omnemque insolitum motum, ut est oscillatio, multis in hominibus generare nauseam & vomitum: sed quando illa corpora diu tali motu agitantur, tandem ita assuescunt, ut in ipsis neque nausea, neque vomitus, ex navigatione generetur. Est ergo nausea & vomitus navigantium species regulae generalis, qua constat, corpora fere omnia motu insolito agitata incidere in motum inversum motus vermicularis ventriculi & intestinorum. Adeoque haec observatio nihil aliud est, quam detectio consensus inter concussionem corporis & motum particularem Ventriculi & Intestinorum, quo experimur, quali lege, & quali consensu Deus nostrum corpus creavit, nam hoc ex legibus Mechanicis in rebus mortuis deducere velle, frustra omnem impenderemus operam. Egregia autem est observatio legis naturalis, quum lege hac uti possimus, si velimus turbatum motum vermicularem inducere, quemadmodum fecit Auctor in hoc Aphorismo.

Navigationis cur nausea, & vomitum inducit?

L I B. IV. A P H. XV.

125. **Q**uando vis magis ducere Elleborum, moveto corpus. Quando vero cessare, somnum facito, & non moveto.

I. **P**ost datum vomitorium evenire potest, ut evacuatio non respondeat voto, ut scilicet aeger semel aut bis vomuerit, sed non satis evacuaverit: vel quod nimius diu continuetur vomitus, ut inde malum sit expectandum per super-vomitum. In utroque casu praebet Auctor regulam. Si Elleborum, vel quodvis aliud vomitorium non satis operatur, corpus est movendum, Si vero super-vomitum facit, somnus est inducendus, & corpus non movendum, atque his auxiliis compescetur nimius vomitus. Scopus Hippocratis in hoc loco non est omnia auxilia vomitum promoventia & sistenta, sed solummodo ea, quae consistunt in corporis motu & quiete proponere. Et ut imitemur Auctorem, sola illa auxilia examinaturi sumus, reliqua vero a nobis tradita sunt. (Comp. T. 89, LVIII. & LX.)

II. Quum in superioribus observavimus inter motum corporis & motum vermicularem ventriculi locatam esse consensum, uti inter multas quoque alias corporis actiones, non est mirandum, quod agitatione unius promoveatur quoque altera actio. Si ergo Elleborum vel quodvis aliud vomitorium induxit ventriculi motum inversum, ille motus debilior proritari potest, si moveamus istud organum, cuius motui consentit motus vermicularis ventriculi. Inde si in assumpto vomitorio non satis movetur ventriculus, ille motus est insuper concitandus, cui ventriculus consentit. Quoniam autem non quivis corporis motus aequali modo turbat ventriculi motum, ex corporis motu is est eligendus, quem experientia docuit, motum

Motus promovent vomitum.

tum ventriculi turbare, ut est Veslio adversa, oscillatio, adlio in gyrum, navigatio, illeque motus continuandus, donec satis per vomitum fuerit ejectionum.

Quies &  
somnia  
compe-  
scent vo-  
mitum.

III. Quo penitus perscrutatur corporis actiones, eo plura in viventibus detegimus miranda Dei opera, quæ non nisi propriis suis phenomenis patiuntur detegi, nulla arte imitanda; nisi enim constanti observatione constaret, inter motum animale & motum particularem vermicularem esse quandam consensum, nullus Mechanicus ex detectis suis legibus motus, aut anatomicus ex inventa fabrica valeret hunc mirabilem consensum eruere, sed per inventa in viventibus experimur in corporibus æque constantem hujus rei esse legem, quam quæ leges naturæ in mortuis rebus deteguntur, in quibus non amplius inquirimus, unde proveniant, sed tantum qualem ordinem servant: ita quoque in viventibus est faciendum. Invenimus inter ventriculi motum & corporis agitationem quandam esse consensum. Verum hoc non solum, sed inter motum ventriculi & organa sensus, imo inter animi etiam pathemata, ut conspectu circumgyrationis moveatur primo vertigo, dein nausea & vomitus; atque ex auditu vel visu, imo sola cogitatione rei nauseosæ nobis quoque formetur nausea & vomitus. Hic autem consensus non omnibus hominibus est æque valens, quibusdam enim facile, aliis autem minus ex dictis commoveatur ventriculus. Hac lege generali scire novit Auctor noster uti in Medicamentorum operationibus, dum præcipit, si velis cohibere nimiam Ellebori operationem, corpus est componendum ad quietem, ne corporis agitatione, quæ est in nostra potestate, commoveatur simul motus ventriculi. Atque inducendus est Somnus, ut ita adimatur omnis consensus per organa sensuum; & per animi pathemata, quæ in somno perfecto silent. Quia vero somnus non dependet ab arbitrio nostro, uti corporis motus & quies, igitur si sponte non oboritur in supervomitum, hypnoticis est conciliandus. Inde est, quod hypnotica toties in quovis vomitu & alvi fluxu tantis encomiis celebrantur, quoniam compefcunt motum inordinatum ventriculi & intestinorum: an vero hoc faciant immediate, ut inferant somnum, an vero per consensum, quia sopiunt sensus, hucusque determinare non valeo. Id autem inde elicere possumus, Hypnotica egregia esse auxilia, si post ablationem stimuli vomitivi remanserit in ventriculo motus perturbatus, nauseam & vomitum faciens: sed si remanserit irritans, hypnoticum datum, inhibens evacuationem, ut plurimum augebit malum. Si ergo helleborus supervomitum faciat, antequam inducatur somnus per hypnotica, ventriculus est eluendus, ne quidquam de Helleboro remaneat.

#### L I B. IV. A P H. XVI.

126. **H**elleborus periculosus est sanas carnes habentibus: Convulsionem enim inducit.

I. **G**eneralem regulam Medicationis in sanis corporibus (Aph. 62.) nunc specialem facit, & exponit in usu Hellebori; huic addit facile tunc inde fieri posse Convulsionem. Aliqua tamen status differentia notanda venit, cum in præcedente dixerat, qui sana habent corpora, hic autem qui sanas habent carnes. Ex differentia hac desumi potest, quod in præcedente egerat de corpore perfecte sano, at in hoc loco tam in corpore perfecte sano, quam in eo, quod morbo quodam particulari laborat, non habens malum & morbosum humorem per totum corpus dispersum. In utroque itaque statu præcipit Hellebori usum esse periculosum, atque addit rationem, quia convulsionem inducit.

Hellebo-  
ris cur fa-  
ciat cur-

II. Hippocratem hic & in antecedentibus intellexisse Helleborum album nullum erit, qui dubitet, si modo rimatur vehementes operationes, quas Helleboro tribuit,

boit, qualem virulentiam in Helleboro nigro non invenimus. Hujus enim Hellebori albi tanta est deleteria vis, ut quædam gentes ejus succo intoxicare potuerint tela. Quare admodum mirandum, quod hoc medicamento seu potius veneni genus apud Veteres in tam frequenti fuerit usu, quum, si modo paulo largiori dosi fumeretur, vel ab homine non assueto, vel difficile vomente, vel qui carnes habet sanas, in discrimen vitæ conjiciatur. Tantum valent insana consuetudo & mores inveni, ut non dubitarint lubentes volentesque summum subire vitæ periculum; si quis hodie faceret, imprudentiæ pena esset plectendus. Sed quid dicam de mala consuetudine Veterum? Novi agyrtam, qui gloriabatur se omnes febres quartanas profligasse arsenico & mercurio sublimato in aqua soluto propinato, sed si recorder eorum, qui hoc venenum assumerunt, quidam fuere curati, hoc fateor, sed plures post ingentia tormina morte sequente a febre quoque fuere liberati. Exhorrescimus enim talia audire, quæ interdum ab agyrtis peraguntur; si vero huic perverſæ medicationi esset imposita poena, haud credo istos tam facile periclitari multorum hominum vitam. Recte igitur & cum gravi ratione monet noster Auctor, postquam cautelas Helleborismi proposuerat, in hoc medicamento, ita usu recepto, summam deleteriam latitare virulentiam, ut si assumatur, quibus carnes sunt sanæ, periculum faciat Convulsivonis. Quamobrem majus periculum convulsivonis his, quam quibus carnes alieno succo sunt plene, ex iis quæ supra recensuimus facile liquere arbitror. Quæ enim corpora carnem habent sanam, per nullum evacuans a malo succo, qui non adest, possunt liberari, ut demonstravimus (Aph. 62. 111.). Quæ autem corpora morbo particulari laborant, malus ille humor per vehementem illam evacuationem inde elicitur, duciturque ad interiora, & ita ad loca periculosiora, & talia corpora per vehementem vomitum non liberantur. Ergo in utroque casu periculum intenditur: propterea usus Hellebori & omnium Vomitoriorum in dictis corporibus nunquam est concedendus.

III. Per spasimum in hoc loco intelligi alternam invitam violentam musculorum motus animalis contractionem nemo ambigere potest. Eum motum muscularem voluntarium ab influxu spirituum, imperio mentis in sanis hominibus copiosius ad istos musculos fluentium derivari, ex physiologicis assumo, quia nimis copiosum foret hoc loco æstruere. Si igitur per aliquam causam morbosam iidem spiritus copiosius & majori impetu ad dictos musculos ferantur, sequetur constriction, sed violentior plerumque quam ex voluntate. Quærenda ergo est causa hunc majorem spirituum fluxum faciens, & dein videndum, an ea dependeat ab Helleboro. Dum in nobis inordinate & sursum versus incipit fieri motus vermicularis ventriculi, generatur in nobis nausææ sensus: ille motus si validior fiat, musculos voluntarios ventris in consensum trahit, ut sua constrictione cum motu inverso ventriculi ejiciantur contenta ventriculi sursum per os. Ergo patet inter motum inordinatum ventriculi & motum voluntarium musculorum abdominis tantum valere consensum, ut homo mente constans, si urgeat vomendi conatus, non possit horum musculorum motum convulsivum cohibere. Si vero ille motus ventriculi diu continuetur & sensum reddatur validior, non est mirum, tandem quoque omnem motum voluntarium in consensum trahi. Inde reliqua acria medicamenta, quæ non ita exagitant ventriculi motum inversum, minus quoque solent inferre Convulsiones. Propterea adduxit Auctor Convulsionem, ut demonstraret periculum; quare illa Convulsio non est levis censenda, quod infra faciet (Lib. V. Aph. 1.). Si Medicus in hujusmodi casu vocaretur, non sufficeret dicere periculosum esse, sed & ejus exigeretur auxilium. Omnia decantata antispasmodica nullius essent usus; sed rejecto per vomitum Helleboro & eluto ventriculo, compescendus esset inordinatus ventriculi motus per acida grata & hypnotica, quam regulam deduximus ex præcedentibus (Aph. 145. 111.). Quo compescito motu inordinato ventriculi,

res habentibus periculosus.

Helleborus cur inducit Convulsionem?

fenſim etiam ceſſabit Convulſio totius corporis, niſi prius exſtinguatur æger.

LIB. IV. APH. XVII.

127. *N*on febricitanti, cibi faſtidium, oris ventriculi morſus, & tenebricoſa verſigo, & os amareſcens, ſuſſum purgantis opus eſſe, indicat.

Cacochy-  
lia exigit  
vomito-  
rium.

I. *S*i quis ſit in cavo ventriculi corruptus & vitioſus humor, quem Cacochyliam vocant, omnium commodiſſime iſt per ſuperiora evacuari poteſt, quia via eſt breviffima, nam ſi tranſeat per inteſtina, ſua acrimonia potuiſſet inferre ventris tormina, & ob longiorem moram ſenſim reddi acrior, atque forſan pars tenuior corrupta liqueſcens abſorberetur, atque inſiciet totam maſſam. Dandum ergo Vomitorium, ſed an ſit Helleborus exhibendus, quia ſuperius de eo egit, ambigo. Si enim voluiſſet Helleborum, continuaret Auctor ſermonem, & non ſimpliciter dixiſſet, ſuſſum purgante opus eſt, ſed helleboro opus eſt. Atque ex contextu quoque conſtare poteſt, Auctorem innuere aliud genus vomitorii, quum in priori dixerat, periculolum eſſe Helleborum ſanas carnes habentibus, & incipit hunc Aph. non febricitanti, quaſi vellet indicare hominem ſana carne præditum, ſed particulari ventriculi affectione laborantem. Denique expedit in cacochyliā, ut non ſolum fiat vomitus, ſed ut inter vomendum ventriculus ſimul eluatur, ut ita liberetur ab omni alieno contento. Ergo in Cacochyliā expedit mitius dare vomitorium cum copioſiore potatione. Quia verò medicum oportet ſcire, num in ventriculo latitet cacochyliā, quædam debet habere ſigna, quibus hoc colligere valet, priuſquam vomitorium propinet. Nam ſi loco cacochyliæ hæret in lateribus ventriculi Inflammatio, aut Eryſipelas, aut ulcus; vel ſi circa ventriculum orientur affectiones ſymptomaticæ a febre per totum corpus, a vomitorio dato irritarentur crabrones. Hinc ſummo iudicio tot collegit phænomena, quæ collecta Cacochyliam commonſtrant, quorum quædam etiam ex lateribus ventriculi affectis, vel a generali febre quoque produci potuere. Hæc ergo phænomena ſeorſim ſunt examinanda, ut in ſingulis conſtet, ea provenire poſſe ex Cacochyliā, ſed quædam inter hæc eſſe, quæ non poſſunt ex ventriculi lateribus affectis provenire, aut ex febre.

Cacochy-  
liæ ſi-  
gnum fa-  
ſtidium.

II. Faſtidium ſeu *ἀναστροφή* non ſolum denotat abſtinentiam a cibo, ſed quando ſimul cibum averſatur; in quo differt ab inappetentia, qua ægri quidem non appetunt, ſed tamen non ſunt ſimul faſtidioſi & cibum averſantes: hanc invenimus differentiam, ſi ventriculus vario humore alieno ſit affectus, nam cuius ventriculus cibo eſt plenus, aut in quo tanta hæret piritæ copia, ut percipere non poſſit ſenſum famis, talis laborat inappetentia: ſi vero in fibris ventriculi levis motus inverſus ſimul habeatur, ut ſit initium nauſeæ, talis homo faſtidioſus eſt. Hoc phænomenon generator, ſi aliquid corrupti aut putreſcentis hæret in ventriculo, nam putreſcentia aſſumta ſtatim tale faſtidium inferunt. Poteſt etiam generari ex inordinato motu febrili ventriculi motum perturbante, unde hodie adhuc habentur febres faſtidioſæ. Inrerduſ leviter affecta ventriculi latera ſimile faſtidium inferunt. Quare ſolum faſtidium non declarat Cacochyliam. Inde addit Auctor in non-febricitantibus, ut demonſtret faſtidium non fieri ex febre; & addit oris amaritudinem, quæ non ſit ex lateribus ventriculi affectis.

Oris ven-  
triculi  
morſus.

III. In textu habetur *καρδιωμὸς*, quod ſecundum Galeni interpretationem vertitur, Cordis dolor, ſeu morſus cordis, id eſt oris ventriculi, nam hoc quoque Veteres Cor appellabant. Ille dolor ſeu morſus a multis cauſis poteſt oriri, quod hic nimis longum foret recenſere. Oritur ſymptomatice ex febre vel ex ventriculi lateribus affectis, vel ab acrimonia intus hærente, quare admodum incertum eſt cacochyliæ ſignum; ſed ſi abſit febris, & cetera adjungantur ſigna, tunc u-

num

num est ex signis cacochylia rodentis ; quod signum distinguit fastidium a febrile, vel pituita insipida, ut loquuntur veteres.

IV. Quoniam integram Dissertationem de *Vertigine* publici juris fecimus, non erit opus multis hunc morbum exponere, contenti erimus observare, quod Auctor hic intelligat *Tenebrioscā vertiginem*, id est, quod non solum æger videat omnia ante oculos in gyrum agi, ita videntur obscurari & obfuscati oculi, ut visus extinguatur. Hoc phenomenon ex cacochylia ad oculos delata deducere velle, nimis absurdum esset, cum ipsi oculi non obfuscentur, sed ita appareant ipsis ægris, quia potentia visus minuitur. Si Cacochylia sit in ventriculo fastidium faciens commovendo inordinate ventriculum, hic motus inordinatus per consensum turbat visum. Tantus enim consensus inter ventriculum & oculos, ut vicissim operentur & afficiant; ita ex cacochylia generatur scotomos, & conspectus rerum circumactarum inducit fastidium, nauseam, & vomitum. Ergo scotomos in hoc loco duntaxat declarat ventriculum motum inordinato agitari, dum cetera signa probent, eam inordinatam commotionem produci ex cacochylia.

Tenebri-  
cola Ver-  
tigo.

V. Inter præcipua non solum signa Cacochylia, sed & exhibitia naturam contentorum ventriculi est oris amaritudo. Ille enim sapor amarus in ore notat Cacochyliam amaritudinem habere, qualis sapor observatur in bile corrupta, & pinguedine putrefacta. Et quoniam pingue hoc natura levius supernat, facile, si rufus eduat, una assurgit, & ita os suo amore inficit; vel forsan inverso œsophagi motu in fastidiosum & nauseosum, quadam ejus portio truditur versus os.

Oris ama-  
ritudo;

VI. Constat ergo, in ventriculo contineri humorem alienum, pinguedinosum & corruptum, ventriculum prout esse ad faciendum motum inversum pro vomitu, inde summo jure dicit Auctor, hæc signa indicare purgationem per superiora: Nam si maneat diutius, ejus humoris augebitur corruptio, absorptus humor inficeret totum corpus, pulsus per intestina multa tormina inferret, & forsan subsisteret hoc illuc in tam longa via.

# LIB. IV. APH. XVIII.

128. *Supra septum transversum dolores, qui purgatione egent, sursum purgantem opus esse, indicant. Qui vero infra, deorsum.*

I. **A**git hic Aph. de generali evacuatione, vel per superiora, vel per inferiora, in doloribus evacuatione egentibus, qui occupant loca supra vel infra Diaphragma constituta. Sed quoniam in textu habetur *ταῖς παρῶν*, quæ vox aliquam dubitationem inducit, & quia disputari potest, quænam intelligantur evacuationes, hæc sententia prolata ab Auctore strictius erit exponenda.

II. Etiam si ex Lexicis constat *παρῶν* denotare mentem, intelligentiam, aut sapientiam, prius autem ab Hippocrate accipitur pro septo transverso, quod ventrem inferiorem a pectore sepit, hodie Diaphragma appellatum, habens principium a lumborum vertebra octo vel plurimum capitibus; ascendenti hæc capita sensim carnosiora facta junguntur ante spinam, relicto spatio semilunari pro transitu Aortæ, venæ azygos, ductus chyli ferri, & nervi. Media pars convexa versus pectus tendinea est, & vocatur speculum. Juxta spinam versus sinistram latum habet rimam, transmittentem œsophagum; ad alterum latus in diaphragmate apertura est magis ovata pro transitu venæ cavæ. In ambu diaphragma nexum est costis & ictu. Vasa omnia per Diaphragma distributa ad motum & nutritionem vocantur Phrenicæ: nervus ex pari II. III. & IV. colli oritur, unde forsan magis ejus affectiones consentiunt menti, quam morbi aliarum partium.

Diaphragma  
quid sit.

III. Determinandæ nunc sunt partes dolentes, quæ purgandæ sunt sursum vel

C C 2

Quæ partes  
deor-  
tes supe-

rioris &  
inferioris

deorsum. Omnes partes, dicit, supra Diaphragma dolentes indicantes purgationes, sursum sunt purgandæ. Quia vero Diaphragma sursum ita est convexum, ut altitudinem papillæ mammarum interdum superet, facile potest Medicus in assignatione doloris externa falli, num dolor sit in cavo ventris inferioris, num vero in pectore ipso supra Diaphragma. Quare non pauci fuere, etiam ex senioribus Medicis, qui dolores in partibus ventris inferioris, sub hypochondriis hærentibus, qui interdum ob consensum protenduntur usque ad jugulum, pro dolore pleuritico habuere, & inde putarunt pleuritidem alvi fluxu sanari. Partes superiores seu supra Diaphragma in tria genera distingui possunt. (1) In cavum pectoris, ubi est pleura & mediastinum, nam pulmo & cor si afficiantur, potius inducunt anxietatem quam dolorem. (2) Collum, in quo larynx & pharynx, atque fauces. (3) Caput; in quo partes encephali & organa sensuum concipi possunt. Huc etiam conserri possunt brachia. Partes autem inferiores in ventrem, qui varias continet partes, & pedes distingui possunt. In his jam diversis partibus dolentibus imperat purgationem Sursum & Deorsum, quod paucis videbimus.

Que sit  
purgatio  
sursum.

IV. Solebant Veteres Evacuationem per vomitum & per expectorationem vocare Evacuationem sursum, ut hoc passim occurrit in peripneumonia, pleuritide, & empyemate. Hic autem ex nexu cum præcedentibus videtur Auctor intelligere vomitum & præcipue per Helleborum, in qua sententia quoque fere omnes ejus sunt Commentatores, qui multis verbis conantur hanc tueri sententiam, quam jamjam sumus examinaturi.

An vomito-  
rium  
dandum  
in delori-  
bus supra  
diaphrag-  
ma?

V. Omnes morbi inflammatorii & purulenti pulmonis, pleuræ faucium, capitis, egent evacuatione sursum, in his vero omnibus si daretur vomitorium, & præcipue ex Helleboro. fortissimo, induceretur æger in summum periculum; quam ob rem credere haud possum, Hippocratem in ea fuisse sententia, vomitorium Helleborium dandum esse in dictis morbis, ut ejus Commentatores ex nexu Aphorismorum deducere voluere, quum ipse Auctor in instante & confirmata phthisi (*Aph. 118.*) quæ est morbus supra diaphragma, evacuatione egens, omnino vetat vomitorium. Neque quisquam hodie auderet phrenitide, ophthalmia, vel angina inflammatoria laboranti dare vomitorium. Sed si quacumque intelligamus evacuationem, tunc omnino convenit in doloribus supra Diaphragma, sed præcipue in pectore hærentibus, qui egent evacuatione, per superiora evacuari: & qui dolores in ventre hærent, per inferiora. Vice versa enim si moliamur evacuationem, neque facile procedit, & si fiat, aggravare solet ægrum. Hippocratis sententia absolute posita vera est & praxi conveniens, sed si ad præcedentes Aphorismos connectitur, multas haberet difficultates.

## L I B. IV. A P H. XIX.

129. *Q*uod si in purgantium potionibus non sitiunt dum purgantur, non cessant, priusquam sitierint.

Quomodo  
sitis a  
purgante?

I. Sitim speciem sensus naturalis esse in nobis concitatum ex deficiente humiditate confluyente ad os, ut moneamur defectum esse humidum in corpore, o sim in particulari *Exercitatione de siti* exposui. Ubi simul observavi, multas quoque alias minus naturales esse causas sitim excitantes. Inter has est copiosior alvi evacuatio multum humidum tollens e corpore: adeo ut naturale sit ex generali regula post assumptam potionem purgantem sitire. Experientia tamen docet, quædam purgantia nullam sitim inferre, quod huic regulæ obstare videtur. Sed sciendum est. Medicamenta raro unicam simplicem possidere virtutem, pierumque enim variz unitæ in unico simplici inveniuntur, ut quædam expurgantibus simul refrigereat,

rent, calefaciant, resolvant, adstringant, quæ virtus purganti juncta potest facere, ut unum purgans resolvendo & refrigerando simul minuatur sitim, aliud vero siccando & forsan speciali virtute sitim excitante sitim intolerabilem inferat, quæ non ita a virtute purgante, quam quadam alia adjuncta qualitate dependet. Quoniam Auctor suo tempore usus fuit Helleboro nigro ad alvum ducendam, ex frequenti hujus medicamenti usu didicit, post potionem hanc, alvi evacuationem non subsistere, priusquam sitiverit æger, quod non ita est recedens a communi lege naturæ. Quippe quamdiu alvus ex purgante dato fluit, requiritur, ut excretio humorum in cavum intestinorum sit major absorptione, quam non solum ex intestinorum cavitate per purgans eliminantur humores, qui raro tanta copia hic inveniuntur collecti, verum etiam ex corpore reliquo hic secreti & depositi. Quamdiu igitur continuatur motus determinans ad excretionem in vasis intestinorum, tamdiu etiam durat alvi fluxus, ut tandem etiam fiat hypercatharsis; si vero ille motus cessat, nihil amplius deponitur, ut experimur ex hypnotico dato, compefcente solummodo eum motum inordinatum inductum, qui alvi fluxum produxit. Eo igitur magis sistitur, si motus excretorius convertatur in motum absorberentem: unde toties compefctur alvi fluxus anodyno diaphoretico vel sudorifero, mutante directionem humorum ab intestinis ad cutim. Inter signa autem mutationis hujus directionis excellit sitis; nam quamdiu humores copiosiores deponuntur ad chyli vias, inter quos etiam est saliva, tamdiu etiam servatur os humectatum, nullusque concitatur sitis sensus; sed si ille motus convertatur in absorptionem, saliva, uti reliqui humores, non amplius confluit in chyli organa, inde os salivæ confluxu privatum exarescit, quam exarescentiam demonstravimus esse sitis causam naturalem.

## LIB. IV. APH. XX.

130. **N**on febricitantibus si fiat tormen, & genuum gravitas, & lumborum dolor, deorsum purgante opus esse indicat.

I. **C**onsuetus est Hippocrates magis ex phænomenis in ægris detectis imperare medicamenta, quam ex designatis causis, quoniam detexit in praxi apparentibus istis signis profuisse vel nocuisse data medicamina, quod egregie est praxin exercentibus, quoniam non debent ratiocinari, num ex inventis in ægris symptomatibus hæc vel illa causa lateat purgationem indicans. Quia vero multo facilius memorizè mandari potest, si primo proferantur omnes notiones cacochyliz, & dein dicatur, in cacochylia convenire purgans, quam si toties repetantur phænomena, utile esse ratus sum assignata phænomena exagitare, ut pateat, ea provenire ex Cacochylia intestinorum, ut feci supra (Aph. 127.) pro vomitorio in Cacochylia ventriculi. Per Cacochyliam hic intelligo humorem crudum, vel indigestum, vel spontanea corruptione affectum, præprimis hærentem in cavo intestinorum vel vasis mesenterici: vasa autem lactea valvulis instructa si quid contineant, remittere nequeunt versus intestina; sed vasa tam arteriosa quam venosa succo alieno plena per oscula patentia in papillis intestinorum, contentum humorem in cavum intestinorum deponere possunt, ut evacuetur. Talis crudus in his partibus hærens humor omnium commodissime per purgans ejici potest & debet; nam purgans, ut notavimus, non solum auget motum intestinorum, ut contenta ejiciat, sed etiam auget humorum directionem versus intestina. Atque debet dari, quoniam corruptus ille humor sensim deteriore inducit corruptelam; difficile potest ejici ex intestinis per vomitum, & vasis absorptus totam massam inquinat.

II. Quid designet Ventris Tormen, indicavimus (Aph. 121.); istud autem oriri posse ex cacochylia, & egere purgante, hoc loco est adstruendum. Quis alienus humor

Cacochylia intestini  
purgante  
egret.

Ventris  
tormina  
ex cacochylia.

humor contentus in quadam cavitate humida & calida, præcipue si simul accedere potest aer, per insitum suum motum naturalem corrumpi incipit, tam in corpore nostro, modo non cohibeatur corruptela per actionem vitæ, quam extra corpus in simili loco calido & humido. Post peractam illam corruptelam duo inveniuntur, nempe magna nata est copia aeris, qui per actionem putredinis est liberatus, & ita elasticus factus: atque relictus humor, qui etiamsi antea erat mixtus, nunc invenitur acris, & quo diutius agitur, eo redditur acrior. Hoc acre stimulans intestina, vel & vasa mesenterii, motum inordinatum excitat cum dolore, & quia adest simul multum aeris in intestinis, is inordinate propulsus per inæqualem intestinorum internam superficiem sonum format in ventre. Hæc tria juncta, Dolor, Motus inæqualis intestinorum, & Murmura ventris, vocantur Tormina. Quæ medicamentata quoque liberant Intestina & Mesenterii vasa ab eo humore acri, curant quoque Tormina, qualia sunt Purgantia; sed ut constet, hæc Tormina oriri ex Cacoehylia, cetera signa adesse debent cum absentia febris, quum Tormina sola ex variis possint oriri causis, ut passim demonstravimus, quæ usum purgantium vetarent.

Genuum  
gravitas  
ex Caco-  
ehylia.

III. Duplex est genus gravitatis, alterum ex copia, alterum ex virium defectu. Quid ex his sit intelligendum, clare patet, quia nulla mentio fit tumoris, qui semper jungitur copię, in hoc loco diminuta potentia movendi est intelligenda. At vero omnia corpora debilitata, cacoehymica, scorbutica conqueruntur de genuum gravitate, quare incertum esset indicium cacoehylie, nisi cetera adjuncta essent signa, quæ judicium firmant. Quomodo autem ex Cacoehylia generari possit Genuum gravitas, operæ pretium est rimari. Dum primæ viæ crudo scatent, reliquum corpus utili & preparato chylo privatum redditur lassum & debilitatum; sed præprimis muscoli, qui movent gœna, quoniam tollere debent totum corporis pondus, & quia nervi ad mesenterium tendentes & ad hos musculos ex eadem fere veniunt origine, ut ita mesenterii & intestinorum nervi cacoehylia in sua actione oppressi, reliquos ad femora tendentes, magis quam alios in consensum trahant. Nisi demonstratum fuisset, genuum gravitatem generari ex cacoehylia, & eam tolli posse purgante, paradoxum videretur, aliquem velle purgante mederi genuum gravitati, quod nunc vero satis plane constat.

Lumborum dolor  
ex Caco-  
ehylia.

IV. Ut præcedentia phænomena ex variis nascuntur causis, ita etiam lumborum dolor; nam non solum variæ causæ dolorem inferentes lumbos infestant, sed etiam partes variæ ad lumbos locatæ, vel lumbos in consensum trahentes, diversas species doloris lumborum inferunt: ut sæpe exercitatissimi in arte rimari nequeant, qualis sit doloris causa, & qui locus affectus. Si vero Lumborum dolor conjuncta habet annumerata signa, ut plurimum ex cacoehylia mesenterii & intestinorum provenit, quæ ibidem colligitur, quoniam motus vermicularis debiliior non valens preparare & digerere assumta, permittit hic colligi: atque coacta cacoehylia, suo pondere tendens mesenterium lumbis annexum, facit dolorem pleurumque gravativum, qui interdum unico purgante levatur, vel servata alvo laxiore perfecte curatur. Cuncta hæc signa adesse debere sine febre recte monet Auctor, quia sæpe illa omnia conjuncta sunt symptomata febris, vel morbi inflammatorii vel erysipelatosi, in quibus non conducere Helleboro purgare.

#### L. I. B. IX. A P H. XXI.

131. **D** Ejectiones nigre, qualis sanguis niger, sponte prodeuntes, & cum febre, & sine febre, pessime. Et quanto colores defectionum plures fuerint peiores, eo deterius: cum purgante autem melius, quoque plures colores fuerint non pravi.

I. **A** Nte omnia constare debet sensus hujus Aphorismi, ut deinceps veritas & usus dictorum facile intelligi possit. Agit in hoc Aph. de signis ex alvi excre-



excrementis defumendis; proponit Dejectiones nigras, atque coloris varii, & primo Sponte cum vel sine febre; dein per Medicamentum purgans. In his observat colores in excrementis conspectos malos esse, si sponte fiant dejectiones diu durantes; sed meliores esse seu minus malas dejectiones, si a purgante dato fiant. Multas igitur scitu necessarias complectitur sententias, quas sigillatim exposuisti sumus.

II. Alvum reddere feces nigras ex variis causis, notavimus ( in *Comp. T. 90.* Quod sint nigre dejectiones. XX. ) quæ majus minusque periculum portendunt, prout diversa est causa. Quia vero hoc loco declarat pessimam, quædam adjecit epitheta, ut hæc nigra Dejectio seceratur a reliquis, nempe debet esse qualis sanguis niger, sed quia sanguis niger potest esse solutus vel grumulosus, hoc loco acciperem sanguinem nigrum solum, aliter enim adjecisset *Grumulosus*. Hanc quoque distinguit ab Atra bilis evacuatione, quæ habet acrimoniam, & quæ terram fermentat, ut recte ad hunc Aph. notat Galenus, quoniam in sequente Aph. de Atra bile agit. Hæc dejectio sponte debet fieri, non unica vice, tanquam ex vomica vel varice rupta, sed debet continuari per aliquod tempus, quod *orta* designat. Denique sponte cum vel sine febre, ergo intelligit evacuationem sanguinis nigri soluti, qui sponte per aliquod tempus evacuat.

III. Hæc nunc nigra dejectiones cum vel sine febre declarantur pessimæ, quoniam observavit Auctor post tales dejectiones fere semper mori homines. Galenus autem dicit, *quamplurima ejusmodi excrementa pestilentiali morbo illo longo vidimus, quæ non magis in iis, qui perniciose, quam qui salutariter ægrotant, apparent.* Quæ sententia infringi videtur prior. Videndum ergo est, num ipsa evacuatio inferat mortem, an vero sit signum latentis mali. Ipsa dejectio declarat, sanguinis massam intus contentam ita corruptione esse solutam, ut valis Mesentericis non amplius coerceri possit, sed perluat in intestinorum cavitatem: nam si fluere per hepatis seu porum biliarium, sanguis ille non esset niger, sed flavescens. Arguit ergo illa dejectio summam sanguinis venæ portarum vel arteriæ mesentericæ solutionem inducendam putredine. Quæ putrilago sanguinis actione vitæ raro emendatur; unde indicia putrilaginis semper pessima censentur, præprimis si simul quædam fiant putredinem promoventia, ut est evacuatio major debilitatem virium inducens, ut fit hac dejectione, quum actione vitæ reliqua massa sanguinis bona erat conservanda, quibus viribus detractis conceditur facilior spontanea corruptela. Quia vero addit *Cum vel sine febre*, duplicem videtur innuere velle putrilaginem. (1) Si febris validior ita corrumpit sanguinem, ut ex lentore confecto convertatur in materiem sphacelatam. ( *Comp. T. 90. XXVII.* ) (2) Si sanguis minus motus sine febre corripitur spontanea putredine, sique sit etiam in putrilaginem nigram foetentem, amissa seu extincta omni potentia concrescendi, ut sæpe observamus in diu periculose decumbentibus cum summa debilitate sine febre, per alvum reddi ante mortem. In his omnibus morbis etiam hodie observamus, si fiant Dejectiones nigra, mortem instare, nisi forsitan aliquis benignitate eluctetur. Quare summo jure hæc dejectiones pessimæ sunt censendæ, uti etiam morbi pestilenciales, etiamsi unus alterve evadat.

IV. Si nigra illæ dejectiones ita censentur pessimæ, paradoxum videtur, quod, a purgante si reddantur, dicantur meliores: sed si res ipsa intelligatur, non modo plane constabit, sed & magnam habet utilitatem. Nam si absolute posuisset nigras dejectiones pessimas esse, certe si post purgans datum apparuissent, summum terrorem inducerent: propterea recte adjecit, Meliores esse, non quod sint laudabiles ejectiones, sed minus periculose, quam si sponte fiant & per longum tempus, cum talis dejectio prodicens dato purgante non arguit putrefactum esse sanguinem, sed sanguinem nigrum, qualis semper continetur in vena portarum, v. purgantis per dilatata oscula in cavum intestinorum fuisse elicito, & ita evacuatum, quæ evacuatio quoque cessat finita operatione purgantis: quare hæc evacuatio minus periculosa est censenda.

V. In-

Nigre dejectiones a purgante pessimæ.

Nigre dejectiones a purgante meliores.

**Dejectionum colores plures peiores sunt detiores.** V. Inter colores excrementorum etiam niger censetur pessimus, non tamen reliqui colores omni malignitate carent, si observantur in dejectionibus sponte prodeuntibus & diu durantibus cum vel sine febre. In his duas proponit sententias, primo colores plures, & dein inter istos peiores. Naturalis color excrementorum ad flavedinem accedens est unicus, si autem plures in facibus inveniuntur, illi notant alienos humores tingentes facibus admistos esse; quo igitur plures diversi in facibus inveniuntur colores, eo quoque plures adsunt humores in corpore, quod semper malum est, si varii hi morbi diu durant, ut ex indiciiis excrementorum colligitur. Sed si ex coloribus istis constare potest, num sint humores evacuati, magni vel parvi morbi, eo majus erit periculum, quo major designetur morbus per aliquem colorem. Attamen hi colores prodeuntes per medicamentum purgans sunt parvi periculi; vi enim medicamenti varii possunt elici humores, vel ipsum medicamentum suo quoque colore inficere potest faeces, ut patet in Polypodio, Rhabarbaro, Cassia, & similibus, quando ex colore eo nihil boni vel mali est expectandum.

## L I B. IV. A P H. XXII.

132. **M**Orbis quibuscumque incipientibus, si bilis atra vel sursum vel deorsum prodierit, lethale.

**I.** IN præcedente egerat Hipp. de omni deiectione nigra in morbis, hic vero specialiter agit de evacuatione nigra, quæ provenit ab atrabile, in qua determinat primo tempus evacuationis, & dein loca, per quæ fit, nempe sursum & deorsum: atque concludit talem evacuationem esse lethalem. Tempus est morbis incipientibus, quod idem notat quam morbi principium (Aph. 24. IV.). Hoc tempus quia expositum, non est opus repetere. Ibidem autem agit de morbis acutis, hic vero de morbis quibuscumque incipientibus, ergo non solum damnat talem evacuationem in acutis & ardentibus, qui cum febre valida incipiunt, sed & in aliis, qui sine tali vehementia inchoant, & non solent servare tempora critica. Ergo ita sentiendum est de hac sententia, si bilis atra evacuat statim in principio morbi, per commotionem morbi, vel quod in corpore primo concitat morbum, & dein sursum vel deorsum erumpit, talis evacuatio est lethalis.

**Qualis Atræ bilis hic intelligitur.** II. Quum veteres triplicem posuerunt Atram bilem, Nutritivam, Excrementariam, & Morbosam, primo determinanda est species ex his. Quoniam vero Auctor dicit atræ bilis evacuationem lethalem esse, nullus dubitare potest, quin hoc loco intelligat Atram bilem morbosam, quæ has habet notiones: (1) Nigredinem: (2) Splendorem: (3) Tenacitatem summam, aut florem non concreviscibilem: (4) Acrimoniam variam; vel Austerrum; vel Acidam terram fermentantem; vel Putridam cum summo fetore; vel Rancidam urentem. Hæc materies atrabilaria non subit coctionem aut præparationem, ut alii humores, qui actione vitali patiuntur mitigari, sed quo magis hæc materia agitur, eo redditur acrior.

**Quæ atræ bilis sursum vel deorsum erumpens, lethale?** III. Atræ bilis seu materia melancholica, sive nata sit ex sanguine nigro lente-  
sciente, sive ex pinguedine vel bile corrupta in nigredinem commutata, quamdiu non acquisivit acrimoniam, vel nimia copia collecta in vena portarum sine multa molestia, diu latitare potest in corpore ceteroquin sano. Sed si accedente corruptione acquirit acrimoniam, loca in quibus diu collecta hæsit, exagitare incipit, multa & varia anomala symptomata inducit: viscera enim ventris in motum inordinatum & perturbatum concitat sua acrimonia stimulante: sæpe etiam inficit transfluentes humores, atque in totum corpus perturbatum facit morbi principium. Si tunc sursum vel deorsum erumpit atræ bilis, exilis vel dilatatis finibus vasorum me-

meferacorum vel pori biliarii, raro eluclabitur æger hunc morbum, nam atra bilis corrupta in ventriculū & intestina effusa corrumpet ibidem omnes confluentes humores, tantumque concitabit in his partibus motum, quem æger ferre non poterit: imo quæ materia corrupta tamdiu hæsit in vena portarum, etiamsi omnis hac via evacuetur, quod vix sperandum est, impurum & admodum corruptum locum relinqueret. Si ergo morbi incipiunt ex corrupta atra bile, non immerito Auctor pronuntiabit mortem instare. His autem in locis septentrionalibus multo rarius hic morbus occurrit, quam in regionibus calidioribus, in quibus habitavit Hippocrates: vidi autem istos, in quibus nec per narcotica potui compescere dolorem, nec per adstringentia cohibere evacuationem. Si vero corpus atra bile non admodum acri onustum sit, & corripiatur morbo quovis alio, in cuius principio redditur vi istius morbi atra bilis fursum vel deorsum, pessimum quoniam est signum; notat enim atræ bilis abundantiam; ejus evacuatio tantum tunc debilitat, ut vires debilitatæ hunc aggredientem morbum superare non possint; atque atra bilis humoribus mista inhibet alterius morbi coctionem, ut tandem æger copia atræ bilis, & vi morbi accedentis pereat.

L I B. IV. A P H. XXIII.

233. **Q**uibuscumque, ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut ex vulneribus, aut aliter quocumque modo extenuatis, bilis atra, vel qualis sanguis niger, prodierit, postridie moriuntur.

**I**N *Apb.* 131. damnavit dejectionem nigram, instar sanguinis nigri, sponte prodeuntem: in *Apb.* 132. etiam damnavit dejectionem bilis atræ, sed in incipientibus morbis. Hoc loco pronunciat postridie mortem, si hic vel ille humor prodierit in extenuatis (*Apb.* 32., III.). Quia omnes illæ partes superiores sunt expositæ, perpendendum solummodo erit, in quibus extenuatis nigra hæc evacuatio instantem mortem præfagit.

II. Extenuatio a macie distingui potest, quod macilenti æque censeantur sani, quam obesi. At extenuantur nunquam corpora sine sanitate detrimento. Sive in hoc loco non concipitur ea Extenuatio, quæ multis laboribus, vel inedia comparatur, redigitque corpora obesa ad mediocrem crassitudinem, aut corpora sana ad sanam macilentiam; sed quando corpora per morbum quemcumque ad summam macilentiam cum debilitate & perseveratione morbi maciem inducentis rediguntur. Arguit talis Extenuatio plus humidi e corpore auferri, quam accipit ex nutrimentis. Vitium igitur in his utrisque quæri potest. Sed quoniam Auctor addit morbos Extenuationem inducentes, inedia aut labor hic recenseri non potest. Si morbus Extenuationem nimiam inducit, (nam semper a morbo corpora aliquo modo extenuantur (*Apb.* 33. V.)), denotat humores in tali corpore deliquesce & nimis evacuari. Habetur igitur in tali corpore extenuito humorum tenuitas cum putredine liquefaciente, quod vix valet emendare medicina. Tenuitas enim sola vitæ actione compingi potest in sanam & mediocrem spissitudinem, quæ actio vitæ in hujusmodi extenuatis debiliior est, quam ut de hac compactura aliquid sperare possimus. Putrefactum in corpore natum difficulter emendatur. Quare omnes morbi colligativi periculosi, & curatu difficles.

III. Nimiam Extenuationem ex febre infirmitatem præfagire, superius (*Apb.* 33. VI.), notavimus, eadem quoque ratio non solum valet in Acutis, sed est major, nam acuti inflammatorii, aut erysipelatosi, ut & maligni, si conversi fuere in colligationem, nulla spes coctionis restat, quum putredo liquefaciens non solum morbi materiem, verum etiam reliquos humores sanos ita dissolvit, ut undique effluat.

Qualis extenuatio hic intelligitur.

Extenuatio a morbis acutis.

fluant. Miror sepe, quapropter morborum acutorum mutatio tam frequens non censeatur a Dogmaticis inter naturales eorum morborum exitus, dum tamen conversio in scirrhum, quæ raro fit, ab omnibus assignetur. Inde forsitan est, quod medicinam exercentes toties fallantur in prognosi, si morbus acutus transeat in colliquationem, quum hæc mutationem non audiverunt ab antecessoribus suis.

A morbis  
diuturnis.

IV. Ut morbi acuti nimio motu vitali vires deterentes tandem humores in putrilaginem convertunt brevi tempore, sic sensim in morbis chronicis a motu vitali debiliore permittitur spontanea corruptio tarde procedens, qua tandem omnes humores eo usque liquefunt, ut fiant inepti functionibus peragendis, & ad emunctoria delati, sponte & nimis copiose effluant. Ita observavimus pyralismum, urinæ & alvi profluvium, sputi tenuis & copiosioris evacuationem, sudorem colligativum, post inductam summam extenuationem, sine ulla febre, sed cum summa debilitate tandem induxisse mortem. Pallent hi ægri toto corpore, horrent frequentissime, & frigent cum corporis extenuatione & debilitate, ceteroquin satis comode degunt, vix medicinam exoptulantes, tandem placida mors obrepit.

Ex vulneribus.

V. Vulnera, vel ut morbi chronici corpus debilitantia, vel nimia profusio sanguinis aut aliorum humorum, ita exhauriunt vires, corporisque naturales succos, ut destructo æquilibrio inter quantitatem humorum & actiones agentes, omnes functiones languefcentes permittant, bonos humores in spontaneam corruptionem degenerent, atque in summam extenuationem inducant. Inde igitur constat, non solum morbos acutos & chronicos internos, sed etiam externos vi allatos, si inferant nimiam Extenuationem, periculosos esse, ut est contusio, ictus, fractura, luxatio, & similes morbi.

His evacuationibus nigra, postmodum moriuntur.

VI. De his nunc ita Extenuatis pronunciat, si evacuent Atram bilem, vel humorem nigrum instar sanguinis nigri, postmodum mori. Tam brevem instantem mortem non expectamus ex ejusdem materiæ nigre evacuatione, si non præcesserit illa Extenuatio; ergo aliquid speciale in his fieri debet, quod tam cito vitam exstinguit. Qualem hic intelligit Auctor evacuationem, non constat inter Commentatores, an solam alvi egestionem, an etiam vomitum, an vero quancumque. Sed quoniam Auctor dicit generaliter *Proderit*, atque in præcedentibus aphorismis egit primo de defectione per alvum, deinceps vero de evacuatione sursum & deorsum, atque in hoc Aphorismo de generali evacuatione in omnibus morbis, non sine ratione concludendum est, Auctorem hic non solum intelligere nigram evacuationem per alvum & vomitum, sed per quodcumque emundorium. Ut igitur constet, cur extenuati si reddunt Atram bilem, vel humorem nigrum instar sanguinis nigri, sequentia sunt perpendenda. Corpora ita extenuata, omnibus fere humoribus sunt privata, & infirmissima; qui restant humores, sunt tenues & corrupti; his si superveniat evacuatio materiæ nigre, sive sit atra bilis, sive sanguis niger corruptus & solutus, talis evacuatio & ut signum & ut causa, valde mala est: nam nigra prodeuntia declarant, nihil aliud præterea restare, quam nigrum hoc corruptum & liquefactum, quod ineptum est ad suppeditandos humores functionibus exercendis. Atque id minimum, quod adhuc restabat, cum hac evacuatione eliminatur, quare talis homo defectu humorum longo tempore laborans, nunc ulterius privatus, nihil amplius habet, quod viam sustentare potest, unde brevi tempore moritur.

#### L I B. IV. A P H. XXIV.

134. *Dysenteria, si ab atra bile inceperit, letale.*

Quid sit  
Dysenteria.

I. **A** Lvi difficultas, Tormina, & Dysenteria etiam si multis Medicis idem designant, atque alvi cruenta egestio omnis vocatur Dysenteria, puto tamen, in-

inter dicta nomina differentiam esse statuendam; nam Alvi difficultas dolorem ventris & alvum constipatam designare potest; Tormina frequentissime Medicis denotant ventris dolorem cum intestinorum veluti contorfione: & invenitur Cruenta alvi egestio cum & sine dolore. Si ergo cuncta hæc vocetur Dysenteria, incertus semper hæreo quemnam morbum per Dysenteriam intelligere debeo. Quapropter tot phenomena conjuncta sunt enumeranda, quæ semper præsentia esse debent, ut morbus ille conjunctis phenomenis constans, constanter vocetur Dysenteria. (1) Adeffe debet alvi egestio copiosior & frequentior, atque aliquamdiu continuata sine Medicamenti exhibitione concitata, deponens alvus excrementa varia, non vero chylosa. Si enim copiose fit, sed statim definit, amittit Dysenteria nomen, aut si excitetur ab assumpto purgante, vocaretur enim Hypercatharsis: si alvus deponit chylosum, potius ille morbus referetur ad Lienteriam. (2) Præter defectionem illam adeffe debet ventris dolor seu Tormen, unde a Celso vocatur Tormina, sine quo vocaretur Diarrhoea, & sola tormina sine defectione pertinerent ad Colicam vel Iliacam passionem. Si ad defectiones has & ventris tormina accedat vomitus frequens, vocatur Cholera, præprimis si biliosa ejiciuntur. Dum loco excrementorum liquidorum emittitur sanguis, vocatur Dysenteria cruenta; si vero continuo emittantur status sine excrementis, dicitur Dysenteria sicca. Quare alvi egestio frequens cum ventris dolore vel torminibus veram ideam Dysenteria exhibet.

II. Generaliter superius (Aph. 132. III.) demonstravimus, atram bilem sursum vel deorsum erumpentem incipientibus morbis lethale esse. Cur autem post hanc generalem regulam hic proponendus sit specialis casus, qui non facit exceptionem, neque adducitur ad probandam regulam generalem, mirum forsitan videbitur. Puto autem hunc brevem specialem Aphorismum non sine ratione ab Auctore fuisse notatum, quum passim in Melancholicis inculcavit defectionem atræ bilis etiam in principio prodesse, sed ex hoc Aphorismo constat, illam defectionem fieri non debere cum Dysenteria, id est ventris simul torminibus, quoniam tormina illa declarant, in atra bile tantam esse acrimoniam, ut possit inferre dolorem. Illa igitur atra bilis in vena portarum tam diu collecta, donec hanc acquisivit acrimoniam, & tandem erumpens, cum levamine evacuari nequit. (1) Relinquit locum infectum, in quo hæsit. (2) Facile intestina exulcerat. (3) Conscienda alimenta in intestinis coinquinat. (4) Facile cum iis intrat & turbat totum corpus. (5) Potest ita acris facta perrodere vasa tenera hepatis, & multa alia mala patrare. Quare tales homines raro evadunt.

Cur Dysenteria ab atrabili incipiens, lethale.

## L I B. IV. A P H. XXV.

135. Sanguis sursum quidem emissus, qualiscunque sit, malum: Deorsum vero niger dejectus, bonum.

I. Qui putaret, hoc loco intelligendam esse omnem sanguinis evacuationem sursum & deorsum, in exercenda praxi turpiter erraret, & sæpe alienam proferret prognosim: nam hæmorrhagiæ narium sæpe salubriter fiunt, & ex faucibus excreatu rejectus sanguis non multum periculi portendit: sed qui ex pulmonibus, vel ventriculo redditur, semper est mali ominis, & nunquam, nisi casu prodest, vel non multum periculi portendit. Quare pro sanguine sursum emissio accipienda est vomitus cruentus & Hæmoptysis. Idem quoque verum est de sanguinis evacuatione deorsum; rarissime enim per urinæ vias cum bono indicio redditur sanguis niger, & qui eruptis vasis mesentericis in intestina deponitur, non caret periculo, verum ex hæmorrhoidalibus veniens, qui semper est niger, melancholicis sanitatem adferre solet. Quare pro sanguinis nigri defectione accipien-

Quæ sanguinis evacuatione sursum, & deorsum hoc intellegitur.

piendus est hæmorrhoidum fluxus modicus. Si autem concipimus sanguinem nigrum in intestinis concretum, tunc recte inquit Galenus, pro bonum dicendum esse minus malum; nam si sanguis sine mora destillat, designatur vas aliquod hiare, & sanguinem fundere, sed si primo concrevit, spes est consolidationis, ut etiam experimur in marium hæmorrhagiis.

Cur vomitus cruentus & hæmoptysis, malum?

II. Sanguinis evacuationem prodesse & nocere posse, alibi demonstratur, sanguinem coloris varii salubriter & cum damno emitti aliis in locis est exponendum: verum cur qualiscunque sanguis, & quacunque quantitate emittitur, malum censetur, hoc loco exponendum est. Hæc malignitas vel ex sanguinis præstantia, ut multi existimarunt; vel loci natura deduci potest. Sanguis autem, ut satis ex doctrina circulationis constat, sive ex uno sive altero ramo venæ cavæ vel arteriæ aortæ fluat, in indole seu præstantia tantum non differt, ut inde malum vel bonum pronunciari possit. Præcipua ergo ratio in organis est querenda, & facile invenitur, nam tam ex ventriculo, quam pulmonibus contra naturalem legem ravitatis sursum pellendus est sanguis, qui propterea propria sua gravitate facile gubisistit in distis visceribus effusus. In ventriculo hærens nauseam & vomitum creans, facit, ut debita quies non concedatur vasis consolidandis, ex quibus apertis continuo stillat sanguis. In pulmonibus per continuam respirationem non minus difficilis conceditur consolidatio, & si accedat tussis, cum impetu extruditur sanguis, qui collectus in bronchiis & vesiculis pulmonalibus, aeri nudo expositus in loco calido, facile putredinem accipiens, frequentissime pulmonum ulcus & phthisin infert.

Quando hæmorrhoidum fluxus, bonum.

III. Quibus in vena portarum major sanguinis nigri copia collecta est, sive intulit per reliquum corpus alios morbos, uti melancholiam, maniam, aut quemcunque alium morbum, qui atræ bili adscribitur, sive solummodo latens hic bæreat, his inquam sanguinis nigri deiectio ex venis hæmorrhoidalibus prodest, quæ detrahit illam abundantiam, modo non sit nimis copiosa evacuatio, vel diutius durans. Hæc autem salubris evacuatio sanguinis ex venis hæmorrhoidalibus in locis calidioribus frequentius observata fuit ab Hipp. quam a nobis in regionibus frigidioribus & septentrionalibus.

#### L I B. IV. A P H. XXVI.

136. *Si a Dysenteria detento velut caruncula secesserint, lethale est.*

I. Quid veteres intellexerunt per Dysenteriam, superius (134.1.) exposuimus; hoc autem loco non dicit generaliter in Dysenteria omni tempore, sed si aliquamdiu duravit, hoc notatu enim a Dysenteria detento, ut inde non sit conjiendum in incipiente dysenteria si velut caruncula secesserint, lethale esse signum: quum sæpe mucus in lacunis intestini concretus in principio dysenteria ejiciatur referens carunculas, quæ tamen excretio non est lethalis. Sed si diu duravit Dysenteria, hujusmodi mucus concretus evacuari nequit, cum non concedatur in his tempus sufficiens ad concretionem. Unde certi sumus, si in vetusta Dysenteria reddantur carunculae, istas partes secedere ab ipsis intestinis: nam carunculae scilicet hic non solum denotant corpuscula sphaerica seu globosa carnei coloris sed etiam ipsas membranas & filamenta. Quare si talia exeunt, designatur, portionem intestinis esse mortificatam, & una cum aliis excrementis evacuari, quod periculosissimum est, quum in tanta mortificatione vel exulceratione raro maneant intestinum clausum, & ita devoluta excrementa in ventris cavum reliqua adjacentia coinquinant, & ita mortem inferunt corpori præcedente nimia evacuatione debilitato. Potest tamen esse, ut quadam lacunæ intestini recti exulcerata emitterantur, & tandem homo multas miseras passus moriatur, sed quoniam a tali morbo plerumque moriuntur, non sine ratione pronuntiavit Auctor, lethale esse signum. Si in tali casu vocaretur Junior Medicus, omnino incertus hæreret, quid esset agendum,

dum, quoniam topica externa nulla novit applicare; clystina injectum ultra locum affectum fertur; interna data Medicamenta priusquam locum attingunt, sunt corrupta & mutata. Maximum commodum & utilitatem expertus sum huiusmodi in morbis intestini recti, si formentur parvæ turundæ ex terebintina & melle ad consistentiam coctis, aliis consolidantibus mistis, quæ aliquoties de die indantur, præcipue toties ac alvus fuit exonerata.

## L I B. IV. A P H. XXVII.

137. **Q**uibus per febres sanguinis copia undecunque eruperit, in resectionibus, bis alvi humectantur.

I. **E**andem sententiam reperit Auctor in Coacis binis in locis, nisi quod in uno loco dicat, *Magnæ in principis sanguinis eruptiones, circa resectionem alvi humectantur*. Quare non præcipitanter hæc sententia est prolata, sed quia hæc sæpe ab Auctore vel ejus antecessoribus fuit observata, hanc regulam pliusquam uno loco voluit posteritati relinquere, ut non mientur medici videre alvum laxiorem, quæ ita fuit constipata in principio; & ut caveant progrediente tali morbo propinare purgans, quod tunc facile hypercatharsin induceret.

II. Hippocratis scopus non est in hoc Aph. cuncta bona & mala recensere, quæ Quomodo sanguinis eruptio alvi humectat. ex sanguinis eruptione oriuntur, sed duntaxat notare in his, circa resectionem alvum fieri laxiorem. In hac sanguinis evacuatione notat copiam majorum, & ita excludit omne sanguinis stillicidium: & addit *undecunque*, sive per naturales, sive præternaturales, sive per artificiales vias emittatur sanguis, semper debemus alvum humidiores expectare. Qui continua febre vel morbo acuto laborat, ejus semper corpus est siccum, & prompte humidum applicatum imbibens: hoc itaque tempore quidquid liquidi est in excrementis intestini coli, simul absorbetur, solæ fæces duriores, quæ absorberi nequeunt, relinquuntur: quare naturale est in huiusmodi morbis, ut alvus sit constipata, & reddat fæces compactas, siccas. Si vero demonstrari potest, sanguinis largam evacuationem, tam naturalem, quam artificialem, minuire hanc absorptionem & siccitatem, ex ea demonstratione liquebit facile, alvum quoque humectari debere. Sanguis autem compactus in lentorem si continuatur compingi per motum validum vitalem, sensim in majorem spissitudinem condensatur, & quidquid compingi nequit, id valido hoc calore & motu invisibiliter evanescit: si vero magna dematur sanguinis portio, ut aliquo modo destruat æquilibrium, protinus cessat ille calor major & actio vitalis validior; atque ita compacti humores iterum liquefcunt, atque validior contractio firmarum partium dimittitur, ita ut loco cutis siccoris, generetur sudor copiosior cum temperato calore. Quemadmodum in cure convertitur siccitas in humiditatem, ita etiam in intestinis, quæ per receptam humiditatem etiam reddunt excrementa liquidiora. Insuper alimenta & potulenta assumpta circa resectionem minus absorpta adjuvant liquiditatem alvi. An vero hoc conducatur convalescentibus, non addit Auctor. Sed judicandum est alvum modice laxam hoc tempore conducere, sed si nimis fluat, nimiam debilitatem indicat, & sanitati obest, quoniam determinatio humorum ad intestina invertit naturalem crisin per cutim, per quam salubriter febrium materia solet evacuari, & quoniam nutrimentum in intestinis confectum simul eliminatur.

## LIB. IV. APH. XXVIII.

138. **Q**uibus bilioſe ſunt egeſtiones, ſurditate ſuperueniente, ceſſant. Et quibus ſurditas, bilioſis ſuperuenientibus, ceſſat.

Qualis  
ſurditas  
intelligitur.

I. **S**i auctoritate eſſet diſputandum, multa mihi eſſent in promptu loca ex Hipp. & aliis hanc adſtruere ſententiam, ex quibus omnibus hoc ſolum colligi poſteſt, hoc ſapiffime a Præſicis in ægris detectum & verum inventum, ut etiam indicavimus *Comp. T. 90. XLIX.* Sed detegimus etiam alvi egeſtionem bilioſam non tollere aut curare ſurditatem; atque ſurditatem obortam non compellere ſemper alvi egeſtionem bilioſam. Operæ pretium igitur erit rimari, quid notet alvus bilioſa, & qualem ſurditatem inferat, quænam etiam ſurditas alvi egeſtione bilioſa levetur.

II. Facile concipitur, omnem ſurditatem depravato organo auditus natam tolli non poſſe alvi fluxu, ſive ſit bilioſus, vel alius, neque illam, quæ provenit a ſurditate in meatu auditorio vel tympano hærente: quare ea eſt concipienda ſurditas, quæ oboritur in febribus, quod morbi generalis materia ſeratur ad aures ſeu nervum acouſticum, uti fieri ſolet, ſi morbus acutus meſtaſiſim molitur per Parotides, in morbis Acutis Inflammatoriis, Purulentis, & Eryſipelatoſis. Verum ſurditas talis in Inflammatoriis prævenitur hæmorrhagia, in Purulentis per ſedimentum urinx copioſius & purulentum, verum in Eryſipelatoſis, qui dicuntur etiam Bilioſi, admodum conducit materiem illam bilioſam evacuare per alvum, quæ evacuatio ſi non contingit, ſurditas ea in morbis bilioſis præſagit Delirium. Conducit ergo in tali ſurditate ducere alvum per purgantia refrigerantia acceſcentia, quum natura indicet, naturalem eſſe viam. Inanis eſt oppoſitio, nullam eſſe viam ab auribus ad alvum, quoniam non concipimus materiem bilioſam circa aures ſubſiſtentem inde duci per viam particularem ad alvum, ſed quando materia tenuis bilioſa acris cum communi maſſa ſeratur ad aures, facta directione ad inteſtina cum huius materiz evacuatione, tunc maſſa hac materia liberata non poſteſt impetu ſuo majore inferre ſurditatem.

Qualis  
alvi egeſtio  
intelligitur.

III. Hippocratem expertum eſſe, ſurditatem omnem in morbis ſeu febribus natam non tolli quavis alvi egeſtione, inde conſtare poſteſt, quoniam nominat Bilioſam, non vero generalem, vel quamcumque aliam evacuationem. Obſervavit enim, *ſuppuratis ſurditatem obortam, cruentam ſignificare egeſtionem, biſque ad finem nigra prodire.* H, a, 563. Qualis egeſtio bilioſa bona vel mala eſt. Bilioſa autem egeſtio eſt, quæ habet colorem flavum, eſtque tenuis, acris, & calida, qualis materia accuſatur in morbis Bilioſis & Eryſipelatoſis, hæc mobilis admodum frequentiffimam meſtaſiſim facit, quare ſi ſeratur ad inteſtina, non amplius inſeſtare poſteſt caput & aures, quando bona cenſetur.

Surditas ex  
minuta  
alvi egeſtione  
bilioſa malum.

IV. Auctor in hoc Aphoriſmo præcipit viciffitudinem ſurditatis cum alvi egeſtione bilioſa, ſed ſimul non monet, num ſit bona vel mala, quod tamen ex diſputatis ſuperius facile colligi poſteſt; nam quemadmodum tenuis & acris materia per generalem circulationem derivari potuit ab auribus ad alvum; ita etiam materia illa per alvum evacuanda derivari poſteſt ad caput, ut ibidem inferat ſurditatem; ſed quoniam tunc aliunde ducitur materia bilioſa auris, minuitur quidem ejus egeſtio per alvum, & non evacuatur materia e corpore, talem igitur meſtaſiſim admodum malum eſſe ſentio, quoniam repit materia ad locum, ubi turbando actionem plus periculi inſert, & ubi non tam commode evacuari poſteſt.

LIB.



## L I B. IV. A P H. XXIX.

139. **Q**uibus per febres sexto die rigores fiunt, difficulter judicantur.

**I.** **E**X iis, quæ supra (Aph. 49. expofuimus, facile colligi poteft, quid fit fen-  
tendum de observatione temporum in morbis, istamque observationem non  
ita inutilem eſſe, ut quidam contendunt; ſed & ſæpe mutari, prout morbus acutus  
fit Inflammatorius, vel Eryſipelatoſus, vel Putridus, aut ſi aliena methodo tra-  
ctetur. Ex iisdem etiam conſtat, febrem acutam inflammatoriam, ſi viribus vitæ  
ſubigitur & non turbatur in ordine ſuo, vel per cauſas externas, vel præpoſteram  
curationem, accuratiſſime ſequi dies criticos. Si ergo die alio concitantur ſym-  
ptomata, quæ criticam commotionem concomitari ſolent, ut ſunt Rigores, indicio  
eſt, vel non eſſe febrem inflammatoriam, ſed putridam; vel vires vitæ aut debiliores  
eſſe, aut inſtigatas per alienam cauſam. Omnia hæc difficultiorem ſolutionem por-  
tendant. Sive quod fit morbus acutus Putridus, vel Inflammatorius ab ordine  
turbatus. Quid notet *δυσκρισις*, ut habetur in Textu, verba fecimus (Aph. 87.  
III.) Hoc autem loco notat, eam febrem non tam certo finitum, ac ſi Rigo-  
res fierent die ſeptimo, ſed ſæpe eam febrem continuari, vel in alium morbum  
abire, vel ſi deliteſcit, deinceps ſæpe recidivam facere. Hoc autem non inde  
dependet, quia ipſe dies ſextus, qui dicitur Vacuus, ſit malus, ſed quoniam  
acutus inflammatorius morbus regularis iſto die non facit criſin.

Sextus  
dies cor-  
difficulter  
judicet.

II. Noſter Auſtor (H. b. 27.) Rigores fieri dicit ab externis ventis, aqua, cibo,  
potu, aliſque cauſis externis; ſit etiam, dum recidivat morbus, vel abit in cor-  
rupteſam, atque ex critica perturbatione. *A febre ardente occupato, rigore acce-  
dente, ſolutio fit.* (H. a. 87.) quod repetit (H. a. 445.) cum his adjunctis verbis.  
*In febre ardente ſi inſuper corripiat rigor, exſudare ſolet.* Ex quibus & iis, quæ  
in praxi experimur, concludere poſſumus, Rigorem inferri, ſi aliquid alienum  
applicetur organo vitali. Quod ſi id alienum ſit materia morbi præparata ad ex-  
pulſionem, tunc viribus inſtigatis, id alienum nomine evacuationis criticæ ex-  
pellitur: ſed quicquid præterea Rigorem inferat, id ſemper malum portendit.  
Cum ergo ſexto die, quando raro materia critica eſt præſens & matura, ſiunt  
Rigores, hujusmodi ergo Rigores ſunt ſemper mali ominis.

Rigores  
ſexto die  
cur mali?

## L I B. IV. A P H. XXX.

140. **Q**uibus exacerbationes fiunt, quacumque hora dimiſeris febris poſtridie ead-  
em hora ſi corripuerit, difficulter judicantur.

**I.** **N**on omnes Commentatores eodem ſenſu accipiunt hunc Aphoriſmum. Senſus.  
Galenus judicat, hic intelligi debere regularem reditum paroxyſmorum,  
ut nec poſtponat, nec anticipet, ſed omni die redeat eadem hora. Hurnius au-  
tem, quod reſpiciendum ſit ad horam, qua prior paroxyſmus deſiit, exiſtimat,  
ut ſi hora ſexta deſiit paroxyſmus, alter incipiat poſtridie etiam hora ſexta.  
Alii vero putant, Hippocratem voluiſſe indicare eam horam ſequentis diei, in  
qua deſiit febris, ut ſinis paroxyſmi habeatur in hora eadem, in qua ſequens  
paroxyſmus incipit. Cum ita decertant Auſtores, nil certi de difficili judicio-  
ne hauriri poteſt, niſi omnes hi tres modi difficilem judicationem habeant.

II. Non laborabimus veram Hippocratis ſententiam eruere, quum in obſerva-  
tione & prædictione non habeat majorem auctoritatem, quam diſſa Galeni &  
aliorum: ſed videbimus, quid ſit ſentiendum ex diverſo reditu paroxyſmi ad dif-  
ficiliem.

Judicium  
difficile  
ex paro-  
xyſm  
ſiniſi  
Citi-  
mari.

facilem iudicationem statuendam. Præ omnibus sciendum est, triplex genus febrium inveniri, nempe febres Continuas, Intermitientes, & Remittentes. At vero febres Continuae, quia non faciunt Paroxysmorum reditum, in hoc loco examinande non sunt, sed febres vel Intermitientes, vel Remittentes. Si febris intermitiens regularem paroxysmum faciat, id est, si quotidie eadem hora paroxysmus incipiat, ut nec anticipet, nec postponat, talis febris non observatur difficilius solutionis, quum quæ postponit vel anticipat vel vage infestat, etiam si Galenus hanc profert rationem, quæ firmata sunt, & impacta, robusto quodam ut dimoveantur quasi vate opus habent, qui & longo tempore, & cum fortibus, & pluribus auxiliis adhibeatur. Quippe noster Auctor (Aph. 87.) contrariam habet sententiam. In Constantibus temporibus constantes & iudicatu faciles sunt morbi: in Inconstantibus autem inconstantes, & difficiles iudicatu. Unde Constantia præmittit faciliorem solutionem (Conf. Aph. 52. II. & III.) Imo si vires vitæ prævalentes sunt in morbis, signa quoque constantia inveniuntur; sed viribus labefactis omnia sunt Inconstantia. In febribus autem intermittentibus, quæ constantem paroxysmorum reditum habuere, si paroxysmi incipiunt inconstantes fieri, cum diminutione vehementiæ & augmento virium; tunc sæpe observavi facilem fieri solutionem, quod materia febrilis aliquo modo subacta non poterit ulterius tam regularem paroxysmum facere. Sed si paroxysmi constantes cum diminutione virium reddantur inconstantes, aut si simplex intermittens reduplicatur, semper observavi solutionem difficiliorem, quia paroxysmi iterati aliquam induxerint corruptelam pejorem, quæ ordinem turbat. Febres autem Remittentes sive constantes sive inconstantes Paroxysmos faciant, semper sunt solutu difficiles, quia si tales fiant ex Intermittentibus, designant, febrem intermittentem fuisse prolongatam: si fiant autem ex fomite latente purulento vel putrescente regularis vel irregularis paroxysmus nihil boni promittit. Sed quando sequens paroxysmus incipit eadem hora, qua prior desierit, valde timendum est, nam corpus tunc vix liberum est a febre. Sed si aliquod intervallum inter febri paroxysmos habetur, vires recuperari possunt, & tales induciæ notant, tantam non esse morbi materiem, quæ valet continuare febrem. Quare etiam convenienter hic Aph. intelligi potest de reditu eadem hora, qua desit paroxysmus prior.

## L I B. IV. A P H. XXXI.

141. *Lassitas per febres, ad articulos, & circa maxillas maxime, abscessus fiunt.*

Lassitudo  
per febres.

**Q**uid sit Lassitudo & quotuplex, supra (Aph. 30.) observavimus: ex quibus colligi potest, Lassitudinem tunc fieri per febres, si tanta sit facta consumptio in spiritibus, qui ad motum animale sunt destinati, ut inde similis impotentia vel molestia movendi nascatur, qualem experimur post multos labores: simulque humores & fibras musculares per febrem fuisse agitas, ut nunc magis quiescente febre totum corpus sentiat quasi laboribus fractum. Quæ ergo febris singulis paroxysmis talem relinquit Lassitudinem, quam maxime quoque minuet corporis vires, ut id, quod præparandum & expellendum sit, non subigatur aut expellatur.

Cur præ-  
cipit ab-  
scessum?

II. Observavit Noster Auctor, sæpius circa finem huiusmodi febris Abscessum fuisse natum ad articulos, vel maxillas, quemadmodum etiam hodie in praxi comperimus, sed illa observatio non ita est constans, ut si per febrem Lassitudinem observemus, inde concludere possimus, semper esse expectandum abscessum. Quod si febris lentorem format, qui sensim commutatur in purulentiam, illa nata Lassitudinem inducit, quum spirituum materia generetur ex eadem gelatina, quæ motu febrili convertitur in lentorem, & postea in pus, quæ gelatina consumpta produci-  
tur

tur lassitudo . Ergo lassitudo per febrem denotat, tandem gelatinam fuisse commutatam in purulentiam . Inde autem non sequitur , ut formetur abscessus per metastasim seu collectionem puris ad aliquem articulum ; nam si tunc reddatur urina cum multo sedimento albo , abscessus non esset expectandus . Sed si talis non prodit urina , dum tamen ex signis constet , purulentiam fuisse formatam , conicere possumus abscessum ad aliquam partem , qui pus in se recipit . Quod autem talis Abscessus fiat ad maxillas vel Articulos , nihil arcani continet, nam generalis lex est, si materia morbosa per emunctoria evacuari non potest defectu virium , proxime est, ut deponatur ad aliquam partem externam, unde toties post longas febres abscessus fiunt ad partes exteriores superiores vel inferiores . Si autem vires adhuc sunt debiliores , ut nequeant purulentum deponere ad partem aliquam externam , pus tunc moram necdens in corpore convertitur in putrilaginem , qua homo saepe moritur.

## L I B. IV. A P H. XXXII.

142. **Q**uibus ex morbo resurgens aliquid dolet, ibi abscessus fiunt.

**I**N præcedente Aphorismo egerat de Abscessu expectando circa finem morbi seu febris, hoc autem loco non solum brevi sententia præagitur Abscessum finito morbo, sed magis determinat abscessus locum : nam in præcedente docuit, ex materia purulenta in corpore nata & non evacuata, quæ inducebat lassitudinem, expectari posse abscessum ad aliquam partem ; verum si jam materia purulenta sedem figere incipit, facile erit determinare locum, in quo expectandus est abscessus . Constat ergo, si quis post morbum, id est in Convalescentibus, dum totus antecedens morbus fuerit finitus, ut nulla amplius restent signa, nisi debilitas, morbi materiem mutatam quidem & subactam non evacuaverit, facile deinceps deponi posse ad aliquam partem, ut ibi formetur abscessus, modo inflammatorius morbus, qui in purulentiam abire potest antecesserit : quare duobus temporibus generari potest metastasis purulenta, nempe durante adhuc morbo, ut in præcedente, & eo jam finito, uti in hoc aphorismo .

Quomodo abscessus in convalescentibus ?

**I**I. Per Dolorem proprie in hoc loco & absolute intelligitur Dolor, sed in latiore significatione intelligitur etiam Labor & Molestia, unde multi Interpretes Laborem habent, quum Hipp. indicare vult, priusquam abscessus post morbum in parte formatur ex relicta post morbum materia, eam partem non statim maturam abscessum habere, sed dum in ea colligitur morbi materia, eam sensim concoqui in pus, quo pars sentit aliquam molestiam aut dolorem, id est laborat . Adeoque si ex antecedentibus signis morbi Inflammatorii, sine crisi abeuntis, colligere possumus, materiem crudam adhuc in corpore oberrare, & dein incipiat quædam pars laborare, fere semper pars ea in se recipiet eam materiem, & formabit Abscessum . Itaque omnis Labor alicujus partis, post quemcumque morbum acutum observatus, non est præagium abscessus, sed tunc tantum, quando observatur post morbum, qui in purulentiam abire potest, & tunc si ex aliis signis constet, materiem purulentam collectam non evacuari per aliquam criticam evacuationem.

Cur locus dolens abscessum recipit ?

## L I B. IV. A P H. XXXIII.

143. **S**ed & si quid doluerit ante morbum, ibi se figit morbus.

**I**N duobus præcedentibus demonstravit per signa, quomodo in morbo & post morbum quædam in parte potuimus expectare abscessum, quoniam illa signa declarabant, materiem morbi jam incipere colligi in ea parte . Illa igitur signa producebantur a formata materia per totum corpus oberrante, quæ deinceps

Cur pars dolens ante morbum prius abscessum recipit ?

E c

ma-

magis collecta, in parte quadam excitabat Laborem seu Dolorem. Hoc autem loco non ita determinat futurum abcessum, sed sedem primariam morbi expectandam, priusquam morbi materia est in corpore. Ergo hoc signum non desumitur ex latente materia, uti in duobus prioribus, sed vitio ipsius partis, quæ in se habet talem dispositionem, ut in se facilius quam quavis parte alia corporis sedes fiat morbi. Signum hujus est Dolor seu Labor alicujus partis, priusquam morbus ingruit. Ex designata causa itaque eruendum, quamobrem facilius morbi consensumque materiem recipiat. Si totum corpus sit ceteroquin sanum, dum corripitur morbo generali, tunc facere solet depositionem materiæ morbi ad emunctoria: atque si quid alienum sit in corpore, id semper ab interioribus ad exteriora truditur, & tandem eliditur, ut experimur in quibuscumque alienis in corpore hærentibus. Hujus nullam novimus rationem, quam quod Deus tali modo creaverit nostrum vivens, ut ejus actio vitæ in interioribus sit validior quam in exterioribus, ut ita se possit ab alienis liberare: nam quovis in morbo si vires debilitentur, id alienum non truditur ad exteriora, sed vel in corporis meditullio relinquitur, vel si in ambitu corporis propulsum fuerit, viribus interim debilitatis, se ad interiora recipit, quando interiora a morbi materia obfessa & suppressa non raro mortem inferunt, quemadmodum hoc in variolis, morbillis, podagra, & pluribus aliis experimur. Vis ergo vitæ est ea causa movens, quæ ad corporis ambitum trudit aliena, & expellit, qua debilitata, se liberare nequit. Veteres existimarunt, materiem morbi interiora petere per attractionem, sed si causa depellens debilior est, ut semper observamus in tali oppresseione, non erit opus attractionem fingere. Ex eodem principio clarus quoque formatur hujus Aphorismi sensus: nam si quævis pars ante morbum Dolet vel Laborat, hoc ipsum declarat, eam partem esse debiliorem: nam si non sit ex sua natura præ ceteris debilior, colligens in se morbi materiem, per ipsam affectionem debilitatur, quum omnis pars ex morbo laborans sibi debilitatem conciliat. Hoc ergo constat, tali in corpore aliquam partem esse ceteris debiliorem, si nunc in corpore eo generetur morbus generalis, quia pars illa debilior se non potest ita, ut partes reliquæ, a morbo liberare, successive tandem major & major in ea parte colligitur morbi materia. Hoc etiam constanter observamus in praxi, si enim quis quandam partem debiliorem habeat, quoties opprimitur aliquo morbo, statim quoque pars ea magis patietur, quam partes reliquæ. Si ergo scimus in quodam homine aliquam partem esse debiliorem, dum corripitur morbo generali, statim auxilia ita sunt dirigenda, si pars debilis ad vitam sustentandam multum faciat, ut ea pars roboretur: sed si emunctorium sit debilius, sæpe ad curationem faciliorem conducit, quum facilius in se recipiens morbi materiem, reliquum corpus liberet.

## L I B. IV. A P H. XXXIV.

144. *SI a febre desento, tumore in faucibus non existente, suffocatio ex improviso superveniat, lethale.*

Causa  
suffocatio-  
nis ex im-  
provviso.

I. Quid Medici per suffocationem intelligant, & quot modis generetur, supra (*Aph.* 68.) exposuimus; hic autem additur ex *Improviso*, quod non induci per tumorem sensim incrementem, neque per causam aliquam externam, quum ex textu constat, eum hominem ex febre laborare, & ita non expositum esse causis externis suffocationem inducentibus. Invenimus talem suffocationem induci subito in Hystericis aliisque morbis convulsis, si subito confringitur Larynx a spasmo illorum musculorum, aut in febribus continuis, si morbi materia meta-

sta-

statio ad Laryngem faciat. Ut autem Auctor excludat convulsivam suffocationem, addit *a febre detento*, qua phrasi indicat fieri debere in homine, qui febre continua laborat, ut hæc suffocatio sit symptoma febris. Nam si fieret suffocatio ex Inflammatione, vel Erysipellate, tunc primo oriretur suffocatio, & dein accenderetur febris; sed quoniam supervenit, hæc Suffocatio est febris symptoma.

II. Phænomenon hoc ad Anginæ speciem refertur, quæ vocatur *Cynanche*, quoniam causa impediens respirationem hæret in faucibus sine tumore aliquo externe visibili. Nam si ex hac causa impedita esset deglutitio sine tumore visibili, vel externo, vel interno, vocaretur a Veteribus *Synanche*: sed si simul appareret tumor, ab ipsis diceretur *Paracynanche*, vel *Parasynanche*. Ergo Hipp. indicare vult in hoc loco *Cynanchen* natam ex metastasi febris, & pronunciat *Lethalem* esse. Equidem omnis metastasis ad aliquam partem semper censetur mala, utpote indicans vim vitæ tam debilem esse, quæ non valet ad emundatoria ducere morbi materiem, ut eam eliminet; sed tunc præprimis, si talis fiat ad partem, cuius functione carere non possumus, ut est Larynx, & tam exiguum, quæ non valet omnem in se recipere materiem. Nam si externe simul appareret tumor, forsitan locus pro receptione sufficeret, & quædam restaret spes, sed cum externe nullus appareat tumor, scimus interiora laryngis omnem materiem recipere, & ita certe opprimere & suffocare hominem. In tam periculosissimo statu non solum a medico exigitur prognosis mortis instantis, sed etiam auxilium, quod mortem instantem averteret. Quoniam brevi instat mors, omnis cunctatio mala est, quare summa remedia protinus sunt adhibenda, ut tentemus diversionem metastasis ad quamcumque aliam partem; & quoniam inter fauces alvum & pedes maximus est consensus, statim larga est instituenda venæ sectio; alvus ducenda clysmate injecto, quia deglutitio non conceditur; ad plantas pedum epispasticum validum applicandum; hæc si non levant, brevi tempore mors erit expectanda.

Angina  
Cynanche  
ex meta-  
stasi fe-  
bris.

## L I B. IV. A P H. XXXV.

145. *Si a febre detento collum repente inversum fuerit, & vix deglutire possit, tumore non existente, lethale.*

I. Quæ in superiore recensuimus de metastasi febris continuæ ad fauces, hoc loco etiam sunt intelligenda, nisi quod hæc metastasis fiat in Pharyngem, quoniam non facit mentionem suffocationis, sed difficultatis Deglutitionis, quæ deglutitio impeditur, si Pharynx simili modo afficitur, ut notavimus affici Laryngem in suffocatione. Quoniam neque in faucibus, neque externe ullus appareat tumor, hic morbus secundum mentem veterum vocari debet *Synanche*. Signa sunt communia in hoc & in Præcedente Aph., idem quoque præsigium; sed in hoc additur Deglutitio difficilis, & Colli inversio.

Angina  
Synanche  
ex meta-  
stasi le-  
thali.

II. Ut Deglutitio fiat, necesse est Pharyngem dilatari partim per bolum deglutendum, partim per proprios suos musculos, si vero febris materia in Pharyngem deponitur, ut hæc membrana non solum tumeat, sed & etiam doleat & sicetur, ut sit in parte inflammata, vel erysipellate affecta, illa membrana irritata ab attractu boli non solum statim contrahitur, sed & etiam propter suam siccitatem superficiem ingressum bolum non transmittit: unde non solum impossibilis deglutitio, verum etiam admodum dolorosa & suffocativa. Non est opus, ut externe conspicatur tumor, nam Pharynx & Oesophagus pone Laryngem & Tracheam hærens licet aliquo modo tumeat, neque externe tumorem præbet, neque in faucibus, quia tumor & rubor profundius hære possunt, quam ut per os apertum videri possit.

Degluti-  
tio diffi-  
cilis in  
Synanche.

III. Multa commentantur de Colli inversione in angina Synanche, quasi pro-

Colli in-  
versio.

veniret a spinæ luxatione, sed quia Luxatio subito fieri nequit ab interna causa, omnia quæ de ea luxatione dicuntur, inania sunt. Sed quoties in musculis Collum flectentibus, vel torquentibus fiat inflammatio, non solum collum ex suis musculis inflammatis invertitur, sed & etiam alia membra, quorum musculi inflammantur, ultra modum flectuntur vel torquentur: quamobrem sufficit in hoc loco notare musculos torquentes collum esse inflammatos, & ita contractos. Mirum equidem est non in omni angina tale quid fieri, quum hi musculi pharyngi adjacent, nisi quando tam parva sit inflammatio pharyngis, quæ se ad proximas partes non extendit. Unde concludere possumus, Hippocratem indicare voluisse tam magnam circa Pharyngem inflammationem, quæ etiam musculos adjacentes afficiat, ut iis constrictis invertatur collum.

Cur Syn-  
anche le-  
thalis?

IV. Quoniam in præcedente Aph. demonstravimus, propterea Cynanchem esse lethalem, quia intercipit Respirationem, qua carere non possumus, videtur inferri posse in synanche tale periculum non instare, quia per aliquot dies sine deglutitione vivere potest homo. At vero si deglutire non potest, non possumus etiam ulla dare auxilia interna, & æger destituitur omni potu, qui maximam partem curationis in acutis implet. Dein si œsophagus, qui posteriori parti tracheæ continuus est, inflammetur tam valide, rarum foret, si non simul eam in consensum traheret; aut tumens œsophagus comprimeret adjacencia vasa cruenta, ut intercipiatur circulatio. Quare æque fere est periculosa synanche, quam Cynanche, ex metastasi febrili nata, atque eadem prompta auxilia exigit.

#### LIB. IV. APH. XXXVI.

146. *Sudores febricitantibus si inceperint, boni sunt die tertia, & quinta, & septima, & nona, & undecima, & quarta decima, & septima decima, & vigesima prima, & vigesima septima, & trigesima prima, & trigesima quarta. Hi enim sudores morbos judicant. Qui vero ita non fiunt, laborem significant, & morbi longitudinem, & recidivas.*

Connexio.

I. **M**ercurialis, qui in omni Aphorismo tentat investigare nexum Aphorismi cum præcedente, in hoc, quod miror, vix aliquem nexum invenit, qui mihi tamen videtur planus: nam in duobus præcedentibus periculum prædixit ex morbi materia, si metastasin facit ad collum; in hoc Aphorismo nunc præbet regulam generalem, ut sciamus quo tempore possumus ejusdem materię expellere evacuationem criticam per sudorem, quo tempore si non fiat sudor criticus, prædicere possumus laborem, aut longitudinem, aut recidivam. Quare versatur in eodem genere morbi, scilicet in homine a febre detento, cujus materia non facit metastasin, sed molitur evacuationem per sudorem.

Quo tem-  
pore sudor  
criticus.

II. Quoniam de diebus Criticis & eorum causis superius egimus (Aph. 49.) eadem non sunt repetenda. Hoc autem notandum in Aph. hoc, Hippocratem aliquo modo recedere in enumeratione dierum a consueto ordine, numerat enim tertium & quintum diem, omittens quartum, atque pro vigesimo tradit vigesimum primum, addit trigessimum primum & trigessimum quartum, & ad quadragesimum non venit. Qui Criticorum dierum observationem conantur defendere, fundamentum sed labile ponunt in dierum numero: quia vero observatio hæc non ex dierum numero dependet, sed ex natura materię morbi (Aph. 49. VI.) observatione practica detecta, solummodo scrutandum quid natura faciat, hocque solum pro fundamento ponendum, tanquam esset lex condita. Qui autem irrident Criticorum dierum observationem, hunc non solum adducunt Aphorismum, ut demonstrent incertum in enumeratione criticorum dierum, verum etiam adducunt

cx

ex variis locis nostri Auctoris, criticos fuisse sudores die sexto, octavo, & aliis diebus. Hæc omnia mihi videntur magis comparata ad destruendam quam excolendam scientiam, quum in mutationibus morborum non sit statuendus terminus dierum tam fixus, quin possit ab eo aliquo modo recedere per tempestatem, regionem, dietam, & variam medendi methodum (Aph. 49, IV.) Quare in annumeratione dierum hoc solummodo adstruitur, quod frequentissime fiat, non vero quod semper. Atque ex his pronunciamus, sudores istis temporibus in praxi observari utiles. Noster Auctor in hoc Aphorismo non attendit ad sudoris quantitatem vel qualitatem, de his enim inferius erit agendum, ut ex istis quoque feratur iudicium.

III Ex posito fundamento sudores optimos fieri solere dictis diebus, ulterius deducendum non constanter fieri Laborem, Longitudinem, & Recidivam, si sudores alieno tempore fiunt, sed etiam sæpe. Id enim quod a consueto ordine naturæ recedit, raro perfectam evacuationem præstat, unde cum nobis constet ex ordine dierum turbato omnem materiem morbi non fuisse evacuatam, id quod retinetur, inseret Laborem (Aph. 26, I.) Et quoniam perfecte non tollitur morbi materia ulterius viribus vitæ subigenda, portendit Longitudinem. Interdum vero ita subacta fuit morbi acuti materia, ut non amplius febrem continuare faciat, sed si simul omnis non fuit expulsa, ut sæpe fit, si alieno tempore moventur sudores, ea recrudescens non raro recrudescere seu Recidivare facit febrem.

IV. Etiam si ex generali regula constare videtur, quo natura vergat eo ducenda, optimum tempus esse exhibendi sudoriferum, quando natura mollatur evacuationem per sudorem: non tamen desunt, qui injiciunt, scrupulum inferentes, nos tunc nescire eo tempore, nam materia sit præparata ad expulsionem, & properea nos tunc posse eo tempore etiam extrudere crudum: atque eo tempore, quia a natura si fiat evacuatio, & simul a sudorifero, nos per sudoriferum datum nimis magnam copiam sudoris evacuare. Verum hic scrupulus inanis est timor: nam nullum est tempus, in quo majore jure expectare possumus materiem coctam, quam tempore naturali, cum natura isto tempore soleat indicia præbere coctionis. Et quamvis materia fuit cocta, non tamen suo legitimo tempore, propter vires per præcedentem coctionem debilitatas, excretionem conficit. Quare hoc tempore sere semper optimo successu propinari potest sudoriferum. Neque ita timenda est nimia evacuatio, quum hoc tempore natura non faciat evacuationem per vim instigatam, sed quia materia est apta ad evacuandum: quod si tunc addatur sudoriferum, omne coctum expellitur, cujus portio aliter retineri potuisset. Quamobrem pro generali regula accipi potest, optimum tempus exhibendi sudoriferum esse, quando ipsa natura per sudorem crisin facit. Hoc etiam experimur in variolis, nam optimo cum levamine tunc in variolis dantur sudorifera, quæ in morbi principio alias inferunt damnum.

Cur sudor alio tempore præstat Laborem, Longitudinem, & Recidivam?

An tempora critica determinant exhibitionem sudoriferorum?

#### L I B. IV. A P H. XXXVII.

147. *Sudores frigidi, cum acuta quidem febre evenientes, mortem; cum mitiore vero, morbi longitudinem significant.*

I. **H**anc sententiam veram esse, facile colligi potest ex multis Hippocratis locis H. a. 443. 451. & 579. ubi eandem repetit; nam quæ observata in praxi sunt constantia, ea solet noster Auctor ut plurimum aliquoties repetere, atque nos quoque in Praxi quotidiana idem experimur, quare hæc sententia tam universalis est in praxi, ut raro fallat.

II. Si ex cute ad attactum frigidiora emanat sudor, qui cuti adheret, & non facile evanescit, sed sæpe tam copiose effluit, ut guttatum supra cutim colligatur, tur.

Sudores frigidi qui dicuntur, tur.

tur, & interdum defillet, hujusmodi sudor a medicis vocatur frigidus. Intelligunt etiam in morbis acutis calidis non absolute majorem cutis frigiditatem, quam qualis observatur in hominibus sanis, sed frigiditatem comparativam ad illud morbum, etiamsi esset calor major, quam in sanis hominibus.

Sudoris  
frigidi  
causa.

III. Nisi constet, quam ex causa interna generetur sudor frigidus, semper incerta manet ex sudore frigido prognosis, nam ipse sudor frigidus tanquam causa non infert sequentia bona vel mala, sed quoniam designat, interne latitare causam, quæ sequentia producere potest. Si unica esset sudoris frigidi causa, semper quoque ex eo apparente eadem prædictio potuisset formari; sed quoniam ex multiplici, & sane concurrentibus causis generatur frigidus sudor, ex eo apparente varia præfagia formari possunt. Veteres ex extincto Calore innato deducentes sudorem frigidum, per suam alienam hypothesein non raro a veritate aberrarunt, vel per suam adjunctam theoriam obscuriorem fecerunt doctrinam. Ex sudore frigido hoc semper constat, motum vitalem in ambitu corporis, quo in nobis generatur calor naturalis, atque in acutis instigato, majorem, in sudore frigido esse minutum, ut ita corpus instat aliarum rerum mortuorum frigescat. Sed quoniam cum minuto motu vitali etiam minuitur impetus ad cutem, hæc causa nequit inferre sudorem; quamobrem alia accedere debet causa, quæ cum minori impetu facit, ut sudor effluat. Talis causa est resolutio humorum in humorem tenuem, qui antea propter crassitudinem non facile meare potuit per poros cutaneos, nunc sola contractilitate fibrarum exprimitur: atque fit a pororum relaxatione, qua oscula magis patent. Quoties actio vitæ minuitur, minuitur quoque contractio pororum, & minuitur impetus, seu fit partium frigus, uti experimur etiam in sanis, si incident in syncopen. Sed quoniam resolutio vario modo fit, inde in omnibus morbis ex sudore frigido non formatur idem præfagium. Perscrutemur causas solas, quæ in febre acuta Mortem præfagiunt, & in febre mitiori Longitudinem.

Sudores  
frigidi in  
Acuta fe-  
bre non  
tunc.

IV. Febres acutæ & sudores frigidi sunt veluti duo opposita, quoniam in acuta febre semper habetur calor urens, & in sudore frigido cutis frigiditas; febris acuta humores compingit in lentorem, unde cutis generatur siccitas, dum in sudore hoc habetur humidi abundantia. Ergo valde magna debet esse causa, quæ potest facere ut natura febris acutæ ita invertatur, ut inde fiat frigus & humiditas. Si perpendimus causam, facile inveniemus frigus tunc in acutis generari, si impediatur seu extinguatur motus vitalis caloris causa, ut, etiamsi stimulus febris acutæ maneat, tamen defectu spirituum influentium ex stimulo non sequatur motus major, qualis status habetur in mortem proximis. Altera causa est humiditas, quæ tunc fit si compactus sanguis dimittitur, hoc si fiat ex bona causa, uti in resolutione inflammationis & febris ardentis, tunc invenitur diminutio simul ardoris, sed tamen remanet calor temperatus, & exit sudor roridus, verum si dimittitur compactus, ut humor abeat in ichorem. quemadmodum in sphacelo, generatur frigiditas cum humidi expressione. Quare ex sudore frigido in acuta febre constat, dispositionem inflammatoriam abiisse in sphacelum. Sed si sphacelus corripiat generalem massam, nemo aufugere potest. Hinc Auctor noster recte statuit, Sudores frigidos in febre acuta præfagire mortem.

Sudores  
frigidi  
cum mi-  
nore fe-  
bre, Lon-  
gitudinem.

V. In mitiori autem febre, uti in hæcicis, cacochymicis, & scorbuticis febribus, sæpe observantur sudores frigidi sine morte subsequente: in his enim tantus non est calor, ut inde argumentari possimus, validam esse debere causam, quæ talem frigiditatem inducit. Neque in hujusmodi febribus tantus est humorum compactus, ut liquefcere debeant ad sudorem producendum, cum hi homines simul nimia humorum tenuitate laborent. Quare ex levissima causa in his generantur Sudores frigidi. Hi autem appareutes morbi Longitudinem portendunt, quia



quia proveniunt ex putredine spontanea, quæ non ita per tempora critica desinit, uti si in febre inflammatoria, sed putredo sensim procedens tandem hominem longa macie confectum interficit.

## L I B. IV. A P H. XXXVIII.

148. **ET** qua corporis parte inest sudor, ibi morbum esse indicat.

**I.** Sudor in præcedente præbuit prognosin Mortis & Longitudinis, in hoc autem exhibet signum latentis mali: quare indicat & designat interdum sumitur in præsentis tempore, interdum in futuro. In hoc loco non determinat sudoris qualitatem & quantitatem, sed tantum locum, ex quo erumpit sudor. Locutus est vel generalis, vel particularis, de quibus observavit causam morbi latere in eo loco, ut in morbis generalibus, sudor erumpit per totum corpus, sed in partium morbis solummodo ea in parte erumpit sudor. Non est opus examinare sudoris eruptionem in morbis partium externarum, cum ipse æger eam partem indicare potest; sed quando in visceribus morbus hæret, utile est ex apparente sudore iudicium ferre, quodnam viscus latens sit affectum. Quidam hunc Aphorismum ita late accipiunt, ut observationibus prædictis in syncope & aliis morbis detectis, falsitatis arguant. Verum ita ut signum profertur ab Auctore, quod fere semper indicat internam partem læsam. Versatur enim auctor in morbis, qui conjunctam febrem habent, quare hæc observatio non pertinet ad tumores scirrhosos, strumosos, ganglia, vel alios tumore chronicos, sed si pars interna corripitur Inflammatione, Abscessu, vel Erysipelate. Hi tunc morbi interna latentes solent supra locum affectum in cute facere sudorem. Nam hi morbi facientes, vel potius habentes motum vitalem instigatum majorem in parte ea, quam per reliquum corpus, ex motu illo majore faciunt simul, ut in parte adjacente fiat major humorum directio & expulsio, quæ sudorem exhibet.

Morbus  
latens de-  
tegitur ex  
partis su-  
dore.

## L I B. IV. A P H. XXXIX.

149. **ET** qua corporis parte inest calor, aut frigus, ibi morbus est.

**I.** Tantus est inter hunc & præcedentem Aphorismum nexus, ut potuisset facile in eadem sententia proferri: pertinet etiam ad detegendam partem affectam, quæ febrem simul concitat. Quare, quemadmodum in præcedente demonstravimus, irritatione partis circumquaque extrudi sudorem, hoc etiam est concipiendum de Calore. Ex utique in nostro corpore generalis lex, ut quævis pars stimulata se magis moveat, & ita motu illo calorem in ea parte concitet, ex cujus consensu tandem quoque corpus reliquum incalescit, sed excellentior tamen manet in parte vellicata Calor, uti experimur in omni locali Inflammatione & Erysipelate: Quare partis Calor inter signa certissima recensendus, quando morbus Inflammatorius, vel Erysipelatosus interne latet.

Calor  
partis  
morbi  
signum.

**II.** Si vero quadam in corporis parte nimium sentiatur frigus in acutis febribus, istud notat, inchoatam Inflammationem vel Erysipelas abiisse in sphacelum seu mortificationem; nam motu vitali conservatur naturalis in parte calor, quo motu extincto in parte ea percipitur frigus. Sæpe autem in acutis extrema frigent, dum tamen in istis non lateat morbi causa, sed quoniam ita fuere debilitatæ vires, ut motus vitalis debilior non valeat in extremis conservare naturalem calorem. Quare in Acutis pessimum est signum, si post ardorem internum quadam pars interna refrigeretur, vel si partes externæ frigeant cum ardore interno.

Frigus  
partis  
morbi  
signum.

LIB.

## LIB. IV. A P H. XL.

150. **E**T ubi in toto corpore mutationes, & si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color altius ex alio fiat, morbi longitudinem significat.

Morbi  
longitudo  
ex muta-  
tione co-  
loris &  
frigoris.

**I.** Quidam morbi ex sua natura sunt longi, alii autem natura breves, quadam accedente causa fiunt longi, ut monuimus (Aph. 12. III.) Hoc loco intelliguntur morbi breves seu Acuti, qui dicuntur longi futuri ex vicissitudine caloris & frigoris: an non etiam major longitudo promittitur in Chronicis, videbimus. Hæ Mutationes dicuntur fieri in toto corpore, id est in hac vel illa parte corporis; nam si voluisset intelligere totum corpus, dixisset Mutationes totius corporis. Observatio est de mutatione frequenti & inconstanti Caloris & Frigoris in quavis corporis parte, eam præfagire Longitudinem: nam si semel refrigeretur corpus in Acutis, notat recidivam: si vero periodicus fiat calor & frigus, indicium est febris intermittentis. Ergo investiganda est causa diu durans, quæ simul inducit mutationes frigoris & caloris inordinatas. Hujusmodi inordinatæ mutationes contingunt in acutis, quando Inflammatio abiit in Suppurationem, pus simul non evacuantem, quemadmodum fit: si abiit pleuritis in Empyema. Sed tum præcipue si morbus inflammatorius transit in putrilaginem, in qua frequens mutatio caloris & frigoris observatur. Utræque hæ causæ diu persistunt, quare signa externas has causas indicantia Longitudinem portendunt. Ex his non solum petere possumus prædictionem Longitudinis, sed etiam curatio ad morbum purulentum vel putridum dirigi potest.

Ex muta-  
tione Co-  
loris.

**II.** Coloris observatio præprimis in facie detegitur, de ea mutatione frequente quoque, ut alius ex alio fiat, dicit eam morbi longitudinem promittere. Causa ergo mutationis in colore debet pendere a causa, quæ difficulter actione vitæ superari potest, & tamen non cito abiit in mortem. Coloris quidem mutatio habetur, si morbus inflammatorius transit in Suppurationem, sed semel tantum hæc mutatio inducitur, ut color ruber abeat in pallorem: sed quando purulentus morbus est factus, & pus abiit in putrilaginem, uti in phthisicis, frequenter fiunt & inconstantes faciei phlegmosi, qui color igitur ex indicata causa semper longum morbum facit. Atque transitus morbi acuti in morbum chronicum putridum varios quoque infert colores. Quare coloris mutationes recte ab Auctore statuuntur morbi longitudinem præfagire.

## LIB. IV. A P H. XLI.

151. **S**udor multus a somno citra causam manifestam factus, corpus uberiori alimento uti significat. Si vero cibum non capienti hoc fiat, evacuatione indigere significat.

**I.** IN hoc Aphorismo docet Auctor, sudorem multum a somno fieri, vel ex alimento copiosiore, vel sine alimentis copiosioribus, sed non monet, quid sit agendum in casu primo, verum in posteriore casu monet evacuandum esse. Utrumque casum rimabimur cum adjuncta cautela curatoria. In his semper supponimus, plures posse esse causas sudorem copiosorem producentes a somno, quas supponimus cum Auctore non fuisse allatas; ut non habeatur major aeris caliditas, neque æger vel sanus assumerit sudoriferum, aut alimentum, quod sudorem movet; sed si sudor multus fiat a somno citra manifestam causam.

Unde su-  
dor mul-  
tus a som-  
no.

**II.** Multi disputant, cur a somno fiat copiosior sudor, quam in vigilantibus, veritatem experiuntur, sed ut detegant causam, multum laborant. Veteres existimant, calorem innatum in somno concentrari, & ita magis valere ad expellendas humiditates. Neoterici contendunt in somno majorem fieri circulationem in dormien-

mientibus, quam in quiete vigilantium. Sed quoniam in Exercitatione nostra de Somno & Vigilis demonstravimus, tardiozem fieri in fomno circulati onem; & quia caloris concentratio merum est figmentum, alia omnino est assignanda causa. Hoc constat omnibus, in fomno totum corpus laxari, membra esse laxa & flaccida; arque ex pulsus exploratione constat, pulsum fieri tardiozem & molliorem: quibus omnibus concludere possumus, humores in fomno minus compingi quam in vigilantibus, minoremque fieri insensibilem perspirationem, ut nos docuit fellæ usus. Itaque in fomno, quæ compacta fuerè, dimittuntur & liquefcunt, pori cutanei laxiores, cum minori perspiratione, faciunt, ut id tenue transeat per cutis poros, sed quia humor non satis volatilis est factus, cuti adhæret, & copiosiorẽ sudorem exhibet: inde etiam somnifera quoque sunt odorifera.

III. Sudor ut aliæ evacuationes componitur ex duplici specie humorum, materia nempe propria, & materia generali aquosa, quæ per reliqua etiam emundoria eliminari potest. Hoc autem speciale est in Sudore, materiem specialem nunquam esse naturalem, ut est in alvi excrementis, urina & perspirabili, quoniam in homine sano sudoris evacuatio non requiritur, ut maneat sanitas, quod de reliquis dici non potest. Sed quando materia morbofa est in corpore, illa non raro sub sudoris forma exit, quæ tunc non facile per aliud emundorium emitti potest. Ergo sudor multus formari potest, si multum de communi materia supeditatur per alimentum copiosius; vel si magna copia materiz morbi adest, quæ per cutim est evacuanda. Si alimentum copiosius copiosum sudorem facit, melius erit, quam si non fiat copiosus sudor, sed præstantius esset alimentis non abuti: inde si intelligimus hominem a fomno multum sudare, simulque ingerere multum alimenti, illa largior ingestio est minuenda, ne corpus tandem crudis onulium succumbat: aut si relicta fuit cacochylia, illa potest alvi ductione tolli.

IV. Si autem aliquis parcius vivens etiam a fomno multum sudat, de eo scimus eum sudorem non generari ex materia per alimenta copiosiora supeditata, sed quoniam abundat humor in corpore, qui sub sudoris forma exit. De tali sudore dicit, si fiat circa manifestam causam, eum egere evacuatione. Sed quamvis egeat, non addit. Hoc certum est, si ea materia maneat in corpore, plus damni fieri per alienam suam qualitatem, quam facit largiore evacuatione, ergo eget evacuatione ea: sed an illa evacuatio sudoriferis sit promovenda, an vero derivanda sit ad alvum, vehementer dubito, quamvis multi in ea sunt sententia. Fieri enim debet ille sudor citra manifestam causam, ergo non est criticus morborum acutorum, nam tunc ejus causa est manifesta; sed est sudor chronicus omni nocte a fomno apparens in valetudinariis, in quibus nullum manifestum morbum detegimus, qui tantam copiam sudoris expellere possent. At vero talem sudorem colliquativum nocturnum hodie invenimus in ea specie phthisis, quam vocant nervosam, seu in emaciatione chronica colliquativa: Quod si in hujusmodi sudoris propinemus sudorifera aut purgantia, ægri marasmo consumti pereunt. Sed si cohibetur colliquatio illa spontanea per antiseptica roborantia, sensim minuitur sudor nocturnus, & æger lente sanitatem recuperat.

L I B. IV. A P H. XLIII.

152. *Sudor multus, frigidus aut calidus, semper fluens, frigidus quidem majorem, calidus vero minorem morbum significat.*

I. *Q*UUM sudor non sit naturalis evacuatio, sed semper vel arguat violentam causam experimentem, vel abundantiam humoris morbofi sub sudoris forma exeuntis, decessendum est num causa violenta possit facere sudorem copiosum

Sudor multus ab uberiore alimentis.

Sudor multus sine uberiore alimentis, an evacuatione eget?

Sudor multus semper fluens, affluens.

assiduo fluentem, an vero talis prodeat ex morboſi humoris abundantia. Verum ſi cauſa violens hoc faceret, non fieret Sudor ſemper fluens, nam tandem deſiciente humiditate, compaſtis reliquis humoribus, ſubſisteret ſudor: ergo ſemper fluens copioſus ſudor indicat, humores bonos in humorem tenuem liqueſcere, eſtque ergo certum indicium morbi putridi, qui permittit, ut corpus privetur omni humiditate, & ut privetur humoribus etiam bonis liquefactis; qualis morbus non ſolum eſt curatu difficilis, verum etiam ſæpe tranſit in mortem, cum vix habeamus medicamina, quibus coercere valeamus illam ſpontaneam putredinem, qua liqueſcunt humores. Quod ſi cohibeamus per actum frigida effluentem ſudorem, is alienus humor retentus eo magis inſicit ſanos remanentes, ut ſuperius notavimus. Sive ergo copioſus ſudor in Acutis vel Chronicis aſſiduo fluat, ſemper eſt malum indicium.

Multus  
ſemper  
fluens fri-  
gidus ma-  
jorem  
morbum  
indicat.

II. Si vero copioſus ille Sudor ſemper fluens ſimul ſit frigidus, majorem morbum declarat, id eſt, ille tunc morbus multo difficilior curationem admittit, quod ex cauſa frigidum ſimul humorem generante eſt deducendum. Sive calidus ſit ſudor, ſive frigidus, ſemper arguit putredinem, & deliquationem humorum: ſed ſi frigidus ſimul ſit, illa frigiditas denotat motum vitalem tam debilem eſſe, qui non valet humores a ſpontanea corruptela coercere. Igitur ut curetur ille morbus, antiſeptica roborantia ſunt adhibenda, quæ vitæ vires reſtaurant. Sed in cordialibus hiſ hæret ſumma difficultas, poſſidemus quidem ſtimulantia & caleſcientia, quæ videntur erigere vires, verum aperte fateri cogimur, nos nulla habere vera Cardiacæ, quæ vires addunt: nam quæ ſtimulando id videntur facere, veras vires vitæ non ſuggerunt. Propterea huiusmodi ſudores ſunt periculoſiſſimi, ut ſæpe in Phthiſi nervoſa, ſeu Colliquativa chronica expertus ſum.

Calidus  
autem mi-  
norem  
morbum  
indicat.

III. Calidus autem aſſiduo fluens copioſus ſudor minorem morbum declarat, non tamen ſine periculo, ſed comparative ad ſudorem frigidum, quia arguit motum vitalem validius agentem, corruptit humores, & copioſiorem ſudorem extrudit. Igitur curatoria indicatio eſt in tali ſudore cohibere putredinem, & temperare nimium illum motum. At vero minuire nimium motum per refrigerantia multo facilius fieri poteſt, & ad hoc præſtandum multa habemus auxilia. Quare hic morbus multo melius auſcultat. Imo pergente morbo, dum ſenſim debilitantur vires, ille præternaturalis calor ſponte minuitur. Si vero æque eſſet in noſtra poteſtate ſuſceptam putredinem cohibere & emendare, hic morbus curatu foret facilis, ſed quoniam hoc difficile fieri poteſt; manet tamen ſudor copioſus, calidus ſemper fluens morbus periculoſus.

#### L I B. IV. A P H. XLIII.

154. **F**ebres, quæcumque non intermiſſentes, tertio die vehementiores ſunt, magis periculoſæ: quæcumque autem modo intermiſſant, quod ſine periculo ſint, ſignificat.

Febris de-  
ſinitio.

I. **E**tiamſi novus non incipit Aphoriſmorum Liber, novam tamen rem hic aggreſſitur Auſtor, quum jam proponere incipiat multa obſervanda in febris; quare antequam ea noſtris commentariis illuſtrems, neceſſarium duxi brevem præmittere Definitionem & Divisionem februm, ut in ſequentibus conſtet, quid ſemper velimus per febrem intelligere. Nullus eſt in medicina morbus, de quo plures definitiones ſunt traditæ, minusque inter Medicos conſtat, quid ſit per febrem intelligendum. Maxima fuit nata difficultas; quum multa ſint februm ſpecies, in quibus tamen omnibus collecta phænomena eſſe debent, ex quorum præſentia febris a deſſe judicamus. Altera & non minor eſt difficultas, quod non omnia phæno-

nomena eodem tempore conspiciantur, dum tamen in Definitione videtur requiri, ut omne simul in eadem sententia proferatur. Verum apud Medicos manet Definitionis nomen, licet successu temporis quædam notiones insepares proferendæ sunt; sed si plura alia adiunguntur, quæ adesse & abesse possunt, tunc quoque vocant Descriptionem. Febris legitima sive uno sive pluribus paroxysmis absolvitur, ille dicitur Morbus, qui incipit cum horrore, frigore & pulsu debili, pergit cum calore, manente ægritudine, cum pulsu frequentiore & duriori, desinit in sudorem cum pulsu molliore & calore temperiore, cum quo tandem desinit, si homo superstes manet. Conferri possunt, quæ diximus in Comp. nostro Tr. 52. II.

II. Huiusmodi febres aliæ sunt Legitimæ, aliæ autem Symptomaticæ, quæ sunt solummodo symptomata aliorum morborum, in quibus non ita attendimus ad febres curationem, quam ad morbi febrem producentis naturam investigandam. In utrisque fit distinctio ex invasionis modo, ut sit Febris Continua, Intermitte[n]s vel Remittens (Conf. Aph. 100. II.) Ex conjunctione harum non parvus committitur error, dum Medicus iudicat, omnem febrem, quæ eundem ordinem temporis servat, eandem esse febrem, dum ex Legitimis intermitte[n]tibus prolongatis sæpe fiant febres Continuæ & Remittentes; atque ex febribus symptomaticis itidem Remittentes & Continuæ fiant, imo interdum videantur vere Intermitte[n]tes. Quare in sequentibus observaturi sumus, qualisnam febris an legitima an vero symptomatica sit intelligenda, si ratio sit reddenda alicujus phaenomeni.

III. Ex exacerbationibus tertio die vehementioribus constat, Hippocratem hic non intelligere febrem Continuam, neque intelligendam esse Intermitte[n]tem, cum dicat *non Intermitte[n]s*. Ergo si febris hæc ad suum genus referenda sit, pertinet ad febres Remittentes, quæ Syneches dieuntur seu Continentes; & quoniam tertio die fiunt exacerbationes, ea est species, quæ vocatur *Tritaphyes*. Hoc autem non sufficit ad prædictionem formandam, quum *Tritaphyes* febris generetur ex febre Intermitte[n]te tertiana, atque ex morbo aliquo latente, cujus febris hæc est symptoma. Observamus in praxi Putredinem humorum, & Pus in corruptelam conversum huiusmodi febrem generare, quando raro agriemerunt, quare periculosa est *Tritaphyes*, quoniam designat ex valida putredine oriri, quæ ita facit Exacerbationes febriles alterno die, ut tempus intermedium non habeat *Apyrexiam*. Generatur etiam *Tritaphyes* ex febre intermitte[n]te Tertiana ita prolongata, ut sequens paroxysmus incipiat, priusquam prior desit. Sed omnes febres intermitte[n]tes in remittentes conversæ, quoniam magnum augmentum causæ arguunt cum virium defectu, etiam periculum portendunt. Hoc autem discrimen admodum observandum in curatione, quum *Tritaphyes* ex putredine antisepticus sit curanda, sed ex intermitte[n]tibus prolongatis optime aufcultet antidotis.

IV. Quotiescumque autem Tertiana febris veram *Apyrexiam* habeat, ex ea *Apyrexia* cognoscimus, illam intermitte[n]tem non formari ex putredine, vel pure corrupto; ergo de hac febre iudicandum, ut de omnibus legitimis intermitte[n]tibus, quæ rarissime interficiunt hominem: nisi ita fuerint prolongatæ, ut nullam *Apyrexiam* habeant, omni periculo carere. Atque inde deducere possumus, istos non recte agere, qui in intermitte[n]tibus tam diu expectant, donec corpus sit ex ægritudine debile, priusquam antidotum propinent. Atque ex eadem observatione manifestum est, quædam febres continuas & remittentes antidotis aufcultare, quum interdum ex intermitte[n]tibus prolongatis fiant remittentes, & continuæ febres.

Febris  
divisio.Febris  
non intermitte[n]s  
tertio die  
vehementior,  
periculosa.Tertiana  
Intermitte[n]s  
periculo vacat.

## LIB. IV. APH. XLIV.

154. *Quibus febres longæ, his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt.*

Febris  
longæ  
causa.

I. **Q**Uum Auctor dicat febres, noluit solummodo intelligere febres præcedentes tertianas remittentes, sed & reliquas omnes tam continuas quam intermittentes. In his præcipit Tubercula ad articulos aut Labores seu Dolores: sed quia hæc observatio non est constans in praxi, operæ pretium erit rimari causas Longitudinem inferentes; ut ex cognita causa possimus iudicium ferre, quid sit ex febrium longitudine præfagiendum. Febrium omnium causa nobis est res aliena, quæ actione vitæ est subigenda & expellenda. Quoties ergo (1) tanta est ejus materiæ copia, ut vi vitæ integre subigi non possit, febris protrahitur. (2) Aut si materiæ non est abundantia, sed in corpore habetur debili, cujus vires languidiores non valent modicam subigere materiæ copiam. (3) Vel si materiæ indoles est pertinacissima, quemadmodum in intermittentibus febris quartana, & in remittentibus, & continuis febris putrida, vel continua inflammatoria, quæ pus confectum critice non evacuat. Si attendimus ergo ad retentam materiem in febre longâ, illa erit vel cruda febrilis, vel purulenta, vel putrida, quæ humoribus mista febrem continuare facit.

Quando  
articu-  
lorum Tu-  
bercula,  
vel dolo-  
res facit.

II. Si vero ex febris longitudine constet, materiem oberrare in corpore, non certe scimus, circa articulos futura esse tubercula, dolores, vel labores; sed inde præfagire possumus omnia mala, quæ ex materia retenta oboriri solent: uti morbi augmentum, recidivam, metastasim, & commutationem in alium morbum, nisi diâ mala præveniantur critica evacuatione. Quare non debemus otiosi esse expectantes articulorum tubercula, vel dolores, sed omni ope tentare materiæ coctionem & coctæ determinationem ad emunctoria, ut corpus liberetur ab hoste, qui multa mala minatur.

## LIB. IV. APH. XLV.

155. *Quibus tubercula ad articulos, aut dolores ex febribus longis fiunt, his pluribus utuntur cibis.*

I. **I**N præcedente Aph. observavimus tres diversos humores a febre relinqui, qui finito morbo priore, novum alium morbum faciunt; imo interdum tam diu non exspectare, sed etiam nondum finito priore, novum formare, vel prioris recidivam facere. Tunc simul notavimus, incertam esse prædictionem Tuberculorum aut Dolorum ad articulos, quum plures exitus hujus materiæ retentæ fieri possunt. Hoc etiam ab Auctore nostro fuisse observatum, nullus dubito, quum hunc Aphorismum statim subnectat, dicens Tubercula, vel Dolores aut Labores articulorum fieri post febres longas, quando ægri hi utuntur cibis copiosioribus. Ex his verbis intelligi potest, cibum copiosorem in corpore debilitato a febre longa facere hæc Tubercula, vel Labores articulorum. Quæ sententia non ita est repudianda, dum crudum ex abundanti cibo in corpore debilitato natum facile possit ad articulos deponi. Sed quoniam ægri non utuntur cibis copiosioribus a febre longa; nisi simul in his restituatur appetitus, ex fame igitur redeunte post febrem longam videndum est, qualis materia continuavit tandiu febrem, aut quæ relicta fuerit febre finita sine bonâ crisi. Si perpendamus triplicem materiem a febre relictam, facile erit invenire materiem Crudam fuisse relictam, & dein cibo copiosiore magis accumulata; nam si remaneat vel Pus corru-

corruptum, vel Putrefactus humor, nunquam finita febre redibit appetentia, cum omne corruptum & putrefactum famem extinguat. Ergo constat, si finita febre redeat appetentia, cum imperfecta sanitate, quando aeger valetudinarius manet, in tali corpore reliquum fuisse crudum, quod naturalem sensum famis ex defectu nutrimenti natum non extinguit. Cavendum ergo est in hujusmodi valetudinarii corpus onerare alimentis, si velimus evitare Tubercula, vel Labores ad articulos, sed parca dieta est instituenda tamdiu, donec omnis cacochylia sit superata, vel expulsa, & corpus naturalem vigorem recuperaverit.

L I B. IX. A P H. XLVI.

156. **S**i rigor incidat febre non intermittenti, debili jam existenti aegro, Letale.

**I.** Rigor Græce *πῆξις* est morbus ex duobus conjunctis phænomenis nominatus, scilicet ex frigore corporis, & constrictione quadam forti, & utcumque tremente in motu animali: si refrigeratio habetur cum levi tremore & quasi cito decurrente per corpus, *Horror* vocatur. Unde non immerito dixit Hipp. Horror est levis Rigor, & propterea a prædicis unum pro altero ponitur sæpe, quum hi duo sic dicti morbi tantum magnitudine differant, sed Horror levior, Rigor autem gravior & diutius durantem causam habeat. Facile erit ex his Rigorem distinguere a suis congeneneribus morbis, Spasmo, Convulsione, Tremore, & Frigore. Nam in Spasmo constans est muscularum contractio, & in Convulsione alterna involuntaria valida contractio, sed sine frigoris sensu. In Tremore laxa est membrorum concussio, quæ tensiva est in Rigore. Frigus autem corporis non habet constrictionem muscularum.

Rigoris definitio.

II. Rigoris causæ multæ sunt, quæ hoc loco omnes non possunt recitari. Sed si istas percurramus omnes, deregimus cunctas indicare, noxium aliquid applicavi nervis motui & sensui dicatis. Nam id noxium subito inducit musculis motus animalis quandam constrictionem involuntariam, & minuit vitalem motum, ut inde generetur frigoris sensus, atque ita minatur actionis vitalis interitus. Illa causa tam in morbis chronicis quam acutis observatur, in chronicis autem, quia raro tam valida est causa, frequentius fiunt Horrores, quam Rigores. Qui Rigores fiunt in invasione febrium intermittentium, non ita periculosi sunt, sed in Continuis, vel sunt Critici, futuram evacuationem præsagientes, vel Symptomatici, qui semper mali. Sed quia Rigores agnoscunt magnam causam, inde observavit auctor noster H. a. 551. *Rigor una cum judicatione aliquatenus horridus.*

Rigoris Causæ.

III. Superius observavimus, febres Remittentes fieri vel ex pure corrupto, vel putredine, vel intermittente prolongata: in his si tam valida sit causa, quæ Rigorem inducere potest, certe non caret periculo, quod etiam Hipp. a. 524. observavit: *Rigores, inquit, velut in febre tertiana si in media inordinata febre exacerbentur, valde maligni sunt.* In his enim febribus fiunt Rigores, si morbus commutatur in sphacelum.

Rigor in febre remittente.

IV. Quod si aeger jam ex febre non intermittente fuerit debilitatus, corripitur Rigore, nulla spes esse potest curationis vel commotionis criticæ: nam si designat morbi, vel paroxysmi principium, ut indicare consuevit, hoc principium lethale erit, quum aeger jam ex præcedente febre fuerit debilitatus, ferre non poterit sequentem paroxysmum validum, qui cum Rigore tanquam signo paroxysmi validi inchoat. Si vero Rigor proveniat ex commutatione in sphacelum, nil melius prædici potest, quum sphacelus humorum in corpore debili mortem certissimam infert.

Rigor in debilitatis.

L I B.

## LIB. IV. A.P.H. XLVII.

157. **E**xcreationes in febribus non intermittentibus livide, & cruenta, & graveolentes, & bilioſe, & omnes male ſunt. At probe ſecedentes, bonæ. Et eadem ratio eſt quoad alvi egeſtiones, & quoad urinas. Si vero nihil ex conducentibus excernatur per hæc loca, malum.

**Senſus.** I. **Q**uam ſenſus hujus Aphoriſmi non admodum planus ſit, quædam præmittenda eſſe judicavi, ut conſtaret, quæ res in hoc Aphoriſmo ſunt exponendæ. Omnium primum conſtat, Auctorem ſigna bona & mala voluiſſe tradere in febribus non intermittentibus. Ex iſtis ſelegit Evacuationes, quæ in Remittentibus deteguntur, per Excreationem, per Alvum, & Urinam. Ex iſtis pro ſpecimine eligit Sputum, cujus malas notiones citat, ut ſit lividum, cruentum, ſœtens, & bilioſum, de his omnibus dicit malum portendere: atque ſimiles evacuationes per alvum & urinam quoque malas eſſe, adſtruit. Deinde obſervat ſputum bonum, ut & reliquas evacuationes conducentes ægrum liberare poſſe a febre Remittente. Sed ſi in febre Remittente nihil de materia bonæ indolis evacuetur, hoc etiam damnat. Ergo mala materia in Remittentibus evacuata nocet, bona vero conducit, & nihil evacuari quoque malum eſt.

**Qualia ſputa mala in remittentibus.** II. Remittentes febres eſſe ſymptomaticas ex Putredine, vel Pure corrupto natas ſæpe obſervavimus, ſi pus, vel putredo ita latitat in pulmonibus: quæ exſcreando rejiciuntur, declarant naturam materiæ retentæ; Sputa ergo livida, cruenta, ſœtenta, vel flavſcentia, bilioſa dicta, demonſtrant, talem humorem in pulmonibus colligi; qualia corrupta ſi ex ulcere quovis ejiciuntur, non permittunt ulceris conſolidationem, & eo minus, ſi ulcus habeatur in pulmonibus cum febre remittente, quæ declarat, totam maſſam ſimili corrupto humore infectam eſſe. Quare talia ſputa mali ſunt ominis.

**Qualia ſputa bona in remittentibus.** III. Sed ſi Purulentum febrem remittentem faciens ſenſim minus corruptum exit, id valde bonum, quemadmodum in omnibus ulceribus, ſi bonum pus, ſatis copioſum, & tamen non nimis abundans emittitur, ſpes conſolidationis eluſcit. Inde in febre remittente ſi emittantur ſputa alba, æqualia, inodora, libere excurrentia, quæ levant ſymptomata, modico copia ejecta, ſanitatem promittunt: ita enim ſpes eſt, totum purulentum ejici poſſe, & ulcus pulmonis conſolidari.

**Sputum nullum in remittentibus malum.** IV. Sive ſputa illa bona ſive mala antea prodierint, ſed deinceps ſupprimantur, mors imminet. Nam ſi ſputa corrupta ejiciebantur, adhuc potuit morbus protrahi, utpote continuo liberabatur corpus a corrupto humore, dum id corruptum inſuper retinetur, mortem accelerabit. Immo ſputum bonum retentum, quod evacuatum promittebat ſanitatem, diuturniore mora convertetur in putrilaginem, quæ ut alii humores corrupti totam maſſam inficiet, & ita jugulabit vel ſua copia majore, vel aliena iudole, ægrum.

**Urina & alvi egeſtio bona & mala in remittentibus.** V. Tandem ex ſpeciali obſervatione ſputi condit generalem regulam evacuationis urinæ, & alvi egeſtione. De quibus idem eſt concipiendum, quod alvi excrementa vel urina corruptionem in Remittentibus indicantia, malum præſagium præbeant: ſed bona excrementa ſanitatem. Si vero nihil per hæc emunctoria exit in morbis, qui per talia emunctoria ſolent eliminare ſuos humores, tunc ſemper erit malum omen. Quæ autem bona & mala dicantur alvi excrementa, & qualis urina proſit vel noceat, aliis in locis traditur.



## L I B. IV. A P H. XLVIII.

158. **I**N non intermissentibus febribus, si externa quidem frigida sint, interna vero urantur, & sitim habeant, lethale.

**I.** Nonnulli existimarunt, hanc febrem non Intermittentem denotare febrem Continuum, quoniam alibi auctor noster eandem sententiam proferit de febre continua. Ea autem conclusio mihi non videtur satis valida, quum eadem phaenomena fieri possint a diversis causis, & quia versatur in prognosi formanda febrium non Intermittentium, quas demonstravimus hodie vocari vel Remittentes, vel Continentes. Has oriri demonstravimus vel ex putrefactis humoribus, vel ex Pure corrupto. Si igitur ex his deduci possit frigus partium externarum cum ardore interno atque siti, videndum tunc ulterius erit, quid boni aut mali dicta phaenomena portendant.

**II.** Internae partes dicuntur illae omnes, quae nec oculo patent, neque externo tactu explorari possunt a medico; adeoque viscera ventris & pectoris: in quibus si habeatur vel calor, vel frigus, a medico cognosci nequit, sed ab aegro indicari debet. In his partibus per varias causas generari potest Ardor, sed causae hae diversae non faciunt reliqua phaenomena similia, unde ex conjunctis phaenomenis colligere debemus causam latentem ardorem inferentem, ut videamus, quatenus causa latens non solum ardorem inferre potest, sed etiam reliqua phaenomena. Adest febris Remittens, unde possumus concludere, neque Inflammationem, neque Erysipelas eum Ardorem inducere, quia his morbis conjuncta est febris continua. Hinc Ardor internarum partium cum febre Remittente denotat, interna viscera agitari a materia corrupta motum vitalem instigante. Ea autem materia est vel biliosa, vel pinguedinosa, vel purulenta corrupta, quoniam reliquorum humorum corruptiones non inferunt vellicando tantum ardorem. Quoniam omnes morbi putridi sunt periculosi, illi excellunt, qui putrefactum habent in visceribus interni, unde evacuari nequit, & quarum partium functiones depravatae vel extinctae mortem inferre possunt. Hinc etiamsi nullum praeterea adesset malum signum, nisi febris Remittens cum Ardore partium internarum, hoc solum sufficeret ad praefagiendum periculum.

**III.** Per partes externas hoc loco intelliguntur tota cutis, facies, membraque externa. In his si simul habeatur frigus, lethale pronunciat in Remittentibus. Multi negant, tale quid observari posse in febribus, quia Calor & Frigus simul constare nequeunt. Nos autem in periculose decumbentibus saepe haec duo simul observavimus, quo aegri conquerebantur de incendio interno, quasi viscera urebantur, dum tamen partes externae vel erant tepidae, vel etiam algidae. Veteres multum laborarunt ex sua hypothesi de Calido innato, & Neoterici ex ebullitione, aut fermentatione haec opposita phaenomena explicare, sed semper occurrebant tria, quae plenam sententiam repudiabant: neque feliciorum theoriam posuerunt, haec ex obstructione qui deducere conati sunt, quum saepe integrum viscus post mortem inveniatur obstructum sine ullo ardore interno praegresso. Sed si attendamus ad legem generalem corporis viventis, quamcumque partem stimulatam se magis movere, & illum motum vitalem esse causam naturalem caloris, facile intelligitur, si acre rodens haereat in visceribus internis, eam partem admodum calere, & si vehementior sit rosio, partem videre comburi, ut experimur in cute, si applicatum haeret phaenigium. Sed tunc tamen ea videtur restare difficultas, quomodo inde fiat frigus partium externarum quum ex lege stimulantium & calefacientium applicatorum vel assumptorum totum corpus concaleseat. Hoc utri-

Ardor internarum in remittentibus?

Frigus externarum in remittentibus unde?

que semper verum est, modo vires vitæ tantum valeant, ut ex parte stimulata per totum corpus motus vitalis major fieri possit: sed si simul habetur summa spirituum penuria, & virium defectus, pars quidem stimulata ardet, sed in reliquo corpore defectu virium non propagatur ille motus major, sed ex motu languidiore in partibus externis generatur frigus. Propterea pejus est, si partes externæ simul frigent, dum interna videntur uri, quoniam in tali febre non solum designatur Corruptela, sed etiam summa Debilitas.

Sitis in  
Remittente  
unde

IV. Sitim non solum generari ex tenuis aquosi penuria, aut oris siccitate, verum etiam ex putrefacto bilioso & pingui, in nostra Exercitatione de Siti demonstravimus. Hoc etiam fieri in hac febre Remittente, luce meridiana clarius patet; tantus enim calor, aut siccitas non habetur in ore, ut inde nimiam sitim conjicere possimus: dum hi ægri non raro cum ore frigido & humido admodum siticulosi sint: tunc nempe si id putrefactum simul feratur ad os, quod sua qualitate sitim infert, quæ multo potius non placatur, ut fit in siti ex siccitate. Hoc signum licet non adfuisset, morbus tamen per se, ut ex iis, quæ superius exposuimus, fuisset periculosissimus, nunc vero accedente siti, quæ declarat putredinis dispersionem per corpus, aggravatur præfagium malum.

# L I B. IV. A P H. XLIX.

159. **I**N febre non intermittente, si labium, aut supercilium, aut oculus, aut nasus pervertatur: si non videat si non audiat, corpore jam debili existente, quidquid horum fiat, in propinquo mors est.

I. **P**ergit Auctor noster in remittentibus ex phænomenis formare prædictiones, quæ fundatæ sunt in meris observationibus constanter in ægris detectis: quamvis igitur hæc solæ haberentur sine causarum expositione, sufficerent in praxi ad formandas prædictiones. Sed quoniam harum apparitionum investigatio apud omnes medicos laudabilis habetur, atque conducit ad alias res obscuras elucidandas, hæc phænomena ex suis causis eruere conabimur, ut eo firmiorem habeamus cognitionem. Casus est febris Remittens cum summa debilitate: si in tali statu vel inordinatus fit motus animalis in musculis faciei, vel si sensus auditus, vel visus extinguuntur, tunc observavit, mortem in propinquo esse.

Debilitas  
intermittente  
quid  
notat.

II. Ut vires corporis valeant, requiritur spirituum bonorum liber & satis copiosus influxus, quare vel ex intercepto fluxus vel spirituum defectu aut alienata indole debiliior generatur actio movens. Verum interceptum transitum, aut paucitatem spirituum non possumus in febre remittente accusare: nam ex spirituum defectu oritur quidem debiliior motus, sed sine febre; atque spirituum fluxus interceptus particularem paralyfin parit, minime vero debilitatem universalem cum febre. Quare Debilitas magna in Remittentibus arguit, naturam spirituum ita esse inversam, uti inepti sint ad motum in nostro corpore præstandum. Inde admodum valens est corruptio, quæ etiam invertit istos humores, quorum efficacia boni præparandi erant humores. Quo igitur in febribus Debilitas est major, eo majus imminet periculum.

Pacis mo-  
tus tunc  
mutatus  
mortem  
præfagit.

III. Satis constat in febribus remittentibus cum summa debilitate nasum, supercilium, oculum, vel labrum non converti per convulsionem ex spirituum abundantia, aut majore motu, quum deficiat in corpore causa movens: sed quoniam musculi omnes harum partium nervos habent ex medulla oblongata cerebri provenientes, indicium est, id acriter quod febrem remittentem facit, translatum esse ad interiora encephali, cujus irritatione hi motus inordinati in partibus faciei fiunt. Vel inde provenire potest, quod musculi antagonistæ resolvantur subsistente spiri-  
tuum

tuum influxu. Sive hoc, sive istud fiat, utrumque mortem instare, declarat: nam materia morbi ad interiora encephali translata, omnem cerebri actionem invertet. IV. Non solum visus & auditus extinctio in Remittentibus, corpore jam debili existente, instantem mortem præfagit, sed etiam aliorum sensuum extinctio hoc etiam promittit: ut si quis antea siticulosus, sine bona causa non amplius sitiat; aut si pars dolens non amplius dolorem exhibeat: cuncta hæc æqueunt ita inversos aut extinctos esse spiritus, ut isti sensus non amplius exerceri possint. Adeoque in organis sensuum jam inchoata mors est, quæ brevi post quoque reliquis actiones vitales extinguet.

In his visus & auditus extinctio mortem præfagit.

## L I B. IV. A P H. I.

160. **U**bi in febre non intermittebat difficultas spirandi, & delirium fit, lethale.

I. **P**ergit Auctor noster in eadem morbi specie ex supervenientibus symptomatibus formare prognosin: In præcedente tradidit symptomata sensus & motus animalis, quæ propterea mortem præfagiebant, quoniam indicabant materiam corruptam, vel putridam in encephalo colligi, vel versus eam fecisse metastasim. Nunc dicit Difficultatem spirandi & Delirium lethale esse. Non siæ ratione hæc duo symptomata junguntur ad designandum, unicum locum affectum esse, ex cuius oppressione, vel agitatione utraque hæc symptomata superveniunt: nam si solummodo dixerat Difficultatem Respirandi, forsitan materia febris non quiescentis, ut vocat Celsus, occupasset pulmones, sed quoniam addit Delirium, inde concludere possumus, eam partem esse affectam, in qua spiritus consueverunt, pro Ratiocinio & motu Respiratorio. Quemadmodum in Encephalo consueverunt ad motum musculorum in facie, & auditum, & virum exercendum: ita in eodem etiam loco consueverunt, quibus utimur ad bene ratiocinandum, & respirandum. Si ergo in febre Remittente duæ actiones simul afficiuntur, quæ utraque ex Encephalo accipiunt spiritus, etiam si altera harum in pectore exerceatur, admodum verisimile est, causam hæere ad locum commune. Potest tamen esse, ut duæ partes simul afficiantur, sed in hoc Aphorismo crediderim, causam latitare in encephalo, versus quod febris remittens fecit metastasim, quæ turbavit æquabilem motum ad judicandum, & respirandum requisitum. Quamobrem tamen non æque in hoc, quam in præcedente dixerit, mortem instare, meretur observari. Locus quidem in utrisque est communis, & actio respiratoria extincta periculiosior, quam si extinguatur Visus, vel Auditus: verum in præcedente adiecerat signa summæ debilitatis, ex quibus colligere potuimus, functiones jam incipere extinguere; verum in hoc Aphorismo notat perturbatam actionem, nam homo non delirat ex deficiente actione, sed turbata, ita etiam difficile respirat, quod si non respiraret, signum esset extinctionis actionis. Igitur, quia extincta actio mortem instare declarat, sed turbata actio periculum promittit, in hoc aphorismo duntaxat posuit Lethale.

## L I B. IV. A P H. II.

161. **I**n febris abscessus, qui non solvunt ad primas judicationes, morbi longitudo significans.

I. **I**nterpretes multum laborant, num solvunt active vel solvuntur passive intelligi debeat, nos autem magis attendentes ad illustrandam scientiam medicam,

dicam, quam extollendam Hippocratis sententiam, hanc interpretationem Criticis relinquimus, solummodo notantes, si intelligi debeat solvuntur, uti videtur ex Textu græco, sensus hujus Aphorismi non esset Praxi conveniens, nam Abscessus nunquam ad primas judicationes solvuntur, sed sensim evacuato pure, sanantur: verum Abscessus solvunt febres, vel statim, vel tarde, & tunc Aphorismus hic egregiam regulam prognosticam præbet in medicina.

Qualis febris abscessu finitur.

II. Ut febris per Abscessum in quadam parte natum tollatur, necesse est, ut sit febris, cujus materia in pus commutari potest. Verum præcedentes febres Remittentes nunquam formant pus, sed putrilaginem, quare in hoc loco sapienter non posuit febres non intermittentes, sed absolute in febribus, ac si indicare vellent, se in hoc loco non agere de Remittentibus, sed de febribus Continuis, quæ materiem purulentam formant, quæ quoque in Intermittentibus rarissime formatur. Quamobrem in hoc loco intelligenda est febris Continua, quæ potest per criticam evacuationem desinere, vel per Abscessum.

Longitudinis prædictio ex abscessu in febribus.

III. Omnes febres, quæ desinunt per Abscessum, longiores sunt iis, quæ per criticam evacuationem terminantur: nam nunquam tam perfecte tollitur febris materia in formato abscessu, quam per aliquod emunclorium: cum nunquam natura Abscessum formet, si satis valeat materiem eliminare per emunclorium; illa igitur debilitas causa est, cur non satis perfecta fiat materiæ reparatio. Atque ipsa separatio a communi massa non liberat ægrum a toto morbo: cum fiat materiæ dispositio in quadam corporis parte, ubi novum morbum format. At vero scopus Auctoris non est docere longitudinem ex febre quæ desinit per abscessum, sed febrem longiorem futuram, si statim ac apparet abscessus, non quiescit. Ut enim perfecte desinat morbus præcedens per Abscessum, necesse est, ut omnis morbi materiæ ab eo abscessu recipiatur. Quod cognoscimus si statim quoque desinit febris: sed si perfecte non quiescit febris, signum est totam febris materiem in abscessu non esse depositam, quod residuum, ut signum debilitatis virium, morbum prolongabit.

#### L I B. IV. A P H. L I R

182. **Q**uicumque in febribus, aut in aliis infirmitatibus ex proposito: ( id est ob causam ) lachrymantur, nihil inconueniens. Qui vero non ex proposito, magis inconueniens.

Scopus.

I. Continuat Auctor formare prognosin ex phenomenis, quæ febribus superueniunt, sed ut generaliorem debilitatem faceret adiecit, alias infirmitates sine febre, in quibus dicit, inconueniens magis, vel absurdius esse, si non ex proposito, vel involuntarie copiosæ lachrymæ fundantur. Etiam si Lachrymæ egregiam partem Phenomenologia constituerent, a paucis autem medicis ita exponuntur lachrymæ ex suis causis, ut ex lachrymis apparentibus aliquid certi constituere valeamus. Copiosius in hoc Aphorismo proponit Auctor Lachrymarum stillicidium, ut inde ferat iudicium in morbis. (1) Quæ lachrymæ copiosiores fluunt ex cognita causa. (2) Quæ producuntur ex causa latente. De utriusque scorsim acturi sumus.

Lachrymæ copiosæ ex officio manifesta causa nil boni aut mali præfigunt.

II. Ex glandula lachrymali innominata dicta, supra oculi bulbum in fovea hærente stillat assiduus liquor pellucidus, tenuis instar aquæ, qui irrigat oculi partem anteriorem, ut maneant humida & pellucida, atque depurata, si forsitan aliquid ei adhereret, dein absoluto munere recipitur punctis lacrymalibus, ducitur in saccum lachrymalem, & dein cava marium, ubi evanescit: Si autem maiore copia fecernatur, quam ut ita recipi possit a punctis lachrymalibus, vel si illa vel

fic interclusa, supra palpebram inferiorem adscendant lachrymæ & exsillant. Hoc stillicidium frequentissime generatur ex animi pathematibus, oculi, vel narium irritatione, vel quia, ut diximus, via est interclusa, sed si ex his causis fiat, nullum indicium præbent boni, vel mali in morbis totius corporis, quum tales fiant ex vitio organi, & inde solummodo particulare, minime autem generale vitium declarant: & inde in morbis generalibus non censentur inter signa.

III. Etiam si febris esset præsens, si lachrymæ copiosè fluant, inde etiam nullum fieret iudicium; sed si diætz causæ abint, atque ex indole febris copiosè fluuntur lachrymæ, tunc indicium est, sanguinem ferri majori impetu ad caput, atque tunc ea mala expectamus, quæ ex hoc majori impetu deduci solent. Eam prædictionem rotundis verbis exposuit noster Auctor H. a. 667. *Quibus in febribus acutis, magis ardentibus, lachrymæ invita defluunt, his sanguinis a naribus eruptionem expectare oportet, si etiam alia perniciose non habeant; nam his qui male habent, non sanguinis eruptionem, sed mortem significans.* His constat, cur dixerit magis inconueniens, quoniam interdum mortis instantis signum est.

Ex latente causa in febre quid notant.

IV. Simili quoque modo ratiocinandum est in quibusdam aliis morbis cum & sine febre. Nam in *apoplecticis* & *anginosi*, si lachrymæ voluntariæ fluant, vel ex diæti irritationibus nihil boni, vel mali præfagiunt: Sed si fiant ex impedito reditu sanguinis per venam jugularem, pessimum indicium præbent, cum sanguis in encephalo collectus cerebrum, & cerebellum ita comprimat, ut omnis circulatio spirituum supprimatur.

In aliis infirmitatibus quid notant.

L I B. IV. A P H. LIII.

163. **Q**uibus in febre ad dentes viscosa circumnascuntur, his febres sunt vehementiores.

**V**isoso, vel lento humore dentes obsideri, sæpe observamus in praxi tam in morbo acuto quam chronico: hujus originem ex variis causis ducunt; quidam putant, ex dentium substantia exhalantes humores condensari; alii vapores ex ventriculo, vel pulmonibus exhalantes, frigiditate dentium condensatos accutunt; denique quidam contendunt, glutinosa esse alimenta. Sed si rimamur experimenta, quæ probant dentium solidam substantiam crassam non transmittere humores; oesophagum nihil nisi in rutilis, & vomitu emittere, atque tracheam solum humorem integre volatilem exhalare; atque glutinosum hoc nasci post oris collationem, sine cibo deinceps sumto generari, facile persuademur omnes istas allegatas causas inanes esse conjecturas. Quare causa querenda in humoribus, qui in ore ipso seceruntur, five sit mucus naturalis, five saliva in os deposita. Hi humores vitio morbofo lentiores nati in os depositi, magis dentibus quam partibus reliquis adhærent: quum partes reliquæ ex sua substantia emittentes humiditatem id tenax depellant; Dentes autem humidum non emittentes, adhesionem favent. Inde etiam tenacia unguibus applicata diutius & tenacius adhærent, quam cuti. Signum igitur est, quoties forditate, vel glutinosa obfessi inveniuntur dentes, quod in humoribus in os depositis prædominet potentia concresecendi. Quod si solummodo in his humoribus hoc vitium haberetur, nihil mali inde præfagiri posset. Sed quoniam istud glutinosum raro in solo humore salivoso prædominat, inde tanquam signum generale totius massæ accipiendum est.

Visciditas dentium causata.

II. Omnis circumnata dentibus visciditas non est signum febris vehementioris, quum sæpe in chronicis admodum sordescant dentes, sine ullo febris indicio: sed quando hæc sordidates dentibus adhærentes conspiciuntur in febribus, tunc semper vehementem febrem indicant. Nunquam enim humores motu circulatorio aucto

Cur dentium visciditas circumnata, si.

gnum fe-  
bris vehe-  
mentiori

convertuntur in glutinosum corruptum; nisi motus sit validissimus; qui gelatinam compingit in densum, & corruptum lentorem. Quæ ergo conspecta phenomena, ut est viscositas dentibus circumnata, sunt effectiva vehementioris circulationis, eadem quoque probant, adesse febrem vehementem. Quare hoc signum probat, adesse febrem vehementem, sed non futuram; verum febrem periculosam futuram; quoniam humores ita compacti difficulter per bonam erisim evacuari possunt; & est quoque signum Longitudinis, cum lentus humor longo tempore eget ad solutionem. Utilissimum itaque est inspicere os in febris, non ut duntaxat formemus prædictionem ex phaenomenis inventis, sed ut etiam inde habeatur curatoria indicatio: nam quoties inveniuntur dentes viscoso obfessi, eam febrem curare debemus ut vehementem febrem. Et ut levetur hoc symptoma, os est colluendum abstergente antiphlogistico.

# LIB. IV. APH. LIV.

164. **Q**uibus diu tussis sicca, paulum irritantes, in febribus ardentibus, non admodum siticulosi sunt.

Sitis con-  
stans sym-  
ptoma in  
ardenti-  
bus.

**T**ria primaria signa numerant præfici ad definiendam febrem ardentem; Calorem urentem, Siccitatem magnam, & Sitim vix ferendam. Cur autem sitis fiat in ardentibus, hoc loco exponendum est. Sitis est sensus species in nobis, qua instigamur ad hauriendum potum. Hic sensus nobis a Deo est concessus, ut cognosceremus, quando in nobis est defectus, qui ingestione portionis est supplendus, ut famis ad petenda alimenta, & tactus ad evitanda mala applicata. Quoties itaque in nobis est humidi defectus, naturale est, ut percipiamus Sitim. Ergo solummodo esset demonstrandum, in ardentibus defectum humiditatis esse, quæ res tam plane constat, ut nulla egeat expositione, quum morbo circulatorio aucto omne humidum expellatur, & quod expelli non potest, compingatur in lentorem. Hanc siccitatem seu defectum humiditatis in ore & faucibus sensim Sitis producere, in *Exercitatione Medica de Siti* exposuimus.

Tussis sic-  
ca paulu-  
lum irri-  
tantes in  
ardenti-  
bus, unde  
sunt.

**I**. Tussis dicitur sicca, si tussiendo nihil humidi vel phlegmatis ejicitur; hujus Tussis sicca inveniuntur multæ causæ, ut exposuimus in *Exercitatione de Tussi*. Ex istis illæ causæ eligendæ, quæ in febre ardente fieri possunt, & quæ causæ paululum irritando tussim inferunt, adeoque causæ levis esse debet, quæ tussiendo facile lenitur, sed & cito redit. Magis convenientem causam non invenio talem Tussim inferentem, quam internæ membranæ laryngis siccitatem, quæ quamdiu est præsens, stimulando tussim inferit: sed quoniam tussiendo major copia humiditatis fertur ad has partes, tussiendo ea membrana humedatur, & ita cessat tussendi irritamentum: sed ea cessante brevi post exsiccat, unde iterum redit Tussis, quæ nihil ejicitur, sed sæpe redit. Tussiendo huc versus allici humores etiam in sanis, si aliquid in tracheam incidit, probari potest, nam tussiendo ex mechanica causa multum muci tamen ejicitur. Inde optime hujusmodi Tussim in acutis lenire potui hauriendo vaporem ebullientis aquæ, quo latera sicca trachæ irrigabantur.

Tussis sic-  
ca in ar-  
dentibus  
minuunt  
sitim.

**II**. Tussis illa in ardentibus non solet cessare, quamdiu durat febris ardens, ut observavimus in praxi, quia tolli nequit siccitas hujus tussis causæ manente febre ardente. Quod autem minus siticulosi sint in ardentibus, quando talis tussis adest, ex iis quæ exposuimus deduci potest: nam quia tussiendo plus humiditatis ducitur ad fauces, quo lenitur tussis, id quoque adductum minuit sitim, quia siccitas utriusque est causa, nempe sitis, & tussis, & inde adductione humiditatis utraque phaenomena mitigantur. Non debemus ex hoc Aphorismo colligere, ut quidam perperam fecerunt, talem agrum in febre ardente non sitire, sed solum-

mo

modo minus fitit, quia tussiendo plus humidi fertur ad fauces, ut ita mitescat fitis. Ita videmus interdum characteristicum symptoma morbi minui per aliud superveniens, ut in hoc casu minuitur fitis in ardentibus, & in cerebri oppressione minuitur febris ardentis calor. Quare sedulo perscrutanda phenomena in morbis, an non propter aliud superveniens minuantur, vel extinguantur.

E L B. IV. A P H. LV.

165. **I**N Bubonibus febres, omnes mala, prae ephemeris.

**B**UBO seu *Buſſis* quia non est vox semper eandem rem significans in scientia medica, primum constare debet, quid Hippocrates in hoc loco per Bubonem intelligat, antequam scire possimus, quanam febris mala sit in Bubonibus, & quae minus mala, vel bona. In Arte Medica, vel notat partem, vel morbum. Pars illa Latinis dicitur Inguen. Sed si designat morbum, tunc est tumor proprie in Inguine. Verum non omnes tumores inguinis dicuntur Bubones, uti patet in herniis huius loci, ex quibus species invenitur, quae vocatur Bubonocoele, seu Hernia inguinis, quae tamen nunquam absolute dicitur Bubo. Sed si alius tumor Inflammatorius seu purulentus, ut & glandulosus, ut est Phygelion, in Inguine detegitur, talis tumor dicitur Bubo. In hac significatione non acquiescent, sed ex tumoris similitudine sub alis & pone aures, etiam in aliis locis huiusmodi tubercula Bubones vocant. Si sequimur interpretationem Galeni, hoc loco per Bubones intelligendi tumores seu Tubercula inflammatoria, vel purulenta non solum in Inguinibus, sed & etiam sub alis, & pone aures, quae sententia quoque mihi videtur verissima, ut infra constabit.

Bubonis significatio.

11. Febris Diaria seu *quotidiana* ex febribus continuis levissima est species, & brevissima, etiam si a quibusdam referatur ad Intermitteutes, sed quoniam unico paroxysmo absolvitur, species est febrium continuarum. Dicitur Ephemera, quia paroxysmus ille ultra viginti quatuor horas non extenditur. Si autem diutius continuatur paroxysmus, dicitur Synochus simplex, vel & Ephemera plurium dierum. Causa ergo Ephemeræ talis esse debet, quae motu febrili intra viginti quatuor horas tota potest subigi, & expelli, aut in aliquam partem deponi, ubi novum paroxysmum facere non potest. Ea frequentissime observatur, si in Diata commissus est error, vel prohibita fuit insensibilis perspiratio, ut & in tuberculis Inflammatoriis si transeunt in suppurationem. Sufficit in curatione itaque Ephemeræ potandum dare potionem antiphlogisticam diaphoreticam. Huiusmodi febrem post aliquot septimanas recurrentem inordinate observavi in cacochymicis, catharrhosis, & acrimonia cruda laborantibus, quae febre finita cum sudore corpus liberabatur a crudo illo, & alieno humore.

Ephemera quae dicitur.

111. Si conferamus ea, quae superius exposuimus, dicti veritas constabit, omnes febres malas esse praeter Ephemeram in Bubonibus. Bubones enim Pestilenciales, aut qui omnem materiem in se non recipiunt, vel qui fiunt in morbis putridis, non excitant Ephemeram, sed vel febrem continuam per multos dies durantem, vel remittentem, aut hecticam, quae omnes febres, quoniam imperfectam crism designant, male censentur. Ephemera autem nata ex commutatione materiae in pus, quae tunc simul cessat brevi tempore, designans totum reliquum corpus liberatum esse a morbosa materia, bonum ergo praesagium praebet.

Cum omnes febres male in bubonibus praeter ephemeram?

## L I B. IV. A P H. LVI.

166. **F**ebriçitanti sudor superveniens, febre non deficiente, malum. Prorogatur enim morbus, & multam significat humiditatem.

Unde sudor in febribus.

**L. N**aturale est in omni specie februm, ut circa finem paroxyfmi evacuetur sudor, & in omni febre tam Acuta, quam Remittente, & Intermittente legitima, cum sudoris eruptione febris quoque quiescat. Multi inde existimant, sudorem formari ex febris materia: verum maxima pars sudoris ex bonis humoribus corporis depromitur, sudor enim erumpere potest, etiam si nulla sit febris materia in corpore. Quare idem de sudore statuendum, quod observant Practici in urina, tota enim urinae massa non statuitur componi ex morbi materia, sed statuendum est cum urina simul evacuari materiem morbi unde habetur urina Cruda, quæ indicia præbet evacuationis materię morbi, sed Cruda, quæ sine materia excernitur. Hoc etiam sentiendum est de Sudoris evacuatione, sed quoniam sudoris materia ita non potest examinari, uti in urina, alia criteria sunt adhibenda, quibus cognoscimus, num sudor sit criticus, vel symptomaticus. Quando igitur motu febrili corpus valide fuit agitur, atque humores soluti, accedente relaxatione pororum, id quod solutum fuit, sudoris forma exit, partim constans humoribus bonis detritis, partim ex materia febrili subacta.

Febriçitanti sudor superveniens, febre non deficiente malum.

**II.** Ut Sudor adferat levamen, necesse est, simul aliquid de febrili materia auferat: verum hoc si faciat, febris simul vel remittit, vel minuitur, vel quiescit, detracta enim materia irritante febrili minuitur motus ab eo stimulus instigatus: sed non est opus, ut omnino febris abât, sed ut minus se viat. Si vero febris cum tali erumpente sudore non minuitur, aut quiescit, certum indicium est, materiem febris cum sudore eo non fuisse ablatam. Eam retentionem admodum malam esse, non eget explicatione.

Talis sudor præfagit longitudinem.

**III.** Sudorem non auferentem febris materiem præfagire Longitudinem, superius Aph. 12., XII. demonstravimus, quare ad probandam instantem longitudinem ex sudoribus erumpentibus, non quiescente febre, hoc duntaxat esset adstruendum, cum sudorem non tollere materiem morbi, sed quoniam hoc a nobis in hoc loco satis fuit demonstratum, non erit opus repetere.

Et designat multam humiditatem.

**IV.** Hunc sudorem erumpentem in febre non quiescente deducit Auctor ex multa humiditate, quare multi practici, ut curent talem febrem, præcipiunt danda esse Sudorifera Diuretica, & Purgantia, ut corpus liberent a nimia illa humiditate. Auctori nostro consentio, cum sudorem indicare multam humiditatem; sed istis, qui propterea contendunt illam humiditatem esse evacuantiam, consentire nequeo. Quod si rimamur originem hujus humiditatis multæ, facile isti Practici necum ibunt in eandem sententiam. Febris illa si commutatur in putrilaginem, liquati humores sub sudoris forma exeunt, & inde non tollunt febrem, sed eam prolongant, uti observatur in omnibus febribus putridis & colliquativis. Si tunc quis satageret colliquatos humores eliminare per urinam vel alvum, potius interficeret hominem, quam ut tolleretur febrem ex tali putredine natam. Quamobrem in sudoribus erumpentibus non quiescente febre monemus, nos debere per antiseptica ulteriorem colliquationem prævenire, sed neutiquam per evacuantia conari evacuationem.

## L I B. IV. A P H. LVII.

167. **A** Spasmo autem tetano ditento febris superveniens solvit morbum.

Quum



I. **Q**uoniam Veteres ex phaenomenis imposuerunt morbis nomina, non raro duo phaenomena ab eadem causa venientia diversa nomina acceperunt; alii vero morbi causa admodum diversi, non raro idem retinent nomen, quod in prognosi formanda & curatione tradenda magnam difficultatem parit. Hoc patet in Tetani descriptione, ex eo enim morbo tres quasi distinctos morbos faciunt, *Tetanus*, *Empoibosonum* & *Opisthoronum*. Multi *Spasnum* & *Tetanus* eundem morbum faciunt; alii vero dicunt, morbos esse distinctos. Ita etiam *Convulsio*, *Rigor*, *Dissentio nervorum*. *Epilepsia* quibusdam sunt synonyma, aliis autem morbi differentes, quare saepe dubii haeremus, qualisnam morbus intelligatur. Quidam ex Neotericis non sine ratione *Convulsionem* distinguunt in duas species, unam vocant *Convulsionem Tonicam*, cui respondere potest *Tetanus* atque *Rigor* Celsi, nam *Rigor* hodie in medicina aliam significationem obtinuit (*Apb.* 156. 1.) Alteram vocant *Convulsionem Clonicam*, cui respondere potest *Spasmus*, cujus species est *Epilepsia*, *hysterica* & *hypochondriaca passio*. Dum scilicet muscoli voluntati subiecti a causa morbosa interna, etiam reluctante voluntate, validis constringuntur, & ita constricti manent, illum motum morbosum vocant *Convulsionem Tonicam*. Sed si hi muscoli alterne constringuntur & dimittuntur, ut inde fiat motus inordinatus involuntarius validus, ille motus vocatur *Convulsio Clonica*. Quoniam superius demonstravimus (*Apb.* 51. V.) quali modo & quando febris superveniens solvit *Convulsionem*, non erit opus eadem repetere.

Spasmi & Tetani differentia.

L I B. IV. A P H. LVIII.

168. **A** Febre ardente, vigore superveniente, solutio fit.

I. **O**mnem febrem Continuum non esse Ardentem, ex superius dictis (*Apb.* 160. II.) colligi potest. Quare in quadam febre Continua quadam apparere debent notiones, quibus detectis omnes medici concludunt, eam febrem continuam vocari febrem Ardentem. Semper adesse debet in hac febre continua Calor urens ad attrahendum, cum cutis Siccitate summa, laboriosa Respiratione, Pulsu duro & frequenti, oris siccitate, & Siti vix extingibili. Si cuncta haec rimemur, & quae deinceps in febre ardente observantur, probant ea, dicam febrem ardentem esse veram inflammationem per totum corpus.

Quid sit febris ardens.

II. Quid sit *Rigor*, & ex qua causa generetur, exposuimus (*Apb.* 156.) Ex quibus deduci potest, si materia irritando febrem Ardentem inducens commutetur in aliam naturam, tunc fieri Rigorem. Si haec commutatio sit facta in materiem purulentam, saepe subsequitur critica evacuatio, quae liberatur seger a febre ardente: vel eadem purulentia deponitur ad aliquam partem, ubi format abscessum per metastasim. Rigor etiam generatur in Ardentibus: si commutatio fiat in Putrilaginem vel Sphaelum. Adeoque nisi simul perpendantur reliqua symptomata, non potest iudicium fieri, num Rigor in Ardentibus portendat malum vel bonum. Solvitur quidem febris ardens semper a Rigore superveniente, qui designat materiae mutationem, sed non semper bonam solutionem promittit. Si vero post Rigorem illum temperior fiat calor, lenior sitis, humiditas corporis, pulsus mollior, cum evacuatione critica, praecipis per sudorem, urinam, vel spiritum, raro autem per alvum, haec collecta signa demonstrabunt, materiem febris ardentis abiisse in materiem purulentam, quae simul evacuatur. Qualis tunc Rigor est optimum praesagium, & non solet redire: sed si haec non adint, verum saepius redeat Rigor, indicio est, materiem abiisse in putrilaginem. Si vero post Rigorem corpus nimis refrigeratur, vires cadunt, & exprimitur sudor frigidus, foetens, notat talis Rigor mutationem in mortificationem.

Quando rigor supervenit solvit.

L I B.

## L I B. IV. A P H. LIX.

169. *T*ertiana exquisita in septem ad summum circuibus judicatur.

Quæ dica-  
tur ter-  
tiana ex-  
quisita.

Septem  
ad sum-  
mum pe-  
riodis ju-  
dicatur.

*O*mnium primum sciendum est, qualem febrem Hippoc. hoc loco intelli-  
gat. Citat Tertianam exquisitam, unde satis constat, alias præterea in-  
veniri Tertianarum species. Hoc in genere constat per Tertianam intelligi febrem,  
quæ Paroxysmos seu Periodos facit alternis diebus. Sed inveniunt duas tales  
species, una refertur ad febres Remittentes (*Apb. 153.*) Altera ad febres In-  
termittentes. Quæ autem ad Remittentes referuntur, dicuntur *Tritanophyes*. Sed  
*Tritozos*, uti in *Toxto*, est Tertiana intermittens. Verum Auctor non videtur  
contentus solum nominare Tertianam, quum addit *Exquisitam*: quare non in-  
telligit omnem Tertianam intermittentem, sed eam, quæ exquisita talis est.  
Nobis præluet in hac re Galenus, cum dicat in Tertiana paroxysmum non  
debere ultra duodecim horas extendi, eam fieri debere in æstate, regione &  
temperamento calido & sicco; paroxysmum incipere cum Rigore, desinere cum  
sudore, vel dejectione materiae biliosæ. Addere possumus, si non pervertatur  
naturalis ordo venæ sectione, purgante, calefacientibus aut nimis refrigeranti-  
bus, vel alio errore in dicta. Talis tunc febris vocatur Tertiana exquisita.

II. De tali nunc Tertiana exquisita præcipit, eam ad summum septem paro-  
xysmis judicari, id est desinit quarto, quinto, sexto, vel ad summum septimo paro-  
xysmo: quæ observatio practica quoque hodie vera invenitur, modo sibi relinquatur  
febris Tertiana. Quare in febre Intermittente non habetur criticorum dierum æ-  
numeratio, uti in febribus Continuis, per dies successivos, sed per numerum paro-  
xysmorum, ut unusquisque paroxysmus habeatur præ die in febre Continua. Hoc  
quoque tentarunt perscrutari in febre quarana, in qua detexerunt, si singuli paro-  
xysmi durent sex horas, totum tempus febris non ultra terminum febris acutæ exten-  
di. Sed quoniam febris intermittens & continuæ materia non est eadem, non erit  
quoque necesse, ut utraque materia eodem temporis spatio subigatur: si autem  
observetur tale fieri, id non ex convenientia communium febrium dependet: sed  
quia ex lege specifica cuiusque febris hoc ita evenit; nam potuisset quoque  
temporis magna esse differentia, quum harum febrium non sit eadem causa.

## L I B. IV. A P H. LX.

170. *Q*uibus in febribus aures obsurduerint, his sanguis e naribus effluens, aut  
alvus exturbata morbum solvit.

Surditatis  
causa in  
febris.

*D*uo hic simul ponuntur morbi, quorum alter alteri supervenit, Febris nem-  
pe, & Surditas. Hoc loco intelligenda est Febris Continua, vel Remittens,  
quia Intermittentibus hæc observatio non quadrat, atque ab Hippoc. passim non  
accipiuntur Intermittentes generali nomine febris. Continuæ & Remittentes nomen  
distinctum non habent apud Auctorem nostrum, nisi quod Remittentes, ut retro  
observavimus, interdum dicantur febres non intermittentes. Surditas in hoc loco  
non designat, ægrum non audire posse sonum quemcumque graviolem, sed non  
audire vocem vel sonum alloquentium, id est, ut obscurius audiat, quam antea  
solebat. Talis Surditas tunc debet generari, quando æger febricitabat, quod ar-  
guit, eam non oriri ex vitio prægresso in organo auditorio; nam inde nata sur-  
ditas nullum huius rei præslagium præbet. Sed nasci debet ex febre ipsa, vel causa  
eadem, quæ febrem antea produxit, aures enim obsurdescunt in febribus, id est, post-  
quam

quam aliquamdiu adfuit febris, oborta fuit Surditas. Dux in febris præcipue sunt causæ Surditatem inferentes, impetus nempe sanguinis major ad caput, & materia biliofa ad caput magis quam alias partes tendens. Sanguis igitur vel materia biliofa ad caput delata implendo arterias prope nervum auditorium in Encephalo, vel quæ organo auditus infunt ita opprimunt nervum auditorium, vel implent auditus organum, ut fiat impeditus aeris sonori transitus, vel nervi auditorii stupor. Ergo surditas in febris nascitur ex accumulato sanguine vel materia biliofa circa auditus organum.

II. Si in febris sanguis feratur majori impetu ad caput, quod cognoscimus ex oculis rubentibus, trubicibus, facie tumente, pallationibus in capitis arteriis, cum surditate vel aurium sonitu, timor est, ne motu illo majore æquabilis cerebri motus turbetur, & æger deliret: compefcitur autem nimius ille motus, si evacuetur ex naribus sanguis, tunc enim minus distenta vasa, minus quoque urgent. Quamobrem per hæmorrhagiam supervenientem ex impetu majore non solum cessant dicta phænomena, inter quæ est Surditas, ex majore motu ad encephalum nata, verum etiam præveniuntur instantia mala, Delirium, Phrenitis, & Convulsio. Imo tantum valet in ea causa hæmorrhagia narium, ut ipsam febrem compefcit. Ex quibus colligere possumus in praxi talem hæmorrhagiam, nisi modum excedat, non esse supprimendam, ut multi ex incertitia hujus observationis fecerunt. Atque inde patet, sanguinis missionem in tali surditate præcipuum esse auxilium, quum arte id præstemus, quod natura demonstrat adferre levamen. Et quoniam incerti sumus, num certo fiet hæmorrhagia, qua non apparente, imminerent recensita mala, prudentis Medici est non expectare hanc hæmorrhagiam, sed surditate cum aliis signis majoris impetus ad caput apparentibus, protinus secare venam, & si prima vice inde non compefcatur motus ille major, eandem sanguinis evacuationem repetere.

III. Sed si materia biliofa ad caput delata cum febre inducit surditatem, non ita levat hæmorrhagia, & minus conducit sanguinis missio, sed si alvus exturbatur, præcipue si egerit feces biliofas, non solum discutitur Surditas, sed & ipsa febris solvitur: nam materia biliofa per alvum exturbata non amplius cerebrum petere potest, atque derivatio facta ad alvum temperat impetum ad caput tendentem. Ita egregia formatur curativa indicatio in febris biliosis, si surditas oboritur, nam quoniam levamen fit & solutio febris per egestionem biliofam, manu veluti ducimur ad alvum ducentia, quæ materiem biliofam exturbant, & simul minuunt impetum; qualia sunt Cholagoga refrigerantia.

Hæmorrhæcia quando solvit febrem.

Alvus exturbata quando solvit febrem.

L I B. IV. A P H. LXI.

171. **F**ebrienti, nisi diebus imparibus febris dimiserit, reverti solet.

I. **Q**uid fit intelligendum per Recidivam, superius (Apb. 37., II.) exposuimus, eamque sæpissime fieri in omni specie febris, constans est observatio. Sed tunc febris Recidivam facit, si febris materia viribus vitæ vel virtute medicamenti non fuit extincta, & dein expulsa, verum aliquo modo mitigata, ut aliquo temporis spatio non valeat ita rursare corporis actiones, ex quibus mutatis cognoscimus materiem febrilem latitare, dein malignitate increfcens, ut prius actiones vitæ irritans, iterum phænomena febris exhibeat. Ipsam enim causam febris nemo videre potest, sed si illa applicetur ad organa viralia, tunc nascuntur in corpore phænomena, quæ declarant, febrilem materiam esse in corpore: quare febris causa esse potest in corpore sine ullo indicio, uti aliæ etiam causæ morbofæ, quemadmodum Variolarum, Luis venereæ, Hydrophobiæ, antequam inducant actiones vitæ perturbatas. Ut igitur conjiciamus sine phænomenis, num febris materia in corpore lateat, consulenda sunt observata practica, quæ comprobant, ma-

H h

terietur

teriem febrilem adesse, etiam si nulla phaenomena inveniantur. Hæc observata multis modis eruantur, ut si post febrem sanatam remaneat inappetentia; si fugata febre remaneat valetudo adversa; si excrementa, & actiones multum recedant ab ordine consueto; si abiit febris sine signis coctionis; si febris non definit die critico, quum ad legitimam curationem non solum natura expellat materiem quantitate, & qualitate respondentem, sed & servare soleat certum aliquod tempus, ut monuimus in Diebus Criticis (*Apb. 49.*). An vero illi Dies Critici sint dies impares, quam maxime disputant, ita ut Galenus non dubitaverit asserere, se non credere hunc Aphorismum ab Hippocrate esse traditum. At vero Auctor noster dicit *reverti solet*: ergo non contendit semper, sed aliquando reverti febrem, si dimittit die pari. Non ignoro, decimum quartum, vigesimum, & quadragesimum diem pares esse dies; verum decimus quartus ex duobus septenariis, vigesimus ex tribus componitur, & ita quadragesimus ex sex septenariis, ut 20. habeatur pro 21., & 40. pro 42. Tali modo si accipiantur dies impares, sententia in hoc Aphorismo prolata non recedit a generali doctrina Dierum Criticorum (*Apb. 49.*)

## LIB. IV. A P H. LXII.

172. **Q**uibus in febre morbus regius supervenit ante septimum diem, malum est. (*Nisi confluxus humorum per alvum fiat.*)

Icteri de-  
gnatio.

**I.** IN prædictionibus formandis non majores invenio difficultates pluresque tri-  
cas, quam si in morbo, ut in febre, qui ex variis nascitur causis, & ex phaenomenis accepit nomen, aliud veniat symptoma, quod itidem ex phaenomeno nomen accepit, uti est Icterus: potest enim Icterus in variis febrium speciebus venire, & ita pro natura febris bonum, & malum signum esse: atque Icterus ex causa varia potest in quadam febris specie etiam bonum, & malum indicium præbere. Ut igitur ex Ictero febris superveniente certum prognosticum habeatur, determinanda est febris, & Icteri species. Hoc quoniam non satis exacte a Præcicis fuit factum, non mirum est, quod tot dissidia, & variae sententiae de hoc Aphorismo a Commentatoribus sint prolatae, ut quidam non dubitarint nostrum Auctorem falsitatis arguere, quum invenerunt Icterum ante septimum diem supervenisse cum bono exitu. Ut igitur aliquid certi in hac prognosi statuamus, definienda est ea species Icteri, quæ in hoc Aphorismo est intelligenda. Omnis morbus, qui cutim totam suffundit intensa flavedine, nam si ad virorem, vel nigredinem vergit, vocatur Icterus niger, ita ut oculi quoque album manifestam illam flavedinem exhibeat & reddatur urina intense flavescens, quæ immensum lineum ita inficit colore flavo, ut facile elui non possit, vocatur Icterus, morbus Regius, morbus Arquatus, Aurigo. Et ut hunc morbum distinguat a consimili colore Cachecticorum, adjicit, eum colorem flavum oriri a bile flava diffusa per totum corpus. Ad detectionem ergo hujus morbi sola requiritur accurata coloris mutati observatio, sed non profert causam, nisi solam materialem, hunc colorem inferentem: propterea ex varia causa oriens Icterus potest bonam, & malam præbere prognosin in febribus.

Quæ spe-  
cies Icteri  
ante septi-  
mum diem  
in febribus  
veniens  
malum.

**II.** Paucae sunt Icteri species, quæ quocumque tempore veniant, bonum præsa-  
gium præbent, dum tamen in hoc Aphorismo implicite patet, Icterum septimo  
die venientem, bonum præsagium præbere; nam qui Icterus ex Hepatis obstructio-  
ne, inflammatione, infectione ductus Choleodochi, vel vesicæ felleæ oritur, aut qui  
venit ex putredine, omni tempore etiam septimo die febris veniens malum exhibet  
præsagium. Igitur in hoc loco intelligenda est ea Icteri species, quæ ex febris per-  
turbatione critica nascitur, quum ea tanquam signum criticum septimo die bo-  
nam prognosin præbere possit. Si autem ante septimum diem veniat Morbus Re-  
gius

gius, malum est, nisi coxfluxus humorum per alvum fiat, uti in quibusdam exemplaribus habetur. Scilicet si febris biliosa ante istud tempus commotionem faciat, qua bilis suffunditur per totum corpus, talis præmatura commotio bilis corruptæ abundantiam designat, quæ bilis si simul non deponatur per alvum, sed in corpore retenta, sensim fit acrior, & sua saponacea acrimonia omnes humores in tenuem putrilaginem convertit, quod admodum malum est. Ex dictis his clarissimè exponi potest Auctoris sententia in Libro de victu acutorum. H. b. 313. *In febre biliosa ante septimum diem cum rigore morbus regius accedens solvit febrim. Verum sine rigore si accedat, extra temporis occasiones, perniciosus est.* Quoniam rigores accedentes indicant perturbationem aliquam criticam, post quam si sequatur materiz depositio per alvum, æger liberatur a bile corrupta: nam si talis rigor præcefferat sine subsequente evacuatione bilis, malum etiam esset indicium. Quod etiam nobis reliquit Auctor noster in Epidemici H. a. 663. agens de febrium ardentium affectionibus. *Quibusdam, inquit, morbus Regius accidit sexta die. Verum his purgatio per vesicam, aut alvus exturbata profuit, aut larga sanguinis eruptio.* Et paulo infra, *Senioribus vero ad Morbum Regium res devenit, aut alvi ipsis turbata sunt, aut dysenterici facti sunt.* Ex quibus colligi potest, si Icterus ante septimum diem ex perturbatione febrili fiat sine subsequente bilis evacuatione, malum præfagium exhibere. Atque constat, hic eam speciem Icteri intelligi, quæ fit ex febris commotione, non vero omnem speciem.

L I B. IV. A P H. LXIII.

173. **Q**uibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur.

I. **Q**uid sint Rigores, & quibus causis generentur, supra (Apb. 156.) exposuimus, eorumque causas multas esse, eodem etiam loco demonstravimus. Plura de Rigoribus in febribus memoriæ tradidit Auctor in Libro Coacorum Prænotionum circa principium. Verum omnes hi Rigores non fiunt quotidie, seu certo die non repetunt. De his igitur solis argumentatur in febribus, & de iis observavit tunc quoque febres quotidie solvi, id est non plane finitur febris, nam si Rigores finirent febrim, non possent esse Rigores quotidiani. Invenimus tria genera febrium, Continuas, Continentes, & Intermittentes. In febribus Continuis Rigor semel fit initio, & quando transit in alium morbum. In continentibus seu remittentibus febribus fiunt Rigores inordinati. Quamobrem Rigores quotidiani duntaxat fiunt in febribus Intermittentibus, si novus exoritur paroxysmus. Interdum vero accidit, ut febris Intermittens typum febris continuæ, vel remittentis induat, ut observavi in quadam constitutione autumnali, ita ut in principio constitutionis existimarem febrim esse continuam, pergente vero constitutione, omnes illæ febres in legitimas febres intermittentes commutabantur. Dum illæ febres continuæ sensim incipiebant commutari in febres intermittentes, quotidie febres quoque illæ facere incipiebant Apyrexiam. Ex observatione hac luculentissime patet, etiam Hippocratis tempore huiusmodi febres regnasse, & sedulum nostrum Observatorem inculcare voluisse hoc Aphorismo, si febris quoad conspectum continua regulares quotidie faciat Rigores, eam non esse febrim Continuam, sed intermittentem larvatam.

L I B. IV. A P H. LXIV.

174. **Q**uibus in febre, septima, aut nona, aut undecima, aut decima quarta, morbus regius supervenis, bonum est: nisi dextrum hypochondrium durum sit: alioquin non bonum.

I. **P**ræcedentem *Aph.* 172. huic conjunxit Hipp. in Coacis præz. H. a. 531. *Morb. regius*, inquit, ante septimum diem accedens, malum. Septimo vero, ac 9. & 11. & 14. judicatorius est, si non præcordia indures. Sin minus, ambigua res est. Ex quibus patet, præcedentem Aphorismum in hoc libro interpositum fuisse, atque hunc Aphorismum esse partem prioris. Sententia Auctoris est in hoc Aph. demonstrare, Icterus die critico venientem salutare esse, sed tamen non ita absolute, quin alia possint simul adesse signa, quæ ambiguum prognosin præbent, nam si bona, & mala signa simul apparent, ambiguus est exitus.

Icterus die  
critico in  
febre, bo-  
num.

II. **S**upra (*Aph.* 172., II.) demonstravimus implicite indicari, Icterus septimo die venientem bonum præfagium præbere, quoniam eo die optimæ fiunt perturbationes criticæ; nunc vero plures dies criticos, nempe nonum, undecimum, & quartum decimum citat, ut demonstret, non solum septimo, sed & aliis diebus criticis (*Conf. Aph.* 49.) Icterus criticum esse posse. Verum non ultra decimum quartum ascendit, quod tamen fecit in annumeratione dierum pro sudore critico (*Aph.* 146.) quoniam post decimum quartum diem raro per Icterus fit crisis. Si igitur Color icteriticus, qui alias semper malum est signum, in febre oriatur diebus istis, cum reliquis signis criticis, inter signa critica recenseri potest. Si vero color icteriticus appareat in quovis alio morbo, semper est signum malum. Quare quedam mala signa, modo denotent perturbationem criticam in febribus bonum indicium exhibere possunt.

Icterus ex  
febre cum  
hypochon-  
driis duris  
non bo-  
num.

III. **H**ypochondriorum durities ut causa, & ut signum prognosin ambiguum facit: nam non sufficit, ut Icterus septimo, vel alio die critico in febre veniat, ipsa bilis per totam massam diffusa evacuari debebat, & relinquere debent viscera sana. Si vero Tumor durus hypochondria tenet, signum est, materiem biliosam circa hepar colligi, istudque viscus infarcire, unde, quamvis æger liberaretur a febre præcedente, laborare deinceps potest hepatis infarctione, & ita ad perfectam furorem non venit, nisi simul referatur hepar obstructum. Aut in febribus potest etiam istis diebus criticis oriri hepatis obstructio, quæ Icterus generat, ut superveniens Icterus non sit signum criticum, sed signum obstructionis, vel inflammationis hepatis. Quare patet, Hypochondriorum duritiem ambiguum prognosin facere.

#### L I B. IV. A P H. LXV.

175. **I**N febribus circa ventrem æstus vehementis, & oris ventriculi dolor malum.

I. **P**ergit Auctor annumerare symptomata in febribus, ut ex istis medicus possit judicium ferre, quid sit præfagiendum. Quæ ergo symptomata hic citantur, non præfagiunt idem, si observantur in corpore non febricitante. Propterea ut ex dictis eliciatur causa hæc symptomata inferens, talis erit assignanda causa, quæ febrem, æstum vehementem, & Cardiorum simul producere potest: & dein ex ea inventa formanda est prædictio; seu per prædicam observationem constare debet, qualesnam effectus boni vel mali ex tali causa soleant provenire.

Ventris  
ardor in  
febribus  
unde ori-  
tur.

II. **P**otest generari febris ex causa, quæ ventris ardorem induxit, vicissim eadem causa, quæ prius concitavit febrem, deinceps potest ventris vehementem æstum inducere. Hoc autem est intelligendum hoc loco, nam si illud intelligeretur, dixisset Auctor, in ardoribus vehementibus si oriatur febris, & ita esset febris symptoma ardoris vehementis, dum tamen hic prius ponatur febris ut morbus. Ex simplici hac observatione patet, num accedenda sit Inflammatio, aut Erysipelas, aut Bilis corrupta acris calida tanquam ardoris causa, quoniam in his Ardor inferabile est symptoma, quod fere omnes statuunt Commentatores. Non inficior, istis in morbis particularibus, si ventriculum vel alia viscera ventris ob-  
dent,

dent, ardorem generari atque febrem; sed tunc febris posterior venit, & medici febrem ut symptoma istius morbi particularis habent. Ut si quis pleuritide corripitur, & reticemus istud nomen, volentes verbis phenomena exprimere, non dicimus, in febribus si veniat lateris vel pectoris dolor, nam tunc esset pleuritis symptomatrica febrilis: sed dicimus, in Lateris dolore si habetur vehemens febris. Ergo constat, ventris ardorem non esse veram inflammationem aut Erysipelas, sed febris symptoma. Quoniam febris inseparabile est symptoma altus, quamdiu corporis vires valent, & æstus magnitudo vehementiam etiam febris declarat, pro certo accipi potest, causam febrilem sensim copiosius colligi circa ventris viscera, ut istis in partibus maiorem febrilem faciat agitationem, quam per totum reliquum corpus.

III. Quam maxime laborant Interpretes, num Cordis vel superioris ventriculi morbus hoc loco sit intelligendus. Maxima pars contendit, ventriculi orificium hic esse intelligendum, quoniam Hipp. dicit malum: nam, inquit, si Cor intelligeretur, dixisset Auctor pessimum. Ego vero puto, si Cor magis a febre afficeretur, quam orificium superius ventriculi, non sentiri Dolorem aut morbum, sed Anxietatem, quoniam Cordis affectiones nunquam dolorem, sed semper Anxietatem inferant, dum ventriculi superius orificium affectum fere semper Dolorem moveat. Materia ergo febrilis copiosius circa orificium superius ventriculi collecta non solum infert Ardorem, verum etiam Dolorem, quod frequens est febribus, si quandam partem nervosam præ ceteris aggrediatur: nam etiam capitis Ardores ex febre solent conjunctos habere Dolores: adeo ut quoties materia febrilis occupet aliquam partem, ea pars simul doleat & caleat, sed raro vel Dolor vel Calor solus habeatur ut febris symptoma in quadam parte nervosa.

IV. Constat ex iis que adduximus, Æstum vehementem circa ventrem & Cardioegmum indicare, materiem febrilem has partes magis, quam reliquum corpus agitare: atque per sedulam observationem prædicam nostrum Auctorem didicisse malum sæpe habuisse exitum, sed qualem faciat exitum, non docet. Verum ferior ætas hoc detexit, nam febris hanc partem afficiens omnem destruxit appetentiam, sensim quoque induxit anxietatem, inquietudinem, & vigilas pertinaces, atque agitatione hac non solum perturbatur materiæ febrilis concoctio, sed & maxime inhibetur ejus critica evacuatio, quum irritatio interna inibeat directionem ad cutim: imo hac agitatione non parum turbatur bilis in hepate confectio, unde multa mala, quæ non orirentur ex eadem febre, si hanc partem præ ceteris non afficeret. Sed quoniam illa agitatio non semper istas partes corrumpit, atque febre quiescente non raro manent sanæ, dixit malum: nam si semper sequeretur corruptio, dixisset Lethale.

In febribus Cardioegmos.

Circa ventrem æstus vehemens & Cardioegmus in febribus malum.

L I B. IV. A P H. LXVI.

176. **I**n febribus acutis, convulsiones, & circa viscera dolores vehementes, malum.

I. **Q**uam dicantur febres Acutæ, superius (App. 108. IV.) exposuimus: in his præcipit duo conjuncta symptomata venientia, Convulsiones scilicet, & circa viscera dolores vehementes, malum esse; ergo non statuit, disclam Convulsionem & dolorem vehementem circa viscera ventris tanquam morbos malum præfagire, sed si veniant ex febre. Concipiendum itaque est, vel febrem circa hanc partem præcipuum agere tragœdiam, vel ad eas partes facere metastasin. Rationem dedimus, febrem convulsioni supervenire melius esse, quam convulsionem febri (App. 51.). Solas autem Convulsiones in principio acutorum venientes præprimis in pueris observavi non periculosas esse, sed in adultioribus plus periculi adferre (Conf. H. a 470.). Imo noster Auctor H. a. 534. bonum præfagium ex Convulsione protulit; nam *Convulsio*, inquit, in febre oborians & eadem die des-

*finiens, bona est. Convulsio in febre oborietur, sedat febrem eadem die, aut postea, aut tertio. Si vero tempus, in quo incepit, transgreditur, & non desinat, malum.* Ex quibus facile colligere possumus, ex sola Convulsione superveniente incertum fieri prognosin, quoniam ipsa Convulsio est phaenomenon diversarum causarum, quarum quaedam admodum male, aliae autem vix quidquam periculi portendunt. Ut igitur magis determinata habeatur causa, aliud addendum est symptoma, ut fecit Auctor, dicens, & circa viscera dolores vehementes, malum. Iste quoque Dolor etiam nasci debet ex febris commotione, nam supervenire debet. Propterea si Convulsio fieret ex perturbatione critica, potuisset bonum praesagium praeberere, uti patuit in allegatis locis, & quemadmodum leterus quoque die critico (Aph. 174. II.) bonum praesagium praeberere potest, etiamsi absolute veniens semper malum sit indicium. Verum Convulsio in febre veniens cum diris ventris doloribus, etiamsi veniat die critico, bonam crism promittere non potest, nam vexatio doloris faceret derivationem materiae ad interiora. Si vero dolor ille nascatur ex febre, qui dolor dein sua vehementia concitat Convulsionem, eo pejus est, quum huiusmodi accessus Convulsionis perturbationem summam ex consensu declarat, quae semper in pejus tendit: nunquam enim ex ventris vehementi dolore salutare observatae sunt Convulsionem.

## LIB. IV. A P H. LXVII

177. **I**N febribus, ex somnis pavores, aut convulsiones, malum.

Quid somnus facere debeat in febribus.

**I.** Obdormit homo in febribus vel ex naturali, vel ex morbosa causa: medicus & ager nescit, quamnam harum latent, quum videat fabricantem dormire. Verum si inveniat pulsum frequentiozem & duriozem, atque videat aegrum inquiete decumbere, nimisque calere toto corpore, conjicit medicus, cum aegrum ex morbosa causa obdormire. Sed omnia placide si inveniat, sentit somnum esse naturalem, in quo nulla exercetur actio animalis, tota compages carnosae laxior, respiratio aequabilior, pulsus languidior & mollior, unde spiritus minus consumuntur, & coctiones, quae solo motu vitali sunt absolvendae, fiunt perfectiores & aequabiliores, qui humores antea majore motu fuere compacti, nunc dimittuntur, ad expulsionem disponuntur, atque saepe etiam expelluntur cocti. Quare somnus naturalis in febribus, ut monuimus etiam in Acutis (Aph. 26. V.) est utilissimus.

In febribus ex somnis pavores malum.

**II.** Verum si somnus fiat seu potius sopor ex causa morbosa, ea recensita bona non possunt expectari, quoniam talis non inducitur corpori dispositio, qualis in naturali somno adesse debebat: imo indicatur talem latitare morbosam causam, quae opprimendo cerebrum soporem inferre potest. Dum vero ex naturali somno omnes actiones quiescebant praeter actionem vitalem: hoc non semper obtinet in somno morbofo quum morbosa causa, sive sit materia obsidens cerebrum, sive cerebrum consentiat ex quacumque alia parte affecta, non ita quietas relinquat reliquas actiones sensus & motus animalis, quin irritando illas saepe perturbet; quare somnus inquietus tam malus censetur in morbis. Haec causa morbosa inordinatum motum dormienti inducens, quo agitur ex improvviso cerebrum, hominem eodem modo evigilare facit, ac si aliquis dormiens inopinate vellicaretur, unde evigilans pavet, nesciens quid sit factum. Huiusmodi ergo Pavores seu terrores quoniam latitantem indicant malam causam, atque simul arguunt, coctiones fieri non posse, uti in somno naturali, revera sunt timendi. Si vero tales Pavores saepe fiant, ut dicit Auctor, in somnis, non in somno, certum est, illam causam morbosam constantem esse quoniam toties post somnos repetit Pavores, & inde eo malus malum portendit.

111.



III. Quemadmodum statim demonstravimus, ab irritato cerebro per causam morbosam generari Pavores malum præfagientes, idem quoque sentiendum de Convulsionibus. Nam nullus musculus motus animalis movetur in sanis absque voluntate nostra; si vero contra voluntatem moveatur, vocatur Convulsio, quæ arguit semper adesse morbosam causam irritantem. Hoc autem observamus in Æconomia animali, quasdam causas turbando motum encephali inducere mentis alienationem, alias autem motum animale perturbatum, ut interdum convellantur corpora cum mente constante, & quidem delirent corpore quiescente. Propterea Auctor recte posuit Pavores, aut Convulsiones, & non conjunxit hæc duo symptomata, ut fecit in præcedentibus Aphorismis, quia non necesse erat ad eruendam causam latentem, ut utraque symptomata conjuncta habeantur in febribus, quemadmodum in præcedentibus fieri debuit, quum unum ex his sufficeret ad formandam prognosin malam.

In febribus ex somnis Convulsiones, malum.

L I B. IV. A P H. LXVIII.

178. **I**N febribus spiritus offensus, malum, Convulsionem enim significat.

I. **H**omines, & fere omnia animalia vix per momentum sine respiratione vivere posse, omnia suffragantur experimenta: an vero ad continuandam circulationem per pulmones, an ad refrigerandum sanguinem, an vero ut animal fruatur aeris præsentia, sit data, non consentiunt auctores, neque est hujus loci agitare. Sufficiet indicare hominem natum, nisi alterne attrahat & emittat aerem purum, non diu manere superstitem, si enim maneat in eodem aere diu non renovato, vel in aere infesto, etiamsi alterne eum aerem attrahat & emittat, moritur tamen, quare non sufficit ad continuandam vitam in homine nato, ut alterne dilaret & coarctet pulmones, puro etiam eger aere: neque manet superstes in aere aperto puro, si ejus trachea clausa aeris ingressum intercipiat: aut quando pulmones constricti vel impleti alternam receptionem aeris denegant. Sed ut maneat vita, requiritur alterna pectoris ampliatio, pulmones obsequiosi, ingressus & egressus aeris puri. Tolle unam ex his, breve peribit homo & omne animal perfectum. Hæc ergo actio vitæ tam necessaria sedulo est perscrutanda in morbis ad cognitionem & prædictionem, quæ tamen hodie a multis turpiter negligitur, in solo pulsu quærentes indicia, vel ut alii, qui in sola uromantia conquelescunt. Noster autem Auctor tam sedulus fuit in rimanda Respiratione, ut nullus post eum; omnes enim minimas in ea mutationes notavit & posteritati reliquit, uti Galenus fecit in Pulsibus. Sed quoniam sparsim differit de Respiratione, in morbis, normam Auctoris sequemur, exponendo, quid sit sentiendum de quavis mutatione in Respiratione, donec tandem ex specialibus his possimus generalem formare doctrinam. In genere præmittendum est ex physiologicis, inveniri Respirationem animale seu voluntariam, quam exercemus in stando, cantando, loquendo, & suchione, musculis voluntati obtemperantibus, eamque actionem esse satis validam, atque vitalem seu involuntariam, æquabilem, sed & minus valentem, quæ etiam in dormientibus & de respiratione nihil cogitantibus exercetur, quam multis modis possumus per animale respirationem augere, minuire, & mutare: denique in pulmonibus etiam vacuis interdum tantum invenitur impedimentum, ut etiamsi per animale respirationem conemur haurire aerem, non valeamus, quod sæpissime experiuntur Asthmatici, aut si aer pulmones ingrediens fumo sulphuris, vel alio toxico fuerit infectus, quo videntur pulmonis fibræ ita constringi, ut ne quidem per animale respirationem relaxari, & extendi possint.

Respirationis observatio in morbis.

II. Quod hodie vocatur Respiratio interrupta, olim ab Hippocrate dicebatur spiritus offensus, τὸ πικρὸν πνεῦμα. Dum scilicet, neque inspiratio neque ex-

In febribus Respirationis offensus.

spiratio unica actione absolvitur, sed in media veluti inspiratione vel expiratione subsistit, ut debeat æger renovare actionem ad integram inspirationem vel expirationem absolvendam. Hoc symptoma non patitur æger ex mutata aeris indole, neque in actione respiratoria animali, sed in actione respiratoria vitali, vel quoniam inter respirandum intercludatur toties larynx, ut non ita concedatur liber introitus & exitus aeris, per causam quæ subito adesse & abesse possit. Si vero esset constans causa, ut virium defectus, vel tumor tracheæ aut faucium, vel impletio pulmonis, non haberetur interrupta respiratio, sed intercepta & difficilis. Num ergo actionis vitæ defectus, quæ non permittit unico actu absolvi inspirationem & expirationem, sit huius phenomeni causa, num vero spasmodica Laryngis vel fibrarum pulmonis contractio, discernendum est. Debiliior autem actio faceret tardior, debiliorem, & molestiorem respirationem, uti observamus in summa infirmitate. Quare videtur affectio singultui simillima, quæ inter respirandum contrahuntur tracheæ & pulmonum fibræ, sed quæ contractio subito etiam dimittit, uti in singultu. Pars affecta propterea nequit esse organum animalis aut vitalis respirationis, sed organum id speciale in pulmonibus, quo particularis motus pulmonis & tracheæ absolvitur, quod organum movens convulsionem corripitur. In febribus nunc talis interrupta respiratio, est malum, quoniam sine febre in plorantibus est frequens & non diu durans: verum in febribus notat, motum particularem pulmonum in consensum trahi, quod magnitudinem morbi declarat, & nullum auxilium inferre potest.

In febribus respiratio interrupta Convulsionem significat. III. Non est contentus hoc in Aph. Auctor, uti sæpe facit, pronunciare malum esse, sed ex observatione practica, quia didicit sæpe deinceps natam fuisse Convulsionem, adiecit Convulsionem significare. Hoc autem significat, duplici sensu accipitur, ut præsens tanquam phenomeni causa, vel futurum. Utrumque admitti potest: nam demonstravimus, hanc respirationem interruptam a spasmodica fibrarum contractione oriri, quod forsitan etiam scivit auctor noster. Atque in quibusdam fibris si inceperit Convulsio, non est infrequens, tandem quoque Convulsionem fieri in fibris aliorum organorum. Hoc boni comparamus ex ea observatione, quod si videamus ægrum fere laborantem corripitur interrupta respiratione, nos non solum medicamenta febrifuga præscribere debere, verum etiam antispasmodica, de quibus alias non fuisset cogitatum.

#### L I B. IV. A P H. LXIX.

179. **Q**uibus non sine febre urinae sunt crassæ, grumosæ, & pauca, si ab his cænes & copiosæ mejantur, profunt. Maxima vero tales redduntur, in quibus statim ab initio, vel non ita multo post, sedimentum apparuerit.

Febris  
Cacoehymica.

**H**ucusque annumeravit symptomata in febribus, & inde formavit prædictiones; sed in hoc Aph. aliquo modo mutat sermonem; nam non format prognosin ex urina in febribus, cum dicat in morbis non sine febre: quare non vult hoc loco intelligere febrem essentialem, sed affectionem aliquam, quæ sæpe aliquam levem febrem conjunctam habet, quæ ergo affectio sæpe levem adjunctam habet, quæ interdum quodam tempore incipit inchoare febrem, quæ etiam interdum reddit urinam crassam, paucam, & grumosam. Nam dicit, quibus statim ab initio vel non multo post sedimentum apparuerit. Quibus verbis indicat, talem urinam crassam huic speciei febris communem esse, & eam febrem diu posse durare, si post talem urinam in hac specie febris sequatur tenuis & copiosa, prodest. Cuncta hæc si perpendimus, ne ovum ovo similis invenimus, quam hæc est descriptio febris Cacoehymicæ. Illam nempe febrem intelligo, quæ gene-

generatur ex materia cruda deficiente actione corporis nata , sensum in corruptionem tendente , ex qua dein corruptela nata formatur febris quedam lenta, quæ hodie vocatur Cacochymica.

II. Dum deficiente corporis actione , neque assumta alimenta satis subiguntur , sed retinent utcumque indolem propriam , quam , dum assumebantur , habebant ; neque humores actione corporis inutiles facti satis subiguntur , ut naturalem colorem , odorem , & consistentiam excernendis humoribus præbeant , id quod emititur , utpote minus subsæctum seu coctum , ut Veteres loquuntur , crudum est & crassius , & constat duplici materia cruda , nempe ex ingestis alimentis & inutilibus humoribus . Ingesta alimenta sua natura leviora vix concreciscibilia si antea fuere mista saponaceis humoribus primarum viarum , si cum urina reliqua emittuntur , crassam & utcumque turbidam faciunt urinam , dum partes alimentosæ deficiente actione non satis fuere attenuatæ , ut pellucidæ fiant . Sed humores utiles magis concreciscibiles in excrementitios conversi , eodem deficiente motu non satis exiunt suam concrecibilem indolem , qua faciunt , ut partes turbulentiam vel sedimentum in urina facientes , colligantur in grumos . Quamdiu talis manet in corpore dispositio , agri nulla febre vexantur , & reddunt talem urinam copiosiorē . Verum si morbus ille diutius durat , id quod fit crudum & mite , per insitum in ipsis humoribus naturalem mutationem convertitur in corruptelam : quod enim humores in corpore vivente spontaneam non subeant corruptelam , quam subeunt extra corpus vivens in loco calido , id actioni viventis corporis est ascribendum , quæ si languidior , contenti humores isti crudi in aliquam corruptelam fecerunt . Hæc corruptela corpori noxia concitat febrē , qua promoveatur perspiratio & sudor , quibus , quod tenue est , extruditur , ita minuens urinae quantitatem , sed relinquens crassamentum . Unde tunc in febre Cacochymica generatur Urinae crassæ , grumosæ , paucae .

III. Corruptum hoc in corpore vivente accendens febrē , facit , ut actio vitæ validior fiat ad id , quod damnum & irritamentum infert , subigendum & expellendum . Corporis etiam calor accenditur , pulsus fit plenior & citatior , respiratio frequentior & plenior , quibus patet , vires vitæ magis agitatae esse . Hæc actio major sola est in corpore causa , quæ alienum morbosum invertere , & subigere potest , atque expulsiōni adaptare . Unde febris sibi ipsi non raro medicina est . Hoc quoniam observaverunt prædici , vituperarunt Corticem Peruvianum febrē extinguentem , sed laudarunt amara calefacientia febrifuga , quibus multo certius tollere potuere febrē . Quod ab omnibus est amplectendum , si æger ex tali febre cacochymica decumbat , quum saponacitate & calefaciente virtute solutio hujus materiæ crude promoveatur . Quum corpus tale febre exagitur , quæ cruda magis exagitat & destruit , partemque attenuatam ad emunctoria trudit , urina non amplius continere potest materiem crassam & minus pellucidam , sed ejus loco redditur urina tenuior , & quoniam aucto motu vitæ major copia humorum ducitur ad renes , generatur simul urina copiosa . Ex quibus signis apparentibus patet , materiem crudam subigi & expelli . Si enim talis a febre non reddatur urina , indicio est , hunc motum majorem non valere subigere & expellere materiem crudam , quod pejus est .

IV. Majus arcanum nobis revelat Auctor dicendo , tales maxime reddi , quibus ab initio vel non multo post sedimentum inest . Nam si materia illa cruda liquefcat in putrilaginē , saponacitate & intima solutione putredinis in humore , tanta fit exacta permixtio inter partes crudas & reliquam urinae massam , ut urina nullum deponat sedimentum , quod in morbis putridis sæpe observavi . Putrescens autem , quantum per praxin detegere potui , vix aut non vix emendari potest actione vitæ aucta ; sed si crudum aliquam accepit acrimoniam , qua

Urina crassa , grumosa pauca quid notat in febre cacochymica .

Urinae copiosa & tenues in febre cacochymica bonæ .

Cur præcipue si tales redduntur , quibus ab initio vel non multo post sedimentum inest

se breem concitat, id acre frequentissime motu febrili majore subitur. Quando igitur ex sedimento in urina tali cruda constat, commutationem non fuisse factam in putrilaginem, certiores habemus prognosin curationis instantis, si urina crassa, grumosa, pauca per motum febrilem majorem commutatur in copiosorem & tenuiorem: fecus vero, si adfuerit putredo, quæ generationem sedimenti impediebat.

# LIB. IV. A P H. LXX.

18c. **Q**uibus autem in febre urina conturbata, qualis jumentorum, his capitis dolores aut adfunt, aut aderunt.

Urina conturbata qualis jumentorum quæ dicitur.

**I.** IN hominibus sanis calens & frigesca urina est pellucida habens levamentum aliquod circa fundum, quod non perfecte pellucidum est: ea autem urina dicitur turbida, quæ habet particulas non pellucas per totam urinæ massam dispersas. Verum talis fit urina (1) si reddatur pellucida quam diu calet, sed si aliquamdiu in frigore quievit, amittit suam pelluciditatem, & tali circiter modo fit, ac si aliquis habuisset urinam cum multo sedimento, quam conpassaverat. (2) Vel redditur ita turbata dum calet, sed si in frigore aliquamdiu quievit, deponit sedimentum, post cujus descensum superior pars redditur pellucida. (3) Denique redditur urina turbida & ita etiam persistit in frigore & quiete. Hæ tres species in morbis acutis non oriuntur ab eadem latente causa, & inde diversam prognosin præbent. Necessè igitur erat, ut Auctor adderet distinctionem, dicens qualis jumentorum, vel quales veterini generis, in quibus animalibus redduntur urinae ita turbidae & tales persistentes in frigore cum quiete.

Quomodo urina jumentosa generatur.

**II.** Quæ materia urinam turbat, non est materia sana in corpore nostro, recessum enim a sanitate indicat: ea vero emittitur cum sana urina, & huic tam tenaciter coheret, ut ne quidem in quiete & frigore reliquam massam sanam relinquat, vel ab ea secedat. Id quod emittitur, nihil mali facit corpori, sed exhibet signum maturæ materiæ morbosæ in corpore adhuc latentis, cujus portio nunc cum urina exiit. Quoniam autem turbida illa urina declarat, morbosam materiem intime & tenacissime unitam esse humoribus, non possumus aliquam spem suscipere, corporis vires se facile liberare posse a morbi materia. Itaque ex tali urina constat, morbum futurum pertinacem, & ea mala oritura, quæ a remanente materia in corpore sunt expectanda.

Urina jumentosa in febribus.

**III.** Neque talis unio finior in quovis morbo idem præsagium præbet, talis enim frequens observatur in morbis pectoris, ictero, cruditate humorum, in quibus diversa præsagia præbet: propterea adiecit Auctor in febribus, & quantum ex ipso Auctore coniecere potui, intellexit febrem continuam vehementem (H, 2, 873. & 874.). Quando nempe compactus lentor febrium continuarum, qui optime secedit in pus, per continuatam febrem convertitur in putrilaginem, quæ omnem separationem a reliqua massa bona renuit. Observavit enim noster Auctor dicto loco urinas subsidentes, densas, conturbatas, continuata febre mutatas fuisse in urinam rubicundam conturbatam, velut jumenti, post quam mente motus est phrenitico modo, & mortuus est in vehementibus convulsionibus. Ex quâ observatione hanc deduxit regulam: *Nam urina dense ac conturbata, certum signum sunt doloris capitis, & convulsionis, & mortis.*

Quibus urina jugalis in febre, his capitis dolores,

Quare hujusmodi urina est corruptionis acris calidæ signum in febribus. **IV.** Tandem ex iis, quæ hucusque disputavimus, adstrui facile potest, talem Urinam conturbatam non solum fieri in Capitis doloribus, vel & istos solos præsapire, verum etiam multa alia capitis mala. Nam quoniam transitus materiæ morbosæ factus fuit in humorem acrem corruptum, qui intus unitus est toti massæ,

sz, id corruptum ex communi ratione ad omnes corporis partes potest ferri, ut ibi suam tragediam agat. Quod autem præcipue petat caput, hoc ex observatione practica habemus, & nisi illa hoc adstrueret a priori, illa determinatio non potuisset definiri. Sed ex observatione hac id boni habemus in exercitatione practica, quod sciamus, quid sit in tali malo faciendum, dum expectamus mala capitis ex tali urina: ut scilicet demus alvum ducens, quod ad aliam viam magis ducit materiem caput petituram. Ex hac ratione sæpe dedi Purgans in hujusmodi ægris optimo cum successu.

vel ad-  
sunt vel  
aderunt.

L I B. IV. A P H. LXXI.

181. *Quibus morbi septima die judicantur, iis nubeculam rubram urina die quarta continet, & alia secundum rationem.*

I. A Ntequam aliquid certi formare possumus ex proposito phænomeno in urina, constare debet, quid sit in urina nubecula, & ex quibus causis & materia illa formetur. Materia visibilis a reliquo urinae liquore visu distingueda, tria diversa loca occupare potest. Vel hæret in urinae superficie, quando supernatans dicitur; vel hæret ad fundum, quando sedimenti nomine venit; vel denique medium inter has partes occupat magis minusque elevata, quæ materia in medio suspensa Nubeculam format, ex nubium similitudine & loco in aere, quæ etiam magis minusve elevatae feruntur per aera: quamvis differentia statuitur inter nubeculam & nebulam, ea in urina inspectione tam parvam exhibet differentiam, ut non mereatur distinctionem. Quoniam nubecula seu nebula se præbet visui in medio urinae, quamvis nebula ex partibus tenuioribus videtur congregata, ejus materia distincta esse debet a reliqua materia liquoris urinae. In hominis perfecte sani urina quadam semper nubecula invenitur, quæ videtur confecta ex portione alimentorum non satis subacta, atque ex materia detrita per vitæ actionem in humorem excrementitium: unde in heluonibus & quibus vitæ actio est debilior, tanta hujus copia in urina colligitur, ut vel totam urinae massam turbet, vel copiosum sedimentum turbidum faciat. In morbis autem cum majore motu circulatorio vix aliquid de dicta materia nubeculam formans inveniri potest, quum validiore actione vitæ ea materia ita subtilisetur, ut sui nullum indicium præbeat, quare tunc tota urina redditur pellucida sine nubecula & sine sedimento: quod autem in morbis acutis tandem formetur nubecula, id non arguit superius dictam materiem evacuari, sed omnino aliam, scilicet morbi materiem aliquo modo subactam, vel partem detritam per actionem vitæ validiorem. Quum in hujusmodi morbis talis semper formatur materia, signum est, quando urina in febribus acutis reddatur perfecte pellucida, eam materiem vel aliis humoribus intrinsecari, ut separari non possit; vel retineri in corpore: quare debito tempore in acutis nubecula conspecta bonum signum, nempe exitum materiei morbi, exhibet.

Nubecula  
in urina  
quid sit.

II. Nubecula quidem denotat exire morbi materiem; sed color nubeculae etiam naturam materiei exprimit. Nubeculae in urinis albae quidem & inferne commode sunt, rubicundæ vero & nigrae, ac livida difficile sunt. H. a. 580. Nubeculae ovæ feruntur in urinis, albae quidem bonæ sunt; nigrae vero malæ. H. a. 475. Non est hujus loci omnes nubecularum colores ex suis deducere causas, duntaxat notandum venit, ex qua causa formetur nubecula rubra. Dum in morbis acutis & febribus materia morbi paulo majore motu agitur, quam est motus vitalis in sanitate, præbet in urina materiem visibilem albicantem: sed in motu validissimo id quod prodit vel in nubecula vel in sedimento rubrum colorem habet, imo ipse liquor urinae ruber est, quod etiam observatur in motu musculari

Nubecula  
rubra  
quæ id si-  
gnificet.

validiore: reliqui autem colores flavi, nigri &c a diversis humoribus una ex eorum dependunt. Quoties igitur in urina formetur nubecula rubra, signum est, tali in corpore validissimum motum adesse atque febrem vehementem. Si ergo comparatio fiat inter nubeculam albam & rubram, dici potest, nubeculam albam salutarem esse, sed nubeculam rubram majus periculum portendere.

Nubecula rubra  
quarto die  
apparens  
cur notat  
Crisim septimo die  
futuram.

III. Motus morbi acuti febrilis tam vehemens, qui valet materiem rubram pro nubecula formare, diutius quam per septem dies a corpore sustentari nequit sine corporis interitu, quamobrem recte observavit Galenus, se nunquam post quartum diem vidisse nubeculam rubram in urina præfigentem futuram crisim septimo die. Hæc etiam observatio firmat criticorum dierum doctrinam, quod quartus dies sit index septimi, quoniam in morbis acutis tantum tempus a morbi principia infumitur usque ad acmen, quantum in morbi declinatione, quoniam dies quartus est medius inter principium & septimum diem. Inde etiam si præludia coctionis observantur die septimo, morbus plerumque durat ad decimum quartum; & quæ conspiciuntur undecimo, illa morbum ad vigesimum diem prolongare solent. Hoc tamen observatur in diebus criticis, quod brevius tempus accuratius servet ordinem, quam tempus longius. Dum igitur quarto die ex nubecula rubra constet, febrem esse vehementem, cujus tamen materia incipit quarto die evacuari, spes est perfectam futuram esse coctionem die septimo. Verum sapissime evenit, quod in tali febre vehemente vires vitæ superentur, & ut ita morbus abeat vel in corruptionem, vel sphacelum, hoc signum criticum minus securum est quam si apparuisset Nubecula alba denotans vires vitæ prævalere. Necessè igitur erat, ut Auctor adjiceret, *& alia secundum rationem*. Nam si modo unum alterumve adesset signum, vires vitæ superari a magnitudine morbi, cum homo talis ita versetur in ancipiti statu, & quasi in puncto interitus, hoc signum solum non sufficeret ad crisim septimo die præfigendam.

#### LIB. IV. A P H. LXXII.

182. *Quibus urina pellucida, alba, male. Maxime autem in phreniticis observantur.*

Urina pellucida  
que dicatur.

I. Quoties urina liquor omni in puncto sibi similis est, atque per suam totam substantiam transmittit lucis radios, quemcumque etiam habeat colorem, album, flavum, vel rubrum, talis tamen dicitur urina pellucida. Talis ergo privata est omni materia sedimentosa, & quæ format nubeculam; neque habet admixtam materiem, quæ turbidam facere potest urinam. Inde tamen non inferri potest, morbi materiem huic urina non esse mistam, ita enim sales solvantur aqua, & tamen ejus non turbant pelluciditatem: atque multæ circumstantiæ inveniuntur pellucidæ virtute medicamenti saturæ. Sed quando talis invenitur urina, quæ etiam morbi materiem mistam habet, significat, perfectam esse unionem inter morbi materiem, & reliquam massam urinae. Ita durissima, & opacissima etiam metalla in suo menstruo soluta pellucidissimum liquorem præbent. Quare urina pellucida vel indicat in morbis materiem non evacuari, vel reliquo liquori urinae intime mistam esse.

Alba pellucida  
male.

II. Materia autem morbosa magna copia urinae intime mista non turbat ejus liquorem, sed tamen mutat ejus colorem, unde habetur urina alba pellucida aquosa diaphana, vel pellucida & colorata: hæc semper indicat, nihil de materia morbi, vel materia detrita vitali actione corporis urinae liquori esse mistum: illa autem, quo color magis est saturus, eo majorem copiam materiae detritæ, vel morbosæ admixtionem arguit. Ex urina itaque pellucida alba scimus, neque materiem detritam neque morbosam evacuari. In febribus autem talis urina evacuari

vacuari nequit, quin designet materię utriusque retentionem, quum sola actio vitę vehementior, etiamsi nulla fieret materię morbi subactio, tinctam materię urinam, uti in sanis etiam experimur, quorum corpora sana exercitiis validioribus fuisse agitata. In Chronicis autem sæpe evenit, talem reddi urinam, quum circulatio validior non multum deterit: sed si tamen maneat pellucida longo tempore, significat, materiem crudam, quę generatur in Chronicis, retineri: Ergo tam in Acutis quam Chronicis alba pellucida urina est mala, tanquam signum retentionis materię.

III. Non consentiunt Interpretes, num tali urina præfagiat magnum malum in Phreniticis, cum vero talis in Phrenitide sæpius, quam aliis morbis observetur. Ego autem puto, utramque sententiam esse admittendam. Nam dum Æger laborat Phrenitide (Aph. 109., VII.) & inde corripitur febre, sæpe reddit urinam albam pellucidam, cum morbi materia collecta in encephalo non potest tincturam aliquam præbere urinę: atque urina talis, quoniam indicat, non solum retineri materiem morbi, verum etiam materiem detritam per validam vitę actionem, quę in Phreniticis solet esse vehemens, certissimum indicium præbet, utramque hanc materiem in encephalo colligi, quo signo nihil pejus inveniri potest. Si unquam Purgans datum, vel Epispasticum pedibus applicatum ad derivationem faciendam est adhibendum, talis urina summo est indicio, nam nisi derivetur materia, mors certissima est expectanda.

Alba pellucida cur maxime phreniticis?

## L I B. IV. A P H. LXXIII.

183. **Q**Uibus hypochondria elevata murmurant, dolore lumborum superveniente, bis alvi humectantur, nisi flatus eruperunt, aut urinę copia prodierit. In febribus autem hæc.

**I.** ANtequam certa potest tradi prognosis de alvi humectatione, flatuum eruptione, vel copia urinę, determinandus est status corporis, in quo observantur hypochondria elevata murmurantia, post quę venit lumborum dolor, tum ex his tribus præfagiens. Auctor dicit in febribus, quoniam illa observavit fieri in febricitantibus; sed propterea non excludit, sine febre quoque fieri non posse, verum quia veritatem expertus est in febribus. Recte monet Galenus, Hippocratem, si absolute ponit febrem, intelligere febrem essentialem, & non symptomatice, adeoque in febre continua, vel remittente, quoniam intermittentes raro generali nomine febris citantur. Si ergo aliquis laborans generali incallescencia febrili, sine locali inflammatione, erysipelate aut suppuratione, incidat in Hypochondrid inflata murmurantia, quæritur, unde tunc veniant illa murmura seu borborygmi cum hypochondriorum inflatione. Dum materia febrilis per totam massam sanguinis dispersa sensim ad aliquod organum incipit colligi, ut vergat ad eliminationem, vel metastasin, in tali parte quædam concitat phenomena functioni istius partis propria: nunc autem febris facit Hypochondria elevata murmurantia, quę notant augmentum quantitatis aeris in hoc loco, unde illa inflatio, atque inordinatum in his partibus motum, unde Borborygmi. Omnia experimenta in viventibus animalibus docent, quoties intestina in motu suo peristaltico turbentur, intus in se generare aerem artificialem, ac si motus ille aerem ab humoribus in cavo intestinorum hærentibus intricatum separaret, quemadmodum motus ordinatus eum aerem jungit. Hinc constat ex ventris inflatione cum borborygmis, quod febris illa deponat materiem suam ad mesenterium, & intestina, in quibus tamen partibus non facit obstructionem aut infarctionem, nam tunc non generaretur inflatio murmurans, sed tumor aliquis hypochondriorum durus.

Unde in febribus Hypochondria murmurantia?

Lumborum dolor præfatus  
gens alvi  
humida  
ionem.

II. Ex lumborum dolore in non febricitatibus (*Apb.* 130, IV.) demonstravimus indicari purgans per alvum, quoniam tunc significavit ille dolor cacochyliam. Hoc autem loco materia febrilis se pro maxima parte hic deposuit, & quærit exitum per intestina. Sed nisi sit materia biliola febrem excitans, aut materia chylosa cruda corrupta, raro febres per hanc viam moliantur exitum, sed potius per cutim, vel urinam, unde non sine ratione adjecit Auctor, nisi status eruperint, indicantes materiem potius determinatam esse ad cutim, vel prodierit urinæ copia, quæ secum fert materiem febris. Inde non incongruum erit, si lumbi ex febre doleant cum ventris murmuribus, inflatione, atque signis cacochyliæ, vel bilis corruptæ, propinare alvum ducens, quod illam evacuationem magis determinat.

Dolor  
lumborum ex  
renibus præfatus  
urine copiam.

III. Quia vero lumbis quoque accumbunt renes, vix distinguere possumus, num lumborum ex renibus, vel nexu mesenterico lumbi doleant: sæpe enim evenit, ut calculosi, de quibus certe scimus, causam latitare in lumbis, colicis doloribus, ventris murmuribus, & inflationibus tententur, quum tantum sit inter illarum partium nervos confectus, ut affecto nervo renum, mesenterium, & intestina inordinate moveantur. Quod si vero febris materia magis feratur ad renes, excitans tamen ex consensu intestinorum, & mesenterii symptomata, non est mirandum, si hujusmodi febre fieri posse materię evacuationem per urinam copiosorem.

#### L I B. IV. A P H. LXXIV.

184. *Quibus spes est abscessum fore ad articulos, eos liberat ab abscessu urina multa & crassa, & alba prodians, qualis in febribus laboriosis, quando die quibusdam fieri incipit. Si vero etiam ex naribus sanguis eruperit, brevi admodum solvitur.*

Qualis urina liberat ab instanti abscessu articulos?

L. Qualem statum in febribus Hipp. intelligat, non est opus anxie quærere, nam (*Apb.* 141.) exposuit ad articulos, & circa maxillas abscessus expectandos esse in lassatis per febres: restat ergo videre, qualis urina talem liberationem portendit; illa autem debet esse multa, crassa, alba. Talis urina si veniat in febribus, indicat lentorem febris continuæ incipere solvi, & commutari in materiem purulentam, quæ dicitur cocta in morbis inflammatoriis: nam si tali urina die indice, ut est dies quartus, apparet, exhibens rudimenta coctionis, id judicatorio perfectam crisin expectamus; nempe urinam cum sedimento albo, & copioso, quæ omnem materiem coctam e corpore evacuat. Nam ipsa urina multa, crassa, & alba, tanquam signum imperfectæ coctionis, hominem non liberat, sed est signum perfectæ coctionis instantis, uti flores præfagiunt fructus. Hujusmodi urina alba, crassa, & copiosa quibusdam fieri incipit in febre laboriosa (*Apb.* 26. I.) die quarto, sed etiam aliis diebus indicantibus, septimo, undecimo, imo serius apparere potest, quoniam est signum principii coctionis in febre laboriosa, nam in febribus laboriosis præfagiunt etiam abscessus, sed non ita in aliis febribus: quippe nisi febris tam valida sit, ut labores faciat, non expectamus abscessum. Igitur inutile foret dicere, urina crassa, alba, copiosa prævenit abscessum, si tali febre laboraret æger, ex qua nullum abscessum expectamus. Igitur admodum conveniens est in febribus laboriosis, si videamus urinam albam, crassam, copiosam, ut signum future crisis, hunc non turbare naturæ ordinem per aliquam artificialem evacuationem.

Quando sanguinis eruptio prævenit

II. Particula *Etiam* multis dedit dubitandi ansam, aliis autem errandi occasionem, ac si significaret, sanguinis eruptionem prævenire abscessum brevi, si tunc oriretur, quando in febre laboriosa ex urina alba, crassa, & copiosa, constaret, futu-



futuram esse solutionem per urinam. Unde etiam magni nominis viri non dubitarunt hoc tempore imperare venæ sectionem, ut eo citius ager liberaretur. Hi autem non revocarunt in memoriam monitum nostri Auctoris, (Aph. 20.) quæ judicantur, & judicata sunt perfecta, neque movere oportet, neque innovare, sed finire. Nam si in febre laboriosa ex febris vehementia expectabamus abscessum ad articulos, sed tunc incipiebat prodire urina copiosa, crassa, & alba, ut signum crisis per urinam, hoc tempore vel per hæmorrhagiam supervenientem, vel per institutam venæ sectionem turbaretur cœlionis ordo, & fieret innovatio. Imo omnis evacuatio sanguinis mala est, si Lentor incipit mutari in purulentiam. Restat igitur illa difficultas, quomodo illa particula *Etiā* sit accipienda, ut sensus respondeat experientiz. Ego puto, Hippocratis sententiam esse veram, & ita cum studio summo traditam. Scopus ejus est demonstrare in febribus, quæ per suam vehementiam demonstrant, expectandum esse Abscessum, si in tali febre urina alba, crassa, copiosa prodit, quæ præbet signa futuræ cœlionis, & evacuationis, spem assurgere, eam febrem non abituram in abscessum, sed liberatum iri per urinam cœliam. Sed ne judicaremus, per solam talem crisin præveniri posse abscessum, addit *Etiā* liberationem fieri posse per hæmorrhagiam, sed tunc citius seu breviori tempore liberari. Nam ut sanguinis fluxus liberet hominem a febre (Aph. 170. II.) fieri debet in morbi principio, antequam suppurationis signa apparent, qualia sunt urina alba, crassa, copiosa. Unde hæmorrhagiæ, & sanguinis missiones in morborum principiis sunt salutares minuendo nimium febris impetum, sed tempore suppurationis si fiant, semper damnum inferunt inhibendo puris concoctionem ulteriorem, vel exhibent signum corruptionis. Si ergo ex febris natura, & vehementia conicere possumus, expectandum esse abscessum, expedit, si sponte non fiat hæmorrhagia, largam instituire venæ sectionem, quæ his temporibus prævenit pleuritidis, peripneumoniz, & aliorum morborum inflammatorum transitum in suppurationem.

## L I B. IV. A P H. LXXV.

185. *S*<sup>i</sup> quis sanguinem, aut pus mejat, renem, aut vesica exulcerati significatur.

**I.** Partim hic Aph. cohæret præcedenti, quatenus agitur de signis ex urina: partim vero non cohæret, quoniam non pertrahat signa ex urina in febribus. Vult enim in hoc loco demonstrare ex sanguinis & puris exitu per vias urinæ in utroque sexu, qualisnam pars sit læsa. Antequam designamus partem læsam, certo constare debet de phænomeno, ex quo partem læsam conicimus, nempe quid significat, & quali modo cognoscitur sanguinis vel puris evacuatio per vias urinæ, seu ex urethra tam fœminæ quam viri. Si sanguis purus vel urine mistus per urethram evacuatur, hodie vocatur *Mistus cruentus*. Nihil planius videtur in morbis observari posse, dum tamen a quibusdam urina tuberrima pro sanguinis evacuatione fuerit habita: neque tam manifeste patet non satis attendenti, num ex renibus vel vesica profluat cum topica medicamenta diversis locis sint applicanda: igitur operæ pretium erit ad significanda loca afficla, ut reliqua criteria hujus sanguinis evacuationis perpendamus. Sanguis & urina sunt duo humores specifica gravitate differentes. Sanguis enim est urina gravior, unde hi humores una emissi non diu manent permixti, sed sanguis etiam in urina calente breve petit fundum, si non statim aliquo modo coagulatus evacuatur sanguis, quando facillime distinguitur. Urina autem ruberrima ut plurimum subsistit aliquamdiu, priusquam deponit rubedinem, & si subsidentia plurimum subsistit aliquamdiu,

Mistus  
cruentus  
quam  
partem  
afficlam  
denotat?

diu, priusquam deponit rubedinem, & in sedimento erit differentia. Nam in mixtu cruento superflans urina in colore vix differt ab urina sana, atque sedimentum erit tanquam sanguis grumofus, & corporis color non erit admodum accensus. Urina autem ruberrima ardorem corporis adiunctum habet, & si sedimentum fuit præpositum, superflans urina intensum colorem rubrum servat. Postquam medico constat, rubedinem fieri a sanguine admisto, observandus est locus, ex quo ille sanguis maneat, ut topica medicamenta parti læsæ adhiberi possint. Si ex Urethra profluit, continuo extillat sanguis, & sine conatu mingendi emittitur, quum sphincteris constrictionem non debeat superare, vel sine urina emittitur, vel ante urinam exit. Sæpe etiam dolor partem læsam declarat. Si vero ex vesica venit, imperfecte mistus erit sanguis urinx, non raro sub grumi forma prodit: atque pudendorum molestiam sæpe & dolorem parit. Altius vero si ex renibus vel ureteribus profluit, perfecta est sanguinis cum urina mixtio, cum affectione lumborum. Raro fit, quod arteriæ renales dilatatæ transmitterent sanguinem, quando urinx secessus non fieret a sanguine; quia tunc renibus non con-  
fuitur urina.

Unde Pus  
in urina?

II. Alter humor, qui aqua pura gravior est, vocatur Pus, unde istud urinx mistum, quæ aqua est levior, prompte ante refrigerationem fundum petit, ut inde pateat, non esse urinx album sedimentum, quod tandem in refrigerata urina fundum petit. Hoc Pus ex omnibus locis, ex quibus sanguis profluere potest, etiam effluit vel ex ulcere in his locis hærente, vel quia sanguis antea fluens reliquerit ulcusculum. Interdum vero observatur in morbis inflammatoriis in suppurationem conversis, atque in morbis purulentis, uti Empyemate, & Phthisi, ut materia purulenta reddatur per renes cum levamine. Ex quibus patet, non esse certissimum criterium, si quis sanguinem aut pus mingat, vesicam aut renes ulcere affectos esse. Hanc autem sententiam colligit ex hoc Aphorismo: sed Auctor observavit in praxi, ex ulceratis his partibus Sanguinem & Pus profluxisse; propterea non concludit, nullo alio modo pus reddi posse.

#### LIB. IV. A. P. H. LXXVI.

186. **Q**uibuscumque urina crassa exigua caruncula, aut veluti pili exsunt, a renibus excernuntur.

Quid no-  
tant ex-  
caruncula  
in urina?

I. **V**ersatur Auctor in expositione signorum, quæ demonstrant, Renes affectos esse, horum ulcera & vasorum cruentorum ruptionem manifestam fecit ex urina, quæ continebat sanguinem aut pus, nunc vero ulterius ex Carunculis & Pilis in urina inventis demonstrat, renes quodam morbo affectos esse, cuius nomen non addit. Detexit in urina crassa carunculas, unde concludit, renes quadam labe affectos esse. Prædixi non negant se invenisse carunculas concretas in urina, sed putant esse glandulas, a renum substantia separatas, & quia renes existimant esse glandulosos, non dubitant amplecti huius observationis veritatem, sed pilos excerni posse, qui morbus vocatur Trichiasis, cum Galeno vel negant, vel maxime in dubium vocant. Ego vero maxime dubito, huiusmodi carunculas indicare glandulas renales separatas & cum urina emissas, sed caruncularum evacuationem aliquoties observavi, nam renum papillæ, quæ ab istis pro glandulis habentur, ad summum sunt duodecim in quovis rene, quarum papillarum separatio tantam copiam Caruncularum in urina exhibere nequit. Eodem quoque modo multi ratiocinantur de glandulis Pulmonum per sputum ejcctis, si in sputo detegant huiusmodi corpuscula concreta, quæ carunculas referunt, dum tamen glandulæ pulmonum non in cavitate tracheæ vel bronchiorum hæreant, sed ad externam bronchiorum superficiem, & ita per sputum reddi nequeant. Error ille natus fuit ex præoccupata opinione, quæ  
pu-

putant inter partes firmas coherentes & liquores maximam intercedere differentiam, qui modo attendit ad sanguinem ex pleuritico emissum, juraret, pellem sanguinem illum sanguinem refrigeratum portionem esse cutis vel membranae, cum non minor tenacitas in cuticula illa phlogistica detegatur, quam in quidam vera membrana. Fieri ergo potest in nobis ut quidam humor fluidus stagnando concresecat in corpus densum firmum & compactum, quod habet figuram loculi, in quo congregatum fuit. Hac massula sensim accedente nova materia concrecibili, augetur mole, & ita formatur saepe corpusculum albicans, quod loculum distendendo tandem ita implet, ut loculi vascula cruenta dilatata evomant sanguinem qui striis rubris externe interdum obducit moleculam illam. Tandem loculus irritatus tandem retentam massam concretam & compactam, nunc striis rubris sanguineis externe ornata, eruat, quæ massula in communi via ampliore veniens cum profluente urina progreditur per ureteres ad vesicam, & tandem per urethram emittitur, quemadmodum hujusmodi etiam carunculae ex lacunis bronchiorum cum sputo non raro eiciuntur. Ergo exitus hujusmodi caruncularum demonstrat mucum, quo intus obtegitur renum pelvis contra urinæ rorsionem, nimis tenacem fieri in suis loculis, & tandem extrudi, atque ita relinquere loculos apertos mucagine privatos, quæ tunc loculorum cavitatē ab urina acriori tacta dolores inferuntur: atque ita significatur renes laborare. Et quoniam sensim in diebus loculis novus congeritur mucus concrecibilis, saepe possunt quoque tales reddi carunculae sine amissione substantiæ renum, sed non sine dolore vel renum vitio. Non solum ego hujusmodi carunculas renibus affectis prodire observavi, verum etiam massam aliquam similem concretam oblongam instar vermis aliquot ulnrum, quæ massa etiam externe sanguineis striis ornata prodibat. Addit, cum *urina crassa*: id est cum urina, quæ per totam suam massam non est pellucida, qualis urina sana esse solet, sed habens materiem non integre pellucidam dispersam etiam per reliquam massam. Hoc adjunctum esse debet signum, ut cognoscatur, num carunculae in lacunis renum sint formatae, vel etiam in vesica urinaria, quæ etiam hujusmodi lacunis scatet, mucum fundentibus, quo interna vesicæ superficies contra urinæ rorsionem obducitur. Nam si ille mucus vesicæ in suis lacunis format carunculas, non sit tanta mucī reliqui unio cum urina, ut inde fieret reliqua urina turbida, uti fit, si formatio sit in renibus, quare hoc scitu est necessarium ad designandum locum, si carunculae in urina appareant, num formentur hæ carunculae in renibus vel vesica. Neque hæc observatio recedit ab aliis de origine mucus cruenti, nam si sanguis manat ex vasculis renum, multo accuratior miscela sanguinis habetur cum urina, quam si manat ex vasculo rupto in vesica urinaria.

II. Quoties in urina conspiciuntur corpuscula oblonga teretia instar tenuium filamentorum, illa dicuntur Pili. Nam hujusmodi inveniuntur in urina, admodum disputant, quoniam contendunt in renibus generari non posse, quum præoccupari sunt quadam opinione, pilos hos esse renum tenuia vascula, quæ quum a renum substantia fecedere non possunt, negant totum hoc phenomenon tantum saepe valet præpostera opinio, ut quæ a multis per certam autopsiam sunt manifesta, tamen repudiatur, quia phaenomeni ratio non potest reddi, vel quod nobis sit hujus causa ignota. Sed si omnia phaenomena in morbis inventa sunt abroganda, quorum causa inveniri nequit, certe ne tertia pars signorum in Medicina restaret. At mittamus eorum præposteram theoriam, quæ putant esse vascula renalia, & consulamus præcticos non ratiocinantes ex causis, sed sola phaenomena trahentes, ut facit Auctor noster, num viderint Pilos in urina, uno ore consentitur omnes, se saepe vidisse, quemadmodum ego istos observavi in urina aggratantium. Ergo apparitio illa negari nequit, sed negari potest, esse vascula, nam si in tubulis uriniferis, per quos transit secreta urina stillanda in renum pelvim,

K k

for-

pili in  
urina  
crassa  
quid si  
significant.

258 *MEDICINA HIPPOCRATICA* Aph. 186.  
 formatur materia concreta ex naturali ibidem secreto muco, corpuscula illa æmulantur figuram vasculorum seu tubulorum, in quibus formata sunt: & quoniam cavitas horum tubulorum exigua est, & oblonga, necesse est, ut corpuscula in huiusmodi cavitatibus formata pilorum figuram habeant. Hæc dein formata exeuntia cum urina facile præbere possunt conspicienti figuram pilorum. Et quoniam in toto tractu viarum urinæ non habentur huiusmodi tubuli exiles; non erit mirum, si in urina conspiciantur, tales pilos indicare. Renes esse affectos.

#### L I B. IV. A P H. LXXVII.

187. *Quibus in urina crassa existente furfuracea simul minguntur, iis vesica scabie laborat.*

Cur furfuracea in urina vesicæ scabie significent.

I. Pelliculæ tenues, planæ, figuræ inordinatæ, instar furfuris triticei, concretæ per urinæ substantiam dispersæ in hoc loco intelliguntur: de his dicit Auctor, tales observantur in urina, indicare vesicam scabie laborare. Huiusmodi furfuracea sunt corpuscula concreta majora, quam quæ ire potuissent per minima renum vasa, & propterea nata in urina post secretionem, vel admistæ ei. In Coacis (H. a. 581.) mentionem facit de sedimento furfuraceo. *Letbalis*, inquit, in pleuriticis brevi præsina, nigram subsidentiam habens aut furfuraceam, quoniam designat, morbi materiem ita exeuntem tenacissimam esse & promptissimam ad concretionem in quo casu nullum adest vesicæ vitium, sed talis redditur urina cum morbo vehementissimo inflammatorio. Hoc autem loco nullam mentionem febris facit, quare concipiendum, Auctorem hic indicare voluisse, si vehemens non adsit febris. Quippe si signa ex urinis capienda vult observare in febribus, nomen febris addit, quod plane constar ex superiori Aphorismo 183. Igitur furfuracea hic fuisse admista in itinere, neque est sedimentum furfuraceum, quale in superiore allegato loco indicatur, sed quando per urinam crassam non sub forma sedimenti furfuracea sunt dispersa, quæ statim etiam in calente urina conspiciuntur, & dein quandoque per urinam dispersa manent, interdum uroscopii fundum petunt, prout diversa proportionata gravitas locum his furfuribus parat. Huiusmodi furfures ergo urinæ admiscuntur, quando vesica urinaria scabie laborat, id est, quando ex interna vesicæ superficie transudat humor, qui non facile omnis permiscetur urinæ, sed lateribus vesicæ adhærens format crustulas, quæ dein separantur, ut observamus fieri in porriginè & herpete in cute, humores enim lentescentes ex cute transudantes concreti huiusmodi squamulas vel furfures formant. Quidni ergo simile quid fieri potuisset in vesicæ interna superficie, quod mucus naturalis intus obducens vesicam in sua natura degeneratus, uti humor transiens per cutem concreveret in furfures, qui dein una cum urina exeunt, nihil equidem obstat. Sed quod non significetur pars quævis alia, facile concipitur, quia nullibi talis in viis reflat locus, in quo hi furfures generari possunt. Quamobrem etiam affectus cutaneus furfures emittens scabies vocari debet. Addit in urina crassa existente, quoniam non omnis transudans humor in furfures concrevit, sed reliqua pars urinæ mista præbet aliquam urinæ crassitudinem.

#### L I B. IV. A P H. LXXVIII.

188. *Qui sponse sanguinem mingunt, bis a renibus venæ ruptionem significat.*

Sanguinem sponse.

I. Quam maxime laborant Interpretes in expositione hujus evacuationis sanguinis ex ærethra, quum dicat Hippocrates *αὐτοματῶς*, quod hic vertitur

titur *sponte*, Galenus vero *Inopinanter*, alii autem, forte fortuna vel casu. Ego puro intelligendam esse talem sanguinis evacuationem, quam non possumus coningere provenire ex vulnere, ulcere, vel corrosione aliqua in viis urinæ, sed quod æger incipiat reddere sanguinem loco urinæ, dum non cogitabat tale quid futurum esse, quoniam in viis urinæ nullam molestiam aut dolorem percipiat, ex quibus coningere potest æger, vel Medicus, evacuationem sanguinis generari posse.

II. Quamnam partem affectam mictus cruentus significet, superius (*Aph.* 185. 1.) exposuimus. Hoc loco duo sunt observanda, (1) quæ significantur per mictum cruentum, qui sponte seu inopinanter fit: (2) sanguinem cum manare ex venis, atque ex venis renum. Veteres, etiam si ex arteriis stillabat Sanguis, tamen accusarunt venas, quoniam fabrica arteriarum, & circulatio sanguinis erat ignota ipsis. Neoterici melius edocli statuerunt, omnem hæmorrhagiam fieri ex arteriis, quoniam venæ valvulis instructæ non permittunt regurgitare sanguinem, at eum fundunt ex suis sic dictis anastomosis. Quamobrem quoque in hac sanguinis evacuatione statuunt, ex ruptis extremitatibus arteriarum sanguinem profluere: quod putant satis convenire doctrinæ veterum, qui omnem hæmorrhagiam adscribunt venis, etiam si fiat ex arteriis. Hæc autem nova theoria tanti mihi non videtur ponderis, ut totam doctrinam de ruptione venarum omnino repudiarem, quasi nunquam ex venis sponte potuisset erumpere sanguis. Clare enim nobis constat in hæmorrhoidibus & in aliis partibus corporis ex varicibus ruptis profluxisse magnam sanguinis copiam: atque in venis organorum, quæ semper carent valvulis, æque potest refluxus fieri a trunco versus ramos, quam in arteriis, uti hoc satis patet in venis mesentericis, & uterinis valvulis carentibus. Constat ergo tam ex principiis venarum quam sinibus arteriarum dilatatis fluere posse sanguinem: atque ex varice & aneurysmate rupto ingens etiam generari potest sanguinis fluxus. Nunc autem conspiciendum est, num evacuatio sanguinis *από τῶν αὐτοῦ*, fiat ex vena rupta, vel arteria rupta vel dilatata, ut multi putant. Multo frequentior generatur in venis varix, quam in arteriis aneurysma; atque varices tolerantur sine perceptione ut plurimum ægri, atque generantur sponte sine causa evidente, sed aneurysma ut plurimum generat pulsationem tali in parte, & raro sine valida causa, quæ quidem ab ægro perciperetur, producit. Denique sanguis ex arteria effusus magis concretis, & difficilius intime miscetur urinæ, quam qui manat ex varice diffracta. Quamobrem mihi non absurdum videtur cum Auctore statuere, si antea in vena fuerit nata varix, ex ea rupta effundi posse sanguinem urinæ miscibilem, sponte seu inopinanter cum urina accurate mistum: nam si supponatur arteriarum dilatatio, illa potest esse duplex; nempe a majori interno impetu, sed is tantum calorem & pulsationem prius faceret, quæ ab ægro facile perciperetur; si vero nimia supponatur extremitatum dilatatio in arteriis, evacuetur quidem urina chylosa crassa, sed vix credendum est, per extremitates arteriarum in renibus dilatatas merum profluere sanguinem. Unde non ita a veritate est alienum statuere, ut fecit Hipp., indicare venam esse ruptam. Quod autem judicaverit, cum sanguinem profluere ex Renibus & non ex aliis viis urinæ, nempe ureteribus vel vesica, non est sine ratione, etiam si ex loco dolente non potuerit Auctor dignoscere, num vesica vel renes sint læsi, quia dicit inopinanter fieri, quod notat ex dolore vel affectione aliqua dijudicari non posse, futurum esse sanguinis fluxum: nam omnes venæ & arteriæ in renibus non adferunt sanguinem ad generalem renum nutritionem, sed & venæ, & arteriæ renales functioni, scilicet secretioni urinæ famulantur, in quibus tunc venis non inveniuntur valvulæ, quæ tamen in venis vesicæ adsunt, ut alibi in corpore, ubi non peragitur specialis functio. Atque vasa in vesica non solum propriis suis tunicis fulciuntur, sed insuper tunicis vesicæ, quod non ita fit in vasis cruentis alicujus organi, ubi ex allato sanguine specialis est facienda secretio. De tali mictu

te minge-  
re, quid  
significat?

Qui spon-  
te san-  
guinem  
migrant,  
an ex ru-  
ptis venis  
in reni-  
bus?

creto idem est sentiendum, quod observatur in hæmorrhoidalium fluxu, raro aliquid damni inferre, nisi nimis copiosa fiat aut diuturnior evacuatio: quamobrem non tam anxii esse debemus in curatione hujus, quam si fiat in calculosis a calculo rupente vas, atque eandem quoque non sequitur curationem, sed talis interna est facienda, qualis instituitur in hæmorrhoidibus.

## L I B. IV. A P H. LXXIX.

189. *Quibus in urina arenosa subsident, illis vesica calculo laborat.*

Unde Arenosæ in urina?

**I**N multis hominibus præcipue scorbuticis, arthriticis & podagricis invenimus, si sæpius urinam reddant in eadem matula, quæ toties non repurgatur, illi matula circumquaque accrescere tandem crustam lapideam seu calculosam, uti tartarus lateris usque docti accrescit, in quo servatur vinum. Imo vidi homines, in quorum urina modo per aliquot horas stagnabat, usque ad superficiem ejus, formabatur crusta calculosa ad latera uroscopii, quæ crusta vix abstergi potuit; quod etiam mulierculis novum est, quibus depurandi matulas officium est mandatum. Certo ergo & iterato experimento constat, urinam stagnantem ad latera vasis formare posse crustam calculosam. Sed quod magis est, observationes testantur, corpus durum immissum fuisse in vesicam urinariam, istud dum postea eximebatur, crusta calculosa erat obduclum; quare etiam corpora quacunque solida, si ab urina alluuntur, circumducuntur materia calculosa. Quamobrem generatio Calculi, arenularum vel sabuli facili & apposita comparari potest crystallisationi salium, quum sales libere fluctuantes in liquore stagnante, si modo nanciscantur corpus firmum, statim ad istud suas figunt crystallas; ita etiam frequentissime ad dentes copiosus lapis accrescit in multis hominibus, non quod ex dentibus excreseat Lithodontis, sed ad dentes colligatur, & non ita ad reliquas partes oris molliores. Non est igitur opus querere tam anxie humorem glutinantem partes terrestres, dum ipsa urina sine addito illo glutine calculosum formet ad latera matulae. Si igitur parva crystallus lapidea vel ad latus vesicæ vel renum pelvis concreverit, & statim inde depellatur, hoc concretum variis in locis natum, depulsum & collectum, arenularum, vel sabuli formam exhibet. Quare in ceteroquin sanis hominibus arenularum & sabuli generatio potest fieri in urina.

An arenosa subsidentia in urina notent vesicæ calculum.

**I**I. Facile fieri posse in urina alicubi stagnante, vel fluente perpetuo supra aliquam partem arenularum vel sabuli generationem, demonstravimus, quæ corpuscula concreta dein separata facili cum urina exuntia in fundo uroscopii exhibere possunt sabulum vel arenulas. Ne autem talia inventa illudant inspectorem, sedulo observandum est, num talia corpuscula statim apparent in emissâ adhuc calente urina, an vero dein in sola stagnante urina refrigerata inveniuntur: nam si statim non apparent arenosa vel sabulosa in calente urina, certum est signum, horum generationem non fuisse factam in corpore ægrotantis, sed nata fuisse crystallizando in uroscopio, in quo stagnavit urina: hæc crystallisatio quoniam magis minime coherentes potuit producere arenulas, incertum omnino est iudicium, quod præcisi petunt ex arenularum duritie, num in corpore vel extra istud arenulae fuerint natae. Recte propterea præcipit Auctor, Arenosa subsidere, nam si in matulis habetur concretio calculosi, illa arenosa magis adherent lateribus vasis, quam quod subsident. Hæc nunc arenosa subsidentia in calida urina denotant certissime formationem fuisse peractam, sed an fuerit facta in vesica vel renibus, incertum est. Hoc quidem verum est, evacuari non posse arenulas, nisi fuerint in vesica, sed propterea non est iudicium, originem mali latitare in vesica urinaria: imo his temporibus ex lumborum conjunctis doloribus frequentior oratio est et

esse quærenda in renibus, quam vesica eorum, qui sabulosa vel arenosa cum urina reddunt. Quod autem illi, qui tandem in refrigerata urina multum sabuli habent, frequentissime etiam in morbos renum & vesicæ incident, res est notissima. Quippe quoties his in partibus locus est mucos non satis defensus, ad quem stagnans urina potest formare crystallos, urina ita prona ad calculi formationem, etiam in corpore calculum sepe facit: adeo ut non requiratur, ut semper primordia calculi formantur in renibus, qui tandem magis incrustati majorem calculum in vesica urinaria formant; potest enim talis locus esse tam in vesica ipsa, quam in pelvi renum. Unde non consentirem Auctori statuenti, sabulum vel arenulas indicare vesicæ calculum, nisi intelligat, evacuationem sabuli fieri non posse, nisi calculus prius fuerit in vesica.

L I B. IV. A P H. LXXX.

190. *Si quis sanguinem mingat, & grumos, & stranguriam habeat, & dolor incidat ad lumbum ventrem, & perinaeum, partes circa vesicam laborant.*

I. **O**mnes fere Commentatores auctoritatem secuti credunt, Hippocratem in hoc Aphorismo voluisse indicare ægrotationem vel laborem circa vesicam, non vero ipsam vesicam laborare: ego vero malo, hæc signa indicare, ipsam vesicam affectam esse, si cuncta hæc signa collecta inveniantur, in eodem ægro, uti expositione sequenti constabit. Partes circa vesicam possant esse in utroque sexu urethra & prostaticæ, Perinaeum in viris, quod vocatur in feminis distinctionis ergo interfemininum, intestinum rectum in utroque sexu, sed tamen magis in viris, in feminis autem uteri vagina, vel accipi potest etiam pinguedo copiosa circa has partes hærens. Ex affecto intestino recto, uti patet in Tenesmo & Dysenteria & in Hæmorrhoidibus, non raro generatur stranguria, dolor ad lumbum ventrem, & perinaeum, quoniam in hoc loco etiam intestinum hæret, cujus affectione partibus adjacentibus præcipue in viris, per consensum dolor & stranguria inferuntur, atque in feminis si vagina tenetur dolore, dictæ partes adjacentes sentire solent. Quare hæc signa seorsim ponderata incertum indicium præbent, num vesica, intestinum rectum, vel vaginæ pars præcipue affecta sit. Idem quoque sentiendum est de sanguinis mictu, qui non solum ex vesica, verum etiam ex læsis renibus oriri potest (Aph. 188.) Sed quando illa duo genera signorum, unum quod indicat locum infernum esse læsum, alterum quod declarat organum urinæ esse affectum, concurrunt, tunc certum formatur indicium, vesicam esse affectam. Quippe ex nulla parte circa perinaeum & hypogastrium affecta evacuari potest sanguis, nisi ex vesica læsa. Ille tunc sanguis, si statim ac effusus in vesica, reddatur per urethram, vel si sanguis non admodum sit concretibilis, fluidus potest reddi, sed si majori potentia coagulandi sit præditus, vel aliquamdiu stagnavit in vesica, grumosus reddi potest. Inde talis homo sanguinem mingit & grumos, ut recte præcipit auctor noster.

Partium  
circa ve-  
sicam la-  
borantium  
signa.

L I B. IV. A P H. LXXXI.

191. *Si quis sanguinem & pus mingat, & squamas, & odor gravis sit, vesicæ exulcerationem significat.*

I. **U**num phenomenon raro sufficere ad detegendum latentem causam, ex hoc etiam Aphorismo constat: vult enim per signa externa detegere Auctor vesicæ latentis exulcerationem, propterea tot congerit signa simul collecta, quæ

Vesicæ  
exulcerati-  
onis signa.

omnia

omnia ex nulla alia causa oriuntur. Nam ex solo sanguinis mīctū (Aph. 188.) indicavit, venas renū esse ruptas. Ex sanguinis & puris mīctū iudicavit renū aut vesicæ exulcerationem (Aph. 185.). Ex furfuraceis in urina deduxit vesicæ scabiem (Aph. 187.). Neque urinx fœtor certum est signum vesicæ exulcerationis. Verum si cuncta hæc junguntur, ut quadam demonstrent ulceris præsentiam, & reliqua significant, vesicam solam talia emittere posse, tunc certum erit, id ulcus occupare vesicam. Multa sunt signa, quæ ulceris præsentiam declarant in vis renū, uti evacuatio sanguinis & puris: nam si pus solum evacuetur, forsitan talis fieret evacuatio per metastasin, sed tunc nunquam redditur sanguis, & dein pus, vel hæc duo simul. Verum squamulæ quoniam solummodo in vesica formari possunt ex pure ibidem concrefcente, harum evacuatio certum criterium præbet, puris generationem fieri in vesicæ ulcere.

## L I B. IV. A P H. LXXXII.

192. **Q**uibus in urethra tuberculum nascitur, his suppurato eo, & perrupto, solutio fit.

I. **P**ropter nimiam brevitate magna generatur in hoc Aphorismo obscuritas, nam non constat, quodnam genus tuberculi in urethra intelligitur, neque constat, quidnam solvitur eo Tuberculo perrupto: si enim quis in medicina præctica non satis expertus talem legeret sententiam, iudicaret, per solutionem intelligi debere finem morbi, quasi sufficeret ad curationem huius Tuberculi, si modo perruptum esset, sed in praxi contrarium inveniret, nam si abscessus, vel tuberculum sit ruptum, statim non est ille morbus sanatus. Propterea solutio respicere debet ad aliquid aliud, quod per Tuberculum generatur, & quod solvitur Tuberculo rupto. Recte monuit in hoc Aphorismo Mercurialis, propterea Hippocratem hunc Aphorismum adiecisse, ut demonstraret, omnem puris evacuationem cum urina non esse malam, neque semper pus evacuari ex vesica, verum etiam ex meatu urinario, ut ita sedulo inculcet, pus cum urina missum ex variis locis provenire posse.

Urethrae  
Tubercu-  
lum quid  
faciat.

II. Varia sunt genera Tuberculorum in nostro corpore, quæ exhibuimus in Chirurgia nostra repurgata, ex his sunt Tubercula inflammatoria, quæ tendunt in suppurationem, quare in hoc loco huiusmodi Tubercula sunt intelligenda, quoniam dicit Auctor, eo suppurato, & perrupto, solutio fit, nam reliquæ species tuberculorum, quæ non perveniunt ad suppurationem, in hoc loco intelligi non possunt. Tubercula autem inflammatoria, & reliqua si nascuntur in meatu urinario, duo præcipue mala inferunt, Dolorem scilicet, & Urinx suppressionem. Quamdiu Tuberculum inflammatorium non abiit in suppurationem, neque minuitur Dolor, neque referatur urinx suppressio, sed quando in suppurationem abiit, minuitur quidem Dolor, sed quoniam non est diminutus tumor, manet tamen urina suppressa: verum si maturum hoc Tuberculum rumpatur, & ejus contentum pus evacuet, simul quoque minuitur Tuberculi moles, unde non amplius tam arcte obstricta est urethra a tumente Tuberculo, quam antea, quando sæpe simul reddi potest urina per urethram nunc minus obstrictam, præprimis si simul reddatur pus, indicium præbens, urethram esse apertam.

Solutio  
fit, quid  
significet.

III. Facile nunc erit solvere illum nodum, quomodo Hippocrates dicere potuerit, solutio fit, quod multis Commentatoribus magnam difficultatem præbuit. Solutio enim in hoc loco significat, instans periculum ex doloris vehementia, & urinx suppressione averti, quoniam ex pure prodeunte constat, Tuberculum non amplius favere, & urinx viam esse apertam. Hanc esse veram Auctoris sententiam,



tiam, colligere possumus ex aliis locis nostri Auctoris, uti in Coacis, ubi dicit, huiusmodi Tubercula inducere urinæ difficultatem & suppressionem; & in Aphorismis (Sect. 7. Aph. 17.) aperte dicit, *Solvitur Dolor.*

## L I B. IV. A P H. LXXXIII.

193. **M**ictio noctu multa consingens, parvam dejectionem significat.

**I**RIA generalia invenimus in viventibus emunctoria, quibus eliminatur abundans, & id quod inutile est scilicet, nempe Alvim, Urinæ vias, & Cutim: reliquæ evacuationes humorum in corpore non fiunt in sanitate, ita invenitur vomitus, sputum, humoris effluxus ex ulceribus, hæmorrhagiæ, sed evacuationes hæ non sunt naturales in hominibus sanis. Hæc tria emunctoria evacuant quendam humorem aquosum generalem, & egerunt specialia sua, quæ per alia emunctoria eliminari non possunt. Ea enim, quæ in intestinis ingesta relinquuntur, omnia debent evacuari per alvum. Itidem est quidam specialis humor in nobis, qui duntaxat per Renes separari potest, quum constanti observatione compereamus, neminem vivere posse, nisi interdum reddat urinam, quamvis aucta alvi evacuatione tanta quidem copia humidi evacuari potuisset, quæ defectum evacuationis urinæ suppleret. Hoc etiam verum est de Insensibili perspiratione, materia propria per hanc viam eliminanda non patitur per urinæ vias, vel alvum omnino duci. Ob particularem hanc materiem cuicumque organo excretorium est, quod requirantur semper illa organa emunctoria aperta, quæ specialem humorem excrementitium segregant a communi sanguine transiente per istud organum secretorium, eodem modo uti fit in secretione humorum, ducitur enim per quævis organa secretoria generalis massa sanguinis, sed propter differentem structuram, & motum istius organi a transiente sanguine variis feceruntur humor, qui nullibi in alio organo a communi massa segregari potuit. Ita etiam constitutum est cum humoribus excrementitiis, ille specialis humor, qui verbi gratia exit per urinam, nullibi per aliquod organum a communi massa potuit separari: quare ab urinæ suppressione homo moritur, retenta urinæ materia, etiam si alvus, vel sudor majorem copiam humorum evacuat. Sed præter specialem illum humorem invenimus quoque alium, qui sine discrimine per tria illa naturalia emunctoria evacuari potest, ut si augeatur sudor, vel perspiratio, minuitur urinæ quantitas, & alvus redditur siccor. Illa materia seu humor communis videtur non multum distare ab aqua tanquam communi vehiculo, quoniam aquosa copiosius assumpta evacuari possunt per cutim, & renes, minus vero per alvum, cujus hæc videtur ratio, quod intestina non sint organa emunctoria, quæ ex communi massa segregant humorem excrementitium, sed potius humorem secretorium, destinatum ad aliquam functionem peragendam in intestinorum cavitate.

II. Si ergo quis noctu magnam copiam urinæ emittat, non quia præcedente die multum potavit, sed quum solitam portionis copiam assumsit, talis copiosior evacuatio denotat, fere omnem humiditatem generalem hac via evacuari, vix quidquam de communi hoc liquore evacuari per duo reliqua emunctoria. Unde certo constat, non solum alvum fieri debere sicciorem, sed etiam in hoc homine parciorem esse insensibilem perspirationem. Non sine ratione adjectum *noctu*, ut indicaret istud tempus, in quo corpora quiescere, & dormire solent, ut nempe illa aucta urinæ evacuatio non producat aliquam actionem musculari, vel animi pathemate, quibus interdum hæc, vel illa excretio potest augeri, vel minui, sed ut notaret tempus, in quo excretiones illæ absolvuntur sola actione vitali. Parva tunc regulariter debet fieri Alvi egestio, quia solummodo id, quod ex

Humor excretorius, vel est generalis, vel particula-  
tis.

Mictio noctu multa  
quid si-  
gnificet.

intestinis aborberi non potest, deponendum est. In morbis autem colligari-  
vis interdum observatur mictio noctu multa cum alvo profusa, sed hæc duo  
juncta malum signum exhibent, quoniam nunquam observamus duas evacuatione-  
nes copiosas, nisi humores per putredinem ita sint soluti, ut per omnia emun-  
diora effluant; qualis status periculosissimus est. Qui ceteroquin sanus noctu  
multum mingit, conveniens est, ut huic alvus non solum sit sicciior, sed & in-  
sensibilis perspiratio parciior: nam in tali mictu copiosiore, qui fit in corporis  
quiete, & non post potum copiosiore, denotat omnem materiem generalem  
evacuari per renes. Sed si tantum id speciale, quod per alvum, & per cutim  
est educendum, evacuetur, alvus necessario debet esse sicciior, & perspiratio  
parciior, quum speciale parvam quantitatem exhibeat.

An Gani-  
tati con-  
ducatur mi-  
ctio noctu  
multa.


III. Qui ignorant, perspiratione maximam copiam humorum absumi, semper  
contenti sunt videre urinam copiosius evacuari, quum inde putent, corpus li-  
berari ab inutili humore, atque extollunt quoque alvum liquidiorum. Verum  
si consideremus hominem ceteroquin sanum, salubrius censendum alvum modice  
siccam habere, & urinam parciorem. Nam invenimus, si vires valeant, na-  
turam tunc illam massam liquidam communem pellere per insensibilem perspi-  
rationem. In corporibus autem debilioribus illa communis massa magis eva-  
cuatur per renes. Ergo in hoc casu urina parciior significat vires corporis va-  
lentes, & urina copiosior vires debiliores. In morbis autem hæc regula gene-  
ralis non semper locum habet, quoniam in morbis, quorum materia solum-  
modo per renes a communi massa sanguinis segregari potest, admodum condu-  
cit copiosiore reddere urinam. Si enim aliquis materiem purulentam habet  
in sanguine, frustra expectaret hujus evacuationem per sudorem, imo sudor  
copiosior in hujusmodi morbis damnatur, quum sit indicium colligationis.  
Exemplum habemus in empyematicis & phthisicis, in quibus sudor copiosior  
semper habetur inter mala signa, sed urina copiosior cum laetabili sedimento non  
raro liberat ab Empyemate. Sed morbi inflammatorii antequam in purulen-  
tiam abierunt, soliti sunt solutam illam materiem per sudorem eliminare, sed  
minus per urinam. Status valetudinaris ut plurimum præbet urinam copiosio-  
rem noctu, quum vires vitæ debiliores in hujusmodi hominibus non valent sa-  
tis largam facere perspirationem insensibilem. Quare concludere possumus mi-  
ctionem noctu multam non ita indicare morbum, sed vires debiliores: unde  
melius est ad designandam viam vitæ validam, ut noctu mictio sit parciior.

M E D I C I N A  
H I P P O C R A T I C A ,  
E X P O N E N S  
A P H O R I S M O R U M  
H I P P O C R A T I S  
L I B R U M Q U I N T U M .  
P R Æ F A T I O .

**P**ostquam Hippocrates in arte medica consumatus, tam ad levandam memoriam, quam ut posteritati quoque prodesset, meditabatur artem hanc longam concisis canonibus brevioris, & tutioris facere, jam senex operibus suis, quæ judicavit præcipua, collegit in hoc auxco Libro Aphorismorum: inde quaedam sententia ita coherentes inveniuntur, ut una explicet alteram, aliæ autem nullum omnino nexum servant, prout nempe pervolvendo sua propria opera sententiæ notatu dignæ occurrebant. Dum vero collegis hunc Librum Aphorismorum, videtur morbos mulierum pervolvisse, & ex libro illo hos Aphorismos desumisse: interim tamen quedam aliæ quoque intermixtæ inveniuntur sententiæ, quæ ipsi inter componendum occurrerunt. Quia vero hi morbi maximam partem ex cognita uteri structura sunt intelligendi, quæ non admodum nota fuit veteribus, qui magis in animalium quam hominum cadaveribus rimati sunt structuram, non est mirum me in hoc Libro magis quam in aliis recedere ab Hippocratis sententiâ. Hoc haud credo Lectorem male laturum, quia nostra Commentaria non sint conscripta ad Hippocratis laudes extollendas, qui per se satis dignus est, & laude non caret, sed ut cõservata Medica longo usu comprobata majoris essent utilitatis. Si ergo aliquid occurrit alienum hodiernis inventis, nisi monerem, male agerem, quum totus noster scopus sit ad majorem perfectionem erigere artem medicam. Quod facere non potuisssem, si jurare voluisssem in Auctoris verba. Hanc emendandi libertatem mihi tribui, quum etiam per longum tempus in eadem arte sim nutritus & exercitatus, multaque in praxi quotidiana vidi, unde valui judicare, num sententiæ prolata experimentis respondeant, vel ab iis recedant, quod tiro facere nequit, etiam si in omnibus partibus theoria sit consummatus, quum morbi ut plurimum aliquid habeant speciale, quod non ubique regulis theoreticis responderet.

## A P H O R . I . :

194. *C*onvulsio ex Helleboro, lethale.

I.  Nchoat Auditor hunc librum a morbo, qui nomen habet ex phænomeno in motu animali, qui motus in sanis hominibus solummodo fit ad nutum voluntatis, sed qui nunc fit ex causa morbosa: quoniam in sequentibus aphorismis repetit hunc morbum, qui Græcis vocatur *σπασμὸς*, nullibi convenientior est locus ad exponendum hujus morbi naturam, quam in hoc loco, quæmohrem primo videbimus, quale sit istud phænomenon; dein quomodo ab Helleboro generari possit; & denique cur pronuncietur lethale, si ab Helleboro Convulsio generetur.

Convulsio  
quid sit.

II. Musculi motus animalis seu voluntarii non moventur in perfectè sanis, nisi voluntate nostra (Conf. Aph. 51. III.) eum motum fieri influxu spirituum per nervos, ex physiologicis assumendum, quod nimis longum foret in hoc loco demonstrare. Ille fluxus spirituum per nervos in quiescentibus corporibus tantus non est, ut inde contrahatur musculus, sed si accedat voluntas mentis ducens majorem copiam spirituum, & majori impetu ad aliquos musculos, illi tunc contrahuntur, atque proportionate majore & minore potentia, ut est spirituum influxus. Quoniam videmus, tale quid fieri in sanis hominibus, non miramur videre, dum tamen mihi sit summum arcanum, mentem nostram posse concitare fluxum spirituum; miramur vero, partem aliquam convelli, quod intellectus est facilius, quoniam morbosa causa est materialis, quæ ad intellectum facilius contigitur, eam posse producere motum auctum spirituum per nervos. Si autem ex morbosa interna causa talis motus producat in musculo motus voluntarii, qualis in sanis fit per voluntatem nostram, idem ille motus vocatur Convulsio. Quare nullum aliud phænomenon in hoc morbo habemus, nisi talem motum, qualem observamus in sanis hominibus, qui ex voluntate movent muscolum, quoniam causa interna morbosa nostris sensibus non est potens. Interdum vero ille motus est violentior, quam qui ex voluntate fit, in quo casu judicamus, illum tunc motum ex morbosa causa fieri. Motus voluntarius in sanis est vel æternus vel constans per aliquod tempus durans, talis quoque habetur motus morbosus, qui vocatur *σπασμὸς*. Si autem ex morbosa causa fiat, istum motum distinguunt in Spasmus & Tetanum (Aph. 167. I.). Ergo phænomenon satis se manifestat, dum nempe sine vel contra voluntatem Musculi motus animalis vehementer trahuntur, istud phænomenon nomen morbi accipiens vocatur Spasmus, & Latinis Convulsio.

Quomodo  
Helleborus  
generat  
convulsio-  
nem?

III. Hippocratem in hoc Aphorismo intelligere Helleborum album (Aph. 123. I.) minime dubium est, quoniam veteribus erat in frequentissimo usu, non solum in morbis, sed etiam in sanis, si judicabant, ventriculum esse exonerandum: propterea multas adjecit cautelas; & quoniam vehemens istud Medicamentum sæpe multa damna intulit, de eo plures cautelas adjecit, quam de quovis alio: denique Helleborus si absolute scribitur, veteres semper intellexerunt Helleborum seu Veratrum album; sed si voluerunt alterum Helleborum, qui purgat, intelligere, semper scripserunt Helleborum vel Veratrum nigrum. Hoc nunc Veratrum quali modo induxit Convulsionem, quia supra (Aph. 126. III.) exposuimus, non erit opus repetere.

Cur con-  
vulsio ex  
helleboro,  
lethalis?

IV. Exiis, quæ hucusque & locis allegatis exposita sunt, facile colligitur, quare Convulsio ab Helleboro censeatur lethalis, id est admodum periculosa, ut non raro possit

post convulsionem talem homo moriatur. Nam constat, motum animale non pari convulsionem, nisi ex magna causa, ut in pueris, quorum motus animalis multo facilius turbatur. Verum Helleborus ingestus, vel primo sua rosione & irritatione tantum perturbat ventriculi motum vermicularem, ut etiam totus motus animalis in consensum trahatur, quod nunquam fit nisi a magna causa, & quoniam omnia signa causæ magnæ sunt signa periculossima, inde etiam Convulsio post Helleborum assumptum periculum portendit; præmissis quoniam vehemens ille motus non tollat irritantem causam, nam convulsio non eicit ex ventriculo Helleborum. Vel virulentia Hellebori venis absorpta & delata ad nervos, tandem motus voluntarii Convulsionem inducit in mortem delinentem; nam id acre neque actione cerebri subigi potest, neque inde pelli. Quamobrem recte observavit Hippocrates, Convulsiones ab hac causa lethales esse. Quod observatum hic fuit de Helleboro, id etiam applicari potest ad alia vomitoria vehementia & venena assumpta, ut inde fiat regula practica generalis.

## L I B. V. A P H. II.

195. **V**ulneri convulsio superveniens, lethale.

I. **Q**uemadmodum in præcedente aphorismo dixerat lethale, eodem modo hic intelligendum *Savonar*, non quod semper inferat mortem, sed frequentissime, id est perniciosum, exitiosum est, & propterea monet, Convulsionem in vulneribus non esse flocci pendendam, sed ex superveniente Convulsione summum periculum præfugiendum, & omnia statim pertentanda, quæ auxilium adferre possunt. Vulneris nomen hic late accipiendum, ut non solum indicet solutam unitatem in parte molli factam per instrumentum durum secans, verum etiam Contusionem validam & Puncturam, nam in omnibus his casibus Convulsio lethalis est. In præcedente Aphorismo notavi, Helleborum inducere Convulsionem per consensum vel delationem virulentæ ad nervos motus voluntarii, utrumque hoc in vulneribus admitti nequit, nam causa vulneris vel pars læsa semper manet in eodem loco: ergo Convulsio talis semper generatur per consensum. Quomodo autem vulnera Convulsionem inferant, non omnes idem sentiunt. Constat observatione Chirurgica, statim ab inscio vulnere vel punctura in membris exterioribus non produci Convulsiones, sed post aliquod tempus, aut si acre fuerit vulnere applicatum, quemadmodum observari in punctura tendinis in genu sub patella, ab indita turunda dura unguento basilico obducta hominem fuisse convulsam & periisse, sed in vulneribus vel contusionibus cranii cum meningum latione ut plurimum statim totus homo convellitur. Maxima pars medicorum in ea est sententia, quod quædam fibræ nervosæ faciant ut reliquæ fibræ nervosæ ejusdem nervi integræ manentes, nimis tensæ, primo dolorem, dein Convulsionem inferant. Sed quoniam vulnus latius plures fibras abscindit, & pauciores relinquit integras, quæ propterea magis tenderentur, vulnus tale majorem dolorem & vehementiorem convulsionem ex ratione inferre deberet, quam levis nervi punctura. Sed si consilium experientiam, contrarium invenimus semper, nam vulnera lata raro convulsiones inferunt, puncturæ autem sæpius. Quare convulsionis causa non facile deduci potest ab inæquali tractione fibrarum, quæ relinquuntur integræ, sed a simili causa, quæ valet irritando meninges prompte convulsionem inducere: & quoniam capsulæ nervorum Meningibus similes sunt, & forsan eandem, inde ab irritamento capsularum, quibus motis contenti canaliculi nervosi valide agitantur, videtur generari Convulsio, qualis irritatio frequentior est in punctura, quam vulnere. Quod autem irritatio meningum promptè inducat Con-

vulsionem, & irritatio capsula nervorum post aliquod tempus, inde oriri videtur, quod si meninges agitantur, statim propelluntur spiritus ex encephalo ad omnes musculos motus voluntarii, sed si capsula nervi irritatur, prius consentire debent meninges, antequam universalis Convulsio generari potest, qualis propagatio non ita statim fit post factam puncturam. Si autem illa punctura universalem Convulsionem fecit, signum est, causam esse magnam, quæ potuit totum stamen nervosum in consensum trahere, & quia Convulsio non tollit causam irritantem, inde recte pronuntiatur, lethale esse signum. Quod diximus de nervis, id etiam verum est de tendine, vel membrana, vel alia parte nervosa fauciata.

### L I B. V. A P H. III.

196. *Sanguine multo effuso, convulsio, aut singultus superveniens, malum.*

I. **Q**uoniam in superiore egerat Auctor de Convulsione ex Vulnere, ne aliquis judicaret, omnem Convulsionem generari ex Vulnere, quæ post vulnus oritur, hunc Aphorismum subnectere voluit, ut constaret, Hæmorrhagiam a vulnere natam sæpe causam esse Convulsionis: quare post vulnus si oriator Convulsio, perpendendum est, num ea nascatur ex Vulnere, an vero ex hæmorrhagia copiosiore, quoniam præservatoria curatio & ipsa prognos differunt. Nam si ex vulnere inducatur Convulsio, ad nervum vel tendinem fauciatum applicanda erant balsamica, & resinosa, & in graviore malo urendus vel abscondendus esset nervus: verum si hæmorrhagia inducat Convulsionem, ea est compescenda, & incassum esset priori modo moliri curationem Convulsionis, atque ipsa prognos differt, quæ enim Convulsio fit ex Vulnere, dicitur Lethalis, sed ex sanguine multo effuso tantum habetur mala, id est minus periculosa, quoniam non tam sæpe ex sanguine multo effuso moriuntur homines Convulsi, quam vulnerati & Convulsi. Quamvis hanc dicendi occasionem arripuit, non tamen hæc observatio ita est specialis, ut solummodo complectatur sanguinis fluxum per vulnus inductum, quoniam hæc observatio est generalis de omni sanguinis evacuatione copiosiore per quamcumque causam nata. Antequam dici potest, Convulsionem post largiorem sanguinis fluxum malam esse, videndum est, quali modo talis hæmorrhagia Convulsionem inducat. Hac de re multa & varia proferuntur sententiæ, nemo vero negat Convulsionem fieri post profusionem sanguinis, sed de modo, quo generatur, discrepant. Ne autem hæreamus in aliorum sententiis refutandis, nostram duntaxat proferemus. Ut motus vitalis Cordis & Arteriarum peragatur, non solum requiritur actio contrahens alterne, verum etiam alia dilatans, nempe liquor seu sanguis in cavis cordis & arteriarum, qui vasa implet & distendit, ut iterum contrahi possint. Major autem moles humorum movendorum, & eorum defectus ergo destruit æquilibrium, quod constitutum est inter causam moventem & quantitatem liquoris. Ex hoc destructo æquilibrium turbatur motus ille circulatorius, qui perturbatur quandoque motum animale in consensum trahit & turbat, seu generat Syncopen vel Convulsionem, qui Morbi sunt ex extincto motu animali vel nimis agente. Ita ex solo defectu & non semper ex mutata qualitate humorum, in qua fere omnes auctores quærunr Convulsionis causas, generatur Convulsio & Singultus. Quippe Singultus etiam est species Convulsionis, quæ præcipue agereditur Diaphragma, & inde per eandem causam generari potest singultus, qua producit Convulsio generalis. Cur autem de hac Convulsione tantum dicatur *malum*, dum tamen in prioribus dictum fuerit Lethalis, meretur attentionem. Si vero rimamur rationes datas, facile liquebit hæc differentia. In præcedentibus diximus, lethale esse, quoniam Convulsio non potuerit tollere irritamentum seu causam, vel eam expellere, verum Convulsionis ex destruc-

struſto æquilibrio in actionem vitalem & quantitatem humorum, per ſanguinem proſuſum, tollitur cauſa, nam ſi vaſa circulatoria ſuere inanita ſanguinis proſuſione, eadem vaſa iterum implentur ex cellulis, vaſiſque lymphaticis, & ita ſenſim ceſſat cauſa Convulſionem inducens: hinc ſolammodo dicitur malum; nam ſi tantum ſuppeditari nequit, quod tamen raro fit, moritur homo; unde quoque non poſſumus dicere, etiam Convulſionem carere omni periculo.

## L I B. V. A P H. IV.

197. *Purgationi immedica convulſio, aut ſingulus ſuperueniens, malum.*

I. **M**ulti Commentatores in ea ſunt ſententia, hunc Aphoriſmum intelligi poſſe ex iis, quæ dicta ſunt de Helleboro. Ego vero puto. Hippocratem magis in hoc loco reſpexiſſe ad alvi evacuationem, quam ad ſpecificam qualitatem medicamentum: quum in ſuperioribus ſatis egerit de Convulſione ex Helleboro (Aph. 194.) non erat opus ſtatim illam rem repetere, & ſi idem ſentiret in his duobus locis, non diſiſſet in priori *Lethale*, & in hoc Aphor. *Malum*. Videtur in his duobus aphoriſmīs ſimili modo agere, uti egit in Convulſione ex vulnere (Aph. 195.) & ex multo ſanguine effuſo (Aph. 196.). Alia enim erat ratio in Convulſione ex vulnere, alia vero ex ſanguinis proſuſione per vulnus. Idem etiam ſentiendum de purgantis acrimonia inducente Convulſionem, aliud iterum per evacuationem purgante induclam, ſi generetur Convulſio. Quare hoc loco videndum, quomodo Convulſio generetur ex Hypercarbafis, nullo habito reſpectu virulentia purgantis. Quædam videtur diſſerentia in alvi & ſanguinis evacuatione, hæc enim evacuat bonum humorem, illa vero excrementa, ut putant: ſed ſi rem penitus perpendamus, non tam magna erit diſſerentia: quoniam in utriſque magna demitur quantitas, & ita deſectum humorum ſi deſtruitur æquilibrium, convulſio generari poſſeſt. Qui vero putant, in copioſiore alvi egeſtione evacuari ſola excrementa, a veritate longe abſunt, quoniam in tali evacuatione ſimul deponuntur illi boni humores, qui naturaliter in inteſtinorum cavitatem conſuunt ad alimentorum ingeſtorum præparationem. Quare concludere poſſumus, ex alvi egeſtione tam per evacuationem generalem, quam boni humoris, generari poſſe Convulſionem. Talis autem evacuatio faciens Convulſionem dicitur *mala*, & non *lethalis* ex eadem ratione, quam dedimus de ſanguine multo effuſo. Nam virulentia purgantis inferens Convulſionem, dicitur *lethale*, ſed per evacuationem copioſam nata Convulſio dicitur *mala*, quoniam ille deſectus ſæpe ſuppletur.

## L I B. V. A P H. V.

198. *Si quis ebrius ex improviſo mutus fiat, convulſus moritur, niſi febris correptus, aut ubi ad horam, qua crapula ſolvuntur, pervenit, locus fuerit.*

I. **C**auſæ & ſigna Ebrietatis etiam ſi cuius notiffima ſint, nonnulli tamen exiſtimarunt, eam corporis & animæ mutationem ſoli vino eſſe adſcribendam: ſed ſi conſulimus experientiam, omnia principia in vino non habent inebriandi potentiam, ſed ſolum ſpirituolum inſtammabile hanc virtutem poſſidet: vinum enim deſtillando privatum ſpiritu non inebriat, ſed Spiritus ita ſeparatus ingeſtus ebrietatem inducit. Si examinemus chemice vini generationem, quod nimis longum foret in hoc loco experimentis adſtruere, comperimus, oleum vegetabile attenuatum fermentatione, ut inde fiat liquor totus volatilis & flammam alens, hunc eſſe ſpiritum inebriantem, qui aliis vini adhuc principiis miſtus, per novam fermenta-

Ex qua cauſa ebrius de repente mutus fiat.

tionem in acetum conversus, priorem omnem naturam exiit, & non amplius inebriat, neque flammam alit, neque tunc destillando a ceteris principiis vini separari potest ut prius. Hoc oleum vegetabile fermentatione solutum, mutatum & volatile factum, majore copia ingestum perturbat hominis motum animale; sensum internum & externum, quæ mutatio si modum excedat, vocatur Ebrietas. Omnis ergo spiritus fermentatus majore copia ingestus est ebrietatis causa. Quoniam succus uvarum frequentissime fermentando convertitur in vinum, multi putarunt, inebriandi virtutem in solo vino latitare: verum uti uvarum succus, ita etiam reliquorum fructuum succulentorum succi fermentati præbent similem spiritum. Et quod multi magis mirantur, saccharum, & mel aqua dilutum, & dein fermentatum tale vinum quoque præbet: ut & decocta ex frumentaceis seminibus, atque farinæ dilutæ aqua fermentando in fere similem speciem vini convertuntur, quod hodie vocatur Cerevisia, nam ex his omnibus destillando comparatur spiritus ardens. Quare multi decepti, nescientes, cuncta hæc fermentando præbere spiritum inebriantem, mirantur inebriari posse sine vini potu. Sed in his omnibus oleum vegetabile fermentatione mutatum in spiritum inflammabilem, si assumitur, producit ebrietatem. Parva autem hujus vini vel spiritus quantitas non infert Ebrietatem, sed corporis incalescentiam, sed si major ejus ingeritur copia. Nisi constanti observatione compertum esset, nimio usu hujus spirituosi vacillare motum animale, sensum & ratiocinium perturbari, nemo ex cognita natura spiritus fermentati valeret talem effectum prælagire. Hinc post inventionem hanc multi rimati sunt modum, quo spiritus fermentati inferant ebrietatem; quidam hoc deducunt ex levitate, qua caput petunt; alii ex contractione fibrillarum nervosarum; alii iterum ex coagulatione spirituum. Sed si hoc siue illo modo operentur, effectus tamen est certus, & paucissimi sunt, qui multitudinem spiritus fermentati tandem non obruuntur. Plus facit ad cognitionem medicam observare, hunc spiritum in excrementis hominum non inveniri, qui satis copiose bibunt: quare constat, hoc spirituosum subigi actione vitæ, & ita extingui, ut ne vestigium sui relinquat; quod etiam comperimus, si convertatur vinum in acetum, nam spirituosum non exhalat, sed commutatur. Hæc observatio docet, hominem vino obrutum tunc liberari ab ebrietate, si actione vitæ extinctum fuerit spirituosum; sed si spirituosorum copia est tanta, ut obruat actiones vitæ, perit homo plerumque apoplecticus. Quum vero actiones vitæ vocem formantes opprimuntur, ut ebrius reddatur ex improvise mutus, telis status non multum distat ab apoplexia: nam spiritus ardens exstinguens fluxum spirituum animalium per nervos musculos laryngis & linguæ, aphoniam facit; sed eadem causa major inducit apoplexiam.

Quanto  
talis con-  
vulsus  
moritur.

II. Si ratiocinando prælagirem mortem ex Aphonia in ebrio, nunquam indicarem, talem ægrum dein Convulsione periturum, quoniam aphonia magis convenit apoplexiæ, quam convulsioni; sed quoniam in Græcia admodum valuit bibendi consuetudo, noster Auctor hanc sententiam non posuit sine multiplici experientia. Quia vero Aphonia æque generari potest a convulsis musculis laryngis, quam ab eorum paralyti, verisimile mihi videtur, de repente natam aphoniam provenisse ex convulsione horum musculorum, cujus causa si augetur generatur perfecta Convulsio. Quæ persistens, simul impedit motum circulatorium, atque ita interficit. Non est opus ut statim subsequatur post aphoniam in ebrio Convulsio, nam in fine hujus habetur etiam, quod Convulsio non sit expectanda, eo tempore, quo solet solvi Crapula, ergo si quis post tam longum tempus non loquatur, tunc tandem convulsus moritur.

Febris fol-  
vit apho-  
niam ex  
ebrietate  
natam.

III. Monuimus, actione vitæ tandem extingui & discuti spiritum fermentatum, si ergo vis vitæ langueat, diu durare debet, antequam ille spiritus sit subactus: sed vires vitæ insignitæ multo citius extinguunt fermentatos spiritus: ex hac ratione ob-

fer-



servatur, quod qui refrigerantur ex vini potu, multo magis periclitantur, quam quorum corpora incalescunt, quoniam frigus indicat, vires vitæ succumbere, sed calor notat instigatas esse vires, quare in his multo major est spes subigi posse spirituosum. Febris in hoc loco indicat calorem majorem cum pulsu aucto, & sudore rorido in corpore, est ergo indicium spirituosum fermentatum in corpore magis subigi, quam si corpus maneret frigidum & tepidum. In tali autem corpore ebrio, quod ex improvisa corripiebatur aphoniam, tanta erat spirituum inebriantium abundantia, ut superaretur actio musculorum voci famulantium: nisi ergo accedens motus vitalis reddatur major hunc spiritum subigens & depellens, non caret illa oppressio periculo, nam si paulo magis augatur causa opprimens, æger convulsus morietur. Hæc observatio actionis naturæ egregiam regulam curationis suggerit: monemur enim in hoc casu, nos debere calefacere istud corpus per actum calidam & aromaticam calefacientiam, minime spirituosam, vel vinosam, sed quæ calefaciant sine inebriandi virtute.

IV. Quamdiu igitur durat aphoniam sine febre in ebrio, versamur in ancipiti, num manebit talis homo superstes, num vero exstinguetur superveniente convulsione: scimus enim in tali corpore adesse spirituosum calefaciens in magna copia, quod sua virtute, modo valeant vires vitæ, faciet stimulo majorem calorem seu febrem, verum eam febrem non invenio, ergo mihi indicium est, vires vitæ obrutas esse multitudine vini. Si ergo expectamus per duodecim horas, vel viginti quatuor, quo tempore crapula solvi solet, & tamen vires vitæ non facere majorem motum, & permanere aphoniam, periculum est, ne ex tam diu persistente causa tandem obruatur ebrius: sed si tunc demum ebrius loqui incipiat, ipsa loquela etiam si nihil faciat ad subigendum vinum, periculum detrahet, non ut causa, sed ut signum, quoniam loquela rediens notat, opprimentem causam esse minutam, & inde valentibus sensim magis corporis viribus totum vinum subigetur. Etiam si talis homo maneat superstes, non semper redibit ad perfectam sanitatem, non raro invenimus ex tali vesana & abominabili potatione relinqui alicujus partis paralytin, vel delirium diu durans, ita enim cerebrum spiritu fermentato obrutum, mutatur sæpe in sua functione, ut ablato vel subacto spirituoso ad officium suum redire nequeat. Hoc si quis perenderet, is nunquam Bacchum delirantem & furentem tot laudibus celebraret.

Loquela tempore crapulae solvit aphoniam ebriitate.

L I B. V. A P H. VI.

199. *Qui a tetano corripuntur, in quatuor diebus pereunt. Si vero hos effugerint, sani fiunt.*

I. Si omnibus medicis constaret, quænam phaenomena conjuncta facerent Tetanum, non esset opus hunc morbum circumscribere: sed multi Tetanum faciunt Convulsionis speciem, & inde generari potuisset confusio in morbi cognitione. Noster Auctor in libro de Internis Affectionibus H. b. 266. tres species Tetani proponit; primam speciem ita graphice depingit. *Maxille conglutinantur, & rigent & os aperire non potest: & oculi lacrymantur, & contrahuntur, & dorsum conglutinatum riget, & curva stellere nequit, neque manus, neque spinam. Quum autem letalis fuerit, potum & cibos, quos prius acceperis, aliquando per naves reddit.* Ex quibus apparitionibus concludendum est, omnes musculos motus voluntarii valde contractos esse, & in tali contractione diu persistere, & inde a reliquis convulsionibus (App. 167. 1.) facile distinguitur hic morbus, qui a Celso vocatur Rigor, quoniam totum corpus riget, ita ut neque ab ægro neque ab alio facile flecti possit.

Tetanus qualis morbus.

II. Omnes musculi motus voluntarii si laxi sunt vel alterne moventur, permittunt sanguinis fluxum ex arteriis istis in venas, quæ per istum musculum decurrunt;

An Tetanus corripi in quatuor diebus pereunt?

zunt; sed si validissime contractus est musculus, minus libere continuari potest illa circulatio: atque in validissime contracto musculo omnino sistitur, quoniam arteriæ & venæ in ventre musculi decurrentes tam valide comprimuntur a contracto & indurato musculo, ut dilatari non possint per impletem causam. Quotigitur validius est contractus musculus, eo magis sistitur sanguinis transfusus. Si ergo in Tetano omnes musculi motus voluntarii valide & constanter manent contracti, magna pars circulationis est intercepta, & solummodo peragi potest per vasa, quæ non decurrunt per corpora musculorum. Atque ut maneat illa perpetua restrictio, ex causa morbosa perpetuo ducendi sunt spiritus motus animalis ad istos omnes motus voluntarii musculos; unde magna generatur spirituum consumptio, ut patet in iis, qui ex voluntate aliquem musculum diu retinent contractum, sentiant enim musculum illum maxime esse fatigatum & debilitatum. Hi bini effectus diu persistere nequeunt, ut permaneat illa impedita per omnes partes circulatio, atque magna consumptio spirituum, quin extingatur vita. Quare pronuntiare possumus Tetanum validum brevi tempore mortem inferre. Si autem minus valde contracti sint musculi, non omnino sistitur circulatio sanguinis per musculos istos, & non fit tanta spirituum consumptio, quare idem morbus sed specie levior ad plures dies continuari potest, ut a nobis & aliis practicis observatum fuit, hominem ultra quatuor dies laborantem Tetano tamen fuisse servatum. Verisimile ergo mihi videtur, Hippocratem observasse hos homines plerumque ante quartum diem perisse, & inde hanc observationem nimis generalem nobis reliquisse.

an Tetanici quartum diem effugientes servantur?

III. Ex iis, quæ supra disputavimus, colligi potest, quod Tetanus ultra quatuor dies persistens non sit gravissima species: sed an propterea æger post quartum diem sit incolumis, valde dubito, nam omnis causa Tetanum inducens quarto die non finitur, & experientia etiam constat, homines tales etiam post septimum diem perisse, quod si Tetanus esset morbus semper ex eadem causa dependens, terminus temporis facilius potuisset limitari, sed quoniam est morbus ex varia causa natus, aliquid certi de tempore limitari nequit.

## L I B. V. A P H. VII.

200. **Q**uibus Epilepsia ante pubertatem contingens, mutationem habent. Quibus vero accidunt viginti quinque annis natis, his plerumque commoritur.

I. **T**otus hic Aphorismus ex superiore explicatione (*Aph.* 70.) intelligi potest, quare non opus est eandem rem repetere.

## L I B. V. A P H. VIII.

201. **Q**ui pleuritici facti non repurgantur sperne in quatuordecim diebus, his in empyema convertitur.

Pleuritidis mutatio.

I. **H**oc in loco intelligi Pleuritidem veram superius a nobis descriptam (*Aph.* 199., IV.) non est opus probare, nam si sine discrimine omnis species Pleuritidis intelligeretur, certus temporis terminus non posset defini: neque omnes species etiam diutius quam quatuordecim dies durarent non producerent Empyema, ut sæpe observavimus in pleuritide ex materia tenui acri catarrhosa: quare in hoc loco intelligenda est vera Inflammatoria Pleuritis. Hæc Pleuritidis varios habet exitus, quoniam sequitur naturalem generalis Inflammationis mutationem. (1) In resolutionem. (2) Evacuationem criticam per sputum, vel

vel urinam. (3) Mutationem in purulentiam, quod pus collectum vel colligitur in sacco formato in pleura, vel funditur in pectoris cavum, vel traditur sanguini circulanti, aut id demum deponitur ad partem aliquam, ut fiat metastasis. (4) Abit in putrilaginem, vel tenacem, vel tenuem, ichorosum. (5) Denique transit in sphacelum. (6) Auctores addunt commutationem in scirrhum, vel cancerum, quam fateor mutationem non licuit mihi videre in tota praxi, an alii viderint, vehementer dubito.

II. His temporibus per Empyema semper intelligitur puris collectio in cavo pectoris, sed apud Hippocratem passim indicat suppurationem, seu puris generationem in quocunque loco, vel viscere; hoc autem in loco mallem frequentissimam significationem admittere, nempe puris collectionem in cavo pectoris; vel in sinu facto a membrana pleura aliquo modo recedente a costis; seu in parte cellulosa pleurae.

Empyema  
quid si-  
gnificat?

III. Ut Pleuritis transeat in Empyema seu purulentiam, necesse est, ut Latetis dolor, unde derivatur nomen, proveniat a morbo tali, qui in purulentiam commutari potest: inter causas dolorem pectoris inferentes Inflammatio est, quae commutatur in suppurationem. Haec autem Inflammatio non semper convertitur in purulentiam, ut supra indicavimus: ergo adeste debent signa suppurationis indicantia. Sufficiens signum est, si inflammatio duravit per quatuordecim dies, nam non novimus, inflammationem diutius perstitisse sine conversione in purulentiam, & plerumque quarto, vel septimo die incipit formare pus. Si ergo Pleuritidis inflammatoriae signa permaneant ad quatuordecim dies, certi sumus, pus esse collectum. Si vero interea temporis commutata materia inflammatoria in materiem purulentam conversa non repurgatur, necesse est, ut maneat in corpore; quoniam materia purulenta nunquam invisibiliter exit. An vero in hoc loco sola purgatio superne, id est per sputum, intelligatur, ut multi contendunt, non ita plane constat, quoniam pleuritici non raro liberantur per urinam sedimentosam. Neque Hippocratis sententia probari potest, hic intelligi purgationem per sputum, quoniam ~~etiam~~ <sup>etiam</sup> generaliter notat expurgo, & perpurgo, sed interdum sumitur pro purgo sursum. Sed quando ex constantia inflammationis apparet, Inflammationis mutationem fuisse factam in purulentiam, & non deteximus intra quatuordecim dies, vel in urina vel sputo, materiem purulentam fuisse evacuata, certi esse possumus, hoc in corpore collectum esse pus, seu empyema. Et quoniam post inflammationem pleurae pus istud collectum frequentissime deponitur in cavum pectoris; non erit sine ratione ex tali perdurante pleuritide praesagire Empyema pectoris, quamvis quoque alia inde potuisset fieri suppuratio, ut in sequentibus locis data occasione sumus demonstraturi.

Quam pleu-  
ritides, &  
quando  
conver-  
tuntur in  
Empyema?

## L I B. V. A P H. IX.

202. **T**Abes maxime fit aetatibus ab anno octavo decimo usque ad quintum trigesimum.

I. **P**ost praedictionem Empyematis statim subiungit praedictionem Phthisis, quasi innuere veller, si quis laboravit pleuritide, & non expurgatur intra quatuordecim dies, is saepe incidit in Phthisin; & ita intelligit Phthisin purulentam (Aph. 89. III.). Sed ut sententiam magis universalem faciat, phthisin ponit absolutam purulentam, sive fiat ex pleuritide, peripneumonia, vel sanguinis sputo natam, atque observavit, eam phthisis speciem accidere frequentius intra XVIII. & XXXV. aetatis annum. Hoc tempus subdividitur in tempus Adolescentiae (Aph. 106. I.) quod hic limitari potest intra XVIII. & XXV. Tempus autem aetatis intra XXV. & XXXVIII., tempus Juventutis (Aph. 64., I. & Aph. 108. I.)

Quanam  
aetate fit  
phthisis?

appellari potest. Hoc nunc tempore ætatis, nempe Adolescenciæ, & Juventutis observavit frequentius fieri Phthisin, quam in ætatibus reliquis, quod etiam his temporibus constante observatione practica confirmatur. Qualisnam vera sit constitutio in hac ætate, quæ disponit ad phthisin producendam, non consentiunt Auctores: magna pars derivat hunc morbum ex intemperantia, quæ in hac ætate præprimis viget; sed etiam in temperate viventibus juvenibus non raro oritur Phthisis frequentior quam in quavis alia ætate; unde in juvenili corpore quadam naturalis esse debeat causa corpus disponens ad suscipiendam phthisin. Ea dispositio cuique satis patere potest, si modo rimatur naturalem mutationem incrementi corporis, & augmentum virium. Quamdiu enim crescunt corpora mole, ejus quoque crescunt virtutes agentes, & magis, quam increfcit moles; nam vires juvenum habito respectu corporis sunt majores quam in pueris: ut si juvenis non acquirit molem corporis majorem quam alter puer, corporis tamen vires præcellant. Si ergo corpus nostrum ita tam in mole quam in viribus increvit, circa XVIII. ætatis annum, non amplius multum increfcit corporis moles, sed tamen ulterius augentur vires. Inde ita augentur corporis vires, ut potentia coherendi in partibus mollioribus vix sufficiat hanc sustentare actionem: in puellis tunc sanguine menstruuo effuso, hæ vires refrænantur; sed in juvenibus incrementum a levissima causa incidit in inflammationes, febres ardentes, hæmorrhagias varias, atque sanguinis sputum. Hi morbi in juvenibus nati non raro terminantur in purulentiam, quæ sæpe afficit pulmones, quoniam pulmo etiam si non fuerit affectus, a pure tamen transmissio facile ulcus contrahere potest, quod phthisin inducit, & quoniam hæmoptysis juvenibus est morbus frequentissimus, quæ plerumque terminatur in pulmonis ulcus, non est mirum, quod hac in ætate frequentior quam in quavis alia producat phthisis. Si nunc his causis naturalibus accedat intemperantia, spirituum abusus, in quo juvenes magnam sibi quærunt gloriam, se plus quam adultos bibere posse, & pergræcari, eo frequentior fit in hujusmodi juvenibus Phthisis. Etiam quotidiana exempla sunt obvia, vix tamen Adolescentes, & Juvenes persuaderi possunt, ut temperate vivant, sed moniti non raro avidissime hunc morbum sibi accersunt. Ex hac observatione etiam intelligitur, quamobrem Phthisin in ea ætate multo periculosiorem pronunciant, cum natura prona ad morbum producendum semper curatu difficiliorem morbum producat. Observavi etiam in praxi, adultiores phthisi pulmonali purulenta laborantes, me facilius curare posse, sed in juvenibus raro curationem obtinere potui.

## L I B. V. A P H. X.

203. *Qui anginam effugiunt, iis in pulmonem vertitur, & intra dies septem intereunt, quos si evaserint, suppurati fiunt.*

*Genus.*

I. *Statuit in hoc Aph. Auctor, fieri posse translationem materiæ morbi ex faucibus ad pulmones, quæ translatio si fiat, observavit, tales ægros ut plurimum periisse intra septem dies; quod si vero intra istud tempus non perierint, incidebant deinceps in Empyema.*

*Ex angina  
peripneumonia  
quomodo?*

II. *Dux sunt species anginæ faucibus infestæ: una quæ præcipue corripit Laryngem, quam vocant Cynanchem; altera quæ afficit Pharyngem, hanc vocant Synanchem: sed si etiam signa inflammationis appareant exterie in collo, vocatur vel Paracynanche, vel Parasyanche, prout simul Larynx, vel Pharynx sit affecta, sed prout Respiratio, vel Deglutitio magis sit impedita. In textu est *κρυδύχην*, ergo intelligit Auctor eam anginæ speciem, quæ Laryngi est infesta, & suffocantem respirationem inducit, & quoniam illa species non præbet signa externa,*

na, scimus internam Laryngis membranam affectam esse. Illā membrana jam inflammatione tumens raro ad septimum diem extenditur, quin ita faciat angustum transitum, ut æger suffocatus pereat, vidi, hujusmodi homines periisse intra duos tresve dies. Quia vero inflammatio ad septimum usque diem incrementum solet, & dein commutari in suppurationem, inde plerumque inflammatione interna membrana Laryngis suffocationem induxit, antequam ad suppurationem deducta sit. Si autem levior fuit inflammatio, & minor tumor, quam qui potuit inducere suffocationem, illa post istud tempus formabit pus, quod sua gravitate deorsum descendens implet Tracheam arteriam, & Bronchia, ubi stagnando collectum generat pulmonis suppurationem. Sed si inchoata angina talis sensim etiam pergit continuatam membranam Tracheæ, & Bronchiorum inflammare, inducit peripneumoniam, quæ interimit.

III. Suppurati sunt homines, qui vel in pulmonibus, vel in cavo pectoris colligunt pus: tales suppurationes præagiuntur ex Angina prægressa, quæ abiit sine ratione, id est sine critica evacuatione; nam quæ angina emittit sputa copiosa cocta, non transfertur in peripneumoniam, sed quæ evanescit sine evacuatione hac, & tamen ægri manserunt ultra septem dies superstites cum signis, materiem translatam esse ad pulmones. Hoc tam evidens est in praxi, quam quidquid certissimum: constitit enim, in Larynge adfuisse Inflammationem, eam suam materiem purulentam confectam non evacuasse, acceperunt signa, hanc materiem fuisse depositam per tracheam in pulmones, nam successit peripneumonia hoc declarans; nunc est præterlapsum tempus inflammationis post septimum diem, ergo facile conjici potest, eam materiem jam esse collectam in bronchiis, vesiculis pulmonalibus, vel in cavo pectoris. Ita habemus egregiam prognosin instantis suppurationis seu Empyematis, ne decipiamur judicantes, ægrum esse sanatum, quia effugit anginam. Præstantius autem foret hoc instans malum evitare per optimam medendi methodum. Si vocamur in tali periculosa angina, omni ope tentanda est Inflammationis resolutio per repetitam venæ sectionem, si unice non auscultat, alvus ducenda antiphlogisticis, collum fovendum cataplasmate, fauces colluendæ diluentibus cum adjecto nitro; & vapores aquosi sæpe hauriendi, qui usque in pulmones penetrant. Sed si his omnibus ante septimum diem non auscultat malum, reliquum tempus morbi, ut peripneumonia suppuratoria, vel Empyema pertractandum, ut pus confectum per expectorationem ejiciatur.

Quinam ex Angina, post septimum diem sunt suppurati?

## LIB. V. APH. XI.

204. **I**N tabe vexatis, si sputum quod tussi rejiciunt, carbonibus insusum gravem odorem emittat, & capilli e capite defluant, lethale est.

I. **P**ostquam ex angina erat natum Empyema, pus in pulmone collectum sæpe contrahit pulmonis ulcus, ex quo tandem formatur Tabes: voluit nunc Auctor duo recitare signa in tali Tabæ, quæ periculosissimum statum declarant, nempe profert sputum carbonibus injectum olens, & capillorum defluivum. Sed ne aliquis judicaret, hæc signa duntaxat præagere malum in tabe post recensitam anginam nata, omisit textum priorem, & ita nobis reliquit generalem prognosin in omni vera tabe purulenta ex ulcere pulmonis.

II. Sputa duobus præprimis ex locis proveniunt. Primo ex tota membrana pituitaria & faucibus, hæc excreta solent reddi, tali enim actione sputum seu mucus tenax adhaerens his partibus avellitur, & ita rejicitur. Vel veniunt sputa ex Larynge, trachea arteria, & pulmonibus, hæc ejiciuntur iterata tussi, quæ hæc partes olens.

Quid notat sputum carbonibus insusum?

res agitantur & aer cum impetu emittitur, qui simul educit sputum lateribus harum partium adhærens. Quoniam Auctor addit *quod tussi rejiciunt*, hoc in loco intelligi debet Sputum, quod ex pulmonibus venit. De hoc Sputo dicit, si gravem odorem emittat carbonibus infusum. Ergo non est opus, ut sputa sint foetentia, nisi injecta carbonibus seu prunis candentibus, ut multi existimarunt, qui ad hæc verba exponunt sputa foetentia. Verum nostri Auctoris sententia est, elicere indicia ex sputo non foetente, quod prunis injectum foetorem spirat. Multa commentati sunt de hoc signo, quæ non merentur recenseri. Simplex hoc experimentum magni est usus, si modo sciamus, quinam humores nostri inodores prunis injecti foetorem spirant, & qui inodores manent. Invenimus humores ex pituitaria membrana & trachea secretos in ignem projectos nullum spirare foetorem, sed si sanguis, humor nutritius, & pus infunditur prunis, tunc semper exhalat foetor, etiam si aliter sint humores inodores. Ergo ex hoc experimento constat, vel humorem bonum circulatorium, vel pus tussiendo ejici. Quod experimentum non multum distat ab eo, quod cum sputo in aqua dejecto instituitur: nam excrementitii humores aqua sunt leviores, & inde supernant: humores autem circulatorii, & pus aqua sunt graviore, & fundum petunt.

Capillorum desuvium quid no-

III. Capillos ex suis bulbis, in vel sub cute in tunica cellulosa hærentibus excrescere, res notissima est Anatomicis; atque pilos formari ex humore crescente, ut Bombyx format sericum, Physiologi demonstrant. Sic nati capilli ex cute cranii sensim magis excrescunt, & glutinositate gumorum cutis poris infixi hærent. Si vero hi humores glutinosi exarescunt, uti in multis morbis cutaneis, capilli extenuati desuunt; aut humores hi glutinosi putredine soluti non amplius infixos retinent capillos. Inde in morbis putridis fere semper capilli decidunt, postea repascendi. Adeo ut capillorum desuvium causa querenda sit vel in ipsa cute, vel in generali humorum massa, quæ aliquam contraxit putredinem.

Cur sputum oleum & capillorum desuvium tabidis lethale?

IV. Hoc in loco intelligi Phthisin veram purulentam (*Aph. 89. III.*) nemo dubitare potest, quoniam ponitur sequi post anginam inflammatoriam in empyema conversam. Sed Phthisis illa debet esse confirmata, quoniam dicit in Phthisi vexatis, quæ phrasis apud Hipp. semper significat morbum aliquamdiu durasse. In tali Phthisi confirmata si sputum carbonibus infusum gravem odorem spirat, scimus pulmones consumi ulcere: hoc unum signum non sufficit ad pronunciandum signum lethale, nam si reliqui humores manent sani, non raro evadunt: propterea aliud signum adesse debebat, indicans circulatorios humores quoque infestos esse. Inter ea signa ab Auctore recensetur Capillorum desuvium, quod in phthisicis non oritur ex vitio cutis cranii, sed ex corrupto humore totius corporis. Inde post morbos quoque graviore toties capilli desuunt & capite. Hoc autem signum solum non sufficit ad lethaliorem pronunciandam, sed si jungitur cum signo certo corrupti pulmonis, tunc utraque hæc juncta lethaliorem inferunt.

## L I B. V. A P H. XII.

205. *Quibus sabb laborantibus capilli de capite desuunt, hi alvi fluxu superveniente, moriuntur.*

I. **N** præcedente Aph. lethale pronunciavit signum in Phthisi vexatis ex sputo & capillorum desuvio, ita ut talis tamen homo aliquamdiu vivere potuisset: nunc vero vult mortem magis instantem præfigire in phthisicis ex Alvi fluxu superveniente, id est non concitato aliquo medicamento, nam tunc non est signum latentis mali, verum malum inductum evacuatione sola. Notavimus in præcedente, Capillorum desuvium in phthisicis indicare, materiem corruptam disper-

spem esse per totam massam, & ita corruptam esse materiem nutritiam, atque extinctam naturalem humorum glutinositatem, ut exarescentes capilli excident. His nunc si superveniat Alvi fluxus, moriuntur tales ægri brevi tempore. Quod sit vel ex designata causa, vel quia alvi fluxus tantum mali inducat, vel ab utrisque simul, quod crederem. Sponte si veniat Alvi fluxus in humorum defectu, semper est mali ominis, talis enim nunquam fit in tali casu, nisi ex humorum colliqutione, seu nimia solutione morboſa, cum summa debilitate virium, qua humores non amplius in corpore contineri queunt: Diarrhœa autem in abundantia, ab irritata natura concitata, sæpe multum levaminis adfert. Ergo solummodo demonstrandum esset, in Phthisi confirmata humorum esse defectum, quod putam tam clare constare, ut nullus dubitare possit; phthysicorum enim corpora ita sunt emaciata & humoribus privata, ut nullus sit morbus, in quante mortem minor invenitur humiditas, quam in Tabidis. Ergo in his signum est summæ corruptionis, & eliquationis: verum tali in statu aliquamdiu persistere posset, si non accederet copiosa evacuatio, quæ quod restat brevi tempore tollit, uti est Diarrhœa. Hæc enim brevi tempore residuum in corpore humorem brevi tempore tollit, supprimit sputa excreanda, corruptum purulentum ducit ad alvum, novum nutrimentum detrahit; propterea brevi tempore mortem inducit. Ex hac observatione satis constat, quam perverse multi dant medicamenta purgantia in Phthysicis, quum ipsa natura doceat, alvi evacuationem, ut signum & causam nocere: experti enim sunt prædici, a purgante dato supprimi sputum, & sialvum referaveris, non esse in medici potestate eam iterum supprimere posse.

L I B. V. A P H. XIII.

206. *Qui sanguinem spumofum expuunt, bis ex pulmone talis rejectio fit.*

I. **N**on constat inter Commentatores, quale sit id phænomenon, quod vocamus sanguinem expuere, & propterea certum signum esse nequit alicujus latentis mali, vel partis læsæ: scopus enim auctoris nostri est docere per phænomenon sanguinem provenire ex pulmonibus, si ergo non constat inter Commentatores, quale istud phænomenon sit, incertus quoque manet locus. Possimus expuere sanguinem confluentem ex tota membrana pituitaria in fauces; vel qui manat ex ipsis faucibus & oris cavitate; vel qui in ventriculum confluit & vomitu redditur; vel denique qui stillat in trachœam arteriam & bronchia, atque dein tussiendo sursum elicitur, & ita expuitur. Ad ambiguitatem evitandam si diceretur pro Expuere, Extussire, quod quoque alii observarunt, firmior esset sententia, & minus obscura. Hippocratem in hoc loco intellexisse sanguinis rejectionem tussiendo emissi, nullus dubito. Nam si excreatum vel vomitum intelligeret, talis tunc rejectio non significaret, eum sanguinem provenire ex pulmonibus: verum quidquid tussiendo ejicitur, sive sit sanguis, sive pus, sive sputum, id omne ex pulmonibus venit; quum vomitus sit actio exonerans ventriculum, scretans purgans fauces; sed Tussis liberans pulmones ab inhærente humore.

Quid notet sanguinem expuere,

II. Ut magis certum esset signum, rejectum sanguinem venire ex pulmonibus, adjecit *Spumofum*. Hoc quoque his temporibus invenitur verum, si quis tussiendo reddat sanguinem spumofum, ille ex pulmonibus sanguinem rejicit. Quæ autem sit ratio, admodum disceptant: multi sunt statuantes, ebullientem sanguinem profilire, alii autem ipsum sanguinem efferverescere in pulmonum vasis. Sed si consulamus experimenta in animalibus viventibus, quæ demonstrant, nihil spumosi aerei contineri in sanguine arteriæ & venæ pulmonalis, evincimur credere, spumam eam non esse in sanguine vasis suis contento, verum postea sanguinem in pul-

Sanguis spumofus cur ex pulmonibus?

pulmones & bronchia effusum, spumofum fieri. Quod autem ille sanguis magis quam quivis alius spumescat, non desunt rationes seu causæ. Pulmo enim est istud primum in nobis organum, quod actione sua conciliat sanguini concrescibilem naturam, quare tota massa sanguinis, quæ transit per pulmones, magis concrescibilis est, quam quæ per venam cavam adducitur. Liene contra videtur, hanc potentiam concrescendi in sanguine extinguere, ne tardo illo motu in vena portarum concrederet, & quia forsitan talis natura sanguinis requiritur, ut aprus sit ad bilis secretionem. Illa major tenacitas in sanguine pulmonis facit etiam, ut si bulla aeris in eo recepta sit, non tam facile separari possit, quemadmodum invenimus puram aquam conqussatam vix per momentum continere bullulas aeris, sed si sapo aut glutinosum aquæ adjunctum sit, bullulæ diutissime remanent. Hoc etiam in urina ægotantium observatur verum, quo plus saponacei vel glutinosi, eo diutius conservat ex conqussatione factas bullulas. Altera quæ accedit causa majoris est momenti, nempe continuus introitus & exitus aeris singulis respirationibus, quæ actione aer trajectus toties per exstillantem sanguinem, totam illam sanguinis massam in spumam fere convertit. Quoniam hæc binæ causæ ita cooperantes non inveniuntur ita alibi agere, ubi exstillat sanguis, talis spumans sanguis potest esse certissimum criterium, eum ex pulmonibus venire. Hoc egregium est ad prædictionem formandam ex sanguinis spuro, qui ex faucibus præfluat, quum amplitudo faucium non faciat ita fieri sanguinem spumofum, & quoniam ille sanguis non venit ex arteria vel vena pulmonali, sed ex vena cava vel arteria aorta, ut alibi in corpore.

## L I B. V. A P H. XIV.

207. **A** Tabæ detento alvi profluvium superveniens, lethale.

**I.** **Q**ui putant: Hippocratem conscripisse ex rationibus Aphorismos, a veritate longe recedunt, nam quæ in Aphorismis traduntur, sunt observationes prædictæ, quæ ab Hippocrate ipso, vel ab ejus antecessoribus fuere detectæ. Inde vix alicubi adjicit, quoniam ex ratione hoc vel istud contingit; sed simpliciter ponit hoc vel istud expectandum esse, quoniam observavit tale quid constanter vel sæpe fuisse subsequutum. Hoc etiam verum est in Tabidis, si veniat alvi fluxus; observavit enim Auctor nunquam ab alvi fluxu levamen allatum fuisse, sed ægrum magis aggravari, debilitari, & sputum suppressi, propterea in præsentem statum, si oboritur alvi fluxus, tale quid facile præfigere potuit, ut ex floribus conspectis præfigantur fructus: si talis fluxus alvi veniat in Phthisi, dum capilli de capite desiliunt, mortem insinare significabat: (Aph. 205.) verum in quavis specie Tabis & sine Prægresso capillorum desludio, lethale est signum, quoniam ut signum notat humores colliquefcere, & non observamus in praxi, morbos pectoris per alvum facere critum salubrem; & ut causa quoque nocet alvi fluxus, quoniam ejicit nutritivum, & derivat purulentum aut ichorosum ex pectore ad alvum, atque ita suppressit sputi ejectionem, quod admodum malum est in phthisicis. Ex hac observatione ut ex præcedente (Aph. 205.) certe constat, quam male multi agunt, qui non dubitant phthisicis dare medicamenta purgantia.

## L I B. V. A P H. XV.

208. **Q**ui ex pleuritide suppurati fiunt, si intra quadraginta dies, ex quo ruptio fuerit facta, repurgentur superne, liberantur: si vero minus, ad tabem transiunt.

Empyema I.  
ex pleuri-  
tide igitur

**Q**uid sit Pleuritis (Aph. 109. IV.), ejus mutationes (Aph. 201. I.) & exitus in Empyema (Aph. 201. III.) explicata sunt, ergo in hoc loco viden-



videndum est, quando debemus ex tali nato Empyemate expectare sanitatem, vel commutationem in Phthisin. Tempus determinat Auctor intra quadraginta dies, & solutionem petit ex sputi rejectione.

quod tempus expurgari debet

II. Intra quatuordecim dies solet Pleuritis inflammatoria commutari in suppurationem, sed propterea statim non generatur Empyema seu puris collectio in cavo pectoris, quum saepe pus colligatur in tunica cellulosa pleurae, ubi quandoque diu haeret, antequam rupto illo sacco pus funditur in cavum pectoris: quamdiu pus in eo sacco haeret, suppuratio non est facienda expurgationis, sed tunc demum, si pus in pectoris cavitate colligitur. Quoniam Hipp. dicit intra quadraginta dies, ex quo ruptio fuerit facta, plane constat, numerationem eorum dierum non debere inchoari a principio pleuritidis, vel a die decimo quarto, sed a tempore eo, in quo abscessus ille ruptus effudit pus. Si ergo non formetur abscessus in sacco pleurae, dies numerari possunt a die decimo quarto, sed si faccus formatus fuit, tam diu est expectandum, donec ruptus fuerit ille abscessus. Hae ruptiones non fiunt semper eodem temporis termino, quaedam citius, quaedam serius. Siquidem dolor in principiis fiat, & spirandi difficultas, & tussis, & sputatio perseverans ad vigesimum diem pertingat, eruptionem tunc expectare oportet, aut etiam prius. Si vero quietior fuerit dolor, & alia omnia pro huius ratione, eruptio posterius expectanda est. Necesse vero est accedere & dolorem, & spirandi difficultatem, & sputationem ante puris eruptionem: Hipp. a. 461. & 462. Ut hoc tempus, a quo initium dierum est suppurandum, juniori medico constet, paulo planius tradenda sunt signa. Siquidem ex signis constet, aegrum laborasse pleuritide inflammatoria, eam pleuritidem durasse ultra quatuordecim dies sine resolutione & sine puris evacuatione per sputum vel urinam, dum tamen ex ceteris signis constet, pleuritidem abiisse in purulentiam, tunc iudicandum est, pleuritidem formasse abscessum in sacco dilatato pleurae, nam si pus fuisset effusum statim in cava pectoris, aliquid redderetur per sputum. Ille faccus sensim fiet major, unde febris suppuratoria fit cum respiracionis difficultate & tussi inani, quia pus in hoc sacco contentum evacuari nequit per sputum: sic sensim pergit morbus, donec faccus ille rumpatur, & pus effundatur in cavum pectoris. Facta hac ruptione aeger iudicabit se liberatum esse a morbo, liberius enim respirabit, minus tussiet & dolebit, nam pus in cavum pectoris effusum minus premit pulmones, & pleura rupta minus tensa lenimen doloris faciet. Ab hoc tempore numerandi sunt dies Empyematis, quod initium temporis non habetur eodem tempore ab invasione pleuritidis in omnibus hominibus. In robustis enim fit citior ruptio, ut & in validiore inflammatione, at in debilibus, senioribus aegris, & mitiori morbo, serius rumpitur ille abscessus. Post ruptionem hanc observavit Hipp. si aeger non expurgetur superne, id est per sputi rejectionem, intra quadraginta dies, incidit in Tabem. Quando istud pus ita in cavum pectoris effusum est, propterea non semper sequitur Tabes, nam si istud rejicitur per sputum intra quadraginta dies a dicta ruptione, aegri hi non incidunt in Tabem, sed liberantur ab Empyemate.

III. Quam maxime disputant physiologi, num pus ex pectoris cavo ingredi possit pulmones, ut reddatur per sputum, & urinam. Practici autem hanc viam admittunt, etiamsi contendunt physiologi tales non inveniri vias, pus nimis crassum esse, quam ut possit intrare, quum inveniant in aegris, ut quoque in hoc loco notavit Auctor, pus fuisse evacuatam ex pectoris cavo, & per sputum, & per urinam. Vidi ego etiam in quodam viro, cujus pectus ita plenum erat pure post pleuritidem, ut meditaremur paracentesin, quod omne istud pus fuerit evacuatam per sputum & urinam, & homo perfecte curatus: sive ergo dicant physiologi, nullas esse vias, sive vias concedant, observationes autem hae frequentes probant, pus evacuari posse. Si vero sedulo perpendimus, quae sunt in viventibus,

Quomodo Empyema curari possit per sputum.

bus, injecto acri humore in cavum pectoris, qui tussire facit, liquorem etiam injectum evanescere; inflatos pulmones transmittere aerem, & multa alia experimenta comparamus huic observationi practicæ, admittere debemus non unicam, sed binas vias pro exitu puris ex pectoris cavo, nempe in vesiculas pulmonales aërem etiam transmittentes in pulmonibus inflatis, atque in vasa venosa absorbentia, quæ receptum pus miscent sanguini. Per primam viam, quæ facillima est, fit puris receptio ex cavo pectoris & rejectio per os, sed per alteram viam potius suppeditatur istud pus, quod cum urina redditur. Inde fieri potest, ut pus ex cavo pectoris omne reddatur per os, vel per renes; sed quoniam via in vesiculas pulmonales est patentior, quum transmittat aerem, per sputum facilius quam per urinam reddi potest pus.

Cur tabes,  
si Emphy-  
ma non  
repurgatur  
infra qua-  
draginta  
dies.

IV. Quum vero Pus collectum hæreat in pectore, & non rejiciatur superne, vel via est clausa, vel pus est tenacius, vel deficit actio, quæ absorptionem facit. Igitur Pus hic manens similem subit mutationem, qualem observamus in abscessu purulento, scilicet stagnando corrumpitur. Hoc Pus corruptum semper hærens ad pulmonis superficiem, ejus externam membranam corrodit, & ita pulmones exulcerat, in principio leviter, sensim vero profundius, ita ut post quadraginta dies sic habeatur exulceratus pulmo, qui sanationem respuit, atque inducit Phthisin pulmonalem. Si quis roget, cur post quadraginta tandem dies hoc fiat, & non prius? illa nimis astuta est interrogatio eo scopo excogitata, ut quidquid certi habetur in Praxi reddatur ridiculum, nam invaluit opinio, quod qui non potest reddere rationem alicujus rei, illa res censetur incerta aut nullius momenti: quum igitur nihil certi de termino hoc temporis possit proferri, quibusdam videtur, hoc tempus ex mente Hippocratis fuisse excogitatum. Verum ego omnino aliter sentio, nempe Hippocratem, uti & nos, & alios practicos observasse, pus in cavo pectoris effusum si maneat ultra quadraginta dies, produxisse Tabem, sed si ante istud tempus reddatur per sputum, raro intulisse Tabem. Hæc constans observatio non est opus ratione probetur, & qui hoc temporis studium ratione conatur probare, inanem impendunt operam, nam si quis veller ex natura examinata radicis bulbosæ plantarum definire florendi tempus, ridiculam navaret operam, quoniam tempora hæc solis observationibus sunt detecta.

## L I B. V. A P H. XVI.

209. **C**alidum, eo frequenter utentibus, has affert noxas: carnis efframinationem, nervorum impotentiam, mentis torporem, sanguinis eruptionem, animi deliquium: hæc, quibus mors.

Calidum  
quid no-  
tet.

I. **A**n tequam per experimenta fuit investigatum in corporibus quid sit Calidum, admodum disputarunt Medici & Physici, ut satis constare potest ex Veteribus, qui de Calido innato integros libros conscripserunt: postquam vero Physici experimentis rimati fuere naturam Caloris, detexerunt esse aliquam corporis proprietatem, quæ adesse & abesse potest, augeri & minui in corporibus, cujus præsentia detegitur thermometro & sensibus nostris. Thermometrum expansione sua tamen multo perfectius quantitatem caloris demonstrat, quam possit sensibus nostris inveniri: an vero pari gradu augmentum caloris faciat expansionem corporum, quam detegimus thermometro, adhuc inquirent: neque satis constar, an augeatur Calor collectis particulis igneis, vel quovis alio modo. Nobis in hoc Aphorismo sufficit scire Thermon, seu Calidum eam in corporibus vocari qualitatem, quæ facit elevationem thermometri, & in nobis concitat talem sensum, quem Calorem appellare solemus.

II. Ta-

II. Talis Calor in nobis generatur duobus modis, nempe sponte, sine causa externa, quæ aliis in corporibus concitaret Calorem majorem, vel ab externe applicatis. Quia vero agit de istis Calidis, quibus uti possumus, satis patet, Hippocratem petere indicia ex iis rebus calefacientibus, quæ sunt extra corpus nostrum, in quibus frequentior & rarior conceditur usus. Si has res Calefacientes examinamus, invenimus, quoddam corpus non solum nostrum vivens, sed etiam alia corpora mortua calefacere, quæ res continent Calorem Actuale, qui ambientibus communicari potest. Aliæ autem res corpori viventi ingestæ vel applicatæ augebunt quidem istius corporis calorem, sed corpora mortua non calefaciunt. Talia ingestæ vel applicatæ dicuntur Calefacientia vel Calida Potentialia. Hæc per se non calefaciunt, at applicata vel ingestæ eam causam magis instigant in viventibus, quæ calorem naturalem corporis viventis producit, id est motum vitalem. Præter duos hæc inveniuntur quoque alia, quæ fermentando, putrefcendo, effervescentando, Calorem generant: sed quoniam nostri humores sani has operationes non subeunt, inde per Calidum in hoc loco intelligendum Calidum Actuale, & Potentiale.

Quæ species Calidi intelligatur.

III. Calor actualis corpori nostro variis modis applicatur. Ita est Aer calidus, sive per solem, ignem, vel vaporem exhalantem corpori applicatur; vel aqua calida in modum vaporis, balnei, cataplasmatidis, aut fomenti applicata: vel corpora sicca calentia adhibentur, ut vel pars quædam corporis vel totum nostrum corpus concalefcat. Hi modi diversi varios quoque fortiuntur effectus, & sunt Medicis in frequentissimo usu ad multos curandos morbos; ne autem quis judicet, horum omnium usum frequentiore non posse inferre noxas, Auctor quidam noxas citat, quæ ex tali abusu proveniunt, nullo habito respectu ad humiditatem vel siccitatem adjunctam; nam si hæc simul adsint, compositi etiam effectus proveniunt. Idem etiam sentiendum de Calefacientibus spirituosiss & aromaticis. Quare in hoc loco non omnes noxæ Calidi & Calefacientis recensentur, sed quædam, quæ ex simplici calore majore frequenter adhibito proveniunt. Frequentior usus hic proponitur, quia si semel aut bis vel raro aliquis uteretur istis, non deberet expectare recensenda mala.

Calidi five frequentior usus quales noxas adfert?

IV. Carnis effœminatio notat talem statum in partibus mollioribus seu fibris carnis nostri corporis, in quo sentitur ad attractum major mollitudo, & detegitur minor contractilitas, quam in hominibus sanis esse debet, qualis status morbosus in fibris hodie vocaretur Atonia, vel Laxitas, & quoniam in foeminarum carnibus talis dispositio magis invenitur, quam in corporibus virorum, inde ille status seu dispositio corporis non inepte vocatur Effœminatio. Actu Calida talem inferre Laxitatem, exposuimus in *Comp. nostro* T. 6. atque experimentis quotidianis comprobari potest, modo calor tantus non concilietur, qui comburere potest. Quod autem potentia Calida uti spirituosæ carnis effœminationem inferant, paradoxum videtur, quia hæc stimulando videntur roborare, & firmare solida: sed si intuemur corpora potatorum, veritas observationis nostri Auctoris abunde constat, talia enim bene pota corpora laxa, enervata, frigida, tumida, & tremula inveniuntur, & tam debilia, ut sine stimulo ullo vix valeant se movere. Cavendum omnino, ne quæramus auxilia nostra ad firmandas vires in frequentiori spirituosorum potu, nam si stimulus spirituosorum evanuerit, corpus istud magis effœminatum erit, quam ante horum usum. Neque balneum, fomentum, cataplasma actuali calore omni noxa carent; sæpe enim observavi in praxi, horum frequentiori usu membra amisisse potentiam movendi; & qui semper bibunt aquam calidam magna copia, ut hodie moris est, in tantam ventriculi atoniam incidunt, ut vix valeant digerere alimenta, atque pedes, & reliquum corpus tumeant propter effœminationem tumore œdematoso, & aquoso frigido.

Producit Carnis effœminationem.

V. Duplex in fibris valet actio, una fit ex contractilitate, quæ debilitatur, uti

Nervorum Impotentiam.

in præcedente §. monuimus; altera fit ex motu, vel animali vel vitali, vel particulari, quæ in solis viventibus observatur. Hæc actio a Veteribus tribuitur nervis; unde nervorum Impotentia hodie designat debiliorem actionem moventem in fibris muscularibus cujuscunque motus recessit. Calidorum frequentiore usum omnem illum motum debilitare, nunc demonstrandum est. Actû calida statim minuunt contractilitatem, & in majorem fluorem redigunt humores: inde potentia accurtandi ex voluntate, & actione vitæ debilior, quia ad motum illum requiritur non solum spirituum influxus, verum etiam debita contractilitas in fibris, qua minuta, idem spirituum influxus minus validum motum inducere potest: si ergo talis causa fiat frequens, totus fere tonus fibrarum extinguitur, spiritus debiliori actione vitæ minus præparantur, & propter fluiditatem humorum, & largiorem exhalationem magis minuuntur, unde spiritus minus puri, & pauciores simul faciunt Nervorum impotentiam. In tali Nervorum impotentia calore frequentiore, & nimio inducta observavi, frigore, seu potius aura frigidiuscula, & potu gelido vires recuperatas fuisse, imo asperione aque frigida homo leipothymia oppressus ad se rediit. Cavendum autem in his, ne nimis subito, & magnum frigus admittatur. Potentia Calida nervorum impotentiam producere, abunde probatum invenimus in spirituoforum amatoribus, hi enim, nisi vasa spiritu fermentata fuerint impleta, tremunt, horrent, frigent, & toto corpore languent; tandem vero frequentiore spirituoforum usu, paresci, imo apoplexia ex virium defectu moriuntur. Si quis talem Nervorum impotentiam curare aggreditur, querens auxilium in spirituoso stimulo, infidelem præstabit curationem, dum inveniet virium augmentum, quod evanescet cum exhalante spiritu fermentato, relinquens majorem debilitatem, si omittat spirituosa, corpus stimulo ita assuetum omnino languet. Quare ad curationem fidelem nihil aliud valet, quam sensim minuere spirituosi ingestæ quantitatem.

Mentis  
torporem.

VI. Acumen ingenii sensim fieri hebetius seu torpidius frequentiore usu calidorum, & calefacientium, ut olim observavit Auctor noster, ita etiam his temporibus comperimus, magis autem abusu spirituoforum, quam actû calidorum, ita ut quidam spirituoforum abusu deperditi, omnino stolidi fiant, omni fere judicio privati: ita enim spiritus nostri corporis frequentiore usu a naturali crassi degenerant, ut mentis actionibus peragentis fiant inepti: horum multa, tam in viris quam in foeminis, non desunt exempla, qui per reliquam vitam quasi semper ebrii, mentis torpore correpti, manserunt.

Sanguinis  
eruptiones.

VII. Non est opus ut actû, vel potentia Calida in frequentiore usu adhibeantur, sæpe etiam prima vice hæmorrhagiam inferre possunt: actû enim calida solvendo sanguinem, & laxando solida faciliorem vasculorum ruptionem, & osculorum dilationem permittunt; & sanguis, tenuitate acquisita, facilius exit. Potentia calida quoniam stimulando faciunt, ut sanguis ruat majori impetu in latera arteriarum, & earum oscula, sæpe minima vascula disrumpit vel dilatat, ut ita exeat retinendus sanguis. Quod si frequentiore horum usu vascula sunt laxiora facta, & sanguis tenuior, eo facilius fiet ista sanguinis evacuatio. Inde juvenes, qui spirituosis abutuntur, vel delectantur aromaticis, aliisque calefacientibus, toties incidunt in narium hæmorrhagiam, & hæmoptysin. Inde etiam æstas, & aliis locis calidioribus frequentior hæmorrhagia, quam hyeme, & regionibus frigidis.

Animi de-  
liqua.

VIII. Quid sit Leipothymia, ejusque causa, supra (*Aph. 66.*) exposuimus, ex quibus colligi potest, a calidorum frequentiore usu, quo exhauriuntur spiritus, & partes firmæ laxantur, facile fieri posse animi deliquium, quod toties fit, ac spiritus non amplius fluunt ab encephalo ad organa motoria. Si ab usu Calidorum tantus sit defectus spirituum natus, ut inde fiat vel Leipothymia, vel syncope, verendum est, ne sublevis maneat ille motus, & homo tandem ex improvise moriatur.

IX. Late

IX. Late disputant, qualis sit lectio, & sensus hujus partis ultimæ, quia etiam Galeni tempore varia habebatur lectio, ut *His mors succedit. Ad que mors.* *Hæc quibus mors.* *Hæc ad mortem ferunt.* Qualis autem lectio sit servanda, & sequenda, relinquo Criticis, & iis, qui verba sectantur rem intactam relinquentes. Quod si aliquis sensus sit obscurus, vel lectio varia, id nullam mutationem scientiæ medicæ inducit. Quod si scientia nostra niteretur auctoritate Hippocratis, severo examine illa essent perspicenda, & cum aliis conferenda. Sed quoniam medicina nititur experimentis, non vero auctoritate, si occurrerit sensus obscurus, vel lectio varia, recurrendum est ad experientiam. Hanc si consulimus, facile erit hanc ultimam partem explicare. Hujus Aphorismi scopus est demonstrare, calidorum frequentiore usum multas noxas inferre posse, & inde quasdam noxas recitat, plures annumerare potuisset: dein dicit, *Hæc quibus mors*, vel utitur reliquis lectionibus, quæ omnes notant, post noxas has non raro homines mori. Quod experientia confirmatur; nam si frequentior Calidorum usus tantum defectum virium potuit inducere, qualis cognoscitur in recensitis morbis, illa causa ulterius continuata mortem inferet. Quare sententia non est istas noxas inferre mortem, sed mortem tandem fieri per continuatam illam causam. Et inde recensita mala non sunt flocci pendenda, sed protinus minuendus est Calidorum, & Calefacientium frequentior usus, & sensim transeundum ad Dietam magis frigidam, & refrigerantem, nam si subito talis induceretur mutatio, citius fieret mors, ut experiantur spirituosorum amantes, si ex aliquo morbo coguntur mutare vitæ genus.

Hæc, quibus mors.

## LIB. V. APH. XVII.

210. *Rigidum autem convulsiones, tetanos, nigrores, & rigores febriles.*

I. UT duo sunt genera Calidi, actus, & potentia, totidem etiam sunt genera frigidi, quæ dicuntur frigida, & frigefactientia. Summus autem gradus frigoris vocatur gelu, ut major gradus caloris urit: propterea in hoc loco non inquirendum, quid faciat Gelu, sed gradus gelu proximus quid faciat. Calor, & frigus comparative sumuntur ad eum caloris gradum, qui temperatus potest dici corpus nostrum. Ab eo gradu usque ad gelu videndum est, quas noxas infert frigus. In genere monendum, quo frigoris gradus propius accedat, eo magis illa mala sunt expectanda. Contrarias causas non semper contrarios effectus producere, ex allegandis morbis constare potest, nam tunc deberet frigus corpus roborare, nervos firmare, mentem acuere &c. verum a frigore æque quam a calore producuntur morbi. Inde constat in hoc Aph. intelligi frigus majus, quam quod potest a corpore sano tolerari sine damno. Iste autem frigoris gradus non omnibus hominibus illa damna inferet, sed quibusdam: experimur enim in his locis septentrionalibus, corpora nostra ab acris, & urente gelu roborari, & inveniantur homines ita robusti, & frigori assueti, ut ab intensissimo frigore non afficiantur: alii vero a leviori frigoris gradu in multos morbos incidunt; quod inde est deducendum, quod cujus corporis actio vitæ est debilis, talis homo a frigore majore amittit vel totum illum motum vitalem, in nobis naturalis caloris causa vel tantum minuitur, ut partes firmæ priventur suo motu, & humores subsistant, & ita concrecant. An vero in hoc Aphorismo sint intelligenda Refrigerantia, uti in precedente Calefacientia, ambigo, quum Refrigerantia non operantur per oppositam causam, quæ in Calefacientibus est assignata. Stimulus enim erat causa, ejus oppositum non habemus, & stimuli ablatio non est frigiditatis causa in corpore sano, quod non eget stimulo, ut exerceat suum motum: sed si calor major ex stimulo fuit suscitatus, stimuli ablatio refrigerat, id est redigit nimium calorem

Frigidum quid sit & quæ mala facit.

lorem in naturalem teporem. Inveniuntur autem Refrigerantia, quæ assumpta, vel applicata naturalem calorem minuunt; illa autem recentia damna non inferunt. Propterea in hoc loco accipienda sunt frigida actualia; an vero humida, vel sicca sint accipienda, longe disputant Commentatores, sed quoniam Auditor noster nullam huius facit mentionem, duntaxat videbimus, quid faciat frigus actualis in partes firmas, humores, & actiones, ex quibus generalibus recitatur morbi facile deduci possunt.

A frigido  
spasmus,  
& tetanus.

II. Quod supra monuimus (*Apb. 167.*) Spasmodum, & Tetanum diversum esse morbum, ex hoc Aphorismo satis constare potest; numerat enim Auditor noster morbos ex frigido nascendos; incongruum equidem foret in hoc loco duo proferre nomina eandem rem significantia; igitur per Spasmodum in hoc loco intelligimus alternam violentam contra voluntatem musculorum constrictionem per totum fere corpus: sed per Tetanum constrictionem constantem, ut musculus interim se non dimittat. Quando vero hi duo morbi a frigore inducuntur, allucinantur multi. Tales tamen fieri motus involuntarios, tam in motu animali, quam vitali, & particulari, per frigus applicatum, aliquoties experimur: ita haustu gelidæ aquæ homines fuere suffocati, contractis fibris respirationi servientibus: applicato frigido ad pedes, ventrem, vel alias partes colicas dolor ex contractis fibris intestinorum, & mensenterii inductus fuit: qui vel instrumento, vel liquore frigido tangit in ulcere, vel fistula nervum nudum, æger ut plurimum in motu animali convelleretur. Ergo experimentis satis constat, frigido applicato, vel ingesto generari sæpe Spasmodum, & Tetanum. Hoc quidem sufficeret ad cognitionem practicam, nos propterea non imprudenter debere ingerere, vel applicare frigida. Sed quando ad originem usque ascendere possumus, non solum maior accedat fides, sed etiam egregium ornamentum scientiæ. Quenam sit mea sententia, paucis expositorum sumus. Constat, omnem motum in nobis fieri influxu spirituum, & omnem causam morbosam propellentem hos spiritus producere vel Spasmodum, vel Tetanum. (*Conf. Apb. 126, III, 194, II, 195. I.*) prout constantem, vel interruptam propulsionem faciant. Igitur in hoc loco adstruendum, offendens frigus talem propulsionem facere posse. Observavimus, fibras molles nostri corporis a frigore accutari, atque experimur, excedens frigus applicatum instar stimuli agere: si ergo frigus applicatum ad nervi capsulam ratione contractilitatis, vel ratione stimuli faciat, ut nervi capsula contracta urgeat contentos canaliculos spiritibus plenos, hi spiritus tanto impetu propulsi ad partem aliquam faciunt, ut musculi istius partis vel spasmo, vel tetano corripiuntur, & quoniam nervorum capsulae sunt continuæ, totum corpus consentiens convellitur.

Nigrores. III. Postquam experimentis detectum fuit, sanguinem rubrum in quadam parte collectum nigrum præbere colorem, nullum amplius mysterium est querendum, ut multi ex veteribus, cur frigus inferat nigrores. Frigus enim extinguens in vasculis minimis motum circulatorium, dum tamen arteria major adducit sanguinem, facit, ut tali in parte motu privata accumuletur sanguis: & idem frigus coagulando sanguinem facit, ut ille collectus sanguis in thrombum concreseat. Ergo sanguis ruber collectus, & ita coagulatus præpemis in parte, quæ tangitur a frigore, illos nigrores inducit.

Rigores  
febriles.

IV. Quid sint Rigores, antea (*Apb. 156. I.*) definivimus, eorumque differentiam ad consimiles morbos exposuimus; quibus satis patet, Tetanum & Rigorem non eundem esse morbum. Quomodo autem Horrores febriles, id est tales horrores, quales in febribus observantur, a frigido applicato vel ingesto concitentur, paucis videndum. Dum frigus applicatur parti nervosæ, illa ratione noxii stimuli se inordinate movere incipit, quæ est lex particularis corporibus viventibus, nam in corporibus mortuis non observatur; ille motus inordinatus a nobis perceptus & observatus vocatur Rigor, cujus multas causas exposuimus (*Apb. 156. II.*)

LII.

## LIB. V. APH. XVIII.

211. **F**rigidum inimicum offibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medulla: calidum vero utile.

**I.** Etiam si regulariter idem morbus diversis in partibus corporis idem videatur exigere curationis & medicamenti genus, quum generetur ex eadem causa, constat tamen in praxi, nos saepe debere mutare curationis indicationem & medicamentum pro parte affecta, quod Medico & Chirurgo magnam difficultatem parit: qui enim novit, quid sit agendum in hoc vel illo morbo, decipietur interdum, si ille morbus specialem partem aggreditur: itidem qui cognoscit medelam alicui parti propriam, summopere peccaret, si omnes morbos istius partis eodem modo curare vellet. Exemplum aliquod in hoc Aphorismo proponit Auctor, demonstrans quædam generalia curationis, ut est Frigidum & Calidum prodesse & nocere posse pro diversitate partis. Inimicum *τοῖς ὀστέων* hic significat adversum, noxium, hostile, infestum. Utile *τοῖς ὀστέων* notat adjumentum, emolumentum adferens, commodum, amicum, profuturum. Igitur differentia hæc non est querenda in re applicata, sed in natura partis. Hippocr. in hoc loco noluit omnes partes nostri corporis recensere, in quibus hæc differentia observatur, nam multo plures hujusmodi partes inveniuntur, sed quasdam, ut moneat, nos non solum in applicatione attendere debere ad morbum, verum etiam ad partem variam.

Curatio  
variat pro  
parte va-  
ria.

**II.** Detegimus in nostro corpore vivente aliquam actionem, quæ a nobis vocatur motus vitalis, de quo integram Exercitationem conscripsimus, quæ actio nostri corporis viventis est naturalis caloris causa, ita ut cum validiore hoc motu etiam intendatur calor, & cum motu minuto corpus refrigeretur: ille calor sanguini transfuenti communicatus, etiam aliquo modo transfert illum calorem ad partem aliam, ut fit in translatione caloris actualis. Nam si aqua calida duceretur per vasa alicujus partis, ea pars concalesceret: quare Veteres existimant, corporis viventis calorem pendere ab influxu sanguinis calidi, quasi sanguis in se faceret & foveret causam calefacientem. Nos vero, quod alibi largius disputavimus (*Comp. T. XLIX.*) posuimus calefacientem causam in partibus firmis, motu vitali se invicem terentibus, qua actione vitali transfluens sanguis calorem concipit, quem calorem deinceps aliis partibus minori motu vitali donatis, vel frigori externo magis expositis communicat. Omnibus autem in partibus non est æque valens ille motus vitalis calefaciens, validissimus mihi videtur in pulmonibus, hi quoniam per totam substantiam in singula respiratione perfunduntur aere frigido, tamen manent calidi. Aliæ autem partes, quæ paucas arterias habent, & per quas parum sanguinis calefacti fluit, minus calent, quum causa calefaciens sit motus vitalis, non vero particularis, qui requiritur ad specialem confectionem vel secretionem humorum. Si igitur his diversis partibus majore & minore motu vitali calefaciente præditis frigus applicatur, facile erit in parte debiliore motu vitali donata totum extinguere motum. Solummodo itaque demonstrandum est, recensitas partes, Ossâ, Dentes, Nervos, id est Ligamenta, membranas, omnesque partes albicantes, Cerebrum, & spinalem medullam, exiguum habere motum vitalem, & parum sanguinis calefacti transmittere. Hoc unicuique constat, quoniam istis in partibus vix conspiciantur arteriæ cruentæ motu vitali donatæ: illud autem conjicimus ex actione particulari tali in parte, quæ non est simul causa calefaciens, ut est actio vitalis. Igitur pro regula generali, loco recessionis partium accipi potest, omnibus partibus, quibus est debilis motus vitalis, & parvus transfluxus sanguinis, frigidum applicatum est infestum. Inde quoque hoc bonum habemus, quod

Frigidum  
noxium  
offibus,  
dentibus,  
nervis,  
cerebro,  
spinali  
medulla.

quod in hominibus diversis frigidum etiam infestum esse possit, dum vero aliis sit utile, nempe hominibus, quibus motus vitalis est debiliior, quum frigidum sistens motum vitalem in tali corpore debili, totam vitam facile exstinguit.

Calidum  
quibus  
partibus  
utile?

III. Hippocratem hoc in loco non intelligere excessum Caloris, facile ex antecedentibus (Aph. 209.) colligi potest, neque hic accipiendum Calefaciens nomine Calidi, sed solummodo actu Calidum. De eo dicit utile esse recensitis partibus, quibus infestum erat frigus, & hoc ex eodem principio: nam quibus in partibus, & quibus in hominibus debiliior est actio vitæ, conveniens est, ut per actuale calorem conservemus fluorem in humoribus, & ita nullum imponimus impedimentum motui vitali. Ex qua observatione generali hoc commodum habemus in imperanda diæta, & facienda curatione, ne omnibus partibus, omnibusque hominibus æque frigida & calida adhibeamus, sed semper perpendamus vires vitæ tali in homine & parte.

# L I B. V. A P H. XIX.

212. **Q**uæ refrigerata sunt, excalefacere oportet, præter ea, quæ sanguinem profundant, aut sunt profusura.

Refrigera-  
ta excale-  
facere  
oportet.

**C**ontraria contrariis mederi, generalis est regula, quæ ergo suggerit, nos debere partem refrigeratam calefacere: ne tamen aliquis judicaret hanc regulam tam universalem, ut non pateretur exceptionem, hunc conscripsit aphorismum experientia confirmatum, hanc nempe curationem omittendam esse, si pars illa sanguinem fundit vel profusura est. Antequam dare possimus rationem huius cautelæ, præmonendum erit, quali modo calefacere oportet partem refrigeratam. Pars aliqua corporis hominis viventis refrigeratur vel defectu motus vitalis, vel applicato actuali frigore. In utroque casu tardius transit sanguis ceterique humores per sua vasa, & ipsi sunt simul refrigerati. Humores autem nostri corporis stagnantes concresecunt, & eo magis si sint frigidiores, quum frigus concresecendi potentiam augeat. In parte igitur refrigerata humores vel sunt concreti, vel ad minimum spissiores, & ita inepti ad fluendum per sua vasa determinata. Si quis in tali disposito sanguine partem subito calefaciat vel per actuale vel per potentialem calorem, quo simul magnus concitatur motus, sanguis ille circulationi ineptus, tanta vi propulsus, vasa infarcit, distendit, & tandem etiam rumpit, ut sæpe experiantur illi, qui partes externas frigore suffocatas admovent igni nimis subito. Propterea expedit partem refrigeratam lente tepescere & dein excalefacere, sic sensim liquecet concretus sanguis & fiet circulationi aptus.

Pars re-  
frigerata  
non cale-  
facienda,  
quæ san-  
guinem  
fundit vel  
profusura  
est.

II. In morbis autem, qui contra habent indicantia signa, perpendendum est, num prior indicatio sit implenda vel negligenda propter alteram adiunctam indicationem. In tali ancipiti casu eligenda est causa potior & magis valens, ut ea tollatur, ne corpus per curationem levioris mali, quæ obesset simul graviori, detrimentum patiatur. Huius regulæ egregium habetur exemplum in hoc aphorismo, nam indicatio generalis est, pars refrigerata est excalefacienda, etiam si illa calefactio fiat secundum recensitas cautelas, quando pars talis vel fundit sanguinem, vel profusura est, recte monet, eam partem non esse excalefaciendam. Hinc non intelligitur hæmorrhagia salutaris, vel tam parva, quæ nihil damni inferre posset, sed major & periculosa. Quoniam Auctor dicit, partem talem non esse calefaciendam, duo simul supponit, (1) Hæmorrhagiam periculosiorem esse frigiditate partis. (2) Calefacientia tali in parte revocare sanguinis fluxum. Hoc paucis est exponendum. Pars refrigerata aliquamdiu sine corruptione potest manere superflua, & si demum recaleseat prudentissimo auxilio, sana erit ut antea, ergo permitti potest aliquandiu pars refrigerata sine periculo: sed si sanguis nimia copia profusus



fus fuerit, non tam facile restaurari potest bonus sanguis; imo ex nimia sanguinis profusione tandem periret totus homo, sed si pars per continuatum frigus tandem amitteret vitam, duntaxat periisset pars, non vero totus homo, ergo hæmorrhagia periculosius est symptoma, quam frigus alicujus partis. Alterum quoque plane constat, nam in parte refrigerata sanguis est densior vel concretus, & motus vitalis propellens est languidior: si talis pars calefaciendo agitur, in fluorem redactus, & motus vitalis instigatus, renovabit hæmorrhagiam.

## LIB. V. APH. XX.

213. **U**lceribus frigidum quidem mordax cutem obdurat, dolorem insuppurabilem facit, nigrores, rigores febriles, convulsiones, & tetanos.

I. **Q**uid sit frigidum, superius notavimus (Aph. 210. I.) Atque Ulceris definitio ex Chirurgia nostra repurgata N. 1293. desumi potest. De hoc frigidulo ulceribus applicato multa observavit Auctor noster damna, inter quæ inveniuntur quædam generalia superius (Aph. 210.) recensita, ut Nigrores, Rigores febriles, Convulsiones, & Tetanos. Hi morbi magis fiunt a frigido ulceribus applicato, quam si frigidum cuti integræ applicaretur, quoniam actuale istud frigus immediate tangit partem nudam, & ita validius operatur.

Frigidum quid faciat ulceribus.

II. Non solum ulceribus est Mordax, id est ulceribus dolorem, ac si pars morderetur, infert, sed & etiam partibus reliquis, hoc sæpe nos observamus in regionibus septentrionalibus habitantes, quod frigus intensum vix tolerabilem mordacem dolorem pariat, antequam gelu pars integræ sit concreta. Si enim per majus frigus sensum contrahantur fibræ nervosæ, & ita impediatur spirituum transfluxus, tam diu augebitur dolor, donec omnino omnis spirituum fluxus per eam partem sit interceptus. In frigidissima autem tempestate, dum thermometer sub signis descendebat, inveni partes congelatas quibusdam hominibus sine prægresso dolore quod intensissimum istud frigus non sensim impediēbat spirituum fluxum, & ita faciebat dolorem, sed unico momento omnem fluxum supprimebat, quemadmodum etiam in morbis malignis, partem sphacilescenti sine prægresso dolore. Hanc Morfionem magis inferri Ulceribus, quam partibus integris a frigido applicato, facile intelligitur, quia omnes partes nudæ ad omnem attackum magis doleant, quam partes integræ & sanæ: inde frigidum, quod a parte sana facile potuisset tolerari sine dolore, ulceri applicatum, sive sit Aqua, sive Aer frigidior, dolorem mordacem infert. Propterea in deligatione Ulcerum cavendum est, ne frigidum applicetur, vel ulcus exponatur aeri frigido.

Ulceribus mordax.

III. Experimenta docent, partes firmas cum augmento frigoris sensum magis contrahi & fieri rigidiores, atque liquores sensim fieri magis coherentes: quare partes nostri corporis ex his binis constantes, non tam facile cedunt ad attackum, ut antea, si a frigido applicato refrigerantur, sed molles partes fiunt duræ. Inde tempore hyemali toties in hac regione inveniuntur tubercula dura in partibus aeri frigido expositis. Propterea a frigido applicato non solum cutis seu potius margo ulceris indurefcit, sed etiam ipsa cutis, etiam si ulcus non habeat.

Ulceribus cutem obdurat.

IV. Quoniam humores concreti actione vitæ convertuntur in pus, inde sæpe per mordacia applicata promovetur suppuratio: verum non omnia mordacia eodem modo operantur; infertur enim dolor ab applicato medicamento, quod instigando motum vitalem dolorem & morfionem infert; tale applicatum in ulceribus fordidiis & frigidis promovet suppurationem. Frigus etiam infert morfionem ulceribus, sed contrario modo, extinguendo nempe illum motum; quare frigidum simul extinguendo causam suppurationem facientem, impedit ulceris suppurationem. Hoc evidentissime comperimus in pernionibus hyemali tempore, qui relinquunt ulcera fordida sine puris generatione tam diu, donec calor accedens suppurationem promoveat.

Dolorem insuppurabilem facit.

LIB.

## LIB. V. A P H. XXI.

214. **E**st vero, ubi in tetano sine ulcere, juveni bene carnosio, æstate media, frigide multæ affusio caloris revocationem facit. Calor autem hæc solvit.

**Sensus.** I. **S**uperius (*Aph.* 210.) dixerat frigidum inducere Tetanos, nunc vero aliquam specialem adferre voluit observationem prædicam, Tetani speciem esse, quæ refrigerat corpus, tamen affusione multæ frigidæ recuperare calorem: & ut hanc sententiam non faciat generalem, dicit, *Est vero*, quod ab aliis dicitur *quandoque* vel interdum. Id est, rara exstant exempla, quod corporibus tetano correptis per affusionem aquæ frigidæ revocetur Calor. Ne igitur in quovis Tetano hoc tentaret auxilium, tres adiecit cautelas. (1) Ut Tetanus fiat sine ulcere. (2) In juvene eufarco. (3) Media æstate. Quoniam expertus fuit tali in casu affusionem aquæ frigidæ revocasse calorem. Contra hanc curationem multi se opposuerunt medici, quoniam in praxi videntur, potius generari quam curari Tetanum affusione frigidæ. Sic semper multæ lites moventur in morborum curationibus, si morbus ex phænomeno appellatus non distinguatur in suas causas diversas. Existimant veteres & adhuc multi, Tetanum unicum esse morbum, propterea constantem habere & semper sibi similem curationem: sed quoniam est phænomenon causæ latentis, ejus curatio sibi mutuo contraria esse potest; propterea videndum erit, an non valeamus ex adjunctis rimari, qualisnam sit latens causa Tetanum inducens, quæ minuit affusione multæ frigidæ.

Tetanus  
ex impetu  
& calore  
majore.

II. Tetanum & Convulsionem ex majore sanguinis impetu ad encephalum fieri posse, nobis fidem faciunt morbi acuti ardentes, in quibus semper veremur Convulsionem, Tetanum, vel Delirium, si signa docent, sanguinem ferri majore impetu ad caput: ille impetus major si producat Tetanum, quo in toto corpore per contractos musculos sistitur circulatio, vel ita simul comprimitur cerebellum, ut spiritus vitales fluere nequeant: talis impetus major propter suffocatum circulationem & impeditum spirituum vitalium fluxum, facit corporis refrigerationem. Hæc refrigeratio seu caloris nativi extinctio, & talis Tetanus curandus est minuendo motum vitalem propellentem. Quod egregie fieri potest, si corpus affusione multæ aquæ frigidæ perfundatur, dum actuale frigus augeat constrictionem contractilitatis, sed minuat contractionem ex motu vitali. Ita per minutam actionem vitalem dimittitur cerebellum compressum, & resolutio tetano permittitur circulatio per vasa, unde iterum redit calor naturalis, remotis causis impediens. Quantum juvet distinctio inter contractionem automaticam & vitalem; ex hoc mirabili morbi signo & curationis modo elucescit, quæ a frigore augeatur contractio automatica, & e contra minuatur contractio vitalis. Videndum nunc est ex phænomenis ab Hippocrate usque citatis, num hic recessus Tetanus a majore impetu vitali dependeat. Excipit *Ulcus*, ut indicet, se non intelligere Tetanum ab applicato frigido ad ulcus, quod in præcedente Aphorismo notaverat. Sed quamvis ulcus adesset, potuisset tamen generari Tetanus ex impetu majore, & exigere frigidæ affusionem: at vero ulcus sive adsit sive absit nihil determinat. Deinde addit, *Juveni bene carnosio, ὡς ἐκ τοῦ ἐξ ἑστὸς*, id est robusto, valido, nec macilente nec obeso, cujus corpus est sanum & robustum. Tali in corpore maxime vigere motum vitalem, nemo dubitare potest, quamobrem omnes morbi juvenum (*Aph.* 108.) ex hoc majore impetu deducuntur. In hujusmodi corporibus si Tetanus fiat, magis ex impetu majore quam ab acrimonia cruda stimulante is erit deducendus. Et ut aliquam simul assignaret stimulantem causam, quæ majore impetu ducit sanguinem ad caput, adiecit *Æstatem mediam*. Quo tempore præcipue fiunt febres continuæ ardentes (*Aph.*

100.

100. II.) Si igitur aliquod phenomenon, nempe Tetanus, conspicitur, quod ex majore impetu & calore generari potest, cum adjuncta ætate & causa his producendis prona, verisimile est hoc phenomenon ab illa causa provenire. Quia vero ex causa raro oriatur Tetanus, adjecit *Est vero*, quod notat, ut monui, interdum, quandoque, non semper occurrens. Et itidem scimus, nos non temere hac methodo medendi uti debere, & non nisi nobis constet, ab hoc impetu & calore majore nasci Tetanum. Si autem aliquis plura signa hujus majoris impetus desiderat, ut firmiorem habeat praxim, adire potest *Comp. nostrum* (T. 46. XI.).

LIB. V. APH. XXII.

215. **C**alidum suppuratorium, non in omni ulcere magnum signum ad securitatem: cutem emollit: attenuat, dolores sedat, rigores, convulsiones, tetanos mitigat: capitis vero gravitatem solvit: plurimum autem confert ossium fracturis: maxime vero denudatis: ex his quidem maxime, qui in capite ulcera habent: & que a frigore moriuntur, aut exulcerantur: & herpetibus exedentibus sedi, pudendo, utero, vesica. His calidum quidem amicum, & decretorium: frigidum vero inimicum & occidens.

I. **P**ropter rerum copiam & lectionem variam Commentatoribus hic Aphorismus maximam difficultatem præbuit. Dumtaxat rimabimur rem ipsam, variam lectionem relaturi criticis & literatoribus: neque ubique usuri Hippocratis auctoritate, quum ille vir, quidquid habet, ex observationibus quemadmodum nos omnes, haurire debuit. Scopis noster erit cum Auctore perspicere quid faciat *hæpus* (Aph. 209. II.) quod in hoc loco indicabit Calorem moderatum, ut est in corpore sano, & paulo majorem, minime vero adurentem, qui concitatur ab actu calidis applicatis. Nam si simul adducerentur ea, quæ potentia calefaciant, sensus ubique fieret obscurus. Ita enim exponuntur effectus unius simplicis cause, sed si simul adderentur effectus calefacientium, non constaret eadem sententia, quum effectus actu & potentia calidorum inter se multis in casibus differant. Istud Calidum applicatum vel est simul siccum vel humidum, & hac ratione etiam differunt effectus, quod simul in expositione effectuum erit recensendum. Quid autem sit Calidum, & quoruplex hoc superius indicavi (Aph. 209. I.).

II. Istud vocatur suppuratorium *ἐκπυρῶν*, quod humores concretos tenaces vel in ulcere cavo sorditatis nomine, vel in marginibus impios hærentes, convertit in humorem albicantem, subpinguem, satis consistentem, aqua graviores. Ex qua materia formetur pus, quomodo generetur, & per quamnam actionem, indicavimus (Aph. 72.). Ex quibus constabat ad puris confectionem paulo majorem calorem requiri, quam est calor naturalis nostri corporis: inde itaque actu calida applicata, quoniam istud requisitum faciunt, juvant puris generationem. Propterea experimur in tumoribus inflammatoriis, qui non facile suppurantur, quod cataplasmata calide applicata promoveant suppurationem, quam suppurationem non potuimus obtinere ullis emplastris. In tumoribus vero frigidioribus & ulceribus sordidis simulque frigidis, nisi simul applicentur calefacientia, id sordidum in pus converti nequit, & diutissime permanet, atque margines manent indurati. Hinc quæ parantur ex terebinthina, aloë, myrrha, & similibus dicuntur digestiva, id est suppurationem promoventia. Ne autem aliquis judicaret se posse actuali calore promovere suppurationem, adjecit, *non in omni ulcere*. Nam non omnis materia in ulcere apta est ut inde concitatur pus. (Conf. Aph. 72. II.). Neque humores qui inchoaverunt putredinem vel corruptionem, per calorem in Pus possunt commutari, uti recenset Galenus Dysepsulotica, Cancrofa, Chironia, Telephica, &

Calidum  
actuale  
applicatum  
quid  
faciat.

Calidum  
suppuratorium  
non in omni ulcere, magnum signum ad securitatem.

Phagedanica, quæ omnia dicuntur Anepyctica. Nam putrefactum converti nequit in pus, & quod fuit majore corporis calore corruptum, per calidum applicatum non convertitur in pus, sed in majorem corruptelam & acrimoniam. Utinam hoc semper affequeretur a Medicis in variolarum curatione! toties non perissent acri variolis in putrilaginem conversis: unica enim multi contendunt calidis applicatis, & calefacientibus exhibitis promovere variolarum suppurationem, etiam si experiantur pustulas variolosas abire in putrilaginem. Quod si animo attente hanc generalem perpenderent, non semper calefacientibus tentarent variolarum curationem. Dein addit, *Magnum signum ad securitatem*. Quibus verbis indicat, quod si calidis applicatis experimur promovendi suppurationem, hæc observatio erit signum securitatis, quoniam ex hoc conspectu scimus materiem illam fordidam non esse corruptam, & humores in ulcere hærentes aptos esse, ut inde præparetur pus. Hoc experimur semper, quod qui humores morboosi permittunt conversionem in pus, isti semper sunt blandi & benigni, qui vero in pus non sunt commutabiles, hi sunt corrupti, rebelles & acres, ex quibus nihil boni expectari potest: præterea ipsa conversio in purulentiam est quoad vires corporis bonum signum, nam nisi vires vitæ valeant, nunquam ullus humor in pus convertitur. Quamobrem pustula variolosa si non suppurat, sed convertuntur in hydatides vel putrilaginem, mortem instare indicant: si vero suppurantur, & coctum pus præbent, salutem & securitatem pollicentur.

Calidum autem emolliat, attenuat.

III. Per Calidum applicatum partem molliori, quotidiana docet observatio, nam calidum laxat partes firmas, & contentos humores in faciliorem fluorem redigit, quare pars ad attractum redditur mollior. Hoc etiam verum est in tumoribus morboosis, quare ad emollienda indurata semper Chirurgi adhibent actum calidum. Quæ autem sua efficacia calefaciunt, quosdam tumores emolliunt, alios vero magis indurare faciunt: qui enim ad partem inflammatam applicaret Calefaciens, majorem indurationem faceret, quoniam his in tumoribus per motum majorem est nata durities, qui motus per Calefacientia adaugetur. *Attenuare* seu potius *Extenuare* *λατταίνω*, notat partem tumefactam corporis seu partis sanæ molem minuire: siue enim ex impetu majore, ut in tumoribus inflammatoriis, pars tumeat, siue ex humore crasso & lento impleatur tunica cellulosa, ut ita partem tumere faciat, in utroque casu actum calidum talem partem extenuant; cum actum calidis & humidis, qualia hic præprimis intelliguntur, temperetur nimis motus vitalis tali in parte, qui partem distendebat; atque humor lentus & concretus pituitosus a Calore in fluorem redactus, priorem locum relinquens, sæpe partem extenuat. Sic norant Chirurgi pedes oedematosos tumentes fovendo omni vespere extenuare, cum Calore pituita attenuata eo tempore, dum horizontalis dein conceditur situs pedibus, pedem relinquat. Hoc etiam observavi, membra arthritica sæpe fota, ita fuisse emaciata, ut viderentur aridura correpta.

Dolores sedat.

IV. Promptissimum est auxilium fere omnibus hominibus, ubicunque sentiatur Dolor, statim applicare corpus aliquid calefactum: sic testæ calentes ad ventris dolorem appositæ fabrefactæ inveniuntur, quæ nomen ex colico dolore traxerunt: alii arenam calefactam sacculo receptam applicant: Chirurgi propterea fomenta, & cataplasmata calida adhibent ad leniendos dolores. Hæc autem constanti experientia comprobata sunt magnum solamen attulisse, nam si perpendamus theoriam, horum usus admodum esset incertus, cum ex concepta opinione fere omnes existiment cunctos dolores a frigore oriri, dum tamen maxima pars omnino aliam causam agnoscat. Qui vero perspicit omnem fere dolorem leniri per ea, quæ laxant fibræ nervosam, & humorem concretum atque ita obstruentem resolvunt, facile concipiet, calidum fere semper anodynum esse, quum utrumque faciat.

Rigores, Convulsio.

V. Quum supra exposuimus, quid sit Rigo (Apb. 156. l.) Convulsio, & Tetanus

tanus (Aph. 167. I.) simulque exhibuimus hos morbos validam facere tensionem in fibris, solum restat hoc loco videre, quomodo atq. calida applicata hos morbos mitigent. Experientia ipsa loquitur nos non citius compescere posse Rigorem quam actu calidis applicatis, quibus prompte superatur sensus frigoris, qui simul in Rigore habetur. Tensio autem reliqua in Rigore, & ceteris citatis morbis, quoniam calida laxant, necessario quoque minuitur, & ita dimittitur pars contricta. Inde in Doloribus ventris, & aliarum partium a spasmodicis contrictionibus tanto cum successu adhibentur corpora calefacta.

VI. Caput nobis videtur grave, vel dum majore humorum pituitosorum copia oppletum est, vel si potentia movens est debilior: saepe hoc observatur in valitudinariis, & morbis chronicis. Tali in casu Auctor, & etiam nos observavimus Calida capiti applicata levamen attulisse. Dum scilicet pituitosus humor aggravans caput, non potens ob debilitatum motum vitalem inde expelli, a Calore actuali resolutus, inde depellitur, & ita minuit Capitis gravitatem. Ipsa quoque potentia calida hoc præstant, exagitando partes languentes: propterea ad Capitis gravitatem levandam, capiti affricantur spiritusæ, & olea aromatica, ceteraque calefacientia.

Capitis  
gravitatem  
sol-  
vit.

VII. Ossa frangi nequeunt, quin vasa per os currentia diffingantur simul, & medullæ ex ossis cavo liber concedatur exitus in partes circumjacentes, atque humores vasculis antea coerciti effundantur: rarum esset solum os ita frangi sine contusione, vel læsione partium mollium ambientium. Pars ita disposita effusus habens humores, multaque diffracta vasa, si trañetur frigore, faceret validissimam accurtionem fibrarum, quæ sunt læceratæ, & fieret effusorum humorum coagulatio, quæ deinceps solvi non potuisset: propterea optimum est actuali calore adhibito temperare nimiam contractionem fibrarum, & prævenire coagulationem humorum, ut ita humores fluxiles servati reduci potuisset per venas, ne stagnando corrumperentur. Quam perverse igitur multi agunt Chirurgi applicantes ad ossium fracturas frigida, ex his dictis facile colligi potest.

VIII. Ossa omnia nostri corporis, si excipiantur dentes, sunt ubique recta partibus mollioribus, in quibus demonstravimus (Aph. 211. II.) validiorem esse motum vitalem coarctantem naturalem calorem, qui quoque communicatur ossi incluso, ut corpora calefacta inter se calorem communicant. Talia ossa si fiant nuda, ob duplicem rationem ferre non possunt frigus, sed juvantur actuali calore. Nam privantur non solum suo integumento calefaciente, verum etiam multa vasa os intrantia, quorum munus est conservare motum vitalem in ossæ, abrumpuntur, ita privantur actione sua, ut tale nudatum os semimortuum haberi possit, præcipue si simul periosteum privetur. Ni igitur debilis restans in nudato osse motus vitalis frigore exstinguatur, & ne humores atque medulla concresecat, expedit actuali calore moderato istud os fovere. Hæc observatio magni est usus in omnium ossium morbis ne unquam ad ossa nuda applicemus actu frigida, neque nimis diu in renovatione deligationis moremur, & exponamus os aeri frigido: si vero usu os nudum est tenendum, uti in terebratione cranii, prudentissimi Chirurgi semper curant, ut ambiens aer arte incalcescat.

Maxime  
convenit  
denudatis  
ossibus.

IX. Ex textu satis constat omnibus ulceribus conducere calida, sed inter ea maxime conveniunt Calida ulceribus capitis. Quod ulcera amanti calida, ex iis, quæ diximus, facile deduci potest, quum pars ulcerata multa vasa habeat diffracta, & debiliorem motum vitalem, atque humores effluentes per calorem in fluore sint conservandi. Quamobrem autem id magis ulceribus capitis, quam aliarum partium conveniat, ex alio fonte est petendum. Non novimus loca exulcerata, quæ ossibus propiora, quam ulcera in cranio, si his adhibentur frigida, facile inde periculum, & subiectum os potuisset lædi, quod minus verendum est

Capitis  
ulceribus.

in aliis partibus ; propterea in deligatione ulcerum capitis magis debemus evitare frigidi aeris attractum , quam in deligatione ulcerum aliarum partium .

**Et que ex frigore moriuntur aut exulcerantur.** X. Duplicem speciem morbi ex frigore nati proponit , in qua laudat Calidum , nempe mortificationem , & exulcerationem ex frigore . Huiusmodi morbi in nostris regionibus sunt frequentissimi hyemali tempore . In facie enim , manibus , & pedibus præcipue puerorum tubercula dura nascuntur , quæ Perniones vocant , aut generantur livida sordida , & frigida ulcera , non recedentia nisi accedente solis æstivi calore . Quæcunque laudantur ad hos præveniendos , & curandos morbos , nisi simul adferant Calorem actualem , vel potentialem , nullius sunt momenti , quum frigus externum extinguens motum vitalem in tali parte nulla , mortificationis , & exulcerationis sit causa . Propterea medicamentum quodvis , modo simul adhibeatur artificialis calor , huiusmodi morbos sanat , & eo magis si applicatum medicamentum lenem simul calefacientem virtutem habeat . Si vero nimis concilietur parti calor , ægri ferre vix possunt dolorem , & pars profundius mortificatur , quam si sensim adhibeatur . Quid autem sit agendum in parte congelata exposuimus in *Chirurgia repurgata nostra* . N. 1283.

**Calidum convenit herpetibus exedentibus , sed , pudendo , utero , vesica .** XI. Qualem morbum intellexerunt Veteres per Herpetem exedentem exposuimus in *Chirurgia Repurgata* N. 1374. Ex quibus constat partem eam Herpete tentatam sensim latius corrodere , & exulcerari per humorem acrem corrodentem . Qui si retinetur , stagnando sensim redditur acrior . Sed notatu est dignum , quod non absolute recenscat Herpetem quemcumque , sed qui exedit sedem , pudenda &c. Unde concludere possumus partes has magis exigere Calidum quam morbus ipse . Hoc etiam quotidie experimur in praxi omnibus morbis pudendorum utriusque sexus , & ani admodum conducere Calida . Ut si quis vellet uteri hæmorrhagiam , vel mensium profluvium suppressere applicatis frigidis ad pudenda , ut consuevimus facere ad aliam hæmorrhagiam compescendam , summum inde damnum esset expectandum . Eo itaque magis si ipse morbus harum partium , ut est Herpes exedens , verat actu frigida .

**Quibus partibus Calidum amicum & decretorium .** XII. Post recensionem partium , quæ afficiuntur Herpete exedente , uno verbo voluit indicare applicata Calida non ita conducere morbo recensito , sed præcipue his partibus , ut constaret medicos , & chirurgos ad omnes morbos harum partium semper debere applicare actu Calida , quum Calidum sit Amicum , & Decretorium , id est hæ partes jucundo sensu efficiuntur per Calida applicata , & commodum sentiunt , & si aliquis morbus in his partibus sit curandus , vix curari potest , nisi actu Calida simul applicentur .

**Quibus partibus frigidum inimicum & occidens .** XIII. Quibus partibus frigidum sit inimicum , & noxium superius ( *App. 211. II.* ) recensuimus ; sed his addi possunt anus , pudenda , uterus , vesica , ex eadem ratione , quod partes hæ debili matu vitali donatæ sint . Verum insuper nullus est locus in toto corpore , ad quem tanta est humorum excretiorum colluvies , quorum effluxus si cohibeatur per frigidum applicatum , facile potest omnem illarum partium actionem suffocare .

#### L I B. V. A P H. XXIII.

216. **I**n his autem frigido uti oportet , unde sanguis erumpit , aut erupturus est : non super ipsa , sed circa hæc , unde influit . Et quæcunque inflammationes , aut flammæ ardores ad rubrum , & sanguinem colorem vergentes novo sanguine super ipsos : nam inveteratos nigrescit : erysipelas etiam non exulceratum jurat , quoniam exulceratum ledit .

**Frigidum quomodo adhiben-** I. **N**E autem aliquis iudicaret frigidorum usum ita noxium esse , ut non possit adhiberi frigidum ad ullum morbum curandum , hunc Aphorismum

num scripsit Auctor, in quo tres proponit morbos, quibus frigida sunt adhibenda, & quidem cum tanto iudicio, ut mirari possimus, tunc temporis solis experimentis practicis eo usque pervenire potuisse scientiam medicam.

II. Generalem regulam exhibet de frigidorum applicatione ad sanguinis fluxum cohibendum, quia per frigus minuitur motus vitalis propellens sanguinem, & ipsum sanguinem coagulat, quibus junctis, sisti debet ille effluxus. Propterea si damnum sit verendum ex sanguinis fluxu, generaliter frigida sunt adhibenda, quæ effluxum sistunt. In hac autem regula curationis generalis duo sunt observanda. Ne pars ipsa vetet frigidi applicationem, & ut applicetur ad locum convenientem. Primum ex precedente Aphorismo colligi potest. nam partes circa anum, & pudentia frigidi applicationem vetant, unde in mensem, & lochiorum profluvio, atque in hæmorrhoidum fluxu nimio nunquam per frigida conamur sistere fluxum, sive actu fiat, sive insitet. Alterum est, ut non immediate applicetur ad partem, quæ sanguinem fundit, sed circa eam nude insit. Si enim parti sanguinem fundenti applicetur frigidum, id quidem effluxum sanguinem coagulabit, sed non inhibebit affluxum novi sanguinis; unde tali in loco sæpe ingens sanguinis copia colligitur: quod si vero frigidum applicetur ad arteriam ducentem sanguinem ad locum apertum, ut valeat temperare sanguinis impetum, & ad extremitatem istius arteriæ coagulare, secure sistetur sanguinis fluxus, quia nihil novi adduci potest, unde in narium hæmorrhagiis fronti adhibentur frigida, non vero ipsis naribus.

III. Quam difficile sit ex phænomeno conspecto aptum adhibere auxilium, illi norunt, qui cum studio diu exerceverunt praxin, nascuntur enim sæpe similia phænomena ex oppositis causis, ut inde idem phænomenon diversam exigat medicationem. Ita in hoc Aphorismo laudat frigidi applicationem ad inflammationem, dum tamen experientia doceat per frigida applicata inflammatam partem vel abire in sphacelum, vel indurationem. Inde per circumlocutionem Auctor indicare voluit, se non intelligere veram inflammationem, quæ incipit cum Calore, Ardore, Colore, & Tumore, sed aliam speciem, quam vocat Epiphlogisma, seu incendiosa ad rubrum & subcruentum ex recenti sanguine vergentia. Ex qua circumscriptione colligere debemus cutis rubedinem cum ardore subito natam sine tumore, & sine dolore, quæ in inflammatione adfuit. Neque hæc conjuncta phænomena sufficiunt, quoniam in phthisicis, empyematicis, & scorbuticis sæpissime observemus hujusmodi fugaces rubedines, & ardores præprimis in facie, quæ non sunt curandæ applicatione frigidi, quum id acre irritans, quod rubedinem, & incalcescentiam facit, simul a motu illo majore subigatur, & nunquam abeat in suppurationem. Epiphlogisma autem morbus est constantior, & si perduret motus major, non raro transit in veram inflammationem, sed si peractum frigida motus, & calor ille major compescatur, nihil periculi est expectandum. Si vero tam diu duravit Epiphlogisma donec fecerit tumorem, dolorem, & in sanguine ibidem retento lentorem, tunc frigida applicata concrelescere faciunt sanguinem, ex quo concreto, & collecto pars fit nigra, & dein corrupta. In tali Epiphlogismate monet frigidum applicandum esse ad partem ipsam, quod in sanguinis profluvio veteratur, quia motus major in hoc non erat in parte ipsa, sed in adjacentibus; in illo autem pars ipsa motum majorem habet, ad quem temperandum adhibentur frigida.

IV. Quid sit Erysipelas in *Chirurgia repurgata* N. 1418. exposuimus. Istud autem per signa externa ab Epiphlogismate difficile decernitur, habetur enim in utrisque rubedo & ardor, sed Erysipelati aliquis adest dolor, & rubedo ad flavedinem vergens. Humor Erysipelas producens a veteribus dicitur biliosus, id est tenuis, saponaceus, subpinguis. Tali in morbo monet tam diu adhibenda esse frigida donec sit exulceratum Erysipelas. Hoc etiam hodie experimur in praxi, & non caret ratione, quum humor talis per frigus applicatum minus agitatur, & magis incrassatur, multum amittat

dum in  
sanguinis  
eruptio-  
ne.

Quali in-  
flamma-  
tioni seu  
epiphlo-  
gismati  
frigida  
applican-  
da.

Frigida  
quando  
Erysipe-  
latis adhi-  
benda.

tar de sua acedine: non tamen nimis diu debemus refrigerare, sed continuare donec naturalis calor & color redeat parti. Si vero destructa sint vasa, format speciem Herpetis (Aph. 215. XI.) in quo frigida sunt moxia, uti omnibus ulceri bus (Aph. 213. II.)

## LIB. V. APH. XXIV.

217. **F**Rigida, velut nix, glacies, pectori inimica, tusses movent, sanguinis eruptiones, ac catarrhos inducunt.

Frigida,  
velut nix,  
glacies,  
pectori  
inimica.

**V**ersatur auctor in exponendo usu & damno calidi & frigidi applicati, & in precedente tradidit usum frigidi applicati; nunc agere vult de summo frigore, & propterea exemplum ponit in nive & glacie, quia hæc paulo maiore calore liquefunt primo in aquam frigidissimam. Hodie constat experimentis thermometrorum maiorem gradum frigoris esse in nive, & glacie quam in quavis aqua fluente. Propterea in hoc Aphorismo solummodo perpendendum quid faciat frigoris gradus maior, quam qui reperitur in aqua frigidissima. De tanto gradu frigoris dicit eum inimicum esse pectori. Quoniam nos in septentrionalibus regionibus inhabitantes frequentia habemus nivis & glaciei experimenta, facile iudicare possumus, quid sit sentiendum de veritate hujus sententiae. Non observamus degentes in locis nivis vel gelu confectis frequentius corripri pectoris morbis quam reliquis temporibus, imo in rigidissima tempestate Anni 1740. paucissimi morbis pectoris correpti fuere: quam ob rem posita ab auctore sententia non satis videtur veritati convenire. Sed si rem penitus inspiciamus, veritas clarissime constabit. Auctor enim in hoc loco agit de usu, & damno frigidi, & calidi applicati, & nunc pro exemplo adducit nivem, & glaciem pectori applicatam, & tali in casu pronunciat ea pectori inimica esse. Hoc autem nostris in regionibus raro instituitur experimentum, sed in calidioribus regionibus, ubi Hippocrates habitavit, erat in frequentiori usu ad temperandum nimium calorem. Inde hoc modo concipienda est sententia, si quis excalescens fuerit, & tunc pectori applicat nivem vel glaciem ad temperandum calorem, id omnino damnosum est. Quare monet medicos istorum locorum ne imitentur illam malam consuetudinem. Aut si faciant, expectare debent tussim, sanguinis ruptionem & catarrhos.

Cur frigidam pectori applicata inducant tussim, sanguinis eruptiones & catarrhos.

**II.** Ut nos Auctoris nostri scripta legentes intelligeremus qualia genera morbum pectoris observaverat Hipp. ab applicata nive vel glacie producta, citavit Tussim, Sanguinis eruptiones, & Catarrhos. Quali modo hi morbi ex tali causa nasci possint paucis videbimus. Tantum frigus pectori applicatum, ut est in Nive & Glacie, facile potest mucum in cryptis tracheæ & bronchiorum hærentem constringere, ut maneat in hærens suis lacunis: hoc quoties fiat, quia tunc aliquid durum est in trachea, quod irritat, id debet proritare Tussim. Sed quoniam tenacissime ille mucus concretus adhæret lateribus tracheæ tussiendo difficile separari potest, & propterea manebit tussis pertinax, quæ iterata concussionem violentam tandem rumpere faciat vas cruentum in pulmonibus, quo generatur sanguinis eruptio seu hæmoptysis. Idem frigus cohibendo naturalem ex pulmonibus exhalationem facit, ut in vasculis & nervis exhalantibus humor stagnans acrior factus membranam bronchiorum & laryngis impleat humore tenui, & frigido, qui morbus vocatur catarrhus (Conf. Aph. 110. III.). Hinc toties non solum a nive vel glacie pectori applicata oritur Catarrhus, sed fere semper ab omni aere frigidiore accepto in corpore calido. Ita quidem nobis constat dictos morbos generari ab applicatione frigidi ad pectus, sed si simul inde deduci posset methodus medendi, præstantior esset observatio: Si quis Tussi vel Catarrho laborat, protinus confugiunt ad eclegmata: sed si perpendamus in hoc casu causam fuisse nimium frigus



gus concrefcens humores in organo refpiratorio, & forfan etiam fanguinem in extremis arteriarum, facile concipere poffumus nihil præftantius effe quam fovere iftas partes vapore humido, & calido. Quapropter egregium erit auxilium ad Tuffim, & Catarrhum talem curandum, haurire ore aperto vaporem bullientis aquæ, & bibere potum peftoralem quantum ferri poteft fervidum.

## LIB. V. APH. XXV.

218. **T**umores autem in articulis, & dolores absque ulcere, & podagricos, & convulfiones, magna ex parte, frigida multa affufa, & lavat & exsenuat, & dolorem folvit. Torpor enim modicus doloris folvendi vim habet.

**C**ontra confuetudinem noſtram non poſſum hac in re Auctori conſentire, ut in praxi ad articuloꝝ dolores & tumores, & contra dolores podagricos & ſpaſmata affunderem multam aquam frigidam, vel adhiberem frigida ſtupeſcentia ad ſopiendoſ dolores, quum mihi experientia conſtet, talia attuliſſe præſens levamen, ſed ſemper veritus ſum humores in tumore ſtagnantes ab actuali frigida concretum iri, vel repelli ad nobiliora viſcera: atque experientia didici a quodam agyro applicatum fuiſſe frigidum ad leniendum dolorem podagricum eo effectu, ut in poſterum articulus non potuerit moveri. Quamobrem Auctor eſſe nolo, ſuadens juniorem Medicum, ut imiteret hanc curationem ad leniendoſ dolores. Scio quidem cum Hipp. actum frigidis applicatis minui dolorem, ſed ſcio ſimul inde ſæpe magnum periculum fuiſſe natum. Nam ſi quis membrum ex combustione dolens demergat in frigida aqua, ſtatim ſentiet doloris levamen, verum quam primum recaleſcere incipit, multo acrior erit dolor & profundior eſchara, quam ſi tale quid non feciſſet.

Quinam  
tumores  
& dolores  
articuloꝝ  
rum le-  
vantur  
frigida  
multa af-  
fuſa.

## LIB. V. APH. XXVI.

219. **A**qua, quæ cito caleſcit, & cito refrigeratur leviffima eſt.

**N**on eſt Hippocratis ſcopus in Aphoriſmīs omnia criteria alicujus rei ſimul congerere, ut ſæcitare ſolent Syſtematici ſcriptores, ſed unam alteramve ſententiam abſolute proferre, etiamſi aliis in circumſtantiis omnino contraria inveniantur: quare non ſemper integram doctrinam alicujus rei in Aphoriſmīs invenimus, ſed plerumque partem duntaxat aliquam abſolute poſitam. Ita in hoc loco rimatur, aquæ levitatem, ex eo quod cito caleſcat & refrigeretur, ſed propterea non negat aliis etiam modis aquæ levitatem inveniri non poſſe, per ſtateram vel reliqua ſtatica experimenta, neque propterea inſert eam aquam magis minuve ſalubrem eſſe, uti quidam contendunt. Quare experimentis hæc obſervatio phyſica eſt comprobanda vel refutanda. Illa docent corpora caleſcēta refrigerari communicando calorem ambientibus; itidem frigida incaleſcere, ſi ambientia ſunt calidiora. Quo ſuperficies tangens ceteris paribus eſt major, eo promptior communicatio. Conſtat ergo quod ea corpora, quæ majorem habent ſuperficiem cum eodem pondere, citius calorem & frigus immutent & tradant ambientibus, quam quorum ſuperficies eſt minor. Ergo ad probandam levitatem ſufficit citior communicatio caloris & frigoris, quum inde conſtet idem pondus in duobus diverſis corporibus non habere eandem ſuperficiem, & cujus ſuperficies eſt major, iſtud corpus dicitur levius. Ad uſum medicum laudatur aquæ levitas, non quod talis aqua ſemper ſit ſaluberrima, ſed ut plurimum, quoniam aqua ſemel vel bis deſtillata eſt leviffima & tamen inſalubris, & poſſunt putrefactæ exhalationes aquæ miſtæ

Quoniam  
aqua ſit  
leviffima.

296 *MEDICINA HIPPOCRATICA* *App. 219.*  
 mistæ esse, quæ tamen non augent aquæ pondus specificum: sed quando aqua  
 specificè redditur gravior, ut plurimum continet sales vel partes metallicas so-  
 lutas, quæ aquam usus humano insalubrem faciunt.

L I B. V. A P H. XXVII

220. *Quibus autem bibendi appetentia noctu, iis valde sitientibus, si obdor-  
 miverint, bonum.*

Unde sitis  
 nocturna.

**M**ulti homines noctu sitiunt ex mala consuetudine; alii vero quia largiore  
 cena, præprimis alimentorum salutorum vel aromaticorum usu suere, aut  
 largius biberunt, quod Græcis erat in frequenti usu; denique quidam ex quodam  
 latente morbo aliquo chronico, omni nocte sitiunt: nam si quis morbo acuto la-  
 borat non solum noctu sed etiam de die sitit. Ex his speciebus conjicio Auctorem  
 solummodo eam intelligere, quæ oritur ex quodam morbo chronico latente, nam  
 si aliquis morbo manifesto laborasset, eam simul morbum nominasset. Neque per-  
 fectam sanitatem intelligit, quoniam isti noctu non sitiunt nisi ex errore com-  
 missio in dicitur, quæ sitis nec bonum nec malum indicat, quum noctibus sequen-  
 tibus non continetur. Operæ pretium ergo erit rimari morbum, qui sitim no-  
 cturnam facit. Hodie observamus, homines cruditate humorum laborantes ex defectu  
 virium, quæ materia cruda aliquo modo vergit in corruptelam, noctu sitire,  
 quando nempe id corruptum ad os delatum sensum sitis infert, quæ tamen sitis  
 non est placanda largiore potu, ut fieri debet si quis sitiat ex humidi defectu.

Quando  
 sitis per  
 somnum  
 optime re-  
 datur.

II. Si quis concipit præcedentem morbum, in quo vix videtur ægrotare, in-  
 tellectu facilius est hujus Aphorismi sensus. Nam qui noctu valde sitient ex hac  
 causa, signum est, tunc maxime prædominare corruptum crudum ex defectu vi-  
 rium naturam. Quod si tunc illi multum bibant noctu, magis onerabunt corpus  
 inutili copia aquæ, & ita morbi causam potius augent opprimendo vires. Si au-  
 tem superdormierint, bonum est, quia tunc non oneratur corpus multitudine  
 ingesti, & vires recuperantur per somnum. Interim continuata coctione in  
 somno subigitur & emendatur id crudum, disponiturque ad insensibilem per-  
 spirationem, qua dein diffilatur. Hæc ergo observatio utilissima est valetudina-  
 riis noctu multum sitientibus, ut se, quantum ferre possint, abstineant a po-  
 tatione nocturna. Hanc malam consuetudinem, non ignoro, multos alios abro-  
 gare ex omnino alio principio, quod judicarent ab ingesto novo potu turbari  
 coctionem, sed quoniam ea sententia passim a nobis est refutata, coctionem in nobis  
 non fieri ut in lebece ad igne supposito, non erit opus hanc rem repetere.

L I B. V. A P H. XXVII

221. *Suffusus aromatum muliebris ducit. Sæpius autem ad alia utilis esset, nisi  
 capitis gravitates induceret.*

Suffusus  
 aromatum  
 muliebris  
 ducit.

**I.** Quod ex rebus exhalat, aeri permiscetur & ita applicatur naribus aliisque  
 partibus corporis, id vocatur suffusus: quædam ex his sponte talem fuf-  
 sum præbent, ut omnia odora & olentia; alia autem igni injecta tantum  
 suffum præbent, vel gratum vel foetidum, uti mastix, succinum, mirra &c.  
 Hodie vero adjecto sale volatili, vel quædam cum alcoholo destillata, quæ al-  
 ter vix essent odora, pro suffum inserviunt. Quia autem Hipp. mentionem facit  
 de suffum aromatum videtur intelligere omnia aromata, quæ tunc temporis erant  
 in usu, quorum in loco surrogari possunt hodierna quoque omnia Aromata, quæ  
 col-

collecta inveniuntur in Libro filii nostri *Davidis de Gorter de Materia Medica*. Quæ vel sponte, vel igni injecta fumum exhalant aromaticum. Ita Caryophyllus, Cinnamomum, Rosmarinus, Majorana sponte vel aque ebullienti injecta, suffitus præbent. Alia vero prunis ardentibus injecta, uti myrrha, mastix, succinum, olibanum, benzoin & multa alia exhalant fumum aromaticum. Hæc nunc Muliebria ducunt, id est menses vel lochia suppressa provocant, & quæ in utero continentur, ejiciunt. Quidam dubitant num naribus vel pudendis adhibenda sint. Litem de his non movebo, ego sentio hoc in loco intelligi debere suffitum applicatum pudendis, vel directione infundibili in pudenda immissum. De omnibus aromaticis constat corpori nostro applicatis facere calorem & motum majorem tali in parte. Quod si itaque ope suffitus applicantur aromata pudendis mulierum, his quoque majorem motum facere. Quoties vero in fibris uteri motus major generatur, uterus quæcumque in se continet ejicit. Propterea sanguis in uteri cavo conclusus, vel & alia aliena in utero contenta ejiciuntur. Si vero menstruus sanguis in uteri vasis contentus, propter languidiorem in utero motum subsistat, quod sæpe fit in mensibus suppressis, hoc suffitu commotis fibris uteri, ille sanguis expelletur. Ex eadem ratione Veteres toties indiderunt pessaria acria aromatica ad provocandos menses. Quoniam ille Suffitus vel potest esse siccus vel humidus, cum judicio hoc vel istud est eligendum: nam si pudenda in muliebribus contentis simul calefunt & sicca sunt, eligendus est suffitus humidus, & tunc melius erit vaporem mollem & humidum applicare quam aromaticum. Si vero pudenda sunt frigida, & humidiora, quod sæpe fit in mensibus suppressis, magis conducit suffitum siccum, & aromaticum applicare. Quoniam hi Suffitus sine discrimine omnia muliebria ducunt, cavendus est eorum usus in gravidis, ob periculum abortus.

II. Ut ampliore usum hujus Suffitus aromatum traderet, addit ad alia quoque utilem esse, cum hac cautela, interdum simul inducere Capitis gravitatem. Ex qua adjuncta cautela patet Auctorem hic velle innuere vaporem vel fumum aromaticum exhalantem interdum hauriri naribus, ad multos morbos capitis, sed in usu horum debet selectus fieri aromatum, & etiam idiosyncrasia ægri vel ægræ est observanda, quoniam quidam suffitus aromatici simul inferunt capitis gravitates, atque quibusdam in hominibus unum aroma infert capiti molestiam, quod alteri adfert levamen, quod discrimen non ita observatur si suffitus adhibetur pudendis. Quippe suffitus membranz pituitariæ applicatus, suo stimulo allicit humores, & encephalum in consensum trahit, sed humores hic alliciti non ita possunt per hanc viam evacuari, quemadmodum ex utero, cujus orificium aperiri potest: unde interdum fit, ob allicitos humores versus encephalum, non potentes evacuari, quod caput ita multitudine horum onustum aggravetur. Hodie vero loco horum frequentius adhibentur sales volatiles, & aromata in spirituosis soluta.

Et ad alia  
sæpius est  
utile, nisi  
capitis  
gravitates  
induceret.

## L I B. V. A P H. XXIX.

222. **P**regnantes purgande, si surgat materia, quadrimestres, & usque ad septimum mensem, hæc vero minus. Juniores autem & seniores sæpius, caute vitare oporteret.

I. Idem aphorismus habetur (*Aph. III.*) Sed ibi adducebatur scopo purgandi, hic vero, quia Auctoris scopus est agere de morbis & curatione gravidarum, hæc repetitio ejusdem sententiæ tolerari potest. Sed propterea non erit opus repetere expositionem nostram allegato loco traditam.

## LIB. V. APH. XXX.

223. **M**ulierem in utero gerentem ab acuto aliquo morbo corripi, lethale.

Cur lethale  
gravidam  
acuto mor-  
bo corripi

**I.** Quam dicantur prægnantes seu in utero gerentes, superius exposuimus (Aph. 111. II.) Et definitionem morbi Acuti dedimus (in Comp. T. 53. XLVII.) ubi præprimis intelleximus Morbos acutos febriles periculosos & minus periculosos. Galenus autem & alii ad hunc titulum etiam conferunt morbos sine febre, uti Apoplexiam, Epilepsiam, Convulsionem. Inde variae species morborum acutorum sunt, uti vehementes, febriles, & symptomaticæ, quæ ex Inflammatione vel Erysipellate particulari nascuntur, hæc omnes in hoc loco intelliguntur. Febres autem mitiores, ut ephemeræ, & quædam ex intermittentibus, ad hanc prognosin referri nequeunt, quoniam satis commode sæpe a gravidis tolerantur. At Acuti Morbi sine febre, qui nimiam constrictionem faciunt, uti Epilepsia & Convulsio, vel cum motus extinctione, uti Apoplexia, & Animi deliquium, nisi sint vehementes, non lethales sunt pronunciandi. Hæc prognosis, ut sit certa & perspicua, exigit causarum expositionem, quæ vel matri vel fœtui sunt exitiales. Febres acutæ essentielles & symptomaticæ validissimam habent circulationem per omnes arterias, & etiam per arterias uteri, quæ sanguinem tradunt principiis venarum in placenta. Hæc autem venæ duntaxat arteriis uteri sunt contiguæ, & non cum iis concretæ, unde facile fieri possit per eam vehementem circulationem, ut placenta venæ a contactu eo depellantur, post quarum separationem fœtus a matre nihil amplius accipere potest; ita fœtus privatus communione cum matre necessario moritur. Quasi hæc assignata causa non sufficeret, alia simul nascitur fœtum extinguens, nempe tanta fit humorum & sanguinis matris inversio per motum febrilem, ut sæpe ineptus reddatur ad nutriendum fœtum. Inde rarum est, si gravida femina corripiatur febre acuta, ut non tandem abortiat. Ceteræ species etiam non carent periculo, nam vehemens musculorum & etiam partium internarum convulsio ita interdum constringit ventrem vel forsan ipsum uterum, ut vel fœtus vi excludatur, vel placenta separetur ab utero, & dein sequatur abortus. Si vero in apoplexia vel syncope omnis motus extinguatur, dimitti potest placenta co hæsi, quæ restitui nequit, dum femina ad se redit. Hæc autem species minus est lethalis, quam morbus acutus febrilis, quum observetur in praxi, feminas gravidas sæpe pati animi deliquia, & tamen fœtum sanum legitimo tempore parere.

## LIB. V. APH. XXXI.

224. **M**ulier in utero gerens fœta vena abortit: & magis si major fuerit fœtus.

Cur gravi-  
da abortit  
a vena fe-  
brile.

**I.** Nos non solum in vestitu sed etiam in methodo medendi alias gentes imitatur, non attendentes num sit ex ratione, vel malum vel bonum fortitur effectum: nam postquam in Gallia invaluerat mittendi sanguinis consuetudo in gravidis ad præveniendum abortum, nos quoque in regione frigidiore degentes, earum gentium mores secuti sumus, adeo quidem, ut vix habeatur mulier gravida, quin curet sibi bis terve venam tundi, quo prædicant faciliorem futurum partum, & multa alia bona. Quædam autem prudentiores suum consulunt Medicum domesticum, vel Chirurgum, vel Pharmacopolam. Hi prout magis minusque adiecti sunt phlebotomiæ, vel suadent, vel dissuadent sine ullo discrimine in quavis femina gravida venam esse secandam: ut ad hoc usque tempus admodum fluctet quid sit agendum. Qui imperant venam secandam esse, dicunt sanguinem menstruum

strum gestationis tempore retentum venæ sectione minuendum esse ne officiat. Alii autem contendunt sætus nutrimentum detrahi & ita necari? Et ita incerta redditur praxis. Si consulamus nostrum Auctorem satis patet, eum omnem venæ sectionem interdicare. Antequam autem ejus sententiam perpendamus, præmonendum est, veteres ad heminum seu uncias decem duxisse sanguinem. Si ergo quis rogaret an femina gravidæ vena est secanda, tunc omnino veterem omnem sanguinis missionem. Sed si queritur an non conduceret sanguinem mittere ad quatuor vel quinque uncias, ut hodie fit, absolute non potest negari vel concedi. Nam si femina non grvida copiosus solet evacuare menses, dum grvida sit, quoniam sætus tenellus tantam copiam in incrementum sui non possit convertere, ex abundantia relicta fieri potest abortus depulsa placenta: sed quæ parcius purgantur, quoniam nullus est abundantia timor, his per venæ sectionem generatur defectus, & ita penuria alimenti abortit. Propterea priusquam prudens Medicus concedat Phlebotomiam, ipsi constare debet tali in femina tantum esse sanguinis abundantiam, quæ placentam ab utero depellere potuisset. Sed in his non acquiescunt fœsцитantes, si vena secetur, querunt, num venæ superiores vel inferiores sint secandæ. Neque in hoc consentiunt Auctores, maxima tamen pars suadebit sectionem superiorum venarum, quam contendunt abortum impedire. Alii autem dicunt post factam venæ sectionem æquabiliter totam massam esse minutam, & propterea sine discrimine quamcumque venam aperiri posse. Contra hoc autem inferre possumus, quia tempore venæ sectionis aliquid est discrimen, satius erit eam eligere venam, quæ hoc tempore omnium minimam mutationem inducit, id est si fieri debet sanguinis missio, melius erit superiores quam inferiores venas aperire.

II. Sanguinis missionis ratio erat, minuire sanguinis quantitatem, ne abundantia depelleret placentam. Si igitur tenellus sætus, qui parum nutrimenti capiebat, valuit persistere, sane nullus timor amplius superest sætum grandiorum, qui plus nutrimenti capit, depulsum iri ab utero per sanguinis abundantiam. Satis itaque mirari nequeo quamobrem ita mala consuetudo invaluerit mittendi sanguinem instante partu, quum in partu ipso per lochia fluentia satis copiosa sit expectanda sanguinis evacuatio. Si ullum sit tempus, in quo esset sanguinis missio vitanda, sane illud erit in quo inevitabilis sanguinis evacuatio sit expectanda, ut fit in partu. Inde his temporibus summa observatur puerperarum debilitas & pallor. Contendunt tamen sanguinis missione faciliorem fieri partum. Sed si in praxi perpendo discrimen inter istas, quibus vena est secta, & in quibus omissa, fateor me observasse feminas, quarum vena non fuit secta, regulariter facilius peperisse, quam quæ passæ fuere sanguinis missionem.

Cur magis abortit si grandior erit sætus.

# L I B. V. A P H. XXXII.

225. *Mulieris sanguinem evomenti, mensstruis erumpentibus, solutio fit.*

I. **F**æminis ætate maturis, nec lactantibus, nec gravidis, singulis mensibus per pudenda evacuat quædam sanguinis quantitas, quæ evacuatione restituit æquilibrium inter sanguinis copiam & actiones moventes, unde evacuatio hæc vocatur mensstruatio, menses, & catamenia, quæ est ergo evacuatio naturalis (Aph. 3. V.) Si vero præter solitum istud tempus hac via non emittitur in recensita femina sanguis, talis mensium suppressione laborat: & quando deinceps sponte emittitur sanguis, mensium eruptio proprie vocatur. Quare mensium eruptio designat antecessisse Catameniorum suppressionem ex morbosa causa. Quando igitur accumulata fuit in corpore abundantia, quæ ad aliquam partem ferebatur majore im-

Mensium eruptio quid nescit.

Quid notet  
vomitus  
cruentus.

petu, his erumpentibus tollitur abundantia & reducitur impetus ad partem aliam.  
II. Non omnis sanguinis reiectio per os Vomitus Cruentus vocari debet, quum in prognosi & curatione multum differat, num sanguis veniat ex faucibus, pulmonibus, & ipso ventriculo. Qui sanguis in cavo ventriculi collectus fuit, nauseam creans & dein vomitum proprie Vomitus Cruentus appellari meretur, & isque sanguis sæpe est grumofus, quum ante ejectionem contrefcere poruit in ventriculo, & habet permixta reliqua ventriculi contenta, ut ita a congeneribus facile distinguatur.

Cur mulieri  
sanguinem vo-  
mitenti,  
menstruis  
erumpenti-  
bus, solutio  
fit.

III. Ex præmissis his facile erit concludere hanc observationem praticam ratione fundatam esse, atque interdum naturam aliquam evacuationem suppressimere alia evacuatione. Quippe sæmina tempore suppressionis mensium si inciderit in vomitum cruentum, non facile liberabitur ab eo morbo manentibus suppressis mensibus, quum sæminarum corpora naturaliter generent maiorem sanguinis abundantiam, quæ renovabit vomitum cruentum. Si vero tali in sæmina menses erumpunt, duo simul fiunt, quæ compescunt vomitum cruentum; fit enim per menses non solum ablatio quantitatis sanguinis, qui ventriculi vasa dilatabat, verum etiam directio impetus a ventriculo ad uterum, quo minus ventriculi vasa distenduntur. Eodem etiam modo, sed minus secure per aliam hæmorrhagiam & venæ sectionem sisteretur vomitus cruentus; quia vero sanguinis missio simul non habet signum directionis ad aliam partem, tam certe non compesceret Vomitus cruentum: neque venæ sectio, neque quævis alia hæmorrhagia tam certe promitterent menstruationem in ordinem redituram, quam promittitur erumpentibus mensibus, sine quibus sæmina matura, neque gravida, neque lactans, vivere nequit sana. Ergo non solum solutio fit vomitus cruenti, sed promittit quoque integram sanitatem, quam non tam secure ex aliis evacuationibus sanguinis possumus promittere. Hoc bonum observavit Auctor ex mensibus erumpentibus in vomitu cruento, & ulterius non concludit, quum sit mera simplex practica observatio: sed si perpenditur causa solutionis, hæc regula ad alias quoque sanguinis evacuationes referri potest, & præprimis ad hæmoptysin, quæ omnium periculosissima censetur: propterea in sæminis hæmoptoicis, ex mensibus erumpentibus, sanitatem promissi & multo minus periculum quam in viris, qui hac naturali evacuatione carent. Dum ita in his natura nobis optimam demonstrat viam, medicus naturæ minister hanc demonstratam viam debet calcare, & potius per emmenagoga tempore menstruationis conari in his sæminis referre menses, quam per iteratam venæ sectionem temperare vomitum cruentum, & simul suppressimere menses.

## L I B. V. A P H. XXXIII.

226. Mulieri, mensibus deficientibus, e naribus sanguinem fluere, bonum.

Ex quibus  
causis de-  
ficiant.

I. Menses ex tribus his diversis causis deficient (1) Si sæmina ætatis maturæ ob morbum aliquem non fundit statò tempore sanguinem, talis defectus ut plurimum vocatur mensium suppressio. (2) Si talis matura femina reddatur gravida, vel lactans, in quo casu non eget alia succentruriata evacuatione sanguinis, (App. 224.). (3) Denique increfcente ætate tandem deficient menses, quando nullis auxiliis sunt promovendi, quum post istud tempus ætatis si menses pergunt fluere, non amplius vocatur menstruatio, sed hæmorrhagia uteri, inter morbos recensenda: adeo ut eadem evacuatio, quæ ante istud tempus ætatis salubris erat, & summum erat signum sanitatis, nunc vero post hanc ætatem habeatur inter morbos.

In quibus  
mensibus  
deficienti-

II. Si rimamur has tres causas, facile erit judicare qualisnam mensium defectus sit intelligendus. Nam quibus menses deficient ex causa morbosa, modo simul addit sanguinis abundantia, nam cum sanguinis defectu semper noceret hæ-

MOR-

morrhagia, his levamen fit si sanguis e naribus fluit, quum fluxus tollat illam abundantiam: an vero talis hæmorrhagia bona sit dicenda vehementer dubito. Præsens quidem adfert levamen, sed eo obstinatiorem suppressionem faciet, ut quæ feminæ sæpe patiuntur hæmorrhagiam narium, vel quæ curant sibi perurunt venam, ut minuant symptomata ex sanguinis suppressione nata, in posterum vix unquam ad ordinatum menstruum fluxum redeunt, sine quo vix ipsa femina matura sana vivit: quare hæc ad evitandam præsentem molestiam se in majus malum præcipitant. Videtur inde patere sanguinem menstruum pejorem esse reliquo sanguine cum ejus evacuatione maneant sanæ, sed sunt valetudinariæ per quamcumque aliam sanguinis evacuationem. Ego vero puto differentiam hujus causam non consistere in majori, vel minori sanguinis bonitate, quum demonstratum sit, sanguinem menstruum æque sanum esse, quam qui aliunde educatur, & tenellum foetum ex hoc præcipue sanguine nutrimentum, & incrementum capere; sed quod omnes naturales evacuationes non patientur integre suppressi sine ullo damno, etiamsi aliqua artificialis, vel nonnaturalis succenturiata evacuatio habeatur. Altera causa ex graviditate, vel lactatione suppressens menses si faciat hæmorrhagiam, semper damnum infert. Propterea concipiendum est Hippocratem in hoc Aphorismo intellexisse subsistentes menses ex ætate. Quæ observatio hoc etiam tempore vera est: cui feminæ enim ex ætate subsistunt menses, huic, nisi alia fiat sanguinis evacuatio, vel naturalis, vel artificialis, multi generantur morbi, quum natura consuevit per tam longum tempus huic evacuationi, non patitur statim suppressi. Verum non perinde est, per quamcumque viam natura exitum querit, nam si faciat vel per vomitum, vel hæmoptysin, ex ratione harum partium, succenturiatam evacuationem, novos morbos generare ex læsis organis. Sed quia hæmorrhagia narium talem læsionem non adfert, bonum dici potest; ut aliquoties experti sumus. Ratio autem, cur bona censeatur illa hæmorrhagia, est, quod ille suppleat defectum sine subsequente læsione, ergo naturam possumus æmulari instituendo venæ sectionem, quam alternis mensibus, & dein rarius instituere possumus.

L I B. V. A P H. XXXIV.

227. **M**ulier in utero gerenti si alvus multum fluxerit, periculum ne abortiat.

I. **A**lvus multum fluit, si deponantur plura per anum, & per longius tempus, Alvi fluxus in gravidis cur periculum abortus infert? quam judicare possumus suppeditari posse ab alimentis assumtis: interdum enim accidit, ut quedam recrementa collecta in intestino colo, uno die ejecta multum superent copiam ingestorum, sed talis evacuatio etiam in femina gravida salubris est, quæ liberat corpus ab inutili sarcina; hæc exoneratio non dicitur alvum multum fluere; sed si præter recrementa alimentorum, & humorum eo consensuum, & sine prægressa accumulatione, alvus per longum tempus multum egerit, tunc censetur multum fluere. Ergo in tali fluxu non solum rejiciuntur inutilia, sed etiam humores utiles, vel qui inservissent præparationi, vel nutritioni. Ita ergo privatur corpus mulieris gravidæ utili suo humore, & inde redditur ineptius ad nutriendum foetum, ut monimus in venæ sectione (*Aph.* 224. L.). Ex hac non solum causa abortire potest detractio nutritio, verum etiam quoniam intestinum rectum utero adjacet, quod in tali alvi fluxu continuo instigatur ad egerendum, uterus per consensum non raro quoque disponitur ad elidendum id quod concepit, seu disponitur ad abortum faciendum. Quoniam duæ illæ causæ disponunt ad Abortum, mirum est inde non frequentius fieri Abortum. Monemur itaque nos non debere sine summa necessitate dare purgans mulieribus gravidis, quibus frequens est alvus adstricta; sed si necessitas ducendi alvum in gravidis urget,

get,

302 *MEDICINA HIPPOCRATICA* Aph. 227.  
get, solummodo alvum laxantia sunt propinanda, & tam parva dosi, sed tamen  
iteratis vicibus, ut duntaxat semel, aut bis ex medicamento usu alvum depōnant.

L I B. V. A P H. XXXV.

228. *M*Ulieri ab hysterica passione vexata, aut difficulter parienti, sternutatio superveniens, bonum.

Hysterica  
quid no-  
tet.

Sternutatio  
in hysterica  
passione.

I. *Q*Uum ipse Galenus optimus Hippocratis interpres fateatur obscuritatem esse in vocabulo *δυσκώμ*, num denotet suffocationem uterinam, num uteri contenta post partum, num omnes morbos uteri, non est mirum quod firma doctrina aditui non possit, Sternutationem prodesse, vel nocere. Concedendum est Literatoribus hoc vocabulum frequentissime significare Passionem Hystericam, unde medici, & ipse Galenus multis verbis conantur adstruere, sternutationem prodesse hystericiis. Si autem sensum Aphorismi inspicimus, multo magis conveniret per Hystericum in hoc loco intelligere secundinas retentas: num si uterus non valet expellere foetum, vel secundinas, bonum erit si sternutatio superveniat. Sed hysterica passio nihil commune habet cum partu. Quia vero noster scopus est usum medicum quærere ex sententiis Hippocratis, non vero emendare lectionem, videbimus num sternutatio sit bona in Hysterica passione secundinis retentis, & partu difficili.

II. Nullum invenio in tota praxi morbum difficilius definiendum quam eum, quem solent vocare Passionem Hystericam. Qui enim hunc morbum ex sua causa definire satagunt, contendunt semen muliebri corruptum esse, & suos halitus sursum pellere ad fauces. Alii vero ipsum uterum accusant, quem putant ascendere ad fauces: Quia vero etiam ille morbus ante maturam ætatem observatur, in vietus, mensium profluvio laborantibus, & in gravidis, imo etiam in virili sexu, & quoniam anatomica dissectio ad oculum demonstrat uterum ascendere non posse, patet clarissime hanc definitionem nullo modo determinare, & exprimere Passionem Hystericam: neque tiro Medicus inficiis ex definitione data valeret sibi formare morbi ideam. Qui vero ad faciliorem intellectum ex phænomenis visibilibus definiunt Passionem Hystericam, putant sufficere per interceptam respirationem hunc morbum cognitum facere, vel tam multa congerunt phænomena aliis quoque morbis communia, ut vel exercitatus medicus vix perspicere valeat, quænam sint characteristica signa passionis hystericæ; & quia hystericum nomen adest, quod solis mulieribus est proprium, incerti hærent si similia phænomena etiam observantur in masculino sexu, inde coacti fuere eundem morbum in viris alio nomine appellare, propterea eum vocarunt suffocationem hypochondriacam; sed quoniam annis alte infedit opinio hunc morbum nasci ex semine corrupto, iterum nova nascitur difficultas, nuptos æque quam innuptos hoc morbo tentari, & præcipue istos, qui feminis profluvio laborent, vel venere abutuntur. Ut igitur in posterum constet, qualisnam morbus in utroque sexu vocetur Passio Hysterica, repudianda est omnis analogia vocis, & falsa præconcepra opinio, & tradendus est aliquis morbus suis characteristicis signis definiendus, quem aptius vocare potuissimus Suffocationem Convulsivam, quoniam species est convulsionis, quæ tandem frequentissime suffocationem inducit. In utroque sexu si in ventre inferiore sentiantur involuntaria commotio convulsiva, quæ sensim sursum vergit, in multis ac si globus ascenderet, & dein ad fauces veniens ita constringit fauces ut impediatur deglutitio, & suffocetur respiratio, hæc conjuncta phænomena vocant Passionem Hystericam: in graviori malo fauces in quendam tumorem elevantur; & inde compressis venis jugularibus tota sæpe facies livet. In leviori malo mens manet constant, & membra non moventur convulsive. Verum in graviori malo, ipsa a-

clio



Actio mentis exstinguitur, atque vel cadunt simul in animi deliquium, vel convelluntur membra, uti in epilepsia, interdum vero mens manet constans, dum tamen membra variis modis convulsione agitantur. Accedentia illa igitur symptomata duntaxat magnitudinem passionis hystericae denuntiant. Ex his phenomenonis nullo modo patet uterum esse affectum, & hoc etiam cadaverum inspectio confirmat, quoniam in hysterice passionibus suffocatis, & mortuus uterus fuit inventus insons, & aequo sanus quam aliis sanissimis feminis, sed phenomena docent Convulsionem incipere in mesenterio, & intestinis, propagari per ventericulum, & oesophagum ad pharyngem, cuius musculi una cum musculis laryngis tetanica constrictione contrahuntur: quod si illa convulsio tandem communicatur meningibus, exstinguitur mentis actio, ita comprimitur cerebellum, ut non emitat spiritus ad actionem cordis, & respirationis; vel si motus ille magis est inordinatus, membra externa convulsione epileptica exagitat. In tali nunc suffocatione hysterica nunquam in tota mea praxi potui observare sternutationem profuisse, neque video quid boni adferret. Propterea malo credere in hoc loco intelligendas esse secundinas retentas.

III. Dum formatur in utero foetus, quasdam dedit Deus partes auxiliatrices seu intermediarias inter matrem, & foetum, quarum ope inter haec duo viventia corpora communis habetur vita, ea lege, ut tamen mater sine his vivere possit, sed foetus ante perfectionem si iis privetur, aut si partes auxiliatrices non communicent matri, foetus necessario moritur, ut constat ex abortu, antequam foetus in suis organis est perfectus. Si vero foetus tandem organa perfecta acquisivit, quod raro fit ante septimum mensem a conceptu, patitur illam separationem, & suam propriam vitam agere potest, eo tamen debiliorem quo est conceptui propior, unde cadit falsa opinio foetum octo mensium debiliorem esse quam septem mensium, quum debilitas dependeat a minus perfectis organis ante exclusionem, quae octavo mense perfectiora sunt quam mense septimo. An vero haec partes auxiliatrices quaeque vitales sint, vel mortuae, nullam apud auctores invenio mentionem. Si vero perpendimus impedimenta circulationis a matre per placenta, funiculum umbilicalem intortum longissimum ad foetum, atque vicissim ex foetu debilissimo per easdem partes ad matrem, fateor me concipere non posse sine vitali actione propellente sanguinem in his partibus, fieri posse communem circulationem, sed si concedimus his partibus actionem vitalem, quam Deus noluit ultra novem menses durare in generatione hominis, egregie, & clarissime multa obscurissima in generationis negotio explicari possunt. Cur nempe foetus cogatur nono mense in lucem prodire? Cur mola formari possit, si in principio impraegnationis moriatur embryo, & multa alia, quae non sunt huius loci exponere, sed indicare volui multa obscura ex doctrina hac lucem mutare posse. Si igitur contingat, ut Secundae hae maneant in utero post partum, adstruit Auctor bonum esse si superveniat sternutatio. Hae secundae vel sunt partes firmae, uti placenta, membranae, & funiculus umbilicalis, quae partes proprie dicuntur secundae; vel sunt humores, nempe sanguis qui fluit ex lateribus uteri, & ex abrupta placenta, qui sanguis Lochiorum nomine venit. Forsan Hipp. ad partes non solum firmas, sed & sanguinem retentum significandum, dixit *ὀσπρίον*, in quo casu salutare est si superveniat sternutatio: nam si cuncta haec post partum retinetur, signum est orificium uteri esse clausum, quod ut aperiatur, sternutatio violenter contrahens ventris musculos multum valere potest, quoniam talis puerpera ex voluntate non valeat tantam ventris constrictionem facere, ut fit in sternutamento; quae aperiret orificium uteri clausum.

IV. Qui existimaret in omni Partu difficiliore conducere sternutamentum, & inde vellet adhiberi sternutatoria ad facilitandum partum, multa damna inferret

•Sternutatio in partu difficili, bonum.

sua præpostera medela; nam si ob situm alienum fœtus difficile parit mater, a concussione sternutationis majus induceretur impedimentum, truderetur enim fœtus in tantas angustias, ex quibus postea nulla manuum ope extricari possit. Sed si fœtus legitimo modo fuerit locatus, & propterea non parit, quod conamina parturiendi non sufficiant ad dilatandum uteri orificium, & elidendum fœtum, sternutatio superveniens, majori conamine contrahens abdominis musculos, valet in quibusdam parturientibus extrudere fœtum. Tali etiam in casu conduceret sternutatorium admove re naribus.

## L I B. V. A P H. XXXVI.

229. **M**ulier i menses decolores, nec eodem semper modo, & tempore procedentes purgationem indicans esse necessarium.

Menses de-  
colores  
quoniam  
dicuntur.

**I.** IN omni sanguine sano est color ruber, qui post concretionem & exsiccationem magis in nigredinem vergit, simulque inest prompta concretio dum stagnat; quotiescunque minuitur in sanguine rubedo, simul amittit aliquo modo eam potentiam concrescendi. Hanc rubedinem acquirit satis valida vitæ actio; quare omnibus in debilibus sanguis minus ruber est & pallescens. Si hujusmodi sanguis evacuator per pudenda in femina matura, fluxum illum menses decolores vocant quando statis temporibus redit, & iterum cessat. Si autem fere continuo stillat liquor alicans, ille morbus vocatur fluor albus. Constat ex diâis menses decolores arguere actionem vitæ debiliorem, & præsentiam cacochymiz.

Menses  
inordinati.

**II.** Menses ratione temporis quo fluunt, & ratione quantitatis possunt fieri inordinati. Regularis fluxus est singulis mensibus, quando per unum, duos, tresve dies sanguis ille evacuator ad certam quantitatem, non omnibus feminis æqualem. Si vero idem tempus periodi servent, sive sit longius, sive sit brevius; & si istis temporibus æqualis fere copia emittatur, menses dicuntur regulares: sed qui vel in tempore vel in quantitate variant, inordinati vocantur. Ita sunt inordinati ob aliquam morbosam causam, plerumque ex cacochymia, quæ ex debilitate virium nascitur.

Cur menses  
decolores  
& inordi-  
nati pur-  
gationem  
indicant.

**III.** Coniunxit duo signa mensium, ut inde formaret indicationem ducendi alvum ea ratione, quoniam unum ex his potuisset ex variis causis nasci, quæ omnes, non exigent purgationem: ita in hysteris sæpe sunt menses inordinati, qui tamen non egent purgatione. Sed quando decolores sunt & in tempore atque copia simul variant, pro certo accipi potest cacochymiam simul esse in primis viis, quæ sui eliminatione eget. Itaque magis ut signum purgationis tales censentur menses quam quod ipsi menses decolores curarentur purgantibus. Quippe sanguis pallidior non recuperat colorem per purgans, neque purgans valet errantes menses redigere in ordinem. Sed quoniam horum causa est cacochymia, purgans requiritur ad eliminandam illam. Non tamen præciperem aliquoties ducere alvum, majorem enim induceret debilitatem, sed postquam corpus a cacochymia est liberatum, satius erit corporis vires firmare roborantibus, ne nova generetur cacochymia, quæ mensium ordinem turbat, & pallidiorem producit sanguinem.

## L I B. V. A P H. XXXVII.

230. **M**ulier i in utero gerenti si mamma ex improviso graciles flant, abortit.

Consensus  
inter mam-  
mas & ute-  
rum.

**I**Nter multas corporis partes mirabilem esse consensum, quem non possumus ex legibus mechanicis deducere, passim (Aph. 125. III. 126. III. & 127. IV.) indicavimus. Sed maximus & mirabilis Consensus observatur inter Mammam & Uterum.

Uterum, etiam si partes ex admodum distent. Facile concipitur cur inter lumbos, intestinum rectum & vesicam, propter nexum membranarum, Consensus habetur cum Utero, verum quoniam inter mammas & uterum non inveniunt talem membranarum nexum, multis medicis magnam difficultatem peperit mediam partem Consensum facientem invenire. Galenus posuit vehas, hodierni assignant arterias. Fateor, nisi frequentissime in gravidis, lactantibus, & morbis uteri & mammarum fuisset detectus Consensus, nemo anatomicorum & physiologicorum, ex inventa fabrica, & experimentis hydraulicis vel mechanicis unquam detexisset hunc mirabilem Consensum: sed post eum detectum quæsierunt id quod Consensum faceret. Hinc forsitan neoterici auctoritate Galeni & aliorum ducti substituerunt arterias loco venarum, quæ Consensum facerent. Sed si per experimenta in viventibus tentemus inter arterias ab eodem trunco venientes rinari Consensum, eum nullibi talem invenimus, nam ex affecta arteria unius manus altera non consentit, neque consensus inter arterias utriusque pedis detegitur, etiam si major sit communis origo inter istas arterias, quam quæ detegitur inter arterias uterinas & mammarias. Quare mihi verisimile videtur, arterias magis excogitatas esse ad Consensum explicandum, ut aliquid dicerent, quam quod sit vera animi sententia eorum, qui hanc promulgarunt sententiam, cum nemo fuerit, qui inter fauces titillatas & musculos abdominis vomitum facientes, vel qui inter membranam internam narium titillatam & musculos respirationis sternutamentum facientes, ausus fuit eum Consensum ex anastomosibus vel ramificationibus arteriarum deducere: Quare fateri debemus latitare aliquid arcanum, quod Deus locavit inter quasdam nostri corporis viventis actiones. Et quoniam uterus & mammae in eandem rem perscrutandam tendunt, nempe ad generationem & nutritionem prolis, non est mirandum inter functiones has majorem esse societatem quam inter reliquas. Dum enim matura redditur virgo, quando ovaria incipiunt formare ova impregnationi apta, mammae quoque sororiant. Et dum mulier facta est gravis, sensim cum crescente foetu tument non solum mammae, sed lac stillare incipiunt, ut post partum promptum sit organum, quod infanti lac præbere potest. Hoc observatu est mirabile, quod tempore eo non mutetur mammarum structura aut cursus vasorum, sed quod solummodo earum actio mutetur, quæ mammae aliter nunquam præbuisset lac, nunc vero ex sua actione mutata satis copiosum lac conficiant & emittant. Sed si hanc mutationem actionis conferamus cum reliquis actionibus generationis, nihil arcani involvit. Nam ante maturitatem tam in viris quam mulieribus organa genitalia eandem habent fabricam, sed graciliorem, sensim vero ad maturitatem accedentia redduntur majora, turgidiora, & generant semen & ova prolifica: tandem vero in vetitis, licet structura organorum non mutetur, hæc tamen partes sensim exarescunt & generaturæ naturalis sterilitas. Idem quoque statuendum mihi videtur inter Mammas & Uterum, dum enim uterus foetus est prægnans, sensim roborari actione Mammarum, ut requisito tempore in se conficiant lac proli præbendum. Si quis autem quærit quas partes intermedias assignare hunc Consensum facientes, nullam huic negotio aptiorem agnoscerem quam nervos, quorum mirabilis consensus multis etiam in morbis observatur, ut tradidi in *Comp. T. 17. XXX. ad XXXIV.*

II. Præter motum animale ex voluntate, vitalem perpetuum, & particularem in quibuscumque organis, uti in ventriculo & intestinis, quædam alia motus species in nostro corpore vivente detegitur, qui solummodo ob certam causam agentem se exercet. V. G. non est in voluntate nostra contrahere & dilatare oculi pupillam, vel movere lentem per ligamentum ciliare, sed hæc actio se accommodat visui, in tenebris enim etiam contra nostram voluntatem pupilla se dilatat, verum contrahitur in clariore luce. Hæc maxime in partibus genitalibus observatur, quæ

Cur mam-  
mae ex  
improvisè  
graciles a-  
porum  
præsa-  
gunt.

ex voluntate neque rigent neque fasscunt. Neque femina parturiens conatum parturiendi cohibere potest. Ita etiam mammae sensim magis turgent incremente utero. Sed si interim uteri actio debilitetur, simul ob summum consensum debiliior fit Mammarum actio, uti post seminis ejectionem detumescunt corpora sponsiosa. Si ergo mammae in gravidis subito gracilescent, hujus detumescentiae causa in ipsis Mammis non est querenda, sed in eo organo debilitato, quod antea valens per Consensum turgere faciebat Mammam. Ergo signum est uteri actionem esse debilitatam. Quae talis si fiat, vel quod foetus in utero moriatur, vel quod placenta ab utero fuerit debilitata, necesse erit, ut post paucos dies ejiciatur foetus, qualem abortum nullis auxiliis praevenire possumus.

## L I B. V. A P H. XXXVIII.

231. **M**ulier in utero gerenti si altera mamma gracilis fiat gemellas gestanti, alterutrum abortis, Et, si quidem dextra gracilis fiat, marem, si vero sinistra, foeminam.

**I.** Vterus sectione reliquorum animalium in structura uteri admodum depicti, existimantes utrum constare multis cellulis, vel etiam duobus receptaculis seu cornubus, facile concipiebant alterutrum gemellorum abortiri posse. Postquam autem in feminis detexerant neoterici uterum intus unicum habere cavitatem, inter quos quidam fuisse existimantes gemellos eadem includi membrana, & communem habere placentam, negarunt abortum fieri posse, altero servato. Ego vero in quadam honestissima matrona observavi abortum, quae matrona post tres vel quatuor menses parturit gemellos: quare a tribus foetibus fuit gravida, quorum unus ante legitimum tempus per abortum perit, duo reliqui gemelli perfecti in lucem prodierunt viventes. Ergo certum est alterutrum gemellorum abortiri posse. Sed inde non constat uterum mulierum constare multis loculis distinctis, ut in quibusdam quadrupedibus. Verum constat gemellos non habere communem placentam, neque in eadem membrana concludi. Uterus quidem unam communem habet cavitatem, sed regulariter unusquisque foetus, si plures simul sint in utero, suam propriam habet membranam & placentam, interdum autem tali in casu placentae illae inter se concreverunt, in quo casu necesse est, ut eodem partu gemelli prodeant. Aliter autem qui proximus adjacet uteri orificio abortiri potest relicto altero.

**II.** Rarissima sunt exempla foeminam gemellis gravidam alterutrum abortire; forsitan Hippocr. talem vidit abortum semel aut bis, & in iis observavit Mammam dextram gracilem factam antecessisse, dum elidebatur mas, sed sinistram, dum facta foemina. Inde forsitan iudicavit hoc perpetuum esse, quum ex sectione quadrupedum constabat uterum habere duo cornua. Hanc igitur sententiam posteritati reliquit, quae magnam habens in verbis huius Senis auctoritatem, non dubitavit eandem amplecti. Si vero ipsa experimenta consulamus, nihil certi in hac observatione deregimus; quare non amplius hoc praesagium Mammae gracilescentis inter certa prognostica tenendam. Et quamvis verum esset praesagium, nulla propterea in arte Medica utilitas, nam sive marem, sive foeminam abortiat, par esset periculum, & nulla differentia medelae.

## L I B. V. A P H. XXXIX.

232. **S**i mulier quae nec praegrans est, nec peperit, lac habeat, ei menstrua deferuntur.

**E**tiam si lac liquor sit visibilis, qui patiat experimentis examinari, & constanti lege in omnibus viviparis animalibus post partum generatur in Mammis;

mis, est tamen inter Auctores Medicos magnum dissidium, quoniam sit humor. Quidam enim dicunt esse chylum per ductum thoracicum ad Mammam delatum: alii statuunt esse chylum cum sanguine ad Mammam delatum & dein separatum: nonnulli contendunt esse sanguinem per Mammam in lac conversum: deinde sunt, qui Lac & Pus eundem humorem faciunt. Nos non immeritum aliorum sententias ponderandis & refutandis; duntaxat exagitaturi quæ vera sunt & ad scopum medicum pertinent, ex quibus demonstratis cetera facile corrent. Lac est humor admodum heterogeneus, nutritioni apicissimus, secretus & confectus in Mammis & dein emissus. Neque ipse chylus est, neque sanguis, quum stagnans præbeat butyrum, & coagulatum formet caseum, quæ proprietates neque in chylis neque in sanguine observantur. Est ergo liquor particularis in animali corpore. Si autem lactis originem spectamus, proxima materia, ex qua formatur, est chylus, qui ulteriore actione corporis est elaboratus, & tandem ad Mammam ductus, ad maiorem perfectionem deducitur, & a reliqua massa sanguinis segregatur, cum liquor ulterius in Mammis lactantium confectus & emissus post longam inediam; dum nihil amplius restet in corpore chyli, amittat naturales lactis dotes, & insans eum liquorem abhorreat, atque quædam proprietates assumtorum, quæ actione corporis viventis non facile subiguntur & extinguuntur, in lacte etiam detegantur. Hoc specificum est in lacte, quod contineat etiam materiem nutritiam & corpori utilem, dum vero reliqui humores, qui excernuntur in sanitate, sint corpori inutiles. Sed hoc mirabile est in omni humore qui generationi inservit: nam ipse sanguis menstruus, & semen virile non est humor inutilis.

II. Omni igitur tempore & in utroque sexu præfens est Lactis materia, quum chylus in primis viis natus in sanguinem delatus, ibi ulterius elaboratus invenitur: non tamen omni tempore & in utroque sexu invenitur lac separatam, & per Mammam emissam; sed regulariter in puerperis, in quibus etiam per longum tempus ea continuatur lactis generatio & emissio. Interdum autem quibusdam puerperibus nulla sequitur Lactis confectio. Observatum quoque fuit facta frequenti Mammarum suctione, sine prægressu partu, Mammam lac præbuisse, imò in quibusdam viris, sed rarissima sunt exempla; verum in recens natorum Mammis aliquid lactis simile sæpe invenitur, quod ab obstetricibus exprimitur, ne mammillarum durum relinqueret tumorem. Quod autem regulariter in fine gestationis & in puerperio generetur lac, id demonstrat, quod Mammarum glandulæ, si liceat vocare Mammarum fabricam, in puerperis acquirant actionem seu motum, quem antea non habuere, quo materies chylosa in communi massa sanguinis confecta, in mammis ulterius ad perfectionem deducitur, & a reliqua massa separatur. Ergo ad inquirendam lactis generationem duntaxat est assignanda causa, quæ hunc motum in mammis producit. Illa manifesta est, nam postquam uterus sensim major est factus & robustior, si partes auxiliatrices fetus incipiant mori, vel ab utero separantur, uterus non amplius valens confectum umorem trahere fetus, Mammam in consensum trahit, earumque actionem instigat in principio concipit Colostrum, sed cessante instigatione uteri, sua continuata actione purum lac concipit & emittunt. Observavi in feminis robustissimis, quæ toto gestationis tempore fuere lactantes, quod tamen post partum præbebant Colostrum, certo indicio colostrum non formati ex materia pinguiore retenta, sed speciali instigatione uteri, seu speciali uteri actione ad Mammam delata.

III. Ad lactis generationem in Mammis non sufficere ut abundaret sanguis vel chylus in corpore demonstravimus, sed insuper generari debere motum seu actionem in Mammis particularem, quæ allatum chylum cum sanguine ulterius in naturam lactis commutat, & a reliqua massa segreget: inde factio Mammarum frequens hunc motum suscitans, tandem Lactis generationem produxit, & semina

Lactis  
generatio

Quando  
menstrua  
retentia  
lac gene-  
rant in  
mammis

lactans continuata suctione pergit generare lac; sed sensim minuta suctione, donec cessaverit hæc actio, sine incommodo evanescit lactis generatio. Inde non omnis mensum suppressio lactis generationem producit, neque falsa graviditas lac præbet Mammis, quum uterus morbosus non valeat sanam illam, & vegetam in Mammis, per consensum contitare actionem; etiamsi chyli abundantia habeatur in corpore, sine hoc motu non fit ejus conversio in lac, neque segregatio a reliqua massa sanguinis. Ex quibus omnibus concludere possumus ad lactis generationem requiri materiem productioni Lactis aptam, atque motum Mammarum particularem, & sive hoc, sive istud deficiat, non formari Lac. Si ergo menses deficiunt, generatur quidem abundantia humoris, sed si simul uterus morbo afficiatur, non generatur illa requisita actio: verum si in mensibus retentis uteri actio reddatur robustior, quod interdum fit, tali in casu Mammæ in se lac generare possunt. Quod autem in menstruantibus non generetur regulariter lac, inde est quia Lactis materia aliunde evacuatur. Novi tamen feminas, quibus omni tempore erat lac in Mammis, etiamsi menstrua ordinate fluebant: hæc etiam in gravitate & lactantes menstrua fundebant, sed erant admodum succulentæ & plethoricæ. Nunquam autem lac in Mammis observavi, nisi præcesserat partus, quo hæc actio Mammarum fuerat concitata, nunquam vero in virginibus, nisi subsistant menses. Egregium ergo est signum si virgo celat partum, ad detegendum an partus præcesserit, quia rarissimum sine partu prægresso Mammis generare lac.

## L I B. V. A P H. XL.

233. **M**ulieribus, quibus in mammas sanguis convertitur, insaniam significat.

An mania prædicatur ex sanguinis collectione ad mammas.

**E**andem sententiam habet (H. a. 711:) sed in masculino, Hippocrates, unde patet non solum mulieribus, verum etiam viris maniam præfagiri ex sanguinis conversione ad mammas. Ut formetur præfagium ex phenomenis, certe constare debet, quodnam istud sit, ex quo præfagium sit petendum: verum non satis constat quid sit sanguinis conversio aut collectio in mammas. Si in communis significatione hæc accipiat phrasis, denotaret sanguinem ad mammas ferri majore impetu quam ad alias partes, & per mammas libere meare non posse, unde fieret, mammarum tumor, rubor, ardor, dolor, pulsatio: ex quibus conspectis signis prædiceremus Maniam, id est Delirium vehemens & constans. Nullus dubito, quin Auctor noster post illa signa circa mammas observaverit maniam fuisse secutam, & propterea hanc observationem transtulerit in præfagium. Sed haud credo sæpe fuisse observatum, quum ego in tota mea praxi nunquam hoc observare potuerim: neque convenit aliis legibus, quas in consensu & metastasi morborum observamus. Inter mammas enim, & cerebrum vix ullus consensus, sæpe dirrissimos mammarum dolores, tumores, inflammationes, & canculos tractavi, sed nunquam inde secuta fuit mania, neque metastasis, morborum ad mammas maniam intulit. Hoc autem contingere potest in morbis mammarum, ut in aliarum partium morbis, quod acris materia in mammis nata a sanguine recepta ad cerebrum delata maniam inferat: vel quod corpora valde mobilia nimio dolore mammarum commota in maniam præcipitent; sed ex rarissimis his exemplis & nihil speciale a reliquis partibus habentibus, non possumus formare præfagium. Quare credo Auctorem nostrum, dum observaverit ea signa circa mammas, & dein maniam, forsan judicasse hæc signa præbuisse causam manie sequentis, dum quivis alius morbus interim maniam induxisset. Hoc etiam fallere potest exercitatissimos in arte medica, & fateor me non semel tali modo delusum fuisse, si æger binis morbis laborabat, quorum alter latens quædam symptomata inducat, quæ ex morbo manifesto vix oriri potuerit.

L I B.

## L I B. V. A P H. XLI.

234. *SI scire velis an mulier conceperit, dormiturse aquam mulsam propinato, & si ventris tormina eam corripuerint, concepit, sin minus, non concepit.*

**L** *SI* femina gravida fuerit per quatuor vel quinque menses, ut fœtus se movens, uteri & mammarum tumescencia certa præbeant indicia imprægnationis, non est opus periculum facere per melicratum, num femina sit gravida: sed primis gestationis mensibus utile foret hoc detegere posse, ne tempore eo darentur emmenagoga, vel purgantia fortiora, quibus procuratur abortus. Propterea sedulo omnia pertentantur medici, num possent primis mensibus graviditatem detegere. Inter experimenta erat Melicratum vespertino tempore datum, sed non additur hujus ingerendi quantitas; neque præparandi modus, an ex aqua & melle vel crudo vel cocto, aniso, vel cumino adjecto, an ex melle cum lacte, dein an post cenam, an vero incenatæ mulieri sit dandum, quæ omnia præscienda erant, antequam aliquid certi ex melicrato ad definiendam graviditatem potuisset hauriri. Denique quædam mulieres hystericae vel mobilitate laborantes, etiamsi non sint gravidae, sed huic potioni non assuetæ, in ventris tormina inciderent. Ex quibus omnibus clarissime patet admodum incertum esse experimentum, ut inde concluderemus, num fœmina primis mensibus esset gravida aut non. Quamvis quotidie examinari possint signa graviditatis, tamen ad hoc usque tempus, etiam in mulieribus multorum liberorum matribus, tam incerta & dubia habentur, ut primis mensibus non nisi per conjecturas detegere valeant graviditatem. Inter certissima inveni in mulieribus sanis, quæ regulares habent menses, mensium suppressionem sine causa manifesta, dum interim simul reddant urinam sanam: nam quoties non ex imprægnatione menses subsistunt, urina sanitatis notam non servat, sed aliquod signum morbi latentis solet præbere, quom sanguis morbose detentus æquilibrium destruens, aliqua labe inficiat urinam: sed retentus ex graviditate, in incrementum fœtus cedens, non ita destruat æquilibrium. Si vero, ante imprægnationem, illa fœmina aliquo morbo laboraverit, hoc signum etiam est incertum. Quæ mulieres etiam gravidae menses fundunt, non possunt cognoscere graviditatem, nisi quod menses pauciores fluant quam antea. Idem quoque sentiendum in lactantibus, hæ enim experiuntur lac minus copiosum generari, dum tamen sanæ maneant. Reliqua signa, uri appetitus alienus, nausea, vomitus, inordinatus motus in ventre, anomala sunt, & æque vexant mulieres mensium suppressione laborantes, quam gravidas, & sæpe magis. Invaluit apud mulierculas, medicos videre posse ex urina, num fœmina sit gravida, & medicus ex inspecta urina sæpe verum pronunciat præsagium, quoniam ex duobus facile est forte fortuna conjicere verum. Sed si tamen sine fallacia præsagium sit faciendum ex urina de graviditate, id paucis medicis est datum, & multi medici vilipendentes urinæ inspectionem, omnino irridunt hoc signum. Ego autem sæpius sine fallacia, tam in honestis matronis nuptis, quam in virginibus corruptis ex urinæ inspectione prædixi graviditatem. Quia vero illa uromantia nihil arcani in se continet, & aliis quoque usui esse potest, meam tradam methodum. Si honesta matrona nupta urinam inspiciendam præbet, dubitans an per duos tresve menses sit gravida, & invenio urinam in omnibus signis sanam, percuor an ante istud tempus regulares habuerit menses, & an in præsentī ceteroquin sit sana, præterea an aliquas motiones in ventre inordinatas sentiat, & ventriculi aliena appetentia, vel nausea laboret; quod si annuat, pronuntio esse gravidam, ex hoc principio, quoniam aliter reddidisset urinam morbosam: si vero dicat se inordinata

An ex melicrato exhibitio graviditatem cognoscere valeamus.

solere

folere menstrua habere, & nunc subsistere integre atque reddere urinam morbosam, nihil certi de imprægnatione dicere valeo; quum tam in gravidis quam non gravidis morboſa poſſit reddi urina. Verum ſi quis pro virgine corrupta adferat urinam, ut videamus num ſit gravis, prudentiſſime debemus agere, ſemper rogandum per quot menſes ſubſtiterint menſtrua, an primis menſibus ſuppreſſione graviora vel leviora aderant ſymptomata. Quod ſi reponat percuſſatrix ſymptomata fuiſſe graviora, ſenſim quidem minora & mitiora fieri, ſed plane non evaneſcere, & propterea auxilium petere, ut integre liberetur, dum interim habeatur urina ſana, nunquam me ſeſellit, quin talis virgo fuerit gravis. Si tunc a nobis exigunt Emmenagogum, ut ducantur menſes, de quorum ſuppreſſione primarie conqueruntur, nunquam tale quid dandum eſt, & tamen medicamentum aliquod non eſt denegandum, quia aliter adiret forſan alium medicum minus peritum vel pharmacopolam, qui ipſi daret petitum forte emmenagogum: & ita procuraret infandum abortum. Tali igitur in caſu ſemper aliquod propinandum medicamentum roborans, quod ſedulo moneo hauriendum eſſe per menſem integrum: quia vero raro tales virgines deſoratz ante tertium menſem ſuſpicantur ſe gravidas eſſe, uſu hujus medicamenti, ad iſtud tempus geſtationis perveniunt, ut motum foetus ſentiant, & venter ipſis viſibiliter tumere incipiat, quando non amplius medicamentum ecboicum expoſcere audent. Juniores ergo medicos moneo, ne ita prompti ſint in præſcribendis emmenagogis, quamvis a virginibus poſtulentur; ſed ut ſemper ſecundum dictam methodum prius inveſtigent, num talis virgo ſit gravis, ne ſua præpoſtera exhibitione petiti medicamenti abortum faciant, quod a nobis non minus, quam infantidium teneatur. At honeſte ſailere debemus virginem deſoratz ecboicum a nobis exigentem, & prævenire ne malevolorum auxilia ſibi comparet.

## LIB. V. APH. XLII.

235. **M**ulier prægnans, ſi quidem marem geſtat, bene colorata eſt: ſi foeminam, male colorata.

**I.** Quæ obſervationibus, vel experimentis obviis demonſtrari poſſunt, non erit opus auctoritate comprobare. Noſtro tempore æque quam olim mulieres marem, & foemellam utero gerunt: ſed ad prædicendum num paritura ſit marem, vel foemellam, hodie tam parum conſtat ac olim. Quare conſtat nulla certa eſſe criteria, ex quibus aliquid conſpicere poſſumus in gravis, qualis ſexus continetur in utero. Poſuit autem Hippocrates gravidam coloratiorem eſſe ſi marem gerat in utero. Hanc ſententiam, quæ nullis nititur experimentis, ſed quadam recepta opinione, mares foemellis robuſtiores eſſe, paucis ponderabimus. Faciei color dependet a liquore colorato per vaſa faciei fluente, cum ipſa vaſa omni colore careant. Quod ſi ſanguis, & lymphæ per hæc vaſa circulantia ſana ſint, facies bene colorata erit; ſed in cacochymia converſa faciem alieno etiam colore inficiunt. Igitur faciei color denuntiat humorum bonam, & malam conſtitutionem. Quando igitur mulier ſit gravis, & foetus tantum inſumit, quantum per menſes antea emittebatur, & uterus ſua extensione nulla ſymptomata inferat, talis mulier ſive marem ſive foemellam gerat, retinebit colorem vividum faciei: ſed ſi foetus plus, vel minus conſumit, ut ita deſtruatur æquilibrium, vel ſi foetus ægrotat, aut uteri extenſio per conſenſum afficit chyli organum, quædam cacochymiz ſpecies generatur, quæ faciem alieno colore inficit. Hoc autem quoniam non dependet ex diverſitate ſexus, ejus quoque ſignum eſſe nequit. Atque ſexus differentia etiam poſt nativitatem uſque ad pubertatem tam exigua eſt in hominibus natis,

An ex colorata gravidæ marem, vel foeminam prædicere poſſimus.



natu, ut inde vix quidquam deduci possit : sed si organa genitalia perfecta sunt, tunc demum ex diversitates introducuntur, quæ naturam maris, & femine solent sequi. Quamobrem hanc sententiam incertam, & futilem relinquimus Auctori, & iis qui in re nullius arcana quærunt.

L I B. V. A P H. XLIII.

236. *Si mulieri prægnanti erysipelas in utero fiat, lethale.*

I. **Q**Uum erysipelas, & Inflammatio in partibus externis a medicis sæpe confundantur propter multa communia signa, non erit mirum istos morbos in partibus interioribus, ubi multo pauciora signa habentur characteristica, ut plurimum confundi, & vix a peritissimo a se invicem dignosci. Qui ponant horum morborum differentiam in diversis humoribus, Erysipelas scilicet oriri ex bile acris, & calida, Inflammationem ex puro sanguine, satisfecisse existimant : sed quando egra uteri morbo laborat, non indicat simul juniori medico, num morbus ille veniat ex bile acris calida, an vero ex sanguine puro, sed medicus tenetur ex observatis signis latentem differentiam eruere. Facile concipere possum Erysipelas uteri valde periculosum esse, difficile autem erit detegere, num uterus Erysipelate tentetur, tum ex convenientia cum inflammatione, tum ex affectione partium circumjacentium, & quoniam tumor, dolor, & color sensibus externis non patent : inde majoris momenti est invenire, num uterus Erysipelate afficiatur, quam ex Erysipelate prognosin formare. Quantum ergo vel ex praxi, vel lectione auctorum ad cognitionem hanc mihi comparare potui, proferam. Si femina in infimo ventre sentiat dolorem vehementem, calorem æstuantem, quæ symptomata magis simul urgent vaginam, & pudenda quam intestinum rektum, & vesicam, quamvis semper hæc quoque partes consentiant, constabit ex his, vel Erysipelas, vel Inflammationem tentare uterum. Sed si tunc simul per reliquum corpus habeatur febris remittens magis quam continua, cum calore mordaci magis quam urente ; si urina evacuata sit flammea acris pellucida ad flavedinem vergens, ut plurimum sine sedimento, & sine signis coctionis ; pulsus celer magis quam durus ; sanguis emissus si fluidus fere maneat, & rubellus, nullam cuticulam formans, judicabimus uterum Erysipelate tentari. Sed si febris continua ardens, urina rubra sæpe cum incipientibus signis coctionis, pulsus durus, & frequens simul adsint, judicandum est uterum inflammatione affectum esse, quod Galenus ponit quæstione dignum.

Uteri erysipelas an distinguatur ab Inflammatione.

II. Uterus in gravidis non solum fit amplior, verum etiam in suis lateribus crassior, & magis valens, ut docuit anatomica inspectio in mulieribus paulo ante, vel post partum denatis : & Clarissimus Ruyschius detexit hoc tempore in uteri fundo fibras morrices orbiculares, quas musculus vocat, certo indicio movendi potentiam tunc temporis multo validiorem esse quam in non gravidis. Docet nos observatio prædicta, quo pars erysipelate tentata majorem habeat movendi potentiam, eo quoque plus periculi inferri ab eadem irritante causa, quum ædulo valens instigata omnia destruat, quod non ita ex debiliore actione erit expectandum ; ex qua causa variolæ in robustis censentur periculosiores quam in pueris debilibus. Ergo tempore prægnationis erysipelas plus periculi addert, quam alias ex sua natura intulisset. Fœtui fere semper mortale est Erysipelas, quamdiu non est perfectus, faciet enim abortum, si vero circa finem gestationis fuerit, potuisset exclusus fœtus manere vivens. Retineri enim in utero nequit fœtus, quum uterus Erysipelate affectus, cum motu valido inordinato, tum exsudante ichore erysipelatoso placentam ab adhesionem sua debellet : & sanguis materia erysipelatofo infectus fœtus nutritioni erit ineptus. Si ergo Erysipelas uteri generatur ante

Cur uteri Erysipelas prægnanti lethale.

fœtus

312 *MEDICINA HIPPOCRATICA* *Apb. 236.*  
 foetus perfectionem, mortiferum est foetui; sed dein si veniat, foetus exclusus  
 superstes manere potest: inde foetui lethalis, id est non semper sed sæpe mor-  
 tem inferens: matri quoque lethalis, nam a parvo Erysipelate si sit affectus  
 uterus cum subsequente foetus exclusione, non semper exstinguitur mater, sed  
 si magna sit, mortem inferre potest.

L I B. V. A P H. XLIV.

237. *Quæ præter naturam tenues existentes in utero gerunt, abortiunt, priusquam crassescant.*

*Præter naturam tenues, quæ dicuntur.*

I. *Supra (Apb. 69. II.).* exposuimus corpora ex natura gracilia seu tenuia, & diximus maciem illam tunc sanitati, & corporis actionibus non obesse: atque in hujusmodi corporibus invenimus interdum majorem esse vigorem, & copiam sanguinis quam in crassis seu obelis. Hic autem dicit Auctor præter naturam Tenues mulieres. Erga hoc in loco majorem gradum extenuationis intelligit, quæ simul defectu aliquo sanguinis laborat, & corpus propter extenuationem quoddam actiones exercere cum tanto vigore, & constantia non valet, ut alia corpora sana. Ita tamen ut non sit extenuatum corpus ex morbo, uti in phthisi, vel marasmo, sed quod ceteroquin habetur sanum. Nempe quod corpus macie confectum est sine sensibili morbosa labe, tantummodo quod ex alimentis assumtis non satis nutriatur. Multi Commentatores in ea sunt sententia, hic intelligi corpus inedia confectum, sed experimur pauperes, licet faciem confectam, minus abortire quam laute viventes, quare intelligendæ sunt feminæ macilentæ nimis, ex deficiente actione nutritionis.

*Cur hæ abortiunt priusquam crassescant.*

II. Si ita gracilis, & macilenta femina sit gravida, cujus actio ad bonos generandos humores, ut se ipsam nutriat, est debilitata, vix esset rationi conveniens, hoc corpus valere conceptum foetum non solum nutrire, verum simul incrementum dare. Propterea primo, & secundo adhuc mense, dum tenellus embryon pauco liquore absorpto vivere potuit, non excluditur, sed vero majus incrementum capiens, egens copiosiore nutrimento ex uteri vasibus, propter humorum defectum in corpore matris, amplius nutriri nequit, inde tandem nutrimenti defectu moritur atque excluditur, plerumque secundo, vel tertio mense. Tam diu igitur abortui obnoxia sunt, donec sufficiens iterum sanguinis copia in eo corpore generetur, quod ex corporis augmento conjicitur: quare tandem crassescente corpore valeant foetui sufficiens nutrimentum dare, & gestare ad legitimum pariendi tempus.

L I B. V. A P H. XLV.

238. *Quæ vero mediocriter corpus habentes abortiunt bimestres, & trimestres sine causa manifesta, his uteri acetabula mucosa plena sunt, & non possunt continere foetum præ graviditate, sed abrumptur.*

*Uteri corylledones mucosa plene an abortum faciunt.*

I. *TR*ibus his Aphorismis vult Auctor ex corporis habitu prælagire abortum sine causa alia manifesta. Demonstravit quomodo in corpore gracili generatur, & demonstraturus est abortum in obelis: sed quia mediocriter habitus nequit esse abortus causa, si tamen talis femina abortum faciat sine causa manifesta, quæ potuisset in quovis habitu abortum facere, indicare vult causam internam latentem, eam dicit esse mucum opplentem corylledones uteri. Quoniam hæc causa est latens, ea debuit erui ex anatomica dissectione, quod hujusmodi mulieres dein mortuæ habuerunt corylledones mucosa plenas: vel ex aliis simul apparentibus signis conjicere debemus has partes mucosa plenas esse.

De

De Anatomica dissectione vehementer dubito, nam si Hipp. inspexisset uterum femineum, non dixisset Cotyledones, sed dixisset uteri cavitatem, quoniam quadrupes Cotyledones habent, sed seminarum uterus intus unica cavitate donatus satis demonstrat, Hippocratem non inspexisse uterum huiusmodi seminarum, num mucus fuisset abortus causa. Ergo hoc ex aliis signis conicere debuit, si nempe femina multum muci continuo fundat per pudenda, si post menstruationem etiam multum muci effundatur, & quando una cum abortu multum muci exit. Ex quibus conspectis forsitan iudicavit, habita ratione analogie quadrupedum, mucum illum cotyledones nimis implere.

Mittamus ergo sententiam cotyledonum, quæ in feminis non inveniuntur, sed ponamus feminam mediocriter crassam continuo, secundo, vel tertio mense abortire sine manifesta causa, eamque ante graviditatem rursus muci evacuat, & una cum abortu multum muci prodire, non erit mirandum hanc feminam ex muci abundantia abortum facere, priusquam grandior nascitur foetus. Si enim uteri cavitas mucos abundat, signum est in uteri fibris debilem esse motum vitalem, quæ causa ubique mucum producit. Si igitur tali in utero debiliore non satis etiam constringente ejus orificio, ovum femineum a semine virili imprægnetur, primis mensibus, quamdiu per placentam non est nexum utero, sed solummodo retinetur in utero ejus orificio clauso, humore in cavum uteri depositum imbibit, & sic sensim increfcit: dein vero quando debet applicare placentam utero, ut acquirat cum matre communem circulationem, tenax mucus latera uteri obfessa tenens intercipit ingressum vasculorum placentæ in oscula uteri hiantia: quare foetus ampliore nutrimento egens, non potentia placenta intrare oscula interna uteri, debita copia nutrimenti fraudatus moritur, & quia os uteri laxius est contractum, facile excluditur.

Ita concipimus ex muci abundantia generari posse abortum in feminis mediocriter crassis, sed inferre velle hanc unicam in his esse causam, ut plerique ex Auctore nostro colligunt, nimis arduum videtur: quum non semper ex matris culpa nascatur abortus: potest enim semen virile non satis valens debiliorem præbere embryonem, qui primis mensibus moriens, vel facit abortiri ovum vacuum, vel si placenta tunc maneat vivens, producit molam: potest etiam vita partium auxiliatricum extingui primis mensibus, quando mulier abortiens excludit parvum admodum foetum. Quare causa abortus primis mensibus tam in patre, & partibus auxiliatricibus est querenda, quam in matre, cujus uterus mucos esset plenus.

## LIB. V. APH. XLVI.

239. **Q**Uæ præter naturam crasse existentes non concipiunt in utero, his omentum os uteri comprimit, & priusquam attenuetur, prægnantes non fiunt.

**I.** Si perpendimus ea, quæ Hipp. protulit de uteri structura & cotyledonibus, facile constare potest, eum non inspexisse cadavera humana, & propterea nunquam vidit in denatis sterilibus, num omentum usque ad uterum sit protensum. Igitur per certam quandam conjecturam in præter naturam crassis, iudicavit os uteri ab omento compressum Sterilitatem induxisse. Experimur quidem etiam his temporibus præter naturam crassas mulieres non ita fertiles esse, quam quæ mediocriter pingues sunt, interim tamen notæ mihi sunt mulieres obesse fertiles. Id autem sciendum est, mulieres præter naturam crassas, quales intelligit Auctor, raro concipere. Huius causam dicit esse omentum comprimens os uteri, ut inde istud non potuisset se satis dilatare ad recipiendum semen virile. In valde obesis invenimus quidem hodie. Omentum usque ad pudenda pendulum, & attri-

Omentum  
os uteri  
premens  
sterilitatis  
causa.

R r

gere

314 *MEDICINA HIPPOCRATICA* *Apb. 239.*  
 gere posse externam uteri substantiam, inde vero argumentari velle os uteri comprimari, ita ut semen accipere non possit, non erit conveniens: nam in aqualiculo seu in pelvi hæret intestinum rectum laxum & compressibile; atque uterus durus crassus & firmus, ad anteriorem partem sub osse pubis hæret vesica urinaria, peritonæo recta; reliquum spatium impletur intestinis tenuibus & magna copia pinguedinis. Si increseat ita Omentum, ut etiam in pelvi pendeat, recedent intestina tenuia, sed vesica, intestinum rectum, & uterus comprimentur a molli omento. Quæ partes hoc in loco sunt molles, & compressibiles, eæ facilius comprimentur, quam duriores & firmæ. Si ergo quadam fieret alicujus partis compressio, vesica urinaria, vel intestinum rectum, vel tenuia intestina potius comprimerentur, quam uterus, qui ita firmus est in non gravidis, ut vix cultro percindi possit: Quia vero neque in urina neque in alvi egestione nullam experimur difficultatem, etiamsi mulier sit præter naturam crassa, quæ tamen fieret, si ab omento premente hæ partes nimis comprimerentur; optimo igitur jure concludere possumus, Omentum premens uterum sterilitatis causam esse non posse; præmissis quia uteri os coitus tempore ab omento comprimi non possit, nam vagina membro virili distenta favet dilatationi orificii uteri. Neque ad recipiendum semen magna orificii uteri dilatatio requiritur, modo enim paulo magis tians fiat, quam est amplitudo urethræ virilis, ad recipiendum semen satis capax erit. Qui ergo pendit uteri firmitatem, & parvam orificii dilatationem, non facile admittit potest Omentum premens orificium uteri causam esse posse sterilitatis. Interim tamen præter naturam crassæ mulieres ob pinguedinis abundantiam sæpe non concipiunt: cujus ratio mihi videtur, quod tanta pinguedinis copia in pelvi formetur, ut inde ova in ovario nata venire nequeant in tubam Falloppianam, sine quibus sæmina manet sterilis, etiamsi semen masculinum in utero recipiat. Sive nunc receptio ovulorum in tuba Falloppiana intercipiatur ab omento interposito, sive a reliquæ adjacentis pinguedinis incremento, æqualis nascitur sterilitas, & eadem est causa, nam dum in præter naturam crassis increscit omentum, reliqua quoque pinguedo augetur. Hanc receptionem ovulorum a pinguedinis abundantia fieri posse, ex anatomica demonstratione facile liquet: nam ut ovulum in ovario confectum veniat in tubam falloppianam & dein in cavum uteri, ovarium amplectendum est a tubæ fibris, qualis amplexus ob interpositam pinguedinem facile fieri nequit. Quod si hic pinguedinis interpositus sit causa sterilitatis, facile concipitur tam diu duraturam sterilitatem, donec pinguedo sit ita minuta, ut fibræ tubæ iterum amplecti possint ovarium. Igitur conducit ad hanc tollendam seu curandam sterilitatem, corpus extenuare parciore diæta, laboribus & exercitiis validioribus medicamentis evacuantibus, atque frequentiore venæ sectione. Sed quoniam hæc causa non nisi in divitibus otiose & opipare viventibus reperitur, medicus raro voti compos fiet, nolente tali matrona tam duram propterea agere vitam.

# L I B. V. A P H. XLVII.

240. *SI uterus coxæ incumbens suppuratus fueris, necesse est medicamenta in linteo carpto applicari.*

Omentum  
 os uteri  
 premens  
 sterilitatis  
 causa.

I. **I**N nullo inveni Aphorismo exponendo plures tricas, quam in parvo hoc Aphorismo: nam multi contendunt uterum ligamentis firmatum coxæ incumbere non posse, & si ibidem hæreat, non fore necesse ut suppuretur. Denique multum litigant de significatione vocabuli *ιμυκτον*, num significet medicamentum linteo carpto receptum & applicatum, num, vero ulcus cavum, quod

quod tali medicamento eget. Nos vero, missis criticorum conjecturis, videbimus quomodo uterus coxæ incumbens suppurari possit, quid enim ex tali suppuratione sit expectandum; denique qualia auxilia sint adhibenda.

II. Uterus pelvi & inguibus nexus ligamenti latis & rotundis satis valide in suo situ firmatur, sed quoniam ligamenta hæc multis etiam scatent arteriis, hæc æque quam partes reliquæ inflammatione, quæ commutatur in suppurationem, corripri possunt. Ita tumida & inflammata ligamenta coxæ coherencia si ab uno latere inflammantur, uterum versus istud latus trahunt, & coxæ dolorem inferunt. Quia vero veteres nesciverunt hæc ligamenta inflammari posse & dein suppurari, ex apparentibus signis & conversione uteri ad latus dolens, judicaverunt uteri conversione hunc dolorem generari, qui tandem in suppurationem abibat. Sed quoniam ex generali cognitione inflammationis facile concipimus fieri posse suppurationem, nihil amplius obscuri in hac observatione latet. Ita etiam pleura, aliæque membranae, & ligamenta inflammantur & suppurantur.

Uterus  
coxæ in-  
cumbens  
suppurat-  
us.

III. Si vero ligamentum uteri hujus vel istius lateris inflammatum abeat in suppurationem, pus suppuratione confectum sub multa pinguedine ibidem hærente latens sensim fit acrius, formatque sinum sua gravitate sensim magis deorsum, donec ad latera pudendorum, vel in inguinibus, vel circa interfemineum, aperturam fistulosam faciat. Quod ulcus cum longe remotum habeat fontem instar fistulæ ani in viris, difficulter sanabitur, & perpetuo vel pus, vel ichorem fundet. Si vero uterus ipse suppuraretur potius, pus, vel ichor per pudendam exstileret. Quia autem *ιμυρῶ* notat eum, qui ulcere cavo laborat; atque *ιμυρτωρ*, si subintelligitur *εμψυκτωρ*, designat aliquod medicamentum molle & liquidum, quod lineo carpo receptum, uti hodie habentur digestiva a chirurgis, ulceribus cavis induitur, magis conveniens sensui hujus aphorismi intelligere ulcus cavum quam medicamentum *εμψυκτωρ* applicatum.

Quid sit  
expectan-  
dum ex  
uteri co-  
xæ in-  
cumbentis  
suppurati-  
one.

IV. Quum secundo ad principium hujus ulceris cavi & fistulosi pertingere non possumus, atque pinguedo adjacens a stagnante pure corrumpatur, curatio non solum est difficillima, sed & debet artificiose pertractari. Si enim interne applicetur medicamentum aptum, ejus virtus ad originem mali pertingere nequit, liquor injectus nimis cito affluit; turunda indita claudens aperturam nimis diu intus retinet pus aut ichorem. Præstantissima quæ mihi successit curatio, consistabat ex injectione quadam confecta ex melle rosarum, vel quodam digestivo ex terebinthina cum vitello ovi soluta, quæ medicamina postea diluta decocto acrimoniæ, vel scordii, injecta intus depurabant ulcus istud cavum, dein immittebam turundam ex terebinthina cocta confectam, cui admiscebam myrrham, aloem, olibanum, pulverem fabinæ, vel mitigabam virtutem turundæ addito gummi tragacanthi, mucilaginis radicis althææ vel symphyti. Dein tegebam aperturam plumaceola cum aliquo digestivo oblinita. Interna autem medicamenta nihil speciale continebant, talia enim erant, quæ ulceribus internis adhiberi solent.

Curatio  
in uteri  
coxæ in-  
cumben-  
tis suppu-  
ratione.

## L I B. V. A P H. XLVIII.

**F**Œtus, mares quidem in dextris, femine vero in sinistris magis.

**O**mnia, quæ obviis experimentis, & observationibus possunt detegi, non erit opus firmare auctoritate. Quemadmodum olim, ita & hodie feminae sunt gravidæ, & marem vel feminam gerunt: quod si aliqua esset in hoc, vel illo latere gestatio pro differentia sexus, hoc æque nobis quam Hippocrati & aliis veteribus esset cognitum, dum tamen nemo compertum habeat, num masculinus, vel femininus partus sit futurus, quæ res tam est incognita, ut nihil nisi

316 *MEDICINA HIPPOCRATICA* *Aph.* 241.  
 inanis conjectura superstit. Quæ dicuntur de majore calore dextri lateris, de perfeciore feminis elaboratione pro sexu masculino ex dextro teste, ridicula sunt, quum ablato uno teste vir tamen generaverit sexum utrumque. Neque magis valet Galeni sententia de majore hepatis caliditate, cui accumberet ovarium dextrum, nam in femina non gravida longum interest spatium inter ovarium muliebrem & hepar, & mesenterium cum suis intestinis est interpositum. Quare ratio hujus differentia non plus valet, quam ipsa observatio futuri infantis. Solummodo ex dictis concludere possumus, naturalem structuram, & uteri situm veteribus parum cognitum fuisse, (Conf. *Aph.* 231.) atque rationem istos deduxisse ex uteri fabrica in animalibus. Quippe uterus femineus non habet cavitatem dextram vel sinistram, sed unicam in medio ejus, ut mares & feminae in eodem loco contineantur. Si autem factus hoc, vel istud latus magis occupat, id dependet ab uteri obliquo situ, & talis positura non promittit matrem aut feminam, sed ut plurimum difficiliorem partum, quem omnium optime descripsit Van Deventer.

# LIB. V. A P H. XLIX.

242. **U**T secundæ excidant, sternutatorio indito, nares & os apprehendere oportet.

An secundæ expellendæ si sternutatorio.

**S**uperius (*Aph.* 228. III.) demonstravimus bonum esse, si in secundinis re tentis superveniat sternutatio, qua os uteri clausum retinens secundas aperitur: si vero ex natura non sequatur sternutatio, arte ea est faciendâ; qualia autem medicamenta naribus attracta sternuere faciant, non est opus hoc loco recensere, quum collata inveniantur in filii nostri *Davidis de Gorter Materia Medica*. Hæc dum adhibentur, monet Auctor, ut simul claudantur nares & os, quo simul majore nisu deorsum truantur viscera ventris, & eo validius extrudatur id, quod post partum in utero restitat. Ex generali hac medendi regula Junior Medicus, & etiam obstetrices judicarent se semper debere tali modo sternutationem concitare, si modo relinquantur secundæ post partum. Ne autem ex hac medendi methodo pejora sequantur mala, quam ex secundis relictis, causæ retinentes secundas primo sunt perpendendæ. Quod si remaneant post partum, quia uteri os nimis contractum est, ut monuimus, (*Aph.* 228. III.) maxime conducit sternutationem concitare. Si vero remanserint secundinæ cum uteri orificio aperto, quia placenta tenacius adhæret utero, quam ut statim expelli possit, non esset tutum adhibere sternutatorium; validior enim illa protrusio simul forsan extruderet uterum nunc suo sustentaculo orbatum, quod aliquoties observavi factum per violentiorem funiculi umbilicalis tractionem. Quæ uteri inversio si non protinus reponatur, quod nesciunt illæ obstetrices, majus periculum est expectandum, quam a retentis secundinis. Majus malum est expectandum si portio placenta separata fundat sanguinem, dum altera pars magis adherens deneget exitum; nam non solum periculum est ne inveratur uterus, sed etiam nimia sanguinis profusione puerpera non raro in animi deliquium incidit, & convellitur, atque deinceps pallefcens diu vitam debilem & valetudinariam agit, bono sanguine privata. Hanc tenaciorem placenta adhesionem sæpe observavi in partu præmaturo, dum placenta, antequam ejus propria extincta sit vita, ab utero separari debet. Atque hoc etiam aliquo modo culpæ obstetricum est ascribendum, quæ post partum non ligant portionem funiculi versus placenta, ut per funiculi vasa aperta effluere possit sanguis, qui, hac via intercepta, magis detrusisset adhærentem placenta ab utero. In utroque igitur casu cum orificio uteri aperto, quoniam non caret periculo indere sternutatorium, ego soleo cingere, & sustentare totum abdomen, ejus adminiculo fere semper brevi post partum extrudetur placenta cum membranis: si autem non procedat,

cedat, obstericem moneo, ut secundum ductum funiculi umbilicalis immittat manum, qua artificiose, & prudenter adhaerentem placentam separet ab utero, & demum una cum manu sua, adjuvante conatu matris, placentam educat.

## L I B. V. A P H. L.

243. **M** *Uterum manum si velis cohibere, cucurbitam quam maximam ad mammas appone.*

**I.** **A** Nobis supra (Aph. 230. I.) demonstratum est inter uterum & mammas magnum esse Consensum, atque sententia hæc hoc experimento ulterius confirmatur, dum nempe Applicatione Cucurbitæ quam maximæ ad mammas minuitur & sistitur menstruatio. Quali modo applicari possunt Cucurbitæ cuius notum est, quoties enim cucurbita admodum calefacta cuti applicetur, postquam contentus in cucurbita aer calefactus refrigeratur, cuti tenaciter adhaeret; aut hoc olim fiebat accensa flamma, quæ calefaciebat aerem cucurbita contentum, quo dein extincta flamma refrigerato cuti adhaerebat cucurbita; hodie vero ope Antliae valvula instructæ aer extrahitur ex applicata cucurbita, quæ methodus hoc commodi habet, quod pro lubitu aerem extrahere possimus, dum vero olim sæpius repeti debebat operatio. Ope cucurbitæ eo in loco minuitur supra partem naturalis aeris pressio, unde ad locum minus pressum magis confluent humores, & ita partem in tumorem attollunt, quod fieri nequit, quin partes reliquæ priventur humoribus: hæc autem mutatio maxime inducitur partibus proximis, atque iis quæ huic parti maxime consentiunt. Quia vero inter mammas & uterum maximus est consensus ratione evacuationis, non recedit a generali regula, quod aucta derivatio ad mammas minuitur eadem ad uterum: hinc fæmina lactantes rarissime menstrua fundunt. Propterea non est mirum, quod moneat Auctor noster Cucurbitam maximam applicandam esse, ut ita possit magnam ad mammas facere derivationem, & ita notabilem diminutionem facere ad uterum. Nunc querendum est num Hipp. hunc Aphorismum posuit, ut simplex experimentum, an vero curationis scopo in mensibus profluentibus. Si velis, inquit, cohibere, unde videtur solummodo voluisse indicare fieri posse menstruationis diminutionem per cucurbitas ad mammas applicatas. Si vero hoc auxilium voluisset adhibere in mensium profluvia, præcepisset, in mensium profluvio applicandæ sunt cucurbitæ mammas. Quamobrem mihi videtur hanc operationem tanquam mirum experimentum proposuisse, ad probandum maximum consensum inter mammas, & uterum.

## L I B. V. A P H. LI.

244. **Q** *Uæ in utero gerunt, harum os uteri clausum est.*

**I.** Inter certissima Graviditatis signa numerant orificii uteri clausuram. Obsterices in anatomicis non satis expertæ credunt os uteri esse eam angustiam, quam statim in pudendis ostendunt, quæ pars connivens perperam a multis vocatur os uteri, dum vero sit externa coarctatio vaginæ, quum uteri os adhuc satis distet ab hac parte, nempe hæret in altera interna extremitate vaginæ. Quæ igitur ex hujus vaginæ orificio clauso vellent judicare num fæmina esset gravida, omnino deciperentur. Læm mulier concepit, necesse est, ut ibidem ulterius nutriatur, & incrementum capiat: uterus autem ipse suis fibris contractilibus, atque muscutorum abdominalium pressio, & uteri orificium in parte inferiore positum, non

Os uteri  
clausum  
an gravi-  
ditatis  
signum.

per-

permitterent ut receptum semen vel ovulum imprægnatum retineretur in uteri cavitæte, sed causis his expelleretur: propterea factum fuit, ut post conceptum uteri orificium contrahatur ita, ut causis his non possit aperire & eructare contentum. Ita etiam contractum orificium omnem communionem cum aere ambiente intercept, ut natura methodo consueta omnibus suis operationibus, in loco clauso id faciat, quod in generatione requiritur. Inde toto gestationis tempore uteri os manet clausum, tam diu, donec vel partus vel abortus instans oris dilatationem faciat. Tunc sententia quibuldam paradoxum videtur, quum quædam feminae, quales nonnullas novi, toto gestationis tempore menses fundant ordinate, ac si non essent gravidae, quam evacuationem fieri non posse contendunt nisi uteri os aperiatur. Quia vero similia sunt vasa in vagina suis ostiis donata, uti in utero, verisimile est his mulieribus menstrua fluere non ex utero, sed ex vagina. Alterum dubium maioris est momenti, feminas quasdam passas fuisse superfœtationem, quod etiam observavi: quæ si fiat, concedendum est os uteri interea temporis fuisse apertum. Sed si animadvertimus quam parva requiratur apertura, ut ingrediatu semen, dum interim glans pealis huic orificio applicata exitum intercept, vix verendum est, hoc tempore expelli posse ex utero contenta. Sed ut sit signum graviditatis, hæc duo adesse debent: primo istud os clausum dumtaxat esse debebat solo tempore gestationis: verum ut plurimum omni tempore clausum est, quare deciperet eum, qui tangeret os uteri clausum, indeque semper judicaret feminam esse gravidam. Si vero inveniret uteri os apertum, tunc tuto iudicium fere posset feminam non esse gravidam; aut si offenderet gravidam, instare abortum vel partum. Altera est difficultas, quod in non gravidis os uteri ita habeatur a pudendis remotum in quibusdam, ut digito attingi non possit: in gravidis vero, præprimis instante partu, magis ad pudenda descendens tactu explorari potest, quando non requiritur hoc signo uti ad investigandum, num gravida sit nec ne. Propterea hoc signum & quoniam est incertum, atque etiam impudicum, puto nunquam adhibendum esse, ad investigandum, num femina sit gravida: sed ut cognoscamus, num partus instet, obstetrix eo signo carere nequit; quamdiu enim sentiat, suis digitis os uteri firmiter esse contractum, licet dolores parturientium adsint, non potest exspectare fœtus exclusionem.

## L I B. V. A P H. LII.

245. **M**ulieri in utero gerenti si multum lactis e mammis fluxerit, infirmum fœtum significat. Si vero solida fuerint mammae, saniozem fœtum significat.

Lactis co-  
pioris ef-  
fluxus in  
gravidis  
cur fœtum  
infirmum  
significat.

**C**irca finem graviditatis, sexto, septimo, & octavo mense, quando sensim debilitari incipit actio vitalis in placenta & funiculo umbilicali, Mammæ, sensim cum decremento hujus actionis disponuntur ad lactis præparationem, ut tandem, quando requiritur lac pro infantis nutritione, mammæ satis validam possideant præparandi, & evacuandi lactis potentiam. Sic Deus voluit, ut omnia suis temporibus ordinate fiant, cessante una actione generationis, altera magis valens fiat, sine mutata fabrica in ipsis organis: nam quod uterus quoque fiat major & validior in gravidis, propterea non mutatur ejus fabrica. Neque alia est ante partum, & in victis fabrica organorum genitalium utriusque sexus, quam in maturis, verum organa duntaxat fiunt majora, & potentiora, & denique debilitantur, & exarescunt. Si vero contingat, quod mammæ, quæ debebant sensim magis turgere, & solidiores fieri, se accingentes ad lactis generationem, fiant flacciscentes & fundentes multum lactis, ut signum, & causa fœtum infirmum esse declarant. Fœtus enim debilitatus simul minuit uteri vigorem, qui est causa, quod mam-  
mæ



mæ per consensum turgent, hujus autem flaccescencia dependens ab uteri debili actione signum est fœtum non esse firmum, sive hoc fiat a fœtu prius debilitato, sive ab utero ipso infirmiore, quæ infirmitas quoque debilitabit fœtum. Si autem mammæ multum lactis fundunt, signum est detrahi materiem nutritioni, quæ ad nutritionem, & incrementum fœtus erat destinata, cujus privatione fœtus necessario redditur debiliior, & quoniam directio ad mammas minuit directionem humorum versus uterum, ut demonstravimus (Aph. 243.), ex minori itaque humorum copia ad uterum derivata etiam fit debiliior fœtus. Hoc ergo signum ex mammis desumptum egregium est indicium ad cognoscendum, num fœtus in utero hærens sit debilis vel valens.

II. Ex eadem translatione actionis ab utero ad mammas intelligitur mammas turgentes, & solidas indicare fœtum & uterum valere: tument enim tunc, & solidiores fiunt mammæ etiam in puellis, quando uterus ad concipiendum fit aptus, ut ex sororiantibus mammis, etiamsi talis puella non fundat menstrua, coniciamus eam esse maturam; eo magis si circa finem gestationis fieri debeant lactis promptuaria, tunc enim sensim copia colostri magis turgent, ut non fiant duræ, sed solidæ & tumentes, promptæ ad fundendum lac pro infante.

Cur  
mamme  
solidiores  
firmiores  
fœtum  
inducant.

## L I B. V. A P H. LIII.

246. **Q**uæ perdituræ sunt fœtus, his mammæ graciles fiunt. Si vero rursus duræ fiant, dolor erit aut in mammis, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, & non perdunt.

I. **Q**uod si retineatur translatio T. J. ab Almeseew, & multorum aliorum, hic esset sensus Aphorismi, quibus mulieribus gravidis mammæ duræ, graciles, hæ abortivi: sed si post ea signa abortus instantis mammæ fiant duræ, non fiet abortus, verum dolor erit aut in mammis &c. Ergo erunt mammæ graciliores incertum signum abortus, nam graciles mammæ in duras mutæ indicarent, non expectandum abortum sed dolores. Alii vero per Contra exponunt, & tunc magis conveniens est Aphorismi sensus: nam tunc graciles mammæ abortum præfagiunt; sed mammæ duræ non præfagiunt abortum, verum dolorem partium recensitarum, quod observationi præfæctæ est conveniens.

Sensus.

II. Cur mammæ ex improvviso si graciles fiant, abortum præfagiant, exposuimus (Aph. 330. II.); propterea quibusdam videtur Auctorem rem eandem repetere superius pronunciatam. Sed hoc in praxi sæpe debet fieri: nam quando debemus enumerare signa abortum præfagientia, annumerandæ sunt mammæ graciliores factæ. E contra si volo ex phenomenis apparentibus aliquid futurum pronunciare, solummodo pono istud phenomenon, & dein pronuntio, quæ bona vel mala ex tali phenomeno sunt expectanda. Ea methodus egregia est in praxi medica. Gravidæ verbi gratia dicit sibi graciles fieri mammas, ergo Medicus adhuc est incertus, quid boni vel mali significet, hinc consulit observationes præfæctas, ut inveniat quid secutum fuerit post phenomenon hoc; inter prædicta mala ex mammis gracilibus invenit abortum præfagiri; itaque non confidens huic soli phenomeno, quod fallere potuisset, examinat signa reliqua abortum præfagientia: si ergo invenit præter mammas graciliores reliqua quoque phenomena instantem abortum declarantia, tunc certa fide prædicere potest futurum abortum. Hoc non solum in hac re, sed & in omnibus signis est faciendum, ut si urina, pulsus, aliiisque phenomenis singularibus possimus aliquo modo judicare hunc vel illum morbum instare, antequam eum morbum pronunciamus futurum, reliqua phenomena eundem morbum præfagientia sunt examinanda an adsint. Hinc quam maxime patet, quantum a veritate præfæctæ recedunt, qui ex solo pulsu, urina, sudore, respira-

Graciles  
mamme  
abortum  
præfagiunt.

spira-

piratione, dolore, & ceteris solitariis signis iudicium ferunt, postpositis reliquis ad pronuntiandum, qualis sit morbus præfens, vel qualis exitus sit expectandus, quam pauci sint morbi ex unico phænomeno cognoscendi, sed semper ex multis simul collectis. Propterea hoc semper in meis Collectaneis feci, ut unumquodque phænomenon duobus ad minimum in locis collegerim: ita sponte cuncta, quæ indicabantur ex tali phænomeno, collecta invenire possum; atque ad rem aliquam cognoscendam vel præfagiendam omnia quoque phænomena indicantia simul invenire potui. Hoc utut sit molestum, usum prædium suggerit egregium, & hoc nisi a multis annis fecissem, fateor me non ex proprio ingenio formare potuisse omnia præfagia cujusvis phænomeni, neque omnia phænomena eandem rem indicantia colligere. Quoniam talia non ex ingenio sunt depromenda, sed ex constanti observatione practica. Recte ergo, & cum iudicio Noster egit Auctor, qui idem phænomenon ob scopum diversum plus semel repetit.

Mammæ  
duræ in  
gravidis  
quid præ-  
sagunt.

III. Versatur Auctor noster in exponendis malis, quæ ex vario phænomeno mammarum desumuntur in gravidis, tradidit mammas graciles, & flaccidas (*Aph. 230 II. & 331. II.*) solidiores, & tumentes (*Aph. 245.*). Nunc vero vult prædictionem formare ex mammis duris. Hæc ergo durities est distinguenda a mammis solidioribus, quæ firmum foetum indicabant, & nihil mali portendebant. Neque durities scirrhusa vel inflammatoria, aut scrophulosa est accipienda, quæ æque in non gravidis, quam gravidis accidit; ita etiam lactantibus abundantia vel concretionem lactis mammæ indurescunt: verum hæc omnes species non præfagiunt recensita mala. Quare talis Durities est concipienda, quæ provenit ab eadem sed majore causa, ex qua proveniebant mammæ solidiores, & tumentes (*Aph. 245.*). Qui impetus major ita implet mammarum vasa sine emissionem lactis, ut ad tactum non sint solidiores, & firmæ, verum duræ, & ita renitentes, ut ad digitos prementes non admittant foveas, & propter turgescientiam illam nimiam Dolorem inferant. Signum ergo est uteri actionem validissimam esse, unde ad Abortum faciendum nullum erit periculum, qui non sit valente uteri actione, sed ex ea debilitata vel perturbata. Quoniam adjacentes partes hac prævalente uteri actione simul agitantur, & sanguine implentur, inde in coxis, & genibus quoque dolor. An vero oculi inde doleant, dubitare possumus, sed quoniam in lactantibus observavi, quoties mammæ nimia copia lactis turgebant & dolebant, oculos quoque dolere, verisimile videtur mihi hos oculorum dolores magis ex duris, & nimis impletis mammis oriri, quam ex actione uteri validiore.

## L I B. V. A P H. LIV.

247. *Quibus os uteri durum est, bis necesse est os uteri clausum esse.*

Os uteri  
durum cur  
clausum.

I. **U**teri os in vaginam patens optime comparari potest processui ciliari in oculi bulbo, cujus ope pupilla redditur amplior, & angustior: quando nempe uteri os, quod caret motu voluntario in perfecta sanitate, possit suis fibris orbicularibus sphincterum instar contrahi, & fibris centralibus contractis dilatari; anus vero & oris labia musculis voluntariis gaudent, quibus ab imperio mentis fieri potest dilatio, & contractio. Os autem uteri, & etiam multa alia oscula emissariorum suis sphincterulis contrahuntur, uti etiam oculi pupilla. Quia vero tactu constat, quoties uteri os est contractum, simul esse durum, licet nullus adsit tumor inflammatorius vel scirrhusus, inde patet, quod hæc contractio dependeat a contractione fibrarum orbicularium, quæ contractione, uti omnes reliqui muscoli, hæc fibræ indurate sentiuntur: sed orificii uteri dilatio videtur præcipue oriri relaxatis fibris orbicularibus. Hinc tempore conceptus, partus, & men-  
strua-

struatiōis hæ fibræ orbiculares videntur relaxari, ut transitum præbeant per hoc orificium. Si vero os apertum æque esset durum, quam dum sit clausum, signum esset orificium uteri æque suis fibris distrahi quam contrahi, quod nunc contrarium patet. Inde etiam est, ut ad os uteri clausum, & contractum cum successu adhibeamus laxantia, quæ nihil præstarent, si uteri dilatatio fieri deberet per contractas fibras, quemadmodum ejus sit restrictio. Ergo quoties invenitur os uteri durum, signum quoque est istud contractum esse. Quibus nunc causis uteri os constringi possit, non satis constat inter auctores. Galenus, & alii accusant oris uteri inflammationem, scirrhum, vel & callum: concedendum est hos morbos os uteri durum facere, haud tamen credo hoc in loco talem debere intelligi duritiem, sed talem, qualem in mammis duris præcedente Aph. indicavi, ut constaret in gravidis, num partus instaret, qui fieri nequit, quamdiu os uteri est clausum. Ut igitur obstetrix sciat in parturientium doloribus, num expectandus sit partus, tangens uteri orificium, si istud inveniat durum, pronunciare potest uteri os esse clausum & propterea partum fieri non posse, & expectandum esse monet, donec uteri os mollescat. Hoc signum quoque valet in lochiis vel menstruis retentis, & in uteri hydrope: nam si detegat os uteri durum, novit os esse contractum, & ita intus continere humores; si vero molle inveniat, judicare potest istorum retentionem non oriri ab ore uteri contracto. Sic valet medicus opportuna adhibere auxilia, vel laxantia vel instigantia, ut evacuet id, quod in utero retinetur.

## L I B. V. A P H. LV.

248. **Q**Uecumque in utero gerentes a febris corripuntur, & vehementer attenuantur absque manifesta occasione, difficulter, & periculose pariant, aut abortientes periclitantur.

**I.** **E**Xposuimus supra (Aph. 223.) mulierem gravidam morbo acuto corripiente esse, quoniam vehemente circulatione vel depellebatur placenta, vel ita invertebantur humores, ut ad nutriendum foetum essent inepti. Hoc vero loco agit de muliere gravida, quæ corripitur febris. Ego sentio hic intelligendam esse febrem remittentem (Aph. 100. II.) quæ recurrentibus paroxysmis quasi multas febres facit, quæ etiam frequentius summam extenuationem inducit, quam febres reliquæ continuæ, & intermittentes. Observavit Noster Auctor, ut & nos in praxi quotidiana, gravidæ feminas ita vehementer sine manifesta causa extenuatas partum subisse difficiliorem, & periculosiorem, & hoc sufficeret in memoria tenere ad prædictionem formandam. Si vero hanc observationem practicam rimamur, clare constabit, talem partum instare. Ut enim partus fiat facilis, parturientis vires debent constare, ut foetus excludat, atque placenta una cum partu foetus ab utero secedere debet, dein sanguinis effusio copiosior a tali puerpera tolerari debet, sine multo virium dispendio. Verum si gravida diu fuit febris vexata, vires vix valebunt ad excludendum foetum, unde partus difficilior; & sanguinis copiosior deinceps evacuatio, si quædam restent vires, istas simul auferet, unde partus periculosus. Hoc autem eo magis, si femina gravida vehementer fuerit extenuata, sive respiciamus ad humorum defectum tali in corpore, sive ad causam illam non manifestam, quæ vehementem extenuationem induxit. Nam propter placentæ separationem ab utero necessario sequitur sanguinis evacuatio lochiorum nomine veniens, atque hoc in corpore vehementer extenuato magnum malum inducet. Causa hæc non manifesta Extenuationem inducens est febris remittens colloquativa, quæ eo fit major, quo magis evacuamus. Igitur dum post partum emittitur tanta copia sanguinis, partim sanguinis defectu, partim aug-

Cur partus difficilis & periculosus si gravida corripitur febris, & vehementer attenuetur.

mento febris colliqvativæ moritur puerpera. Ab eadem hac extenuatione, & febris partus fit difficilior, quia vitio matris excluditur fœtus; quia vero vita placentæ extincta fœtus non conatur in lucem prodire, inde sæpe fit, quod post fœtus exclusionem placenta tenaciter utero adhærens, quia non satis exaruit, post partum statim non sequatur, sed remanens partum difficiliorem faciat, & periculum, cum stagnans, corruptionem suscipiens, febrem colliqvativam augeat.

Cur hæ abortientes periclitantur.

II. Sive circa principium, sive medium, sive finem gestationis gravida femina febris colliqvativæ vexata, & vehementer extenuata excludat fœtum, idem patitur periculum. Nam & in abortu, & in partu naturali effudit majorem sanguinis copiam, & placenta tenacius adhæreere solet utero, quam ut perfectum abortum facere possit. Ergo per easdem assignatas causas in abortu femina ita extenuata periclitatur.

# L I B. V. A P H. LVI.

249 **S**i fluxui muliebri convulsio, & animi deliquium superveniat malum.

In menstruum fluxum convulsio, aut lipothymia, aut malum.

I. **G**alenus, & fere omnes Commentatores hic accipiunt pro fluxu muliebri Menstruum profluvium, vel fluorem album, vel quamcumque aliam copiosorem evacuationem per pudenda, quæ diu durare debuit, ut tandem acrimonia humorum inde nata induceret irritando Convulsionem. Quia vero noster Auctor antea egit (*Aph.* 196. & *Aph.* 197.) de Convulsione ex nimia evacuatione, non possum credere Hippocratem hic voluisse intelligere menstruum profluvium, verum solitam sanguinis menstrui evacuationem, quæ non est causa Spasmi, vel Lipothymia, quali in sensu fere ab omnibus accipitur: propterea voluerunt hic intelligere immodicum fluxum. At vero ipse textus non indicat immodicum, vel diu durantem menstruum fluxum, neque dicit ex fluxu muliebri si fiat Convulsio, vel Lipothymia, verum dicit, huic fluxui si superveniat, id est si talia symptomata fiant in fluxu muliebri, malum signum est. Equidem hodie pronunciamus malum, si femina verteretur in naturali menstruatione, atque tum a Convulsione, vel Lipothymia corripiatur; nam observavi ab his supervenientibus symptomatibus illam menstruationem non solum turbari, verum etiam in medio fluxu sufflaminari, cum multo detrimento mulieris. Novi multas feminas, quæ sæpissime menstruationis tempore hujusmodi symptomatibus corripiuntur, quæque per triduum, vel ultra decumbere debent, donec cessaverit ille fluxus, etiam si non sit immodicus. Igitur Convulsionem, & Lipothymiam non deduxi ex nimio profluvio, sed ex aliquo morbo latente, qui producit Lipothymiam, aut Convulsionem, dum uterus se accingat emittere sanguinem menstruum. Quid sit Lipothymia (*Aph.* 66.) & Convulsio (*Aph.* 51. III. & *Aph.* 194. I.) exposuimus, ex quibus constat, homines debiles, mobilitate solidorum laborantes, his morbis sæpe tentari ex levissima causa. Restat ergo inquirere, an menstruatō talem causam suppeditet, & quando inde fiat Convulsio aut Lipothymia, quid mali ex his supervenientibus sit expectandum. Quamvis fere omnes Medici hodie menstruationem ex sanguinis plethora derivent, non possum tamen his in omnibus assentiri, quoniam observavi in multis feminis, quibus sanguinis erat defectus, hunc tamen statō tempore fieri fluxum: sed quando motus aliquis particularis fieri incipit in uteri vasis, tunc sanguis in uteri vasis hærens extrahitur, qualem motum quoque observavimus in mammis, alisque partibus genitalibus (*Aph.* 230. II. & *Aph.* 232. II.). Imo viri hæmorrhagis narium affuere, priusquam sanguinem fundunt, circa nasum motum insolitum percipiunt. A forti pulsu in ulceribus sanguinis eruptio est expectanda, ut infra sumus demonstraturi. Ex quibus omnibus colligere possumus, ipsam plethoram per totum corpus non sufficere ad menstruationem, sed causam adesse debere

Menstruum fluxum motu particulari.

de ore moventem, quæ contentum sanguinem in arteriis magis ducit ad uterum, & ibidem evacuat. Quoties hæc causa dirigens cessat, etiam si maneat tali in corpore sanguinis abundantia, menses tamen sistuntur, quod experimur in feminis menstruantibus, si subito aliquo terrore corripuntur. Hic nunc motus particularis derivans sanguinem ad uterum, & eum evacuans, non raro reliquum corpus in consensum trahit: quod si cadat in mulieribus mobilitate solidorum laborantibus, quarum corpora ex minima causa admodum turbantur, sæpe fit quod per consensum hunc mulier corripitur Animi deliquio aut Convulsione, quæ hodie vocatur Convulsio Hysterica. Quibus symptomatibus abortis, sæpissime in medio fluxu supprimuntur menses, qui deinceps difficile revocantur. Nam Lipothymia extinguens omnem motum vitalem, etiam simul extinguit hunc motum particularem uteri, qui cessante lipothymia non semper redit, quod sæpe observavimus in feminis mobilitate solidorum laborantibus, & ceteroquin sanis. Eodem modo Convulsio hysterica commutat motum alternum contrahentem, & dilatantem, quo propellebatur sanguis menstruus, in motum tonicum perpetuo contrahentem, quæ tetanica contractio non solum valet cohibere menstruum sanguinem, verum etiam lochiorum fluxum, imo si parturienti superveniat, quod sæpe observavi, inhibet foetus exclusionem. Igitur Lipothymia, vel Convulsio superveniens valet suppressere naturalem mentium fluxum. Non erit ulterius opus rogare, cur dicatur malum, & quid mali fiat, si Animi deliquium, vel Convulsio superveniat, quum menstrua naturalia suppressa semper malum dicantur. Non sufficit in Arte Medica scire, quid sit malum, simul indicandum est auxilium, quod id malum vel tollit, vel mitigat. Quoniam hoc malum sæpe accidit, & per experientiam didici, si ex spasmo subsistebant menses, me potuisse antispasmodicis anodynis menses revocare, & minuere molestiam ex spasmo natam, hæc auxilia reticere nolui in juniorum Medicorum gratiam. Si vero Lipothymia fuerit causa, his admisceo quædam spirituosa aromatica, & sales volatiles cum optimo successu.

## LIB. V. APH. LVII.

250. **M**ensibus copiosioribus prodeuntibus, morbi consingunt: & non predeuntibus, ab utero fiunt morbi.

I. Superius (Aph. 3. V.) notavimus mensium fluxum esse feminis naturalem evacuationem, si sint ætate maturæ, neque lactantes, neque gravide; hoc autem loco determinanda est hujus evacuationis quantitas, aliter enim intelligi nequit, num menses fluant copiosiores. Hippocrates, & ex ejus auctoritate multi medici quantitatem comparant duabus heminis Atticis. Quia vero stillatim exit sanguis, & recipitur linteis; ratione exsiccationis, & quia sanguis ille seorsim ponderari nequit, vix valemus evacuati sanguinis pondus determinare. Præterea non omnibus mulieribus æqualis est quantitas, quædam enim triplo majorem copiam fundunt quam aliæ, quæ tamen omnes sanæ vivunt. Quamobrem ut determinetur quantitas mediocris, id debemus sciscitari ex ipsa femina, an dum sana sit, soleat tantam circiter quantitatem singulis mensibus evacuare. Hæc quantitas varia in diversis feminis, sive sit major, sive minor, mediocris censenda est. Possumus tamen aliquo modo ex habitu, & diætâ conjicere quantitatem. Quippe in corporibus mollibus succulentis, & feminis otiose, & opipare viventibus multo major est menstruationis mediocris quantitas, quam in corporibus stigris, & durioribus, atque in feminis duriter, & parce viventibus.

II. Si femina vel singulis vicibus majorem copiam sanguinis fundat per pudenda, vel crebrius menstruationem patiatur, vel laboret continuo stillicidio, illa

Mensium  
naturalis  
quantitas.

Quinam  
morbi ex

mensibus  
copiosiori-  
bus.

324 *MEDICINA HIPPOCRATICA* Aph. 250.  
vacuabit majorem sanguinis copiam, quam suum corpus ex alimentis affumentis con-  
ficere potest, unde generatur sanguinis rubri defectus, & reliquum corpus conficie-  
tur macie, vel turgebit humore lymphatico aut cachectico. Nam continuata ni-  
mia sanguinis evacuatione, quæ ingeruntur alimenta, & potulenta non solum in  
bonum humorum commutari, quum ad humorum præparationem non solum re-  
quiratur firmarum partium actio, sed & debita vitalis humoris admisti quantitas,  
quæ tali in corpore deficit. Illa ingesta alimenta, & potulenta actione vitæ non  
subacta in propriam corruptelam abeunt: prout nunc ille humor ex alimentis  
imperfecte præparatus in tenuitatem, lympham, cacochyliam, putrilaginem abeat,  
ita quoque deinceps nascuntur morbi. Nam tenuitas humorum vasculorum orifi-  
ciis non retinenda relinquit corpus aridum, & tandem marasmo consumit. Lym-  
pha tenuis, vel pituita viscosa in cellulis pinguedinis collecta Anasarcam, vel  
Leuco phlegmatiam inducit. Putrilago nata producit Cacochymiam cum colore  
lurido. Omnes hi morbi omnem respuunt curationem durante copiosiore men-  
struatione, sed si moderatus fiat fluxus, & corpus firmetur roborantibus, atque  
alimentorum confectio promoveatur stomachicis, sensim evanescent recensiti mor-  
bi, & recuperabitur color ruber sanguinis.

A Men-  
bus non  
prodeun-  
tibus, ab  
utero sunt  
morbi.

III Menses non prodeunt, vel ex naturali, vel ex morbosa causa; nam ante  
pubertatem, & vietus salubriter non apparent; neque in gravidis, & lactantibus.  
Quare ad has subsistentes menses non respicit Auctor, verum si in femina matura  
neque grvida neque lactante menses non prodeunt, observavit uteri morbos fi-  
eri. Sed inde concludere noluit per reliquum corpus nullos fieri morbos, hoc  
enim non quadraret observationibus præclicis, quæ docent multos morbos totius  
corporis fieri a mensibus non prodeuntibus, quod non est hujus loci exagitaré.  
Verum ex mensibus non prodeuntibus multo frequentius sunt uteri morbi quam  
ex mensium profluvio: nam in profluvio si quid morbosi esset in utero, id simul  
evacuaretur: sed in mensibus non prodeuntibus plerumque causa suppressionis la-  
titans in utero, ibidem continetur, atque sanguis hic evacuandus retentus, &  
accumulatus uteri morbos inferre potest, nempe obstructionem, sanguinis coagu-  
lationem, stagnantis corruptionem, & multa alia mala. Propterea conducit ad  
evitandos uteri morbos procurare, ut menses non prodeuntes omnimodo referen-  
tur, & ducantur, priusquam recensiti morbi fuerint firmati. Curationis modum  
hic addere nequeo propter multiplices causas menses suppressantes, quæ non  
omnes eadem methodo sunt tollendæ.

## L I B. V. A P H. LVIII.

251. **R** Ecto intestino inflammato, & utero inflammato, & renibus suppuratis,  
urinæ stillicidium supervenit. Hepati autem inflammato singultus super-  
venit.

Intestino  
recto in-  
flammato  
supervenit  
stranguria.

**Q**uid sit Stranguria seu Urinæ stillicidium supra (Aph. 110. IV.) exposui-  
mus, ex quo loco simul constitit hunc morbum ex variis causis nasci:  
hoc autem loco indicat Auctor intestini recti inflammationem, sed non  
determinat, num Inflammatio hæc sit causi stranguriæ an vero stranguria per  
aliam causam natam ad Intestini recti inflammationem accedat, nam utroque mo-  
do stranguria supervenire potest. Hoc autem non fecit sine ratione, quum non  
semper ex intestino recto inflammato generetur stranguria. Quippe in feminis ra-  
ro fit ex intestino recto inflammato stranguria, quia vagina interposita facit ut inter  
intestinum rectum, & urethram minor sit communitas quam in viris, in quibus  
hæ partes juxta locatæ sunt. Dein non semper ex inflammato intestino recto ita  
consentit vesica, vel arethra, ut stranguriam faciat. Tamen propter vicinitatem  
ha-

harum partium, & quia ex Intestino recto inflammato etiam interdum afficitur Vesica, vel Urethra, fieri potest stranguria. Propterea non debemus semper inflammatione intestini recti querere aliam causam stranguriam inducentem, quamvis videatur morbus novus, quum Inflammatio latius dispersa, vel vesicam, & urethram in consensum trahens, stranguriam inducere possit. Hoc boni ex hac observatione habemus, quod solummodo tentemus curare Intestinum rectum inflammationem, post cujus mitigationem, & curationem curabitur quoque sponte stranguria.

II. Hoc in loco non solum illam partem intelligi, quam hodie uterum vocamus, verum etiam Vaginam mihi verisimile videtur, quoniam vagina magis consensit urethrae & vesicae, quam uterus ipse. Quando igitur in femina Uterus aut ejus Vagina ab inflammatione tentatur, eodem modo, ut statim dixi de Intestino recto in viris, stranguriam inducere potest, & curari debet. Quomodo Inflammatio ab Erysipelate harum partium distingui potest supra (Aph. 236.) exposuimus; interim credibile est Erysipelas aequae quam inflammationem producere posse stranguriam.

III. Sive Renes vel ex praegressa inflammatione formaverint pus, sive corrodingo, vel detritu calculi contraxerint ulcus pus fundens, quamdiu istud pus est blandum, redditur per urethram sine ulla rosione, unde saepe in empyematicis, phthisicis, & critica evacuatione morborum acutorum redditur cum urina pus, sine ulla indurata stranguria, quoniam interna urethrae latera mucos naturali obducta non afficiuntur a puris transitu. Si vero istud pus redditur acre corruptum & ichorosum, non solum simul in transitu suo aufert mucum naturalem, verum etiam tangens nuda latera vesicae & urethrae, irritando facit ut involuntarie contrahantur. Hinc in principio dum fluere urina incipit, urethra se dilatari permittit, sed in transitu irritata se contrahens iterum exitum urinae, & puris intercipit, qualis morbus vocatur stranguria. Quoniam non omni in casu pus ita est acre & corruptum, non semper adest stranguria. Sed si superveniat, signum est majoris acrimoniae & corruptionis in pure transeunte, quod malum est, & difficiliorem curationem arguit.

IV. Hepar inflammari posse, quum donatum sit arteriis ab aorta venientibus, in quibus omnibus inflammatio fieri potest, nemo inficias ire potest: non tamen in omni Hepatis inflammatione generatur Singultus, propterea, si interdum Singultus superveniat, interdum vero non, vel hoc pendere debet ex natura aut magnitudine inflammationis, vel ex diverso loco inflammato provenire debet. Quum vero experimur interdum in graviore hepatis inflammatione non fieri Singultum, qui vero supervenit quandoque leviori inflammationi, videtur mihi ex parte hepatis diversa inflammata Singulum nasci. Hepar ipsum praeter motum exiguum vitalem ad nutritionem sui, & motum particularem ad bilis secretionem, non possidet motum, quo potuisset amulargi Singultum; inde necesse est, ut hepatis quadam pars inflammata Diaphragmati consentiat, ut ita convulsiue deorsum tracto subito Diaphragmate, cum simul clauditur larynx, in nobis generetur Singultus. Nam statuere velle ab oesophago convulsio singultum fieri, id non responderet phaenomeni, quia oesophagi convulsio elevando diaphragma extruderet aerem, dum in singultu attrahitur aer, cujus introitus simul intercipitur. Crederem ergo Ligamenta hepatis necessitia hepar diaphragmati esse inflammata, quando singultus superveniat. Facile ergo ex his colligitur, omnia spirituosa & arcana contra singultum hunc nihil valere, sed eum curandum esse, uti curantur omnes morbi inflammatorii.

## LIB. V. APH. LIX.

252. **M**ulier si in ventre non concipiat, velis autem scire an conceptura sit, vestibus circumtectam subter suffito, & si quidem procedere tibi videatur odor per corpus ad naves, & ad es, scito, hanc non propter se ipsam infecundam esse.

I. Nul-

Utero inflammato supervenit stranguria.

Renibus suppuratis stranguria supervenit.

Hepati inflammato singultus supervenit.

An ex  
situ di-  
gnosci  
possit num  
mulier sit  
fœcunda  
vel steri-  
lis.

326

MEDICINA HIPPOCRATICA Aph. 252.

1. **N**ulla in parte Medicinæ plures nugæ & perversas sententias detexi, quam quæ complectitur partes genitales & ipsam generationem, quod forsitan ex ignorantia structuræ præcipue natum est. Ita supponit Auctor seminam secundam transmittere fumum aromaticum (Aph. 221.) pudendis receptum, ut naribus, & ore percipi possit: e contra feminam sterilem non transmittere eum vaporem. Quasi aura seminalis per totum corpus feminæ meare deberet, ut inde redderetur femina prægnans. Hæc sententia tam inanis est & inutilis, nullis experimentis fundata, ut non egeat refutatione, quia ad concipiendum sufficit si semen virile veniens in uteri cavitate imprægnat ovum feminæ maturum aliter sterile. Sed non est opus ut totum corpus permeet semen virile ad imprægnationem. Præterea multæ sunt causæ sterilitatem inducentes, quæ experimento unico unam verbi gratia causam detegente non possunt detegi. Quamvis poneretur feminam percipere debere odorem in naribus, & ore, forsitan anaueret se percipere odorem eum, ut celaret sterilitatem. Satiùs ergo duco hoc experimentum non instituire, ut nulla suspicio fœcunditatis, vel sterilitatis per experimentum hoc introducatur. Si tamen scire expedit, inspiciendæ sunt externæ partes genitales, num tali laborarent vitio, quod seminis virilis admissionem intercipit, quo non invento, pronuntiandum est, nos nullam causam sterilitatis detegere posse.

L I B. V. A P H. LX.

253. *S' mulieri in utero gerenti purgationes prodeant, sætum sanum esse impossibile.*

An per-  
verante  
menstrua-  
tione sæ-  
tus sanus  
manere  
nequeat.

1. **O**bservavit quibusdam in feminis Auctor menses fluere etiam si sint gravide, hoc etiam hodie observatur, sed raro: in his detexit semper fuisse fœtum debilem, unde iudicavit hoc aliter fieri non posse. Videamus an ex natura rei fieri non possit, ut fœtus tamen nascatur sanus ex gravida femina, cui prodibant purgationes. Creavit Deus ita corpora feminarum, ut ætatis tempore maturo plus conficiant ex alimentis assumtis, quam ad nutritionem sui requirunt, hoc abundans, nisi statò tempore evacuetur, multos parit feminis morbos. Non omnibus autem feminis æqualis est huius abundantie generatio, quasdam enim novi, quæ & tempore graviditatis, & lactationis satis copiosa menstrua fundebant, sine ulla indulta debilitate. Quinobrem Auctori in omnibus assentiri nequeo statuenti fieri non posse, ut fœtus maneat sanus; sed statuendum est hoc raro fieri, quod quasdam feminæ gestationis tempore menstrua habeat. Adducunt tamen argumenta, quæ ex natura rei probarent fœtum debilem fieri debere. Nam menstruus sanguis, qui destinatus erat ad alendum fœtum, eliminatur; unde supra (Aph. 224.) dixit, mulierem gravidam secta vena abortire. Alii autem putant menstrua fluere non posse, nisi uteri os aperiat, vel & quædam placenta portio separatur ab utero. Quod si rationes hæc essent veræ, menstrua non fluere sine instante abortu; verum quibusdam feminis satis copiose menstruantibus ex vagina profluit sanguis, ut non sit opus in quovis fluxu menstruo, os uteri aperiat in tali gravida, vel placenta portio separatur ab utero. Hoc autem verum est, in gravidis menstrua detrudere portionem nutrimenti: sed si fiat in femina admodum plethorica, illa ablata quantitas nullum periculum adferre potest; quare his temporibus admodum frequens venæ sectio in gravidis raro abortum infert: & inveniuntur feminæ plethorice, otiose & opipare viventes, quibus, nisi bis aut ter gestationis tempore secetur vena, abortus imminet.

L I B.



L I B. V. A P H. LXI.

254. *SI mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre superveniente; cibi autem fastidia ipsi accidunt, hanc in utero gerere putato.*

I. *SI* concepit mulier, non est opus ut illa mutatio morboſa in eo corpore fiat, ſolummodo enim augetur uteri moles, & ſanguis qui per menſtrua effundi ſolebat, nunc cedit in embryonis incrementum: unde quædam faminz ex conceptu nullam moleſtiam percipiunt: imo inveniuntur, quæ nullo tempore ita vivunt valentes, quam dum ſunt gravidæ, vel lactantes. Si igitur femina perfecte ſana, cui ſine ulla viſibili, vel cognita cauſa ſubſiſtunt menſes, a nobis exigit ſcire, num ipſi ex graviditate, vel morboſa cauſa interna menſes ſubſiſtant, egregium reſponſum dedit nobis Auſtor, dicens, ſi huic ſuperveniat cibi faſtidium, vel & appetitus alienus ſine horrore & ſine febre, judicandum eſt talem ſeminaſſe eſſe gravidam modo per tres quatuorve periodos non prodierint menſtrua. Non tamen judicandum eſt omnibus feminis in principio geſtationis corripici cibi faſtidio, ſi vero iſtud accidat, neceſſe erit, ut non habeatur ſimul horror, & febris: nam ſi dicta ſimul adeſſent, incertum eſſet ſignum graviditatis, ſed potius morboſæ ſuppreſſionis. Meretur igitur rimari, cur a menſibus ſuppreſſis ex morboſa cauſa febris, & horror ſimul producat, dum vero in Menſtruis ſubſiſtentibus fere ſemper ſolum ciborum faſtidium producat. Si menſtrua ſubſiſtunt ex graviditate, non eſt opus, ut illa labeſ morboſa fiat ex deſtructione æquilíbrio humorum, quod ſemper deſtruitur, ſi menſtrua ſubſiſtant ex cauſa morboſa. Uterus autem ſenſim mole increſcens intellina ex ſua priori ſede detrudit, atque uteri alio ſit majoris vigoris. Per hanc mutatam ſedem, & auctam uteri actionem, ventriculi motus ſæpe in feminis perturbatur, ut vomant, naſcent, faſtidioſæ ſiant, ut quidam procelloſo mari non aſſueti: tandem vero magis progreſſæ gravidæ feminæ, huic motui & ſedi aſſueſcentes, non amplius faſtidioſæ manent, ut homines longis navigationibus exercitati. Huiusmodi etiam feminis, licet ita faſtidioſæ ſint, urina manet ſana, ut indicavimus (Apb. 234. I.). Sed quando menſtrua ex morboſa cauſa ſubſiſtunt, non ſolum generatur faſtidium, ſed propter cacochyliam (Apb. 127. II.) ex æquilíbrio deſtructione natam, generantur inſuper horror, febris, & alia cacochymiz ſigna. Docemur ex hac obſervatione evidentiffime, quid ſit in tali grvida femina faſtidioſa agendum, nempe compendendus eſt motus ille inordinatus ex conſenſu productus per ſimilia, quæ experientia didicit compereſcere naſeam navigationis, qualia ſunt vinofa grata aciduſcula, & ſpirituofa aromatica, quæ ſi non ſufficiunt, aliquod anodynum lenè eſt admittendum. Talia danda ſunt ad compendendum faſtidium, ne continuo faſtidio grvida femina aliquod damnum patiatur.

L I B. V. A P H. LXII.

255. *Quæ frigidos ac denſos uteros habent, non concipiunt. Et quæ præhumidos habent uteros, non concipiunt; extinguitur enim ipſis genitura. Et ſiccos magis, & advenientes: alimenti enim inopia ſemen corrumpitur. Quæ vero ex utriſque temperamentum habent moderatum, hæ ipſæ proliſera ſunt.*

I. *Q*uemadmodum Veteres quatuor poſuerunt in homine vivente Temperamenta ſimplicia, totidemque compoſita ſinixerunt. Ita etiam in Utero, tanquam parte ſpeciali, eadem Temperamenta quæſiverunt, nempe Frigidum,

menſtrua ſponte ſubſiſtentia cum faſtidio, ſine horrore & febre graviditatis ſignum.

Uteri temperamenta.

dum, Humidum, Siccum, & Calidum; atque ex his quatuor compositum, ut frigidum, & humidum vel siccum; atque calidum, & humidum, vel siccum. Quod si vero nihil horum excedebat, dicebatur Eucrasia. Hæc temperamenta erant Temperata, quando non ita excedebant, ut inde fierent morbi, sed Intemperata, si morbos producerent. Quamobrem in fine inquit moderatum temperamentum non inferre sterilitatem, sed quando Temperamenta illa modum excedunt, sterilitatem inferunt. Quando igitur hic agendum erit de Temperamentis sterilitatem inferentibus, semper intelligendum erit Temperamentum intemperatum. Ex his elegit solummodo quatuor Temperamenta simplicia, quia si habeantur composita temperamenta intemperata, eo major erit sterilitatis causa. Hinc quoque concipitur, ex qua causa dicit, *ex utrisque*, ut indicaret Temperamentum simplex, & compositum, aliter dicere debuisset, ex his quatuor &c.

Uteri frigida  
sterilitatis  
causa.

II. Quum Uterus in corpore lateat, per propria signa non potuerunt ejus intemperantiam detegere, propterea si volebant scire, nam hac vel illa laboraret intemperantia, primo periclitabantur signa generalia Temperamenti frigidi, calidi, siccī, & humidī totius corporis, ex quibus conjiciebant uterum eadem intemperantia laborare: dein perpendebant magis propria signa ex pilis pudendorum, ex mensibus fluentibus, & denique ex actione generationis. Si igitur Pili essent breves, molles, rari, flavescentes, non ultra pueritiam nascentes; si Menstrua fero veniat interdum post vigesimum ætatis annum prima vice sine causa alia morbosa retinente, quæ etiam præmature desinunt vix post quadragesimum annum, quæ prodeuntia fundebant sanguinem tenuem, aquosum, frigidum; si sæminæ se facile abstineant a venere, & ea vix delectentur, stantebant hujusmodi uterum intemperantia frigida laborare. In tali utero simul statuit densitatem, utpote ex abundantia frigiditatis uterus non potuit allatos humores discutere, sed ex iis in fe collatis densitatem facit. Quamobrem vero talis Uterus sterilitatem parit, rationem dat, quia genitura in ipsis exstinguitur, quæ quoque ratio est in utero præhumido. Certe ratiocinium hoc non ita recedit ab experientia, & veris rationibus, ut multi ex hodiernis autumant, est utique magis conveniens quam ex fermento corrupto, vel quavis postea inducta hypothese deducere sterilitatem. Nam si ponamus in partibus genitalibus actionem languidiorem, cujus ope consiciuntur ova matura, & ea devolvuntur ad uteri cavitatem, ea deficiente formantur immatura ova generationi inepta, & non pervolvuntur in uteri cavitatem, ut ab allato semine virili imprægnari possint, sine quibus femina concipere nequit. Nemini mirum videri potest quod solus uterus frigiditate laborare possit, qui perpendit actionem generalem vitalem, quæ in nobis est calefaciens causa, quadam in parte ita languere posse, ut una dumtaxat pars, verbi gratia manus, vel pes, præ ceteris partibus frigida sit: & eo magis si perpendimus partes genitales habere specialem sibi actionem, quæ sola debilitari potest, quod frequentissime quoque experimur in ventriculo, intestinis, hepate, cerebro, aliisque organis particularibus. Quali modo hæc intemperantia frigida sit curanda, ut ita fiat femina fertilis, ex data theoria facile deduci potest, nam generalia quæ intemperantiam frigidam curant, sunt adhibenda, & ad pudenda applicanda, vel ex uterinis eligenda, quæ simul calefaciunt, & roborant, qualia medicamina passim existant apud Veteres Practicos.

Uteri humiditas  
sterilitatis  
causa.

III. Quod monuimus supra in Uteri frigiditate, hoc est repetendum in Uteri Humiditate: nam post signa generalia temperamenti humidī attendendum est ad partes genitales, quæ ad attractum sunt molles, tumidæ, & frigidiore; menstrua pallida, aquosa, sæpe copiosa; frequens fluor albus; lumborum frigus & gravitas. Quia vero non generatur talis intemperies humida, nisi simul adsit firmarum partium laxitas atque motus vitalis, & actio istius partis sit debiliior, eodem fere modo ut frigida intemperies Sterilitatem inducit, imo frequentius, quia humoris crudi abundantia,

ria, si forte generarentur ova matura, ita submergeret ova, ut a semine virili non potuissent imprægnari. Præter recensita auxilia Discutientia hic conveniunt.

IV. Non omnis Uteri siccitas ad hunc titulum pertinet, nam siccatus uterus Uteri fœd-  
ex inflammatione aut erysipelate, vel si propendens siccetur, talis siccitas nume-  
ratur inter morbos: verum si Uterus suo loco manens minorem copiam humoris in  
se continet, & fundit per pudenda, talis dispositio uteri sicca intemperies vocatur,  
quæ defumitur ex signis generalibus Siccitatis totius corporis, atque ex pudendis  
aridioribus, vix ullam humiditatem stillantibus, ex mensibus paucis, & sangui-  
nem compactum exhibentibus. His fieri dicit Auctor Sterilitatem ob alimenti  
inopiam. Ova quidem generantur, & imprægnari possunt; sed quando illa ex u-  
teri lateribus capere debent nutrimentum: & incrementum, ex humidi defectu  
ovum imprægnatum perit, atque ita in principio gestationis sit abortus; vel dein  
liquefens in utero; aliens in humorem tenuem corruptum, absorbetur, ut non  
prodeat in lucem. Talis ergo femina otiose vivere debet, & diata humectante  
uri, conducet etiam genitalia fovere solum, vel vaporem aquoso, ut laxentur fibre  
& suppedietur major humidi copia.

V. Etiam si veneris appetentiam deducant ex Uteri caliditate, Calida tamen in-  
temperies hic proponitur ut causa Sterilitatis, quia semen corruptum alimenti  
defectu: igitur non multum distat ab intemperie sicca, nisi quod simul habeatur  
major veneris appetentia, imo furor uteri. Sed quoniam uteri Caliditate, id est  
validiore motu in suis fibris, omne humidum discutitur, ova imprægnata exsic-  
cantur, ut in fœtum crescere nequeant. Præter recensita auxilia in siccitate  
quædam simul refrigerantia sunt adhibenda. Auctores præcipiunt feminam talem  
sterilem imprægnari posse si nubat viro opposita intemperie laboranti: ut si fo-  
mina frigida matrimonio bateat maritum calidum, & ita porro, unde provenit  
quod in sequentibus nuptiis talis semina sterilis fiat prolifera.

Uteri ca-  
lidas Steri-  
litas cau-  
sa.

## LIB. V. APH. LXIII.

256. Similiter autem etiam in masculis. Aut enim propter corporis varietatem spi-  
ritus extra fertur, ut semen non demittat: Aut propter densitatem humi-  
dum non pervadit foras; Aut propter frigiditatem non incalcescit, ut ad hunc lo-  
cum congregetur; Aut propter caliditatem hoc idem contingit.

I. Uti in feminis formantur ova speciali fabrica, & actione ovarii, ita in  
viris testium fabrica, & actione conficitur ex allatis humoribus semen, in  
quod ulterius per epididymidem, & vas deferens, delatum, atque in vesiculis se-  
minalibus collectum ad majorem perfectionem deducitur. In utroque sexu vitiatum  
organo induci potest sterilitas. Ita ab uteri morbis, vel vitiatâ fabrica interdum  
non conceditur feminis virilis admissio: vel ovaria corrupta vel obstructa non pro-  
ferunt ova: in masculis eodem modo a membro virili intorto, vel nimis curto,  
vel alio modo vitiatum, semen duci interdum nequit in uteri cavitatem, vel a te-  
stibus scirrhotis, vel obstructis non generatur in viris bonum semen. Atque ita  
per multos morbos in utroque sexu nascitur sterilitas. Has autem omnes causas  
noster Auctor in hoc Aphorismo assignare noluit, quamvis a Commentatoribus al-  
legantur, sed per hanc sententiam adstruere conatur ab intemperie æque in ma-  
sculis quam in feminis sterilitatem induci posse, hujusque rationem addit, quæ  
an multum, vel parum valeat non curabimus. Observavit Hippocrates, ut & nos  
hodie, quod viri interdum ex matrimonio non accipiunt liberos, in quibus viris,  
vel seminis nullum apparet vitium sterilitatis, semina tamen illa in secundis nu-  
ptiis invenitur prolifera. Propterea judicavit vitium sterilitatis in semine virili la-  
titare, quod quadam intemperie laborat. Galeus acriter hic insurgit, credens  
T t bunc

An intem-  
peries ne-  
quit esse  
sterilitatis  
causa in  
masculis?

hunc aphorismum esse spurium, & Hippocrate indignum, quasi ex Intemperie non potuisset in masculis fieri sterilitas. Ego vero puto hanc causam æque valere inferre sterilitatem masculis quam feminis. Uterus etenim non est organum ova semineæ formans, sed ea generantur in ovario, ex humore suis vasis allato, per actionem specialem: sine ovis his maturis, & bene formatis nullus fit conceptus in utero, etiamsi uteri cavitas semine virili optimo esset plena. Itidem in viris per actionem testium ex allato humore præparatur semen prolificum: si vero illa actio testium vel sit debiliior, vel aliena, conficitur quidem in testibus liquor, & ducitur ad vesiculas seminales, sed quia non continet illa animalcula viventia, quæ in semine bono deteguntur microscopiis; ille liquor seminalis ad ovula femininarum applicatus, ovulum imprægnare nequit. Non enim sufficit ut ovum maturum semineum in utero irroretur liquore quodam ex viro proveniente, ut imprægnetur, sed requiritur semen maturum his viventibus animalculis præditum. Quia vero demonstravimus per Intemperiem ita mutari posse actionem, quæ facit ovula in ovario, ut nullum inde perfectum, & maturum ovulum prodeat, nulla mihi videtur restare ratio, cur non æque in viris per Intemperiem prædominantem potuisset produci liquor seminalis generationi ineptus. Imo verisimile videtur, hanc causam frequentissimam esse causam sterilitatis in viris. Sed quoniam in feminis hæc causæ non solum inferunt sterilitatem ex imperfectis natis ovis, verum etiam si uteri quoque corpus eadem laborat, ratione incrementi foris, verisimile videtur hanc Intemperiem frequentius in feminis quam viris inducere sterilitatem.

#### LIB. V. APH. LXIV.

257. **L** Ac dare capite dolentibus malum. Malum vero etiam febricitantibus, & quibus hypochondria elevata sunt murmurantia, & fisticulosis. Malum autem & quibus deiectiones biliosæ, & qui in acutis sunt febribus: & quibus copiosi sanguinis fausta est egestio. Convenis vero tabidis non admodum valde febricitantibus lac dare, & in febribus longis & languidis, nullo ex supra dictis signis præsentem: & præter rationem quidem extenuatis.

Lactis  
usamen.

**I.** Quid sit Lac, & quomodo generetur in mammis mulierum, vel uberibus animalium exposuimus (Aph. 232.) ex quibus colligi potest, præcipuam materiam esse chylum ex alimentis assumptis confectum, actione corporis aliquo modo mutatum, ut ex eo facilius quam ex crudis alimentis produci possint nostri humores sani, & proprii. Omnia genera alimentorum ab lactantibus animalibus assumpta, per actionem organi chylicæ, & affluxum humorum saponaceorum ita solvantur in sua veluti principia, ut referant massam homogeneam albicantem ad aspectum, quam chylum vocamus. Hic constat ergo alimentis solutis, liquoribus affusis, quibusdam partibus non solubilibus, quibusdam etiam adhuc immutatis, & portione quadam omnino soluta, & nutritioni adaptata. Talis humor in massam circulatoriam delatus, reliqua actione pulmonum, & artieriarum per totum corpus, & propria natura administratorum nostrorum humorum, magis præparatus in humorem nutritivum, mittit sensim indolem priorem, quam possidebat in assumptis, & tandem iterata actione corporis vivens omnem priorem naturam amittit, & convertitur in nostros proprios humores. Antequam ad eam pervenerit perfectionem, utcumque quædam retinet proprietates priores, ut patet ex odore aliisque specialibus detectis in hoc humore proprietatibus. Quamdiu chylus talis sanguini circulanti mistus est, in femina; vel animali lactante ad Mammæ delatus, actione ea speciali Mammarum a sanguine separatur, ubi simul utcumque in Lac commutatur, quod in se aliquo modo continet maturum non facile domabilem assumptorum. Non debemus judicare purum chylum ita separari ab

ab allato sanguine, sed tenendum est etiam aliquid de præparatis propriis humoribus istius corporis chylo esse mistum, ut constituat Lac, quibusdam in proprietatibus a chylo distans, & eo magis, quia actione Mammarum ille allatus chylius aliquam quoque mutationem subit. Hinc Lactis materia petenda ex assumtis, & propriis humoribus istius corporis, qui uniti subierunt aliquam mutationem in Mammis. Ille igitur humor experimentis est examinandus, quales proprietates possideat, antequam aliquid certi de ejus usu in morbis possimus adituere. Lac ex animalibus desumtum, quæ solis plantis, vel gramine vescuntur, in loco tepido retentum, secedit in tres partes, superne colligitur butyraceum oleosum pingue, reliquum inferius partim abit in materiem caseosam, & partim in liquorem tenuem scorum. Tota massa brevi tempore acorem contrahit. Sed quod Lac generatur in mulieribus, & aliis animalibus carne utentibus, sibi relicum non contrahit acorem, sed potius rancorem. Omne Lac facile coagulatur, seu ejus pars caseosa facile unitur, & secedit a reliquis, & se unit in corpus firmum. Meretur nunc inquirere quoddam genus lactis in hoc loco intelligitur. Quia vero olim ut hodie Lac vaccinum in frequentissimo fuit usu, nullum est dubium, quin in hoc loco sit accipiendum Lac vaccinum, nam ovinum, vel alinum si dari debet, animalis nomen adjectum invenitur. Lac vero ex animalibus carne vescentibus raro, vel nunquam datur: sed ex mulieribus solis phthisicis, & infantibus conceditur. Quare quidquid dicatur de usu lactis in sequentibus morbis, id lacti vaccino est adscribendum. Hoc lac quia desumitur ex animali, quod solo gramine, & aqua vescitur, ejus spontanea mutatio est in coagulationem, & acorem, ejus materia ita est soluta & præparata, ut proxime accedat ad naturam nostrorum humorum.

II. Non inficior Hippocratem observasse usu lactis intendi capitis dolorem, & Lac in capite dolentibus an-  
qui his doloribus sæpe sunt obnoxii per nimum lactis usum in Capitis dolorem incidisse. Neque negari potest, capitis dolorem leniri usu lactis, quod sæpe in praxi observavi. Ergo incertum videtur, num lactis usus conveniat vel noceat. malum  
Quia vero Capitis dolor a multis causis possit fieri, quarum quædam usum Lactis exigunt: alia vero respuunt, absolute poni nequit, num conducat vel noceat Lactis usus. Ita tamen solent Veteres ratiocinari in morbis, qui ex diversis causis oriuntur, ut morbum talem habeant legitimum, qui ex frequentissima causa oritur. Ita absolute dicitur Pleuritis si fiat ab inflammatione; Nephritis a calculo: iidem autem morbi ab alia causa nati habebantur illegitimi seu notii. Hoc etiam statuendum est in Capitis doloribus, qui frequentissime oriuntur ex sanguinis abundantia, & impetu majore ad caput. His hominibus si detur multum Lactis, quod prompte cedit in bonum sanguinem, generatur ex exhibitione ea capitis dolor, quia augetur sanguinis copia, quæ doloris est causa. Hic vero Lactis acorem accusare vel vaporem caput petentem, ut multi, non videtur mihi alicujus momenti, cum decocta farinosa, quæ citius acorem contrahunt, laudentur, & sæpe utimur lactis vapore naribus attrahendo, ut medeamur capitis doloribus.

III. Propter rancorem, in quem dicunt cito abire Lac, non sunt aut Lac dare febrecitantibus, magis credo ut quidam ratione firmarent Hippoc. & Galeni sententiam, quam ut proferrent veritatem. Nam in febribus essentialibus (Aph. 153.) conveniunt ascentia, quale medicamen est Lac, quod in calore retentum brevi accessit, ut supra probavimus. Reponunt tamen, lac potum brevi post ructum nidorosum facere, quod ejus cremor seu pars butyracea in rancorem abeat; & Lac coctum rancilum fieri. Vera sunt experimenta, sed non probant id, ad quod adducunt, nam iidem in hominibus a pura tepida aqua pota etiam sit ructus nidorosus, ex quo experimento nemo colligere potest aquam commutari in nidorem, sed adfuisse pinguedinem corruptam in ventriculo, eamque aquæ tepida potu solutam, & ita supernatantem, ructum nidorosum facere, quod etiam a lactis potione

An Lac non dandum febrecitantibus.

Et Lac diu coctum nidorem contrahere verum est, sed tantus non est ventriculi in febricitantibus calor, ut inde lac coqui possit. Alia igitur esse debet ratio, quamobrem non damus febricitantibus Lac, & cur ex ejus usu intenditur febris. Illa ratio plana est: in omnibus febribus calidis victus humidus (Aph. 16.) est imperandus, & tenuis debet esse Dieta in omni morbo acuto (Aph. 8. 10. 11. &c.). Quando igitur Lac multum nutrimenti præbet, febribus obest. Lac vero multum nutrimenti continere, cum ex chylo formetur, neminem latere potest. Si ergo quis vellet Lac dare febricitantibus, istud multa aqua prius est diluendum. Tali modo dilutum Lac expertus sum febricitantibus potum esse egregium, sed si merum Lac detur, propter copiam nutrimenti a febricitantibus tolerari non potuit.

Lac an noceret quibus hy-  
pochondria  
Si hypochondria  
elata mur-  
murant.

IV. Nonnulli elevata hypochondria murmurantia referunt ad febrem antecedentem, alii vero hoc phenomenon sine febre accipiunt: utrumque casum perpendemus. Si hypochondria sint elata murmurantia ex febre, tunc signum est materiem febrilem magis ferri ad intestina & eorum motum turbare (Aph. 183.). Ex febris ratione deduximus non convenire Lac, sed & motus admodum perturbatus intestinorum convertit Lac merum assumtum in corruptelam. Experientia constat eo validiorem corruptelam fieri, quo plus nutrimenti est in assumtis, inde teterrima corruptio ex pinguedine producit. Propterea Lac merum in tali symptomate non conducit. Quibus vero hypochondria elevata murmurant sine febre, illis ut plurimum contenta intestinorum aliquam faciunt commutationem in acidum specie fermentationis, & quoniam lac in loco calido cito etiam acescit, non convenit tale dare alimentum, quod sponte acescit.

An Lac non dan-  
dum siti-  
miosis.

V. Sitis naturalem causam esse defectum humidi in corpore, quo os siccatum nobis Sitis sensum concitat, demonstravimus in speciali Exercitatione de Siti: hæc causa fit eo major in febribus, quibus omne humidum expellitur, & reliquum compingitur, quare in febribus frequentissimum, & molestissimum est symptoma. Hoc ut tollatur, exigit humidi abundantioris ingestionem, quod vix aliquid nutritivum in se continet. Si nunc examinemus Lac merum, id nutritivum abundans non præbet tale humidum, quale ad Sitem leniendam exigitur. Si vero magna copia ingeratur, corpus multitudine nutrimenti, quod in febribus est evitandum, opprimitur, & non suppeditatur tamen humidi, quantum ad Sitem leniendam requiritur. Qui ergo Lac potandum dare vult sitientibus cum vel sine febre, id admodum erit prius diluendum magna copia aque.

Num Lac  
malum,  
quibus de-  
jectiones  
sunt bilio-  
se.

VI. Biliosas dejectiones supra (Aph. 40. II. & Aph. 133. III.) descripsimus, ex quibus constat eum hominem habere in intestinis materiem pinguem corruptam, acrem, & calidam: his igitur hominibus nulla sunt danda pingua, ne materiam biliosam, quæ ex pinguedine corrupta præcipue formatur, demus suppetias. Quia vero in lacte multum pinguedinis hæret, ut patet ex ejus supernante cremore, facile intelligitur Lac dandum non esse, nisi magna copia aque dilutum sed potius aciescentia macra. Lactis exhibitio eo magis est evitanda, si febris acuta adsit, quæ prompte humiditatem discutit, & reliquam pingue in rancorem convertit. In dejectionibus autem biliosis sine febre lactis serum aciescens, quod pinguedine caret, expertus sum egregium fuisse medicamentum, quo potui omne biliosum corruptum eliminare.

An Lac  
nocet,  
quibus  
copiosa  
sanguinis  
fluxus est  
egressio?

VII. In Dictione hæc quedam est obscuritas, quidam enim intelligunt Diarrhoeam vel Dysenteriam cruentam, in qua noceret exhibitio meri lactis; alii accipiunt sub hoc sensu omnem sanguinis evacuationem ex quacunque parte, in quo etiam non conducirer; denique intelligunt quidam tempus illud, in quo æger per antecedentem sanguinis evacuationem est sanguine veluti privatus. Quævis autem sit vera sententia Auctoris non primabimur, sed videbimus quid sit sentiendum in his diversis casibus. In Diarrhoea, & Dysenteria cruenta per experientiam constat Lac ingessum, vel clysmatis ope injectum magnum solamen attulisse,

se, nam id acre, quod intestina vellicat, lactis injectione, & assumptione egregie temperatur. Si vero sanguis ejicitur propter tenuityatem sanguinis, vel laxata oscula vasorum, hanc defectionem equidem non curabit, sed quoque nihil damni adferet. In quavis alia sanguinis evacuatione multi suadent lac non esse exhibendum, quia copiosorem hæmorrhagiam facit, quod etiam experimur; sed propterea non debet æger se abstinere ab omni lactis usu, modo enim moderatam copiam ingerit; sed ex copia majore damnum pateretur, quia corpus sanguine exhaustum leni, & paucio nutrimento est sustentandum, quale est lac modicæ copie sumtum. Sed sese abstinere a lactis usu, qui debilitatus est per antecedentem sanguinis evacuationem, eum male agere existimo, corpus enim illud est restaurandum bono, & levi nutrimento, quale lac suppeditat: verum hoc corpus onerare magna copia lactis puri, esset obruere vires multitudinis alimentis: quare credo Auctorem in hoc casu vetare nimiam lactis puri ingestionem. Hoc ex textu constare potest, quia dicit, quibus copiosa est facta sanguinis egestio, quibus verbis indicat eam egestionem non fieri, sed fâctam esse, quod corpus debilitatum non fert tantam copiam puri lactis ingestam.

VIII. Quid fit Phthisis superius (Apb. 85. II.) definivimus, in quibus hominibus non est defectus concoctionis in organis chylopoieticis, sed corruptio præparati humoris præprimis in pulmonibus: in his igitur, quia tanta est boni humoris consumptio in materiem purulentam, convenit ut suppeditetur alimentum satis copiosum, quod non eget multa præparatione, quale est Lac. Propterea phthisici si non amplius alia alimenta ferre queunt, solo lacte sustentantur. Multi quidem Lac asinum eligunt, sed ex qua ratione non intelligo. Ruminantia animalia enim perfectius sua alimenta præparant ruminando, quam non ruminantia, ut Asinus, atque meliori gramine vescuntur. Si Lac asinum sit magis dilutum, & inde facilius digeratur, hoc quoque obtineri potest afundendo aquam Lactis vaccini. Igitur concedo Auctori nostro, qui laudat Lac vaccinum in Tabidis, qui non admodum febricitant, ac multitudine nutrimenti lac obest feбри, ut antea monuimus.

Lac. convenit tabidis.

IX. Dietam tenuem imperandam esse in Acutis passim observavimus in Libro Primo, ex hoc principio quoniam vis vitæ admodum laborans a morbo per multa alimenta aggravata magis laboraret, & forsitan succumberet: si vero febris longior erat expectanda, concedebatur victus largior, quia corpus per tam longum tempus victu tenui non potuisset sustentari. Eadem est in his febris ratio, nam assignatur febris longa, & languida, in qua corporis vires non multum instigantur, sed quæ tamen diu duratura est: in qua si non suppeditetur nutrimentum sufficiens, vires vitæ debilitarentur alimenti defectu. Hinc lac nutrimentum satis copiosum præbens, sed quod etiam facile ab actione corporis potest subigi, his hominibus est dandum ut sustentent vires.

Lac. convenit febrilibus longis & languidis.

X. Quenam dicantur corpora extenuata unusquisque intelligit, sed cur dicatur præter rationem meretur observare. Hæc est communis locutio Hippocratis, si significare vult non adesse causam manifestam, ex qua possumus tantam extenuationem expectare. Mirum enim non est, quod aliquis ex morbo acuto, vel febre, vel ulcere pulmonis admodum extenuetur; sed si ipsi ægri mirantur se summo pere extenuari, dum tamen belle comedunt, & non multum ægrotant; talis tunc Extenuatio inde oritur, quia assumpta alimenta ingesta defectu virium non compinguntur in humores crassos sanos, sed tennes manent. Quo nunc alimenta majore actione compingenda sunt in humores nobis naturales, eo minus conveniunt: quæ vero levi actione vitæ commutabilia sunt, uti est lac, ista præstantissima censenda sunt. Inde Hippocr. per experientiam præfaciam id detexit, quod ex firma theoria debuisset deduci. Sic videmus veram Theoriam semper respondere praxi.

Lac. convenit præter rationem extenuatis.

## L I B. V. A P H. LXV.

258. **Q**uibus tumores in ulceribus apparent, non valde convelluntur, neque insaniunt. His autem de repente evanescentibus, quibus in postica quidem parte fuerint, convulsiones, tetani, quibus vero in antica, insania, aut lateris dolores acuti, aut suppuratio, aut dysenteria, si rubicundi fuerint tumores.

Morbi ex  
consensu  
& meta-  
stasi.

**I.** Hoc in Aphor. Hippocr. naturæ arcana re velat, quæ a paucis bene intelliguntur, quum sine cognitione anatomica, & intellectus actionibus corporis viventis intelligi nequeant: ea tamen detexit Auctor per praxin, non vero ex prævia cognitione theoretica. Nobis enim quædam mira reliquit exempla, quomodo morbus in uno loco corporis natus possit etiam alia in parte producere morbum: num vero ille alter morbus per sympathiam vel metastasin generetur non explicat; verum docet quinam morbi producant alium in aliquo loco remoto, & quinam raro id faciant. In superioribus demonstravimus (*Apb. 125. III. Apb. 126. III. Apb. 127. IV. Apb. 230. I. &c.*) inter quædam corporis partes maximum valere Consensum, & maxime inter istas, quæ ex eodem ganglio nervos habent, vel communem fere exercent functionem. Inde si pars una afficiatur morbo, altera etiam afficitur, sed quoniam tali in casu non fertur morbi materia ex uno loco in alterum, hi morbi ex Consensu nati non adferunt levamen, verum semper magis opprimunt ægrum. Si vero morbi materia ex uno loco ad alterum feratur, quando vocatur metastasis, talis transplantatio bona esse potest, & mala. Nam ut bona sit, omnis materia est transferenda ex parte magis principi ad minus principem, ex loco ubi exonerari non potuit ad aliquod emunctorium conveniens: ita enim æger liberari potest ab omni materia morbi. Si vero imperfecta sit translatio, vel ad partem, ubi eadem materia majus periculum inferre potest, augebitur morbus. Semper ergo attendendum in prædictionibus, & curationibus ad has regulas generales. Has applicabimus ad exempla allata: multa plura quidem sunt, sed quoniam hic non est locus omnia tradere, quæ dicenda sunt de Consensu & Metastasi, paucæ ea ab Auctore allata sufficiunt.

Non valde  
convellun-  
tur aut  
insaniunt  
quibus tu-  
mores in  
ulceribus  
apparent.

**II.** Chirugos per Ulcus intelligere vetustam solutam unitatem in partibus firmis, in qua plerumque quædam portio simul demta est, ex nostra Chirurgia re-purgata, & aliis libris Chirurgicis intelligi potest. Ambitus hujus ulceris seu ora ejus vel tument, vel non elevantur, prout fluens humor morbosus in istis colligitur, vel non. Si multa sunt Ulcera dispersa per cutim, ut hic habetur in plurali, non possumus accusare vitium locale, sed humorem morbosum per totum corpus diffusum, uti in variolis: in tali nunc statu morbofo observavit Auctor agros non valde convelli, aut insanire, id est, rarum est si ora ulcerum turgant, quod tunc ægri corripiantur Convulsione, vel Insania: hoc etiam observamus in variolis, quoniam morbi materia per corpus dispersa tunc colligitur ad ulcera, propterea non fertur ad encephalon, ut irritando nervos inferret convulsionem, vel insaniam. Si vero illa intumescencia evanescat, facile fieri potest, ut ad Encephalon delata materia istos morbos inferat. Non tamen illa intumescencia tam certum est signum, ut nunquam inde fieri posset Convulsio, aut Insania, nam observavi in ulceribus cum læso nervo vel tendine intumescenciam magnam præfagisse Convulsionem vel Insaniam. Hujus discriminis ratio est, quoniam alia pars in Consensum potest trahi, & per Metastasin recipere morbi materiem. Quod si vero ex intumescencia læsi nervi vel tendinis generetur Convulsio aut Insania, hi morbi non superveniunt ex Metastasi, sed ex Consensu, qui non admodum frequens est in ulceribus cuti.

Qui morbi  
nant ex

**III.** In superioribus demonstratum est multa ulcera arguere morbi materiam ge-  
ne-



nerari per totum corpus, quæ ad ora ulcerum delata ibidem manet, donec tandem acquisita maturitate per apertum ulcus evacuetur. Si vero tali in statu evanescat intumescencia derepente, signum est eam materiem non fuisse evacuatam per ulcera, sed rediisse in communem circulationem, quod malum est, quia fertur a peripheria corporis ad interiora, & a loco ubi potuisset evacuari ad locum magis principem, & ubi tam commode evacuari non potest. Igitur talis disparentia tumorum semper mala est; verum non determinat, qualis morbus sit expectandus; nam prout illa retrogressa materia in hanc, vel illam partem deponitur, ita quoque morbus erit varius, & magis minusve periculosus. Adhuc tamen vita non ita est inconstans, ut sine ullo discrimine quemcumque morbum ex tali metastasi faceret, propterea experimenta practica sunt consulenda, quid natura facere soleat in tali regressu materię, nam hoc ex legibus hydraulicis demonstrare non valeo. Videamus ergo quid Auctor noster in morbis his detexit, & quod dein per experientiam practicam fuit firmatum.

IV. Qualis sit morbus Convulsio, & Tetanus, & quantum differant, ex iis, quæ exposuimus (Aph. 167.) facile colligi potest. Experimenta in corporibus viventibus docuerunt, irritatione facta ad nervos, vel duram matrem, totum corpus ceteroquin sanum adigi posse in Convulsionem, vel & Tetanum. Quibus constare potest, si modo aliquid acre internum feratur, & applicetur ad recensitas partes, id acre inferre posse Convulsionem, & Tetanum. Nullus autem erit, qui per se non potest concipere tale quid fieri posse, si tumores derepente circa Ulcera evanescant: nam ille humor corruptus circa Ulcera subsistens evanuit, seu potius inde depulsus fuit, & non emendatus, & receptus est in communi massa circulante, igitur mirum esset, si illa materia acris, & morbosa quoque non ferretur ad nervos, & cerebrum, & in his partibus sua rōne produceret motum illum validum, & involuntarium.

V. Quoniam speciali titulo in nostra *Medicina Dogmatica* exposuimus Delirium, Insaniam, ceterosque congeneres morbos, non erit opus hoc loco repetere. Pleuritis definitionem exhibuimus supra (Aph. 109. IV.) Ex iis, quæ in hoc Aphorismo generaliter explicavimus constat materiem acrem ex tumentibus marginibus ulcerum intro ferri. Illa materia si feratur ad nervos motores, inducebat motum involuntarium validum; sed si feratur ad partes acuto sensu donatas, idem tunc acre validos dolores infert, qui hic dicuntur Dolores lateris, qui locus solus non est obnoxius huic receptioni: observavi quoque ex tali disparentia natos fuisse dolores capitis, & ventris, sed quoniam ille dolor pectoris observatus fuit ab auctore, eum pronunciat; sed propterea non negat alias quoque partes dolore corripi posse. Eodem modo, ratiocinandum est de Insania, nam materia illa ad eum locum cerebri delata, in quo mens nostra sensus interioris exercet, eum locum in suo placido motu ita perturbat, ut mens tali modo afficiatur. ex hac commotione interna, ac si agitaretur perturbatis quibusdam sensibus externis; & quoniam tunc anima nostra ex perturbato motu interno ratiocinatur, & operatur, talis adhuc dicitur Insania. Hoc autem mirabile observavit Auctor in hac metastasi, quod ex ulcerum detumescencia in partibus posterioribus frequentius generetur Convulsio, & Tetanus; sed ex metastasi partium anteriorum frequentius Insania, & Laterum dolores. Ego fateor me in praxi illam differentiam observare non potuisse, interim tamen non possum inficiari, qui tale quid detexerit per suam praxim frequentior.

VI. Quomodo autem ex hac detumescencia generari possit Suppuratio seu Empyema, primo intuitu videtur conceptu difficile, sed quoniam materia purulenta in marginibus ulcerum collecta, uti alibi in corpore, inde reduci potest, & humoribus circulantibus misceri, ex communi observatione translationis puris satis evincitur, suppurationem alibi in corpore, vel in cavo pectoris fieri posse: ita observavimus in febre per metastasin fieri Anginam (Aph. 144.) ex Angina Peri-

derepente  
disparentia  
tumoribus  
circa  
ulcera.

Ex ulcerum  
detumescencia  
Convulsio, &  
Tetanus.

Ex ulceris  
detumescencia  
Insania,  
aut lateris  
dolores acuti.

Ex ulcerum  
detumescencia  
suppuratio.

pneumoniā (*Apb. 203.*). Obſtare tamen videtur nimia puris craſſitudo, & nulla patens via ex una parte in aliam. Verum ſæpe experimur in empyematicis puri evacuari per urinas, non quod ex pectore ad renis ſit canalis apertus tranſmit- tens pur; ſed pur aliquo modo liquatum, venulis abſorptum, cum ſanguine circulante circumductum, actione renum iterum ſeparatur, & cum urina exit. An vero talis meſtaſis bona, vel mala ſit ſentientia, facile intelligitur, quia translatio a peripheria corporis ad interiora ſemper eſt mala, unde quoque talis ſuppuration non ſolum mala eſt, ſed & revocationem ad priora loca reſecta exigit.

Ex ulce-  
rum detu-  
meſcentia  
Dyſenteria,  
ſi rubicun-  
di fuerint  
tumores.

VII. Dyſenteriam non ſolum ſignificare ſanguinis ejectionem per anum, ſuperius (*Apb. 134. l.*) demonſtravimus, ſed etiam notare alvi frequentem dejectionem cum dolore, ſive ſanguis exeat ſive non. Talem dejectionem obſervavit Au- thor exſpectandam eſſe, ſi derepente tumores circa ulcera evaneſcant. Sed hic ad- dit, ſi tumores fuerint rubicundi, quam phraſin ego referrem duntaxat ad hanc meſtaſin ex ulceribus ad inteſtina, non vero in reliquis omnibus: nam ſi rubedo illa major adeſt in oris ulcerum, ſignificatur materiem eryſipelatoſam, vel & aliam acrem & irritantem adeſſe, non vero purulentam, uti in præcedente meſtaſi. Si illa materia acris rubedinem inducens, quæ veteribus dicitur biliola, miſceatur ſanguini circulanti, illa quoque frequentiffime deponitur ad inteſtina; ubi ſua irritatione generat dolorem & tormina; & quoniam ad partem ſtimulatam magis confluunt humores, inteſtina irritata magis mota, majorem copiam recipientia, generant Dyſenteriam humoris acrioris, qua ejectione continuata tandem egeritur etiam ipſe cruor. Quamvis illa meſtaſis fiat ad organum excretorium, non tamen ita bona eſt cenſenda, nam id acre obambulavit prius totum corpus, ubi reliquos quoque humores inquinare potuit; ulcus eo fluxu non eſt ſanatum, unde ſit imperfecta Meſtaſis, quæ ſemper mala; evacuatione hac ſæpe etiam exulceratur inteſtina, ut ita augeatur malum; contenta alimenta in inteſtiniſ tali corrupto humore perſuſa non concoquuntur, & una cum corrupto humore elimi- nantur, atque ita privatur corpus ſuo naturali pabulo. Tot ergo concurrentibus rationibus perſuaſus credere nequeo hanc Meſtaſin eſſe bonam, ſed potius malam cenſendam eſſe ſtatuo. Quid vero ſit agendum in hiſ omnibus, quoniam nimis longum foret exponere, iſtud reſervabo in locum magis opportunum.

## L I B. V. A. P. H. LXVI.

259. *SI magnis, & pravis exiſtentibus vulneribus, tumores non apparent, in- gens malum.*

In magnis, l.  
& pravis  
vulneribus,  
& contuſio-  
nibus nulli-  
tus tumores  
te, hodie proprie vocatus Vulnus, ſed per inſtrumentum, vel corpus obtuſum diſ-  
fractio facta in partibus mollibus hodie proprie dicitur Contuſio. Qui vero gene-  
raliter agunt de Vulneribus, ſimul ſolent Contuſiones eodem titulo pertractare.  
Sic quoque apud Hippocratem τραυμα ſæpe ſignificat Vulnus, & Contuſionem.  
Quia vero in utriſque hiſ morbis Tumores non apparentes malum indicium præ-  
bent, hos morbos conjunctim explicare volui. Sive ab inſtrumento acuto ſive ob-  
tuſo læſio notabilis eſt facta, illæ partes læſæ ſe magis movent, ex lege generali,  
omnis pars mobilis in noſtro corpore vivente irritata ſe magis movet. Hoc mo-  
tu aucto ita urgetur ſanguis per ſuas arterias verſus ramos minores, ut arteriæ  
lymphaticæ diſtente a majore illo impetu ſanguine rubro impleantur; & quoniam  
ſanguinis tranſitus per venas multis in locis ibidem eſt interceptus, pars conſuſa,  
vel

vel vulnerata sensim in majorem tumore rubrum elevatur. Hinc quamdiu vis vitæ valet, sensum magis increfcit tumore pars læsa, usque dum suppurare incipit. Quando ergo post læsionem hanc non generatur tumor, indicium est vitalem actionem in ea parte esse extinctam. Propterea addit, in Vulneribus, & Contusionibus pravis ingens malum, ut intelligeremus actionem vitalem eo in loco, ubi quædam pars vitæ admodum necessaria hæret, extinctam magnum periculum portendere: nam ea sunt Vulnera, & Contusiones prave, quæ lædunt aliquod viscus, vel partem principem. Ex quibus colligere possumus, naturaliter ad omnes Contusiones, & Vulnera magna expectandos esse tumores, ex quibus non apparentibus malum præsignium desumitur. Et novimus inde in facienda futura humida, ne nimis arcte consueamus vulneris magni labia, quin fila transeuntia aliquo modo dimitti possint cum increfciente tumore. Arque in Contusionibus omnino cavendum, ne comprimendo vel cingendo conemur inhibere Contusionis tumorem: sed applicanda sunt emollientia, & laxantia, quæ tumoris generationem promonent. Si vero Tumor major pro ratione Vulneris, vel Contusionis nascatur, hoc etiam malum est, non propter Tumorem ipsum, sed propter signum latentis mali: nam si ingens Tumor nascatur, indicium est latitare aliquod malum oculis non patens, quod tantum tumorem faciat.

## L I B. V. A P H. LXVII.

260. **L**æxi tumores, boni: crudi vero, mali.

**H**oc in Aphorismo intelligi Tumores, quamquam non habetur in textu græco, ab aliis satis demonstratum est: sed non conveniunt, num hoc in loco sensus sit generalis de omnibus Tumoribus, an vero solummodo de Tumoribus vulnerum, & contusionum. Ego existimarem solummodo in hoc loco accipiendum esse Tumorem, qui ex vulneris, vel contusione nascitur, ut hic Aphorismus sit veluti continuatio prioris. Sententia ergo est, Tumores vulnerum, & contusionum Læxi seu potius molles sunt boni; at Crudi, id est duri & resistentes sunt mali. Quod paucis videbimus. Dum propter irritamentum vulneris, vel contusionis circumquaque generatur Tumor laxus seu mollis, qui digitis tangentibus aliquo modo cedit, & habet paulo majorem calorem, quam est naturalis calor in tali parte, talis Tumor denotat quidem motum vitalem instigatum esse, sed tamen tam moderate, ut pars modice distendatur, & impleatur. Si tali tumor ad tempus suppurationis pervenit, quando sensim iterum instigatus motus incipit sedari, vasa illa laxiora facile permittunt, ut compactus humor in purulentiam conversus sine ulteriori læsione vasorum evanescat, seu tradatur sanguini circulanti, & ita evanescit sæpe tumor contusionis sine evacuatione. Si vero Tumor crudus, id est durus, quoniam omnis tumor durus in suppurationem seu coctionem non abit, observatur, malum erit signum; nam durities renitens oritur ex compactis, & concretis humoribus, qui difficulter solvuntur, vel ex validissima vasorum infractione, qua vasa ut plurimum disrumpuntur, & humores ita infarcti raro retroPELLUNTUR. Igitur ex duritie ea cognoscimus validam fieri irritationem, humores nimis compactos esse, quam ut resolvi possint, & multa vasa destructa per tam validam impletionem.

Cur tumores molles boni; duri vero mali.

## L I B. V. A P H. LXVIII.

261. **P**oslica capitis parte dolenti, recta in fronte vena secta juvat.

**E**xpertus est Hippocrates Capitis dolorem in parte posteriore sublatum fuisse facta venæ sectione in vena frontali; hoc etiam posteriores Medici experti sunt.

An vena frontis secta

sunt, non tamen voluit ex uno alterove experimento formare regulam generalem curationis, quare dixit, *Juvat, non vero curat, vel secanda est vena frontis in capitis dolore, qui posteriorem partem affligit.* Neque affirmari potest hæc doctrina: antequam enim definiti potuisset, num vena esset secanda, constare deberet, an dolor erat in partibus externis, vel internis, & quænam esset causa eum dolorem faciens. Sed quoniam hoc non est determinatum, incerta foret curatio. Multi tamen medici hanc curationem imitati sunt, donec detecta circulatione indicarent frustra hanc venam secari, & eundem effectum expectari ex secda vena in brachio, quare postea obsoleta fuit hæc operatio. Deinceps vero Hydraulici demonstrantes nos posse variam facere derivationem, si hæc, vel illa vena aperiat, iterum a quibusdam instituta fuit phlebotomia in vena frontali. Quia vero ratione derivationis sive hæc, vel illa vena aperiat, non multum boni, vel mali sit expectandum, atque illa venæ sectio non instituitur, nisi collum stringatur, ut compressis jugularibus detineatur sanguis in capite, non videtur mihi opus amplius ad capitis dolores leniendos, hanc pertundere venam. Quæ narrantur de derivatione in partem oppositam, ab uno latere ad alterum, non sunt alicujus momenti, quia quæcunque vena secda exonerat illum sanguinem, qui ad partem eam adducitur per arterias ejusdem lateris, quare magis evacuat sanguinem ex parte ipsa, & adjacentibus, quam ex parte opposita.

L I B. V. A P H. LXIX.

262. *R*igores incipiunt, mulieribus quidem ex lumbis magis, & per dorsum ad caput. Viris autem, postica magis parte, quam antica corporis, velut ex cubitis, & femoribus. Sed & cutis viris rara est. Hoc quidem pilus indicat.

Cur Rigo-  
res magis  
ex lumbis  
incipiunt.

*I*Supra (*Apb. 156.*) exposuimus quid sit Rigor, & ex qua causa proxima nascatur. Constitit omne acre noxium nervis sensuum, & motus vitalis applicatum, Rigorem inferre, quod nuper expertus fui in viro fistula in lumbis laborante, si modo immittebatur stylus, qui tangebatur nervum, vel injiciebatur liquor vix quandam acridinem habens, ipso momento Horrore, & Rigore corripiebatur per totum corpus. Quærendum ergo est, cur Lumbi magis quam partes reliquæ corporis tali noxio applicato afficiantur: & dein, cur Rigores eo in loco incipienter petant caput. Ex tota theca vertebrarum nullibi plures emergunt nervi, quam ex vertebis lumborum, inde enim emergunt nervi, qui ad omnia viscera ventris tendunt, & ad pedes. Lumbi etiam constituunt partem infimam medullæ spinalis, ubi illa medulla in caudam veluti compactam, non amplius mollem medullosam, abit. Hoc etiam in loco Infatnes frequentissime patiuntur spinam bifidam. Humor roridus nutriendus vagina medullæ spinalis coercitus, hic satis magna copia colligitur, & nudis nervis accumbit. Ideoque nervi in hoc loco maxime sunt expositi rebus acerbis applicandis; quoties enim aliquid acre in illo succo hæret ob locum decliviorum, & ampliorum ad nervos hic nascendos applicatum, Horrorem & Rigorem inducit. Quia omnes hæ concurrentes cause minus inveniuntur in locis reliquis, magis hoc in loco habetur Rigoris origo in lumbis quam in partibus ceteris. Non ignoro a quibusdam Rigores hos deduci a succo pancreatico effervescente cum bile, sed quia hujus effervescencia diu fuit improbata, & quia succus pancreaticus, in natura vix differens a saliva, deponitur in duodenum, non vero circa lumbos, non erit opus multis verbis hanc repudiare sententiam. Neque inde constaret, cur hic concitati Rigores peterent sursum ad caput, secundum spinalem medullam. Sed si perpendimus capsulam nervi ruditer tactam concitare Rigorem, & capsulam nervi continuatam esse vaginæ medullæ spinalis, plane constare potest, per irritatam capsulam medullæ spinalis

in lumbis, irritamenti propagationem fieri posse usque ad meninges, quum meninges cum vagina hac unam continuatam membranam constituant, quæ omnibus nervis per totum corpus dispersis largitur capsulam. Quod autem in mulieribus frequentius ex lumbis quam in viris incipiant Rigores, inde forsitan est quod feminis major concessa sit pelvis ossea, & in ea uterus locatus; plures nervi hic oriuntur. quam in viris, & ita major proventus hujus succi: qui acrimoniam illam irritantem continere potest.

II. Pilos copiosiores nasci in viris quam feminis constans est observatio, præprimis quando ad maturam ætatem pervenerint, an vero inde major, vel minor Cutis raritas possit probari, non caret dubio: nam pili per cutis poros transeunt, istosque implentes minorem raritatem relinquerent, quum spatiosa raritatem facientia implerentur. Nec video ex qua ratione illa raritas probaret frequentiores horrores fieri ex dorso, sed absentia pilorum uti in feminis indicaret horrores fieri debere ex lumbis. Hanc ergo sententiam in medio relinquam, donec clarior ratio hanc observationem ad majorem usum redegerit.

An cutis viris rarior quam mulieribus?

## LIB. V. APH. LXX.

263. **A** Quartanis correpti, a convulsione non admodum corripuntur. Si vero prius corripiantur, & postea quartana supervenerit, liberantur.

**I.** **D**UO hic proponuntur morbi utrique chronici, nempe Febris quartana (Aph. 50. II.) atque Convulsio (Aph. 51. III. & Aph. 194. I.) De quartana dici potest, quod sit morbus admodum pertinax, qui interdum ad annos continuatur suis redeuntibus paroxysmis, sed tamen raro, si pura manet, hominem interficit: quia vero ut plurimum auscultat antidoto, constat unicam simplicem ejus esse causam, quæ antidoto subacta, hominem sanum relinquit. Convulsio autem est morbus ex variis causis natus, quæ propterea non habet antidotum constans, quod duntaxat valere potest in certa specie Convulsionis, sed non in omnibus. Hinc mihi quoque incertum est præsigium, an Quartanis correpti non admodum corripiantur Convulsione, cum quædam causæ Convulsionem inducentes atque generari possint, siue Quartana sit præsens, vel absens. Imo observavi in praxi mea levissimas convulsiones hystericas frequentius fieri in iis, qui quartana febre laborant, quam in perfectè sanis. Nisi ergo addatur certa species Convulsionis ex sua latente causa, non possumus pronuntiare an quartanarius liber manebit a Convulsione, vel non.

Quartana corripit an non admodum convulsione corripitur.

II. Quod statim proposuimus est repetendum, quum quædam causæ esse possint Convulsionem inducentes, quæ a superveniente febre Quartana subigi possunt, & cum sudore subsequente expelli: sed & sunt plures aliæ causæ Convulsionis inducentes, quæ potius per quartanam intenduntur, quales differentias in praxi mea sæpe observavi. Propterea nisi per multiplicem experientiam constet, quænam species Convulsionis a Quartana subigatur, tam diu incerta manebit prædictio.

An convulsio tollitur superveniente quartana?

## LIB. V. APH. LXXI.

264. **Q**uibus cutis obtenditur arida ac dura, sine sudore moriuntur. Quibus vero laxa ac rara, cum sudore moriuntur.

**I.** **N**ULLAM in curatione hic Aphorismus habet utilitatem, sed solummodo Medico auctoritatem conciliare potest aliquid præfigiendū, quod omnibus non ita patet. Ut plurimum experimur instante morte ex tota facie sudorem guttatim

Signum ex cute an aeger curatur.

340 MEDICINA HIPPOCRATICA Aph. 264.  
 vel sine<sup>8</sup> exprimi : né autem hoc phænomenon expectemus antequam quis moritur :  
 sudore fit hoc Aphorismo addisci potest interdum sine apparente sudore homines mori .  
 moriturus Sed ut prædicamus , num prius sudor sit expectandus , vel nullus , indicia ex  
 Cute desumenda : nam quibus tota cutis est arida , & dura , hi sine sudore  
 moriuntur . Talis est Cutis in iis , qui ex marasmo moriuntur consumtis om-  
 nibus humoribus : vel & etiam in validissima febre ardente , . dum omnes hu-  
 mores fuerint compacti , & tamen vehementi tali motu vitali instigato , ita  
 destruuntur solida , & consumuntur spiritus , ut æger in vigore febris moriatur .  
 Frequentius autem diminutis viribus , & colliquatis humoribus homo moritur ,  
 in quali statu ante mortem cutis defectu contractilitatis laxa est , & tenuitate  
 corrupti humoris undique fit uliginosa .

# LIB. V. APH. LXXII.

265. **I**ctericis non admodum flatulenti .

An Icteri-  
 ei non ad-  
 modum  
 flatulenti . **Q**Uum Auctor in quibusdam Ictericis ( Aph. 172. I. ) detexerat non ob-  
 servari statum , hanc regulam posteritati reliquit , Ictericos non admo-  
 dum flatulentos esse . Sed si ipsam observationem Hippocratis conferamus ( H.  
 a. 739. ) satis constat , quod qui ictero tenebatur , etiam esset flatuosus . At-  
 que nos in Praxi frequentiores statum in Ictericis observavimus quam in aliis  
 morbis : & minor non frequentius observari , quum ipse icterus causam fre-  
 quentem flatuum contineat . Sæpe enim a spasmodica contractione ductu chole-  
 dochi statum . ( Conf. Aph. 183. I. ) Bilis effusio in intestina intercepta permit-  
 tit ut ingesta alimenta sponte fermentando aerem artificialem seu statum pro-  
 ducant . Icterus a calculo obstitante exitum bilis in duodenum , atque hepatis  
 scirrhusa induratio statum producit . Hinc tam frequens etiam Tympanites in  
 Ictericis . Ex quibus rationibus potius pro regula aliqua admitterem Ictericos  
 flatulentos esse .

M E D I C I N A  
H I P P O C R A T I C A,  
E X P O N È N S  
A P H O R I S M O R U M  
H I P P O C R A T I S  
L I B R U M S E X T U M .  
P R Æ F A T I O .



Ullò in Libro Interpretes magis laborarunt ad inveniendum nexum inter Aphorismos, quam in hoc Libro Sexto, quum vix duo inter se verum nexum doctrinæ habeant; ex quo intelligi potest Auctoris scopum fuisse, duntaxat colligere sententias seu regulas generales præcipuas in praxi medica, ex quibus posteri tandem potuissent concinnare systema. Hæc autem temporibus, vel simplices conscribunt Observationes medicas, vel statim se accingunt componere systema medicum, mediam hanc partem intactam relinquentes, per quam tantum in arte medica fecit Hippocrates progressum, ut omnes hodie miremur, scientiam hanc ad istud fastigium perfectionis pervenisse eo tempore, ut a posteris non nisi in theoreticis aliquod incrementum acceperit. De industria sæpe multis in morbis, quæ de iisdem Hippocrates tradidit, in aliquod systema redegi, antequam alios praticos perolvere inciperem; at miratus detexi, me ex aliis vix quidquam ad praxin medicam spectans addere potuisse, & quæ inveniebam bona, longe artæ ab Hippocrate suere observata: imò quod pejus erat, multa egregia ab Hippocrate dicta in istis auctoribus frustra quaerui. Hortor igitur & moneo Praticos, ut in posterum non amplius ita additi sint describere specialia observata, vel continuare systemata practica, sed practica, sed ut potius scientiam medicam aliis Aphorismis generalibus novis ornent, quo tandem de quovis morbo perfecta & absoluta haberi potest doctrina. Quali autem modo conscribendi sunt Aphorismi, & quomodo redigi possunt in ordinem, supra in Præfatione ad Librum secundum demonstravi.

APHOR.

## A P H O R . I .

266. **I**N diuturnis intestinorum lævitatibus ructus acidus superveniens, qui prius non fuit, signum bonum.

Ex qua  
causa Lienterix diu-  
turna.



**C**Opiosior, & frequentior alvi egestio morboſa varia nomina obtinuit ex diverſa materia eieſta, ut ſi alimenta ingeſta vix aut non mutata brevi poſt ingeſtionem eiciantur, Græcis *λιεντερία*, Latinis Lævitas inteſtinorum vocatur. Gale- nus eos vehementer increpat, qui tale nomen impoſuerunt huic morbo, quaſi intelligerent, aſperitate inteſtinorum ci- bos retineri, & coqui, quod omnino negat. Non vero vi- deo, iſtos ita increpandos eſſe, quoniam per canalem intus lævigatum tranſitus fiat prompte. Qui vero ſtatuant cum Galeno, ventriculi actionem eſſe coquere cibum, & inde hunc morbum magis pertinere ad Ven- triculum, quam Inteſtina, concepta quadam opinione ſeduſti ſunt, quum ad præparanda aſſumta alimenta plus faciant Inteſtina, quam ipſe ventriculus. Con- ſtat enim experimentis, in canali anguſtiore, & longo contentos liquores perfe- ctius elaborari, quam in cavitare ampliſſima; & certum eſt etiam copioſiore aſ- ſuſione humoris præparatorii perfectiorem fieri coctionem ſeu aſſimilationem. Hæc ſi conferantur ad Ventriculum, & Inteſtina, res ipſa conſtabit: Ventriculus enim ampliſſima cavitare complectitur ingeſta, & vix quidquam aliud agit quam ſuo calore, & humiditate aſſumta macerare; Inteſtina autem huic illucque agitando tranſeuntia, poſtquam iſtis admiſſa eſt bilis, & ſuccus pancreaticus, non ſolum eodem calore, & humiditate macerant, ſed & omnia accurate miſcant, & conqua- ſant, ſuis oſculis lacteſcunt, & forſan principis venarum meſeraicarum præpara- tum deponunt, novumque humorem vitalem ex arteriis meſeraicis recipiunt, con- tentis iterum miſcant, ut ita omne ſolubile miſceatur, præparetur, & dein au- feratur coſtum, relictis in ſua cavitare, quæ ſolvi nequeunt, poſtea eji- ciendis. Quare ventriculus tanquam commune receptaculum concipi poteſt, ne homo co- geretur perpetuo ſumere alimentum, ubi ſimul aſſumta aliquo modo macerantur: ſed Inteſtina vera ſunt præparatoria organa. Si actio illa inverſe conſideretur, optime comparari poteſt organo urinæ, ſi comparetur Ventriculus veſicæ urinariæ, & inteſtina tenuia renibus. Nemo enim adſtruet, veſicam eſſe organum ſecreto- rium, vel præparatorium urinæ, ſed receptaculum, ne homo omni tempore co- geretur reddere lotium: ita ventriculus eſt receptaculum, ne homo etiam conti- nuo cogeretur ingerere cibum. Neque hæc actio eſt ſingularis in viventibus; ob- ſervamus enim ubique naturam uti longiſſimis, & exiliſſimis canaliculis, ſi ali- quid ſit præparandum, nunquam vero cavitatibus amplioribus. Si igitur Inteſtina lævigata ſint intus muco obducſa, introitum in vaſa lactea intercipientia, cum motu aucto ſolo eo, qui ad inferiora ducit, neceſſe eſt, ut Ventriculus aſſumta alimenta protinus dimittat per pylorum in duodenum, & inteſtina propellentia recepta ſine vix aliqua inducſa mutatione deponant per alvum. Conſtant ergo cauſa eſt in Lienteria, ut adſit motus major ventriculi, & inteſtinorum ad infe- riora, cum intercepta vel minuta abſorptione per vaſa lactea, ſive hoc produca- tur a muco obſidente oſcula, ſive deficienti motu vermiculari chylum urgente in eadem oſcula. Cauſa igitur unica eſt aſſignanda, quæ talem motum producit, & ſimul inhibet abſorptionem, quæque diu durare poteſt. Hanc cauſam inveni eſſe Putredinem chronicam, quæ naſcitur ex deficienti actione vitali, qua humores ſibi veluti reliſci corrumpuntur, & partim abeunt in humorem tenuem, & par- tim



tim in tenax viscosum: quoniam omnia putrefacta in ventriculo, & intestinis hærentia stimulant has partes ad ejiendum, uti experimur, si modo putrefactum ingeritur, id enim in ventriculo hærens primo nauseam, dein vomitum creat, sed in intestina delatum alvi fluorem inducit. Igitur tenax gluten corruptum lateribus intestinorum adhærens suo speciali stimulo in intestinis, producit motum ad exonerandum disponentem, & quia simul obstinata a viscofo sunt oscula absorbentia, & tunc simul non fit ille motus vermicularis, qui requiritur ad pellendum chylum in lactea vasa, cuncta quæ tunc ingeruntur, non mutata per intestina trajiuntur, & egeruntur. Quia vero talis spontanea corruptio diu perseverare potest, & corruptum tenaciter adhærens lateribus intestinorum expelli nequit, necesse est, ut talis lienteria interdum duret per multos annos, ut in quibusdam observavi.

II. Constitit ex iis, quæ disputavimus, putredinem chronicam permanentem esse causam Lienteriæ diuturnæ, ergo ex Ruclu acido superveniente constare debet, causam hunc ruclum producentem tollere posse antecedentem putredinem. In Ruclu acido duo sunt observanda, primo ruclum fieri motu ventriculi inverso, quo truditur aer in ventriculo contentus per oesophagum; & secundo ut ille aer imprægnatus sit vapore acido. In vetusta Lienteria continuus motus erat deorsum, sed quoniam nunc fit ruclus, signum est, eum motum deorsum non ita constantem esse, sed quoque incipere sursum, hinc spes est, fieri posse, ut restitatur motus peristalticus, qui vicissim operatur sursum, & deorsum in intestinis, qualis modo agit in sua actione naturali, qua præparantur alimenta; & quia in ordinem redire incipit, signum est, causam priorem, eam propulsionem facientem, incipere minui. Hinc solus ruclus si prius non adfuit, bonum signum præbet. Sed si Ruclus fiat acidus, eo signum est melius: nam spontanea corruptiones sunt duplices, vel per putredinem in alcali corruptum, vel per fermentationem in acidum. Ex Chemicis experimentis discimus, hæc duo simul constare non posse, putredinem, & fermentationem, cum alcali, & acidum se mutuo extinguant. Si ergo signa adfunt, fieri fermentationem, certus sum putredinem cessare. Ruclus autem ille Acidus tale certum est signum, quoniam sine fermentatione tale quid in nobis nunquam generatur. Igitur ex Ruclu acido scio, eum nunc hominem, qui tamdiu laboravit putredine, num laborare acido fermentato: quæ dicuntur de Acido succo pancreatico; & ventriculi naturali, quoniam satis refutata sunt, non erit opus hoc loco repetere, sufficet accipere, quod ab omnibus physiologis experimentis fuit probatum, & acceptum, acidum ventriculi generari ex assumtis vegetantibus per fermentationem in acidum commutatis. Differentia itaque morborum nunc est proponenda, ex qua deducere debemus, acidi productionem bonum esse signum. Experimentis confirmatur, mutationem induclam per Putredinem immutabilem deinceps esse, nos nulla arte corruptam carnem ita emendare posse, ut non sit corrupta: sed acidum fermentatione natum facile est extinguere. Alcali quidem volatile in Putrefacto possumus per admissum acidum extinguere, sed pinguedinem adhærentem destructam in pinguedinem naturalem redigere non valemus: verum acidum fermentatione natum eodem modo per additum alcali extinguere possumus, vel repetita destillatione, atque etiam pinguedinem adjunctam nobis iterum bonam recuperare valemus. Unde constat, Putredinem majorem destructionem facere quam fermentationem. Hæc si applicamus ad nostrum corpus, clare patebit, actionem nostri corporis valere omne acidum fermentatione productum extinguere. Qui enim assumunt acetum, vel bibunt vinum rehenanum, modo corpora sint sana, illi nec vestigium acidi evacuant, neque invenietur remanens in corpore. Qui autem putrefactum continet, illud emendare non potest; sed reddere iterum debet, ut ab eo liberetur.

Ruclus  
acidus in  
Lienteria  
diuturna  
bonum  
signum.

344 *MEDICINA HIPPOCRATICA* *Aph 266.*  
 retur. Si ergo Ructus acidus superveniat, signum est, motum peristalticum in ordinem redire, putredinem cessare : sed laborare morbo ex acido, qui cum possit actione nostri corporis subigi, quæ causa præcedens non erat domabilis, certe tale signum est bonum. Ex istis facile decernere possumus, an succi vegetantes saponacei acidi ita sint vitandi in diuturna Lienteria; an debeamus adstringentibus talem Lienteriam compescere; an jura carniū sint danda ad majorem nutritionem, ut multi præcipiunt.

## LIB. VI. APH. II.

267 *Quibus nares natura humidiores, & genitura humidior, imperfectius sani sunt, quibus vero contraria, perfectius.*

Nares natura humidiores quid no-  
 gent.

I. Hippocratis scopus est in hoc Aphorismo ex quibusdam signis colligere magis, & minus firmam Sanitatem: requiritur itaque, ut primo pendamus signum ipsum, ex qua causa nascatur, antequam possumus ex designata causa aliquam prædictionem formare. Nares natura sunt humidiores, ergo tales esse non debent ex aliquo morbo, vel medicamento adhibito, ut in Coryza, vel permico attractio: neque illa humiditas per breve tempus durare debuit. Verum natura humidiores Nares designant, constantem esse causam eam humiditatem inferentem. Omnibus hominibus sanis interna cava narium sunt humida, sed si tanta humiditas in hoc loco proveniat, ut exstillet mucus, nares dicuntur humidiores. Hanc abundantiam muci non ita provenire ex copia majore humorum, quam ex motu debiliore in membrana pituitaria, demonstravimus (*Aph. 110. XI.*). Igitur ex naribus humidioribus scire possumus, eam membranam debilem habere motum, & quia dicitur natura humidiores nares, illa debilitas est constans non facile curanda.

Genitura humidior quid no-  
 tet.

II. Omnes fere Commentatores cum Galeno per genituram intelligunt semen virile, & inde ex ejus majore humiditate præsagium formant. Ego autem puto, genituram in hoc loco non notare semen, sed partes genitales tam virorum quam mulierum, quoniam *γυνή* æque notat partes genitales quam semen, & hoc loco agitur de naribus humidioribus, non vero de muco humidior; itaque conveniens est, ut hic quoque accipiantur partes genitales, non vero semen. Et quid quæso signum desumeretur ex semine humidior; nisi vir laboraret pollutione vel gonorrhœa, quum alias humiditatem seminis non esset licitum observare? Propterea concipiendum est, Hippocratem intellexisse humiditatem partium genitalium utriusque sexus. Quæ humiditas in his partibus eodem modo, uti in naribus, oritur ex laxitate, & deficiente motu in partibus his.

Cur nares humidiores & genitura humidior minus perfectam sanitatem indicant?

III. Etiam si quibusdam in partibus quidam sit debilior motus, quam qui potest suos humores attenuare, & discutere, inde non sequitur, ut inde homo aliquo morbo dicatur laborare, tam levis enim est hujus partis affectio, ut non mereatur morbi nomen, sed tamen non est perfecta sanitas, tam ratione signi, quam ratione causæ; sepe enim fit, ut si quadam in parte conspiciatur debiliior actio, etiam in reliquo corpore actio habeatur languidior, præprimis si duobus simul in locis talia signa inveniuntur, uti hic in partibus genitalibus, & naribus. Atque humores his in locis stagnantes, minus commoti, sensim corrupti, & minus præparati traduntur communi circulationi, ubi totam massam inficiunt humore crudo, & leviter corrupto, qui quidem actione vitali emendari potest, sed tamen inde non fruitur ille homo perfecta sanitate.

Nares & genitura

IV. Si vero partes, quæ ex natura sunt laxiores, & uliginosæ, modice siccæ inveniuntur, signum est huc confluentes humores ita attenuari, ut per insensibilem per-

perspirationem evolent, quod etiam hoc in loco notavit Galenus: nam actio validior in his partibus non solum propter majorem concitatum calorem ex hoc motu, & promptiorem expulsiorem minuit hujus partis humiditatem, verum etiam reducit per vasa abforbentia, & venosa eam humiditatem, quæ alias ibidem subsisteret. Hinc ratione signi, & causæ harum partium siccitas modica est bona, quum notet actionem valentem, & non permittit, istos humores stagnando corrumpi.

Sicciora perfectiorem sanitatem indicant.

## L I B. VI. A P H. III.

268. **I**N longis dysenteriiis apostitiæ, malum, & cum febre pejus.

I. **S**Atis constare potest ex iis, quæ diximus (Aph. 134. I.) quid proprie per Dysenteriam sit intelligendum: verum in hoc loco designantur Dysenteriz longæ seu diuturnæ. Adeoque Apostitiæ non ita damnat in initio Dysenteriz, sed si aliquandiu duraverit. Quæ differentia est notabilis, nam fieri potest, ut humor aliquis acris in intestina depositus rodendo inferat dolorem cum copiosiore dejectione, sed postquam hic humor fuerit evacuatus, sensum quoque cessat Dysenteria. Verum diuturnæ Dysenteriz denotant, scaturiginem humoris acris exhauriri non posse, vel eum humorem acrem induxisse intestinorum exulcerationem, quæ dein Dysenteriam continuare facit. Ergo solæ dysenteriz longæ per se sunt malæ, quod corpus exhauriunt, & malam latentem causam designant. In his si fiant Apostitiæ, malum. Ut intelligamus hanc prognosin, videndum, ex qua causa latente illa Apostitiæ fiat. Nostrium corpus vivens ita est creatum, ut eget nutrimento, quod restaurat deperditum inevitabili actione corporis. Deus, ut caperemus alimenta, nobis concessit sensum famis, qui nos instigare ad alimenta capiendâ, & simul Gustum, ut acciperentur cum oblectamento. Quando per morbosam aliquam causam deletur famis sensus, etiam in corpore habeatur alimenti defectus, qui naturaliter in nobis famem excitat, proprie vocatur Inappetentia; sed quando simul capiendâ alimenta aversionem pariunt, Fastidium dicitur, quod in hoc loco per Apostitiæ intelligitur. Potest enim æger esse sine desiderio capiendâ alimenta, ut si videat ea, vel comedat, dum tamen non fastidit. Quare perpendendum, quibus frequentissimis causis fastidium generetur. Experimur Fastidium fieri, si motus ventriculi fiat inversus, ut in nauseosis, vel quando aliquid putrefactum in ventriculo hæret. Si ergo aliquis fastidiosus fiat, signum est, ventriculum consentire, & putrefactum quoque in eo coherere. Dysenteria autem est dispersa, quod malum est: præterea per fastidium designatur, Dysenteriam abiisse in putredinem, quæ commutatio quoque est mala. Denique corpus per Dysenteriam ita exhaustum tunc privatur simul suo naturali nutrimento, quod amissum restaurare debet. Hoc in longis Dysenteriiis periculosum est, quarum causa est constans, ut monuimus, in incipiente autem Dysenteria spes supererat, evacuata cacochylia, appetentiam redituram, sed nunc vix ullam spem habere possumus, quum causa constans demum inducens fastidium, simul privet corpus suo naturali nutrimento, & signum sit, latius propagari morbum.

II. Plerumque Dysenteriiis adjuncta est febris, verum non semper requiritur, sæpe enim observavi Dysenteriam sine ullo indicio febris: quippe Dysenteria habet motum intestinorum perturbatum, & febris est motus vitalis cordis, & arteriarum perturbatus; quare hi duo morbi sunt duas actiones distinctas afficientes, & non semper sequitur, ut ex moru vitali depravato in febris motus intestinorum in consensum trahatur, quod interdum fit; interdum vero non. Sed si motus intestinorum turbatus sit, frequentius motus circulatorius in consensum trahitur, quod etiam in

Et cum febre pejus.

346 *MEDICINA HIPPOCRATICA* *Aph. 268.*  
 aliis motibus particularibus observatur. Si ex motu particulari, ut ex motu turbato intestinorum circulatorius motus in consensum trahitur; nisi ille motus simul valeat tollere causam, ille motus & ratione causæ, & effectus, eum morbum augeat, quod paucis videbimus. Si Dysenteria cum febre incipit, & tamen non cessat Dysenteria, signum est, febrem non valere causam Dysentericæ superare, & expellere: interim tam longa fuit facta evacuatio, ut vires vitæ per imperfectam illam crisin fuerint exhaustæ; quare vix ulla spes superest curationis. Si vero in principio non adfuerit febris, sed postea superveniat, talis febris vel accenditur per consensum ex motu perturbato intestinorum, vel ex translatione materiæ ex cavo intestinorum ad organa circulatoria. Utrumque malum est. Nam motus febrilis in organo circulatorio per consensum concitatus non compescet motum turbatum intestinorum, neque emendabit corruptos humores in intestina confluentes, verum utraque hæc potius augebit. Si humor corruptus ex intestinis, ubi est perpetua scaturigo in Dysenteria diuturna, feratur ad organa circulatoria, tunc simul tota massa sanguinis hoc putrefacto infecta citiorem interitum minabitur. Recte ergo præcipit Auctor cum febre pejus, quoniam latiore consensum, & translationem indicat, quam quæ observatur in sola Apostitia superveniente.

#### L I B. VI. A P H. IV.

269. *Ulcera circumglabra, maligna.*

Ulcera  
circumglabra,  
maligna.

I. **T**Ria in hoc Aphorismo essent perpendenda, primo qui morbus dicatur Ulcus, sed quoniam huius definitionem dedimus in Chirurgia Repurgata 1293. non erit opus reperere. Alterum est quando dicantur circumglabra; & denique cur talia dicantur maligna. Pars glabra dicitur, quæ omni inæqualitate caret, si fiat in parte pilosa, si pili cadant, & non renascantur, in aliis autem partibus si squamulæ epidermidis secedant, & quasi politam superficiem relinquunt, sed præcipue tunc habentur glabræ partes, si earum superficies obducta sit muco tenaci, ac si esset pinguedo corrupta tenax parti adherens. Hæc ultima species an sit concipienda ac si solummodo haberet in ambitu glabritiem, an vera etiam in ulceris cavitate, disputari potest, nam si ulcus ipsum & ejus margines sint glabræ, tale ulcus quoque circumglabrum dici potest. Talia nunc Ulcera pronuntiavit *maxillæ* maligna, quoniam designant, hic colligi corruptos humores, & difficilem curationem admittunt, quod quoque passim in praxi observamus. Si enim pinguedo naturalis circa partem exulceratam hærens corrumpitur, illa vel abit in ichorem tenuem, qui cuncta, quæ tangit, liquefacit, ut inde squamulæ epidermidis decendant, & pili defluant; vel abit in tenacem, & corruptum mucum, qui omnem consolidationem impedit. Quamdiu igitur manent signa corruptæ pinguedinis circa ulcus, non possumus expectare curationem. Huius autem corruptionis signum certissimum præbent Ulcera circumglabra. Moneatur ergo, quamdiu videmus Ulcera circumglabra, nos non posse expectare curationem, sed transitum in maiorem malignitatem. Hinc omni ope tentanda est emendatio, & ablatio corrupti per externa abstergentia antiseptica applicata, & per interna, quæ usus docuit summopere cohibere progressum putredinis, nam putrefactum per emunctoria eliminare non facile fieri potest.

#### L I B. VI. A P H. V.

270. **D**Olores in lateribus, & in pectoribus, & in aliis partibus, si mul non differant, considerandum.

I. Ob.

**O**bservavit Hipp. Dolores ex variis nasci causis, & varias aggredi partes, ut inde non potuerit certam prognosin, & curationem formare, dum tamen multi ex solo Dolore sine discrimine forment prognosin, & deducant curationem. Hoc etiam hodie experimur, quamprimum enim aliquis in parte quadam sentit dolorem, statim auxilium petit. Empirici quoque nihil aliud quam arcana crepantes sine ullo discrimine medicamentum vel applicant, vel exhibent. Quia vero observavit noster Auctor, nos non posse sine discrimine quemcumque lenire dolorem, monere voluit medicam artem exercentes, ut, antequam dent medicamentum, perpendant doloris differentias, exempla adducit, dolorem pectoris, & in lateribus, sed quoniam brevissimus est in Aphorismis, non fecit annumerationem, quoniam differentia fiat observanda.

II. Vix latior in tota praxi est Titulus, quam qui dolores complectitur, quum non solum variis ex causis generetur, sed etiam fere omnibus partibus sit infestus: requiritur ergo, ut propter varietatem suam multiplicem certo proponatur ordine. (1.) Maximam differentiam doloris invenio tam ratione prædictionis quam curationis, prout variis causis, & morbis producat. Ita dolores ex Inflammatione, Consensu, Catarrho, Scorbuto, & ex multis aliis causis summopere differunt: hi enim non solum lenimen exigunt, sed etiam diversa medicamenta postulant his causis appropriata. (2.) Quamvis eadem causa inferat dolorem, partes tamen diversæ mutant præfagium, & curationem, quum quædam partes affectæ ex earum necessitate ad vitam sustentandam doloris periculum augeant; & non omnium partium dolores eadem methodo curari possint. Ita habentur dolores capitis, ventris, pectoris, oculorum, & aliarum partium, natura & curatione admodum differentes. (3.) Ipsi dolores etiam specie differunt, ut mites; vehementes; fixi; vagi; frigidi; calidi; increscentes; decrecentes; constantes; & intermittentes. Hi omnes multum lucis præbent ad investigandas doloris causas: nam non quælibet causa quamlibet doloris speciem infert. Si ergo quis novit, qualis species ex cognita causa generetur, eadem doloris species, sed ex latente causa, arguit latentem & manifestam causam non multum differre. (4.) Denique varii effectus ex doloribus provenientes sunt sedulo observandi, ut inde majus, & minus malum instare cognoscamus.

Quæ do-  
loris dif-  
ferentiam  
fiat ob-  
servanda.

## L I B. VI. A P H. VI.

271. **R**enum, & vesicæ vitia in senibus difficulter sanantur.

**S**upra demonstravimus (Aph. 64. IV.) senum diuturnos morbos solere ad mortem durare; atque, (Aph. 105. V.) senes sæpe nephritide, & stranguria (Aph. 110. IV., & VI.) laborare. Ergo videndum est, qualia Renum, & Vesicæ vitia hic intelligantur, & cur illa in senibus difficulter sanantur. Noster Auctor H. a. 8:3. *Renum affectiones*, inquit, *non vidi sanatas supra quinquagesimum annum*. Frequentiora vitia Renum, & Vesicæ non habentur, quam Calculus his partibus dolorem inferens, quare per nephritidem ut plurimum intelligunt Calculum. Frequens quoque in senibus est renum, & vesicæ dolor ab humore acri, qui sæpe vocatur nephritis notha. Reliqua autem vitia, ut inflammatio, vel scirrhus, vel ulcus, minus frequentia sunt, propterea judicarem, respexisse Auctorem nostrum ad generationem Calculi, & succi viarum urinæ acrimoniam. In Pueris, & Senibus frequentior est Calculi generatio, quam in reliqua ætate, cum vires minus valentes non satis attenuent partes terrestres, & salinas, verum istas permittant condescere in Calculum. Pueri autem quoniam increscente ætate senim roborantur, has partes terrestres, & salinas ita attenuant, ut ineptæ

X x 2

fiant

348 *MEDICINA HIPPOCRATICA* *Aph. 271.*  
 fiant ad producendum Calculum, & ita sponte liberantur. Senes autem ingravescente ætate sensim magis debilitati, magis prout sunt ad Calculi generationem. Quia vero non habemus medicamina, quibus possumus hanc naturalem debilitatem prævenire, inde recte monuit Auctor, hos morbos, & dolores difficulter sanari posse in Senioribus. Neque multum valemus in corrigendo acrimoniam spontaneam, quæ ex debilitate nascitur in succo obliuente vias urinæ senum, quæ maxime convenit Raucedini, & Gravedini (*Aph. 65. V.*) quum illa sit superanda viribus vitæ validioribus, quæ in senibus resuscitari nequeunt.

L I B. VI. A P H. VII.

272. **D**olores qui in ventre sunt, elevati quidem, leviores: non elevati vero, vehementiores. »

Dolores  
elevati  
qui di-  
cantur.

I. **O**Mnes Auctores fere sequuntur expositionem Galeni, qui per *μυρία* intelligit dolores in partibus exterioribus ventris, seu qui sæviunt in partibus extra peritonæum locatis, sed per alios dolores, qui in visceribus ventris urgent. Ego vero puto, si voluisset Auctor illam doloris differentiam indicare, quod dixisset Dolores externos, & internos, tunc enim multo clarior esset sensus; ita enim solet loqui de doloribus Capitis, & Pectoris. Si allegatus sensus esset vera sententia Hippocratis, non ita ubique vera inveniretur: nam in partibus externis æque vehementes dolores oboriuntur, sed minus periculosi, quam in partibus interioribus. Imo in hepate raro tam acuti, aut vehementes sunt dolores, quam in partibus abdominis externis. Quare credo per *μυρία* tales dolores intelligi debere, qui ventris Inflammationem seu Elevationem faciunt, quando nempe per dolores intenditur venter, quasi flutibus distenderetur.

Quare  
ventris  
dolores  
elevati  
mitiores,  
non ele-  
vati, ve-  
hementio-  
res?

II Ventris nomine, quamvis multa significet (*Aph. 15. II.*) hoc loco intelligi abdomen, nemo inficias ire potest, quum cavitates reliquæ non possint ita elevari, uti abdomen. Observavit Auctor hos dolores ventris sublimes, seu elevatos mitiores; non elevatos vehementiores, quod etiam in praxi expertus sum, non solum in ventre, sed & etiam in aliis partibus. Si enim causam dolorem faciens valide agit, eo majorem dolorem infert, quo fibra magis manet retinens, quando talis pars simul non tumet, sed in sua constrictione persistit: si vero fibræ dimittant tensionem, pars ea tumere incipit, & tunc fit, doloris lenimen, quod podagrici sæpe experiuntur, non enim sævities doloris lenitur, nisi pars dolens tumeat. Hoc omnino verum est in ventris doloribus, si motu inordinato intestinorum producitur aer artificialis cujus expansio impeditur per validam fibrarum tensionem, immanis fit dolor: si vero relaxatis fibris aer permittitur expandi, statim mitescit dolor. Hinc calida, & humida, quæ fibras laxant, applicata cum ventris intumescencia leniunt dolores.

L I B. VI. A P H. VIII.

273. **H**æmorrhagicæ ulcera in corpore orta non facile sanantur.

Hydrops  
qualis  
morbus  
sit.

L. **Q**uoniam in hoc Aphorismo agit de difficultate curationis in Ulceribus, atque nullam ulceris distinctionem proponit, sed solummodo quia accidit in corpore hydropico, necesse erit hoc loco notare, quid proprie in hoc loco medici per Hydropem intelligant. Omnis collectio humoris pellucidi, aquosi, vel pituitosi copiosior, vel per totum corpus, vel in quadam parte proprie vocatur Hydrops, si illa collectio præcipue habeatur in tunica cellulosa sub cute, & in cutis

cutis substantia, Aqua inter cutem appellari solet: sed in alijs partibus si fiat collectio, specialia sæpe accipit nomina, ut Hydrocephalon, Hydrocele, Ascites, qui morbi solummodo sunt species hujus morbi generalis.

II. Ulcera in Hydropicis duobus modis generantur, vel per artem, vel sponte, utraque difficulter sanantur; sed quæ sponte veniunt, difficiliora. Si per caustica, vel vesicatoria concitentur ulcera, ad loca ea lacerata tantus fit humorum confluxus, ut in loco eo pus formari non possit, nam ut pus formetur, aliquamdiu humores in ulcus confluentes quiescere debent, donec actione vitæ convertantur in pus, sub quo recrefcit caro, & epidermis; affluxus autem perpetuus lymphæ illam quietem, & moram intercipit: neque aqua hydropica istius est naturæ, ut in pus converti possit. Quare experiuntur Chirurghi, factam aperturam difficulter consolidari posse. Si sponte generantur ulcera, adhuc difficiliorem curationem promittunt: nam si sponte oriuntur ulcera, signum est, tantam esse acrimoniam in latice hydropico, quæ valet corrodere cutem, & epidermidem: si ergo ad partem eam corrosam copiosus ejusdem humoris habetur affluxus, major est expectanda corrosio, & vix ulla consolidatio, nisi per effluxum illum simul auferatur lymphæ illa acris, quod fieri potest in particulari hydropice, qui per factam aperturam omnem suum humorem exonerat, sed si in generali Hydropice omnis lymphæ evacuanda sit per unam hanc partem corrosam, partes ambientes continua colluvie vexatæ ut plurimum moriuntur, seu sphacescunt. Hinc tutum non est in hydropice generali concitare emundiorum particulare, neque sanitatem promittit, si quis sponte acquirat in quadam parte ulcus fundens lympham: sed in particulari hydropice conducere potest. Atque observavi in Pectoris hydropice ulcera sponte, vel & vesicatoriis in cruribus facta summum attulisse levamen, & tandem perfectam sanitatem, evacuata aqua per illa ulcera: in Ascitide autem talia ulcera multum quoque liquidi plorant, sed post evacuatam laticem perierunt ægri. Ex quibus omnibus perpensis colligi potest, ulcera in corpore hydropico nata difficulter sanari, sed non semper mala dicenda esse, quum quibusdam in casibus sanitatem attulerunt.

Hydropicis ulcera in corpore orta non facile sanantur.

274. **E**fflorescentia lata, non admodum pruriginosa. LIB. VI. A.P.H. IX.

I. Multitudo morborum in cute, quia a Veteribus plerumque deducebantur a variis humoribus, sola hypothesi nitentibus, maximam confusionem peperit, nam non facile est ex conspectis in cute phænomenis determinare, qualis humor hoc, vel istud phænomenon inducit. Quare idem phænomenon promutata hypothesi varium accepit nomen. Hoc quam maxime apparet in morborum cutaneorum descriptione. Nulla mihi morborum classis majorem difficultatem peperit, quam qui morbi externe cutem afficiunt; quod patere potest ex iis, quæ in Chirurgia repurgata exhibui. Volui propterea proprium nomen græcum Exanthema (Ch. 1396.) servare, quod alias Efflorescentia, Pustula, vel Papula vocatur. Quod Exanthema debet habere colorem rubrum in ambitu limitatum, cum quadam cutis elevatione, ut distinguatur a maculis, quæ non elevant cutem; sed tamen sine tumore elato, ut differat a pustulis, & tuberculis. Talia ergo Exanthemata possunt esse lata vel parva instar stigmatis, modo aliquam in cute elevationem faciant distinctis in locis, & colorem rubrum habeant.

Exanthemata lata quæ dicantur.

II. Eundem humorem seu causam Pruritum, & dolorem inferre posse, demonstravimus (Aph. 110 X.). Ex omnibus experimentis constat, levissimam vellicationem ad nervum sentientem inferre Pruritum. Observamus præterea non sine discrimine quancumque vellicationem Pruritum generare, imo quadam levissima

Exanthemata lata, minus pruriginosa.

acria

acria applicata Pruritus compescere: quamobrem tenendum, speciale genus acrimoniae potius Pruritus producere, quam dolorem, alia autem genera dolorem sine Pruritu. Hinc Pruritus est aliquod phenomenon, quod certam speciem acrimoniae, vel rationis declarat. Hoc magni momenti est in Medicina, & Chirurgia observare; nam si Pruritus sit inseparabile phenomenon specialis acrimoniae, per phenomenon hoc observatum in morbis possumus iudicare, qualis sit latens causa. Observavit noster Auctor Exanthemata lata minus pruriginosa esse quam Exanthemata parva seu angusta: si ergo examinavimus naturam acrimoniae Pruritus excitantis, novimus quoque, quid sit agendum in latoribus, & minus latis Exanthematibus: nempe per ea applicata, vel exhibita, quae naturam specificam pruritus inducentem extinguunt.

## LIB. VI. A P H. X.

275. *C*aput laboranti, & circumcirca dolenti, pus, aut aqua, aqua sanguis effluens per nares, aut per os, aut per aures, solvit morbum.

Capitis  
doloris  
frequen-  
tissimi  
causa quae  
sit.

I. *E*X multis observationibus particularibus conatur Auctor generalem con-  
fingere Aphorismum. Detexit enim Capitis labores, & dolores, tam in par-  
tibus internis, quam externis, sponte cessare evacuatione per nares, os, & au-  
res; praeterea jam liberari effluxu sanguinis, jam puris, jam vero lymphae. Non  
debemus iudicare, quemcumque morbum Capitis sine discrimine hoc, vel illo hu-  
more effluente sanari, sed unaquaeque specialis causa suo proprio effluente humore  
solvitur: inde necesse est, antequam cum certo fundamento valemus praescrip-  
tum formare, ut perspicimus quinam morbi praecipue Capitis dolores inferant.  
Frequentissimi morbi dolorem capitis inducentes sunt Impetus sanguinis major ad  
Caput, Inflammatio meningum, atque humor tenuis acer Catarrhus. Ut mor-  
bi hi suis signis distinguantur, reliqua phaenomena hanc, vel illam causam con-  
comitantia simul sunt perpendenda, secundum datum praecceptum generale in do-  
loribus (*Apb. 270.*) Nam capitis dolor est phaenomenon, quod ex multis causis  
oriri potest, quae causa detegi nequit, nisi tot colligantur phaenomena dolori ca-  
pitis conjuncta, quae causam hanc a ceteris distinguere valent. Si impetus san-  
guinis ad caput sit major, qui dolorem infert, vasa arteriosa in partibus exter-  
nis capitis majus agitata, & impleta faciunt faciem inflatam, & rubentem, na-  
res rubent, & prurunt, caput incalcescit, & arteriarum pulsatio sentitur in tem-  
poribus, interdum etiam in collo. Atque partes arterias a carotidibus internis  
ramos accipientes motus majoris etiam indicia praebent, ita oculi protuberant,  
rubent, truces fiunt, cum effluxu lachrymarum; vident saepe scintillas; aures tin-  
niunt, & sonitum audiunt, vel obscurdefcunt; vel cerebrum agitatedum delirium,  
vel soporem inducit. Inflammationis signa non multum a praecedentibus distant,  
nisi quod dolor sit fixissimus, & constans, & ea omnia sint vehementiora. Quan-  
do haec cessare incipiunt sine bona crisi, iudicamus abiisse in purulentiam. Sed  
quando morbus fuerit chronicus, vel continuum inferens capitis dolorem, vel  
per intervalla redeuntem, sine signis istis citatis, sed cum doloribus vagis, vel  
fixis in aliis partibus corporis, qui nunquam abierunt in suppurationem, iudi-  
camus lympham acrem tenuem vellicare meninges, & ita producere dolorem.

Qui dolo-  
res capitis  
solvantur  
evacuatio-  
ne san-  
guinis,  
puris, vel

11. Tria proponuntur emunctoria, per quae humor evacuatus solutionem por-  
tendit, & tres evacuari humores recensentur: verum non est iudicandum,  
unumquodque emunctorium suum solum proprium humorem evacuare: observa-  
tione constat, Nares praecipue evacuare sanguinem, Cs lympham, & Aures pus.  
Haec tamen praedicta observatio non est ita constans, quin interdum hic ordo in-  
verta-



vertatur. Verum humoris diverſi exitus magis conſtans eſt : nam Capitis dolor ex impetu majore natus optime liberatur narium hæmorrhagia , quæ minuendo ſanguinis copiam majorem ſimul compeſcit illum majorem impetum , & inde natum dolorem. Sed circa finem morborum acutorum , ſi per metaſtaſin ad caput delata eſt materia purulenta , aut quando in interioribus capitis fuerit exulceratio capitis dolorem inferens , ſæpe obſervavi , puris evacuatione peraures homines fuiſſe liberatos , interdum etiam per os , & nares : ſed minus frequens per hæc emunctoria eliminatur pus. Humor autem ſeroſus acris capitis dolorem inferens ſine multo discrimine per tria hæc emunctoria eliminatur . Hæc eſt quotidiana experientia , & vix aliquis exercuit praxin , quin hæc evacuationes detexerit cum ægri levamine . Theoretici hæc obſervationibus non contenti , rimati ſunt encephali fabricam , invenientes omnia cranii foramina Dura matre teſta : quia non detegunt viam , ſategerunt hanc invertere prædicam obſervationem , quaſi materiæ morboſæ fieri non potuiſſet evacuatio per partem aliquam , niſi via anatomicis eſſet cognita . Verum in viventibus multa ſunt , quæ ab anatomicis in cadaveribus non poſſunt demonſtrari , præprimis ſi vis vitæ inſtigetur ab aliqua morboſa materia . Satiſ itaque exiſtimo veram obſervationem prædicam mordicus tenere , quam eam repudiare , vel denegare , quoniam nos later ſtruſtura .

aquæ , per os , nares , & aures ?

L I B. VI. A P H. XI.

276. *Melancholicis , & nephriticis hæmorrhoides ſupervenientes , bonum .*

I. Duplici ſenſu vocari homines Melancholicos , obſervavimus ( *Apb. 119. II.* ) . Nam ſi reſpicimus ad animam , triſtes , & mærentes ſine cauſa , & timentes non timenda , dicuntur Melancholici . Qui materiæ Atrabiliariam collectam gerunt in vena portarum , ſive tales animi affectiones inferat , ſive non , tamen cenſentur Melancholici . Hanc præprimis poſteriorem ſpeciem hoc in loco intelligi , conſido , quom citet evacuationem , qua illa materia evacuari poſteſt . Quamobrem vero Hæmorrhoides ſupervenientes hoc loco magis extollantur , quam quævis evacuatio alia tam ſanguinis , quam aliorum humorum , attentionem meretur : reddunt etenim melancholici urinam nigram ſine levamine , & ducitur iſtis ſanguis , vel ſponte oboritur narium hæmorrhagia cum incremento mali . Satis demonſtravimus loco citato , materiæ melancholicam venire non poſſe in ſanguinem venæ cavæ vel arteriæ aortæ , niſi tranſeat per hepar , neque per aliam viam duci poſteſt ad renes , ut urinam ſua nigredine inſiciat . Si ergo ejus aliqua portio tranſeat per hepar , ſons tamen perpetuus manet in vena portarum novam materiæ ſuppeditans . Quod ſi ex naribus fuiſt ſanguis , non magis de materia atrabiliari eliminari poſteſt , quam de reliquo ſanguine bono : unde ſæpe miratus vidi , toties tentatum fuiſſe melancholicos curare per venæ ſectiōnem . Si autem Hæmorrhoides fluunt , ille ſanguis venæ portarum evacuat , qui maxime imprægnatus eſt materia melancholica , nam hæmorrhoidales venæ ſurculi ſunt venæ portarum . Hæc quoniam valvulis caret , permittit ſenſim omnem inſectum ſanguinem hac via eliminari . Interim non tam certa fit purgatio materiæ melancholicæ a reliquo ſanguine bono , ac fieret , ſi interpoſitum eſſet organum ſeparans , quom ablata portione , & dein reſtaurato ſanguine , in eadem vena portarum , evacuando ſenſim minuitur materiæ atrabiliariæ proportionata quantitas . Hæc ſententia in exemplo clariſ ſcincipitur . Si verbi gratia aliquis contineret in vena portarum uncias duodecim ſanguinis Melancholici , & evacuaret unciam unam , duodecima portio hujus materiæ Melancholicæ evacuaretur : poſt evacuationem ſi iterum bonus ſanguis accederet , dein facta æquali evacuatione , non

Melancholicis hæmorrhoides ſupervenientes , bonum .

352 *MEDICINA HIPPOCRATICA. Aph. 276.*  
 non emitteretur duodecima portio materiæ melancholicæ. Et quo frequentior sit facta evacuatio, & restauratio, eo minor portio materiæ melancholicæ evacuetur: adeo ut tandem in una uncia evacuari sanguinis ne quidem semiuncia materiæ melancholicæ contineretur. Hæc est ratio, quod Hippocrates dixit, Bonum, non vero Solutio fit. Imo locus aptus ad producendam atram bilem inter evacuum iterum æqualem copiam ejusdem regenerare potest, quam est ea, quæ singulis vicibus emittitur.

Hæmorrhoides  
 Nephriticis  
 super-  
 venientes,  
 bonum.

II. Veteres omnes dolores lumborum, ubi renes hærent, Nephritidem vocasse ex variis locis ( *Aph. 110. VI.* ) colligi potest. Credere enim non possum, dolorem nephriticum per calculum in renibus hærentem, dolorem inferentem, hæmorrhoidum fluxu curari posse. Sed mesenterium lumbis annexum, quod multos ramos venarum portarum continet, si propter impletionem a materia melancholica vel ejus acrimonia lumbis dolorem infert, conceptu facile est, facta depletionem per venas hæmorrhoidales levamen fieri doloris. Inde etiam toties per alvi ductionem, qua depletur vena portarum, minuuntur dolores nephritici, non quod calculum auferat, sed vasa mesenterii distenta, dolorem infrentia, depleat. Mirum nemini videri potest, me mesenterii dolorem hoc loco vocare Nephritidem, locus enim tantum non distat, ut per designatum locum dolentem has duas partes semper valemus a se invicem distinguere.

## L I B. VI. A P H. XII.

277. *Hæmorrhoides curantur diuturnas, nisi una servata fuerit, periculum est, ne hydrops superveniat, aut tabes.*

An hæmorrhoides diuturnæ non omnes curantur.

I. **P**ER Hæmorrhoides hoc loco intelligi sanguinis fluxum ex venis hæmorrhoidibus, non vero has partes dolentes ( *Aph. 109. XIII* ) colligi potest ex adjunctis verbis, *nisi una servata fuerit*, nam dolentes hæmorrhoides omnes tuto curantur, neque ex curatione doloris in hoc loco aliquid mali esset expectandum: verum si cohibeatur consuetus fluxus, materia tali modo retenta morbos varios inducere potest. Hæmorrhoides diuturnæ si solummodo bonum sanguinem fuderunt, istis sanatis, corpus huic evacuationi assuetum, quæ nunc suppressa est, ad morbos disponitur. Consuetudo enim non subito mutanda ( *Aph. 76. I.* ). Hinc etiam viri hæmorrhagiis assueti, venarum sectioni, iis omissis in varios morbos labuntur. Maxime hoc observatur in menstruo sanguine suppresso, sive ex causa morbosa sive ætate ingravescente, rarum est, si inde non nascatur aliquis morbus. Quod si ex hæmorrhoidibus diuturnis effluerit sanguis vel humor morbosus, his tunc omnibus sanatis plura mala sunt expectanda, quia tunc non solum suppressa consuetudo evacuatione destruit æquilibrium, verum retentus humor sua malignitate ut plurimum periculosissimos morbos infert. Ita patere videtur, omnes hæmorrhoides diuturnas non esse sanandas: sed si permittantur, rarum esset si non generantur fistulæ aut, quæ quoque molestissimæ sunt. Ergo accipites hæremus quid sit faciendum. Si enim curo omnes, multi morbi fiunt, si non sano, generatur ani fistula: igitur media via est ineunda, nempe sensim omnes hæmorrhoides sunt sanandæ, ne subitanea inducatur mutatio. Si interim retinetur morbosa materia, illa medicamentis internis est emendanda, vel alibi in corpore foniculi sunt concitandi, qui collectam materiem evacuant: aut aliquoties est repetenda venarum sectio, vel alvi ductio, ne subitanea mutatio introducatur.

Cur ex hæmorrhoidibus diuturnis sanantur.

II. Qui humor ex Hæmorrhoidibus fluit, est sanguis purus, vel melancholicus, vel est liquor aliquis morbosus. Prout diversus illius humoris effluxus supprimitur, ita etiam varii fiunt morbi. Nemo mirabitur ex suppressa melancholia vel

vel humore morboſo retento generari morbos, ſed ſi ſanguis talis, qualis colligitur in vena portarum, hac via conſuetus evacuari retinetur, tunc dicit Auſtor, periculum eſt, ne ſuperveniat Hydrops, aut Tabes. Ergo hæc phraſis duo inculcat, nempe non ſemper fieri Hydropem vel Tabem, ſed interdum; & alterum eſt ſi talia ſuperveniant, malum præbent ſignum, quoniam dicit, periculum eſt. Etiamſi hos duos morbos citat, non tamen reliquos excludit, ſed inculcare vult, ſe cum damno ægri hos duos vidiffe morbos conſecutos. Quod mirum eſt in hoc Aphoriſmo, ex eo patet, quod citat duos morbos toto cælo ſibi oppoſitos: nam Hydrops humorum abundantiam arguit; ſed Phthiſis eſt morbus ex ſummo humorum defectu. Quomodo autem hi duo morbi ex eadem cauſa generari poſſint, paucis videbimus. Si ſanguinis evacuatio diuturna per hæmorrhoides ſupprimatur, ex abundantia humorum deſtruitur æquilibrium inter cauſas agentes, & quantitatem humorum: humores itaque minus compaſti per ſpontaneum deliquium vel abeunt in Viſcoſum vel Laticem tenuem. Quod ſi id viſcoſum colligatur in cellulis pinguedinoſis, generatur tali in corpore Hydrops. Sed ſi ex defectu virium liquati humores ſimul excluduntur per emunctoria, corpus macie conſumitur. Igitur degeneratio humorum in utroque morbo eſt eadem, ſolummodo differt evacuatio, quæ in uno morbo parcior, in altero copioſior fit. Quare duo hi morbi in ſua natura non multum differant, ſed in phænomenis apparentibus, quæ a Veteribus maxime obſervantur, multum differre videntur. Unde ſæpe obſervamus etiam in Phthiſicis, pedes fieri œdematoſos, & in Hydropicis partes tabe interdum extenuari.\*

notis per-  
ricu-  
lum eſt,  
ne fiat  
hydrops  
vel phthi-  
ſis?

## L I B. VI. A P H. XIII.

278. **A** Singultu detento, ſternutationes ſupervenientes, ſolvunt ſingultum.

**I.** **N**on dubito, quin Auſtor noſter obſervaverit, aliquem Singultu aliquandiu detentum, ab iteratis ſternutationibus accedentibus fuiſſe curatum: ſed an inde generalis regula præctica conſtaas poſſit elici, vehementer dubito, fateor me hoc in tota praxi non obſervaviſſe. Sunt enim duo morbi motus depravati, qui ex phænomeno apparente obtinere nomen. Fieri ergo poteſt, ut ſingultus naſcatur ex cauſa mobili irritante ſuperius ventriculi os, ut inde convellatur diaphragma, quæ cauſa altera actione ſternutationis depellitur; vel quod materia tenuis ab orificio ventriculi delata ad nares loco Singultus Sternutationem faciat & ita ſuperveniens ſternutatio curet Singultum. Sed & poteſt quoque Singultus eſſe ex multo ſanguinis fluxu, (Aph. 196. I.) aut Hypercatharſi, (Aph. 197. I.) vel hepate inflammato (Aph. 251. IV.) vel & aliis morbis fixis circa ventriculi oriſcium, in quibus omnibus commotio valida ſternutationis augeret morbum. Propterea ſi unus morbus ex phænomeno denominatus ab altero morbo ſuperveniente debet tolli, niſi addatur prioris morbi cauſa diſtincta, omnino incerta, & inutilis eſt obſervatio præctica.

## L I B. VI. A P H. XIV.

279. **A B** hydropem detento, ſi qua ſecundum venas in alvum fluxerit, ſolutio fit.

**I.** **A N** Hydropem generalem, vel particularem Auſtor hic intelligat, contentundum Commentatores, neque conſentunt, an intelligatur aquæ fluxus in cavum ventris, vel in inteſtina, vel etiam per veſicam. Similem fere ſententiam habet multis locis, in quibuſdam vero Leucophlegmatiam ponit; aliis etiam eva-

cuationem per urinam laudat. Denique non concipiunt, quomodo secundum Venas aqua fluere possit. Cuncta hæc subtiles sunt quæstiones, quæ nihil lucis adferunt cognitioni, aut curationi: neque multum refert, num Hippocrates aliis in locis idem vel aliquid aliud statuatur, quum tota auctoritas nostra in meris observationibus prædicis sit fundata. Nemo nescit, Hydropem esse morbum ex abundantia humoris aquosi in vasculis dilatatis, tunica cellulosa, vel in cavitatibus corporis: atque constat, nos non posse curare eum morbum, neque sponte evanescere posse sine istius humoris evacuatione visibili, quum tanta habeatur aquosi humoris copia, & tanta virium debilitas in his morbis, ut per insensibilem perspirationem eliminari nequeat. Tria nobis sunt data organa excretoria naturalia, nempe Cutis, Vesica, & Alvus: sed quoniam Cutis naturaliter transmittit rorem, & aquæ tanta abundantia eousque viribus corporis non potest attenuari, emitti ergo debet vel per Vesicam, vel Alvum. Utraque hæc via satis accommodata est ad exonerandam aquam, ingens copia enim arteriarum fertur ad intestina, & quæ adit renes, satis magna est. Sanguis itaque lymphæ dives per arterias hæc vel ad intestina vel Renes delatus si deponat copiosorem lympham, valet tandem omnem aquæ abundantiam exantlare sine ulla vasorum ruptione, quod indicare videtur, dum dicit, *secundum venas*, per quas arterias ubique sere intelligere debemus. Id autem generale observamus in hydropicorum aqua, quod sit quasi vehiculum commune, quod per omnia emunctoria eliminari potest, qualis natura non habetur in speciali urina: vel perspirabilis materiae liquore, neque in ipso pure: hoc enim rarissime cum levamine eliminatur per alvum, sed per sputum, vel urinam. Igitur si natura vergat ad Intestina vel ad Renes, hac via utraque aqua hydropica eliminari potest. Si tali in evacuatione reddatur aqua pura inodora, minime corrupta vel acris, signum est, corporis vires valere exonerare istud onus, & vasa non esse corrupta, & sic sæpe sanantur; quæ observatio etiam magni momenti est in propinato purgante vel diuretico; nam si his medicamentis in parva copia datis, magna sit evacuatio aquosi inodori cum detumescencia corporis, & virium levamine, magna spes perfectæ curationis assulget. Sed si per magnam dosim parum evacuant, vel emittitur aqua corrupta, post sufficientem evacuationem ægri moriuntur, putrescens, & corruptis visceribus ab incumbente liquore. Imo observavi, fluxu spontaneo oborto in cruribus copioso ægros fuisse liberatos a tumore hydropico, sed post sufficientem extensionem perierunt; quum excoriatio illa denotabat, aquam hydropicam suscepisse acrimoniam, quam potuit excoriationem facere, & ita simul corrodere interna viscera.

## L I B. VI. A P H. XV.

282. **A** *Diuturno alvi profluvio detento, sponte superveniens vomitus, alvi profluvium solvit.*

**I.** **N**on dubito, quin Hipp. observaverit, Vomitu superveniente diuturnam Diarrhæam fuisse sublata, sed puto tamen hanc observationem non fuisse universalem, ut possimus inde certam prognosin formare, vel hac in re imitari naturam dando vomitorium in diuturna Diarrhæa. Fieri equidem potest, ut inter ventriculi plicas aliquid corruptum viscosum hæreat, quod transeuntia alimenta insiciens generet diuturnam Diarrhæam: vel quod bilis viscosa ex vesica fellea in duodenum deposita alvi diuturnum fluxum faciat. Hæc scaturigo quædiu manet, continuare facit Diarrhæam, sed quando valida actione vomendi excutitur ex ventriculo viscosum, vel ex vesicula fellea bilis corrupta, ablata illa causa, cessabit Diarrhæa. Si vero hac vomendi actione non eliminatur ex ventriculo,

culo, & vesica fellea omne corruptum, Vomitus ille non solvet Alvi profluvium. Quod si Alvi profluvium diuturnum nascatur ex humorum colligatione per totum corpus, qui continuo deponuntur ad intestina, quod sæpe in praxi observavi, vel ex debilitate intestinorum, qua assumpta sponte permittuntur corrumpi in intestinis, vel a vitiata bile, quæ omnis ex vesica fellea evacuari nequit, vel per ductum hepaticum continuo deponitur, his omnibus in causis, & in multis aliis Vomitus si accedat, augebit morbum: minuetur quidem quantitas dejectionis, sed totus ille compositus morbus fiet gravior. Si essent signa indicantia hanc vel illam latentem causam proritare Diarrhæam diuturnam, aliquid certi ex superveniente Vomitu hauriri posset, sed quoniam hæc signa admodum sunt ambigua, nihil certi ex Vomitu superveniente deduci potest.

L I B. VI. A P H. XVI.

281. **A** Pleuritis, aut a peripneumonia detento diarrhæa superveniens, malum.

1. **Q**uales morbi dicantur Pleuritis, & Peripneumonia, ex antecedentibus (Apb. 109. IV. & V.) peti potest, iis si detineatur æger, id est si hoc vel illo morbo aliquamdiu laboraverit, & dein corripiatur Diarrhæa, ille fluxus malum portendit. Observavi in praxi, a Diarrhæa superveniente sputum in pleuriticis & peripneumonicis præstantissimam evacuationem supprimi, & corpus summopere debilitari. Paradoxum autem quibusdam videtur, per alvi dejectionem copiosiores fieri non posse criticam evacuationem in pleuriticis, & peripneumonicis, cum sit amplissimum emuntorium, per quod in capitis morbis toties observatur fieri levamen, & multi medici ex dato purgante in principio horum morborum egregium quoque levamen percipiunt. Meretur igitur, ut hæc evacuatio in dictis morbis penitus perspicuiatur. Constans est observatio, quodcumque organum secretorium, & excretorium suum proprium humorem secernere a communi massa sanguinea, ita Renes omnium optime purulentiam ex communi massa auferunt, & cum reliqua urina emittunt; Intestina autem materiem biliosam, & melancholicam: putrefactum vero, & aquosum omnia emundioria. Vicissim conari evacuationem non procedit: nam etiamsi urina subnigra denotet evacuationem melancholicæ, & fulva aut flava exitum bilis, nisi his morbis fiat alvi evacuatio, nunquam perfecte curantur, sed evacuationes hæc sunt symptomaticæ. Ita etiam puris evacuatio per alvum, si pus non sit formatum in intestinis, nunquam liberat hominem a morbo suppuratorio, quum intestina non sint organa, quæ valent purulentum separare a tota massa. Si igitur fiat Diarrhæa in Peripneumonia, & Pleuritide inflammatoria, quæ abierunt in suppurationem, quod indicatur his verbis *Pleuritide vel Peripneumonia detento*, signum igitur est, hac via non evacuari pus, sed humorem alium, aliter enim dixisset Auctor alvi ejectionem purulentam. Inde colligendum est, morbos istos inflammatorios non abesse in purulentiam bonam, sed in puritraginem malam, quæ materia facile potest per intestina eliminari. Quia vero a pectore ad intestina non habetur via particularis, sed puritrago prius est tradenda communi massæ circulatoriæ, antequam ad intestina veniat, concludere possumus, malam fuisse factam commutationem morbi inflammatorii, & materiem corruptam toti massæ esse traditam, a qua difficulter separari potest per intestina tanquam organum excretorium. Dein etiam ex constanti lege comperimus, unam evacuationem impedire alteram, unde alvus fluens non solum dicta mala indicat, verum etiam facit spuci suppressionem, sine quo peripneumonia, & pleuritis non curatur, unde ex materia in pulmonibus collecta generatur difficultas spirandi, cum summo ægri periculo. Ex quibus observatio ni-

II. Omnia Vesicæ vulnera non esse lethalia, comprobatur calculi sectio, qui educi nequit, nisi plaga facta in vesicæ collo; & post altam dictam operationem Lithotomiz in vesicæ fundo incisio fuit facta, post quam operationem nonnulli fuere sanati. Ruyschius etiam observavit Vesicæ vulnus sanatum. Non tamen sentiendum est, omnia Vesicæ vulnera non esse lethalia: nam si ejus magna quædam arteria sit abscissa, quoniam medicamentum, vel instrumentum adhiberi nequit, ut compescatur hæmorrhagia, inevitabilem mortem intulit: atque vulnera satis lata ita in Vesicæ fundo, ut omnis in vesica colligenda urina effundatur in ventris cavitatem, quæ ibidem sensim majore copia collecta, & acrior denique facta, comprimendo, & corrumpendo viscera abdominalia, mortem inferunt; parva autem punctura hoc in loco vesicæ, quæ se contrahit, sanata fuit.

III. Multum differt in assignanda lethalitate vulneris, siue dixerim Cerebri, vel *enkephali* vulnera, ut habetur in textu, nam per Cerebrum eam solam partem intelligunt Medici in encephalo, quæ in ejus parte anteriore continetur, dura & pia matre testam, unde nervi motus animalis, sensuum suam originem habent: hac in parte levissima vulnera non attulerunt semper mortem: quæ vero profundiora fuere, absciderunt aliquod vas cruentum, vel læserunt medullam oblongatam, vel cerebellum, illa omnia nulla arte curari potuere. Antequam ergo pronunciare possumus, nam vulnus Encephali sit lethale, scire prius oportet, quænam pars in Encephalo fuerit læsa. Multi putant, omnia vulnera Dura matris lethalia esse, verum experientia probatur, talia vulnera sæpe fuisse sanata. Nam si sanguis dura matre tectus invenitur post trepanationem cranii, non dubitant Chirurgi pertundere Duram matrem, ut evacuent sanguinem, & ita sanantur hominem læsione Encephali laborantem. Sæpe etiam Cerebri sanguis, qui sine Dura matris læsione fieri non potuit, curatur, sublata satis magna portione Cerebri. Nimis latam autem conclusionem facere non debemus de his fangis, quasi satis magna portio Medullæ cerebri simul tolleretur, cum arteriæ in cerebri cortice sustentaculo privatæ, in satis magnam molem excrescant, ex cujus ablatione non sequitur simul ablatio medullæ; neque fibræ medullosæ istius portionis privantur sanguine circulante, quum arteriæ corticis cerebri tam frequentes faciant anastomoses, ut etiam si quædam portio tollatur, per alias tamen arterias anastomoses facientes suppeditetur sanguis.

IV. Cor consistere fibris muscularibus in gyrum decurrentibus, nullus est qui nescit, istud quoque intus habere duas cavitates, quas ventriculos nominant, dextrum scilicet, & sinistrum, quibus recipit sanguinem, & dein eum extrudit magna vi, dexter nempè ducit in arteriam pulmonalem, & sinister in aortam. Olim hoc in corde locarunt fontem Calidi innati, quod exstingueretur vulnerato corde, unde ejus vulnera lethalia erant. Hodie vero tribuunt Cordi totam actionem circulatoriam, sine qua etiam vivere nequit animal, & propterea ejus etiam vulnera absolute pronunciantur lethalia. Obstupescit tamen hærent, si observant in Cadaveribus reliquam cicatricem vulneris consolidati in homine, qui satis diu post acceptum istud vulnus vixit. In aliis detexerunt, post vulnus acceptum, quod penetravit cor, locutos fuisse, & per aliquod tempus vixisse: & quod caput superat, rana exento corde saltat, & natat, atque partes infeliorum dissectæ diu viventes manent toto corpore privatæ. Quibus adductis experimentis multi hæsitant, num Cor sit in nobis organum tam necessarium, ut sine eo nemo vivere potuisset. Si autem rem ipsam perpendamus, luce meridiana clarius constabit, nos vivere non posse sine motore illo generali, nobis enim unicum Cor est datum, unde inchoamentum totius circumductionis sanguinis, istud enim non solum dat impetum sanguini circulanti, verum etiam suppeditat arteriæ aortæ sanguinem, qui ducendus est ad omnia organa, ut his suum præbeat requisitum humo-

Vesica  
perforata.Cerebri  
vulnera.Cor  
vulnera.

humorem, sine quo functio nulla fit. Sed præterea in arteriis est motus aliquis vitalis, qui receptum a corde sanguinem ulterius propellit, ad quam circulationem continuandam Cor solum est impositum. Si ergo Cor ita læditur, ut ejus extinguatur motus, veluti in abscissione nervorum cardiacorum, Corde non amplius suppeditante aortæ sanguinem, necessario sequitur mors, sed non statim, dum Cor agere cessat, sed quando arteriæ illæ suo motu vitali suppeditarunt omnem suum sanguinem, nihil amplius ex corde recipientes. Hoc etiam fieri potest abscissa arteria coronaria, quo intercipitur sanguinis circulatio per cordis substantiam, quum experimentis constet, nullum musculus operari, cui negatus est influxus sanguinis per suam arteriam. Quia vero talia vulnera nullum admittunt auxilium, & mortem semper inferunt, lethalia absolute sunt pronuncianda, etiamsi vulneratus per aliquod tempus maneat superstes. Experimenta Insectorum hanc observationem dubiam non faciunt, quum non sit necesse in his, ut unicuique generalem habeant motorem: atque illa longo tempore facere possunt omni motu privata, & postea reviviscere, quod nobis non est concessum. Alterum genus vulnerum facere potest ex cavis cordis tantam sanguinis effusionem, ut homo talis sanguinis defectu pereat; si autem sensim introducatur sanguinis defectus, mirabile est observatu hominem vivere posse tunc cum exigua sanguinis copia in arteriis, & venis, sed si subito auferatur, quia vasa se tam subito contrahere nequeunt, vel moripatur tunc defectu sanguinis, qui non amplius propellitur, vel a sanguine effuso ita opprimuntur partes, ut eorum actio omnino extinguatur. Talia quoque vulnera absolute sunt lethalia, si vos cito sive tarde veniat. Denique Cordis levissima vulnera num sint lethalia, vehementer disputant, quum inveniantur cicatrices in corde relicte. Si Cor potuisset quiescere, ut reliqui musculi motus animalis, vulnus non penetrans in ejus cava, facile consolidari potuisset, quum sit pars carnosa, uti reliqui musculi: sed propter perpetuum suum motum non nisi raro permittit consolidationem, unde fere semper post longas miseras mors obrepit. Quum vero nemo potuit apta medicamina huic vulneri adhibere, si æger post tale acceptum vulnus, etiam post longum tempus, moriatur, istud fuit vulnus absolute lethale. Hoc solum præstare possumus in tali vulnerato, ut minuamus circulationem tantum, quantum fieri potest manente vita, ut ita concedatur hujus partis consolidatio.

Septi  
transversi  
vulnera.

V. Quid sit Diaphragma seu septum transversum, satis ex Anatomicis constat: ex quibus dicimus, Diaphragma istud esse sepimentum, quod thoracis cavitatem a ventre inferiore distinguit, istud circumquaque nexum esse extremitatibus costarum, vertebrae præprimis lumborum, & parti inferiori ossis sterni; habere figuram convexam versus pectoris cavitatem; in hujus medio habetur locus tenuior tendineus, qui deorsum trahitur, & complanatur; si fibrae carnosae hujus Diaphragmatis operantur. Constrictione musculorum abdominalium viscera in dicta cavitate contenta satis valide urgentur ad internam hujus convexam superficiem. Vulnera hujus partis ponuntur lethalia. Sed debemus maximam differentiam ponere, quænam pars in Diaphragmate sit læsa, & insuper non solum diaphragma, vel & adjacentia vasa & viscera, quod frequentissime fit: denique a Diaphragmatis vulneribus homines diu manserunt superstites, qui tamen postea post multas miseras passas moriebantur. Si pars carnosa in ambitu Diaphragmatis lædatur, & vulnus non admodum fuit magnum, tale vulnus non semper attulit mortem; sed coaluit cum visceribus adjacentibus: illa autem consolidatio difficilior fit, & tardior, quam in reliqua carne propter motum perpetuum respirationis. Si vero simul alia visa, vel viscera fuerint læsa, incertum est, num Diaphragmatis, vel reliquarum partium vulnus mortem intulerit. Sed vulnera penetrantia, præprimis in ejus parte tendinea, si parva sint, lævata, sed tamen certissi-

mam

nam mortem inferunt: pars enim illa tendinea tensione Diaphragmatis sensim magis debiscet, & si ad locum illum hæreat ventriculus, aut intestinum colon, hæ partes membranose contractione muscutorum abdominalium continuo pressæ, per dictam aperturam sensim formant speciem herniæ, quæ prominet in cavum pectoris: illa hernia sensim increfcens ita implet pectoris cavitatem, ut pro pulmonibus, & corde non satis magnum spatium relinquatur: unde tandem ægri sine ullo auxilio pereunt. Talia fuisse facta, testantur diffeciones anatomicæ in cadaveribus, in quibus invenerunt ventriculum, vel colon totum pectus fere implens. Quidam ex his ultra annum post insiliens vulnus tandem perierunt post intolerabilem cardiacam, vel colicum dolorem.

VI. Intestinelorum tenuium non solum, verum etiam crassorum vulnera lethalia esse possunt, & interdum curantur, quare ita absolute lethalia pronounciari non possunt. Quoties enim intestinum aliquod ita est læsum, ut sua contenta ejiciat in ventris cavitatem, & læsum intestinum se ita subducatur, ut cum abdominis integumentis confui non possit, & cum iis consolidari, ut e corpore deponat sua contenta, omnia talia vulnera etiam si lentam mortem inferant, sunt tamen lethalia: excrementa enim in cavum ventris effusa, cuncta viscera corruptentia, tandem mortem inferunt. Si vero vulnus sit parvum, quod se contrahere potest, vel & partibus adjacentibus accrescere, talis vulneratus servatus fuit. Si intestinum tenue autem abscessum sit prope pylorum, quo vulnere interceptur chyli absorptio, etiam si contenta intestinelorum ejicerentur extra corpus, tale tamen vulnus inferret mortem post lentam extenuationem, propter chyli ingredientis defectum.

VII. Ventriculi vulnera ratione periculi multum differunt, nam exigua vulnera, quæ ventriculo vacuo, & contracto clauduntur, consolidari possunt, si modo caveamus, ne ventriculus nimis impleatur, & ne alimenta duriora ingerantur. Latiora autem, quæ fundunt recepta sua alimenta in abdominis cavitatem, lentam mortem inferunt, partim defectu alimenti in toto corpore, partium effuso humore in ventris cavo, vel comprimente viscera, vel ea corruptente recepta putredine. Interdum vero accidit, ut docuerunt observationes chirurgicæ, talia latiora vulnera fuisse consolidata cum abdominis integumentis, emittentia recepta alimenta per apertum vulnus. Quandoque vero perfoctis ventriculi vasis majoribus ægri brevi tempore perierunt sanguinis defectu, qui ergo ex ventriculi vulnere brevi tempore moriuntur, ii magis ex sanguinis effusione, quam chyli, vel alimenti defectu pereunt.

VIII. Hepatis magna vulnera percidentia ramos venæ portarum magnos, brevi tempore interficiunt effuso sanguine ex hac vena in ventris cavitatem, & dein post animi deliquium extinguuntur; alia autem minora, quæ simul lædunt ductum choledochum, inferre solent anxietatem, punctionem, quæ ad jugulum, & scapulas extenditur, vomitum, & dejectionem biliosam, accenditur dein febris cum actu ingenti, post quam moriuntur: unde discimus, hepatis affectiones interdum usque ad jugulum extendi, qui dolor perperam pro pleuritide habetur. Vulnera autem exigua non raro consolidantur, observavi enim, magnam copiam humoris corrupti per aperturam in integumentis abdominis fuisse evacuatam, & hominem perfecte curatum fuisse benignitate naturæ.

## L I B. VI. A P H. XIX.

284. **U**bi diffectum fuerit os, aut cartilago, aut nervus, aut genæ pars tenuis, aut præputium, neque augetur, neque coalescit.

I. **I**nter plantas, & corpus nostrum illa maxima observatur differentia, quod ramos arboris amputatus renascitur, arbor ex suo trunco novos emittit ramos, Quæ partes diffecit, nec



que au-  
gentur  
neque  
coales-  
cent?

mos, nostrum autem corpus si privatur quadam parte, non regenerat novam, si excipiamus pilos, & ungues: ideoque in nobis, & aliis animalibus perfectis constantem hanc legem observamus, partem aliquam mutilatam non regenerari. Ergo non est opus, ut solummodo annumeremus partes a Veteribus spermaticas dictas: si autem portio media ex carne fuerit ablata, regenerabitur, & quali modo, infra videbimus. Per Coalescentiam intelligunt, si duæ partes separatæ sibi mutuo junctæ inter se ita conrescunt, ut verus sine glutine fiat nexus. Hanc non adstruunt sententiam ex vera observatione practica, sed ex quadam opinione theoretica, partes scilicet ex semine natas, quales citantur in hoc Aphorismo, amplius increfcere non posse, vel coalescere, quia deficit materia seminalis: partes autem sanguineas putant augeri, & minui posse, quia sanguis etiam post natiuitatem augetur. Qui autem perspectam habent subtiliorem anatomiam, bene sciunt, inter fabricam membranarum, & carnis nullam esse differentiam, nam eloto omni sanguine ex parte carnosâ, pars residua mera pars nervosa apparet: & vicissim fortiter vasîs arteriosis lymphaticis membranæ impletis, membrana videtur rubra caro: quod etiam sæpissime in morbis occurrit: tunica enim oculi adnata si ophthalmia sit affecta, ita rubet, ut vera caro videatur. Quod autem sit sentiendum de partibus specialibus in Aphorismo citatis, paucis videbimus.

An os  
diffectum  
neque au-  
getur ne-  
que coa-  
lescit.

II. Miror sane Galenum, virum longo usu practico exercitatum, hanc sententiam adscripturam, contententem partes ossis fractas postea consolidatas vero nexu non concrefcere, sed per callum circumnatum conferminari, dum hodierna observatio chirurgica constans sit, ita junctâ ossa vero nexu conferminari, & quidem tam firme, ut si os bene consolidatum sit, eo in loco firmiorem habeat nexum, quam in partibus nondum ruptis. Neque latere potest ossium incrementum, si quædam pars media fuerit ablata: observationes chirurgicæ multæ existant, in quibus satis notabilis portio ossis fuerit ablata, qui locus dein vero osse fuerit impletus. Portio quoque cranii fuit ablata, & locus dein primo membranosâ substantiâ, dein cartilaginea, ultimo ossæ fuit impleta. Quare non possumus diutius dubitare quin ossa in loco recto, modo extremitates eorum maneannt viventes, possint post natiuitatem ulterius increfcere, & consolidari.

An Car-  
tilago?

III. Tria genera partium in corpore nostro inveniuntur. Durissima sunt Ossa, quæ neque flectuntur neque accurtantur, ut reliquis partibus præbeant firmam sustentacula, & munimenta; alterutrum genus, quod permittit flexuram, & extensionem, & adductionem, & quod extensum se ipsum accurtat, se accommodat extensioni, & flexuræ variæ sine integra separatione, ut est caro, membrana, vas: denique tertium genus est, quod permittit flexuram sine ruptione, sed sibi commissum se non accurtat, sed loca, quæ munit, magis expandit, illa pars proprie vocatur Cartilago; in qua id speciale detegimus quod, si flectatur, vel per causam aliquam externam, vel per actionem muscularem, quamprimum sit sublata causa flectens, se iterum expandat. Harum ergo partium usus est egregius in locis, ubi canales debent manere aperti, & tamen contractiles, quod neque ab osse, neque a membrana fieri potuisset, uti in organis respiratoriis. Præter hæc ut reliquæ omnes pari modo cum corporis mole increfcunt, & augentur, quare idem de Cartilagine sentiendum, quod antea observavimus de ossibus. Aliquis tamen inferre posset, si cartilagine narium fuerint abscissæ, istas non regenerari, rehero autem, quod si hoc experimentum probat, cartilaginem non consolidari, vel augeri tunc nulla pars est in corpore nostro præter ungues, & pilos, quæ regeneratur, & tunc una pars præ alia non erit excipienda: nam si membrum aliquod fuerit amputatum, nulla pars in trunco remanente magis excrefcit, sed omnes accuratæ manent.

An ner-  
vus.

IV. Latior Veterum quam Hodiernorum est Nervi significatio: nos enim per Nervum duntaxat intelligimus eam partem organicam, quæ ex medulla oblon-

gata

gata cerebri, & medulla spinali oritur, distributa per omnia puncta corporis, ut functionem sensus, & motus faciat, siue illa functio concipiatur fieri a fluentibus per istos spiritibus, an vero a fibris suis, hoc in loco non est inquirendum. Veteres autem non solam hanc partem Nervi significatione intellexerunt, verum etiam membranas, fibras, ligamenta, tendines, adeoque omnes partes tenaces, flexiles, & albicantes nomine nervi complexi sunt. Inde quando dicit Auctor, Nervus dissectus neque augetur neque coalescit, intelligit omnes has partes. Omnes hæ partes admodum tensæ sunt, si modo separentur, quam maximus fit hiatus inter istas, propterea non facile uriri possunt Experimenta Chirurgica in his sunt consulenda; de membranis id accipi potest, quod superius in vesica, & intestinis notavimus. De Tendine observatum fuit, Tendines confutos coaluisse. De Nervis ipsis, non novi unquam abscissum Nervum coaluisse, sed partem inferiorem semper factam fuisse inutilem, scilicet amississe sensum, & motum..

V. Genas constare epidermide, cute, tunica cellulosa, & musculis, ut quævis partes nostri corporis, res ita cognita est anatomicis, ut nemo inficias ire possit. Genam autem percissam neque augeri, neque coalescere, observationibus chirurgicis est adstruendum, vel refutandum. Faciei vulnera futuris colligata brevi tempore ita consolidantur, uti in aliis partibus corporis: si quis dubitat, perpendat modo, qualisnam sit curatio Labii leporini, quæ naturalis separatio arte ita curari potest, ut post consolidationem parva duntaxat relinquatur cicatrix. Quia vero inter curationem vulneris faciei, & aliarum partium in consolidando nullam invenio differentiam, hanc partem ab aliis non exciperem, nisi quod in curandis vulneribus faciei, quia visui patent, majori cura studendum est pulchritudini cicatricis, quam in partibus reliquis.

VI. Quod statim monuimus de consolidatione labiorum oris, idem quoque sentiendum de præputio, quo naturaliter tegitur glans penis, eo enim percisso, & dein confuto coalesceret: quia vero in circumcissione non requiritur consolidatio, sed ut præputium abscissum relinquat glandem nudam, inferri inde non potest, eam partem consolidari non posse.

285. *SI in ventrem sanguis effusus fuerit præter naturam, necesse est suppurari.*

I. **I**lla morboſa mutatio, qua humores convertuntur actione vitæ in materiem albam, ponderosam, subpinguem, consistentem, vocatur Suppuratio. Quoties enim deest in morboſo illo humore color albus, vel vocatur Ichor, vel materia lenta, corrupta, glutinosa, & nunquam puris nomine venit, vel dicitur Pus corruptum. Si humor morboſus natus levior sit aqua, ut supernatet, etiamſi omnes præterea notiones puris præbeat, non tamen nomine puris venit, sed vel mucus, vel pituita, aut phlegma vocatur; interdum lac ex mammis suppuratis stilans vix a pure distingui potest, nisi quod minus sit cohzrens, & specificè levius. Pituitosi humores intime misceri possunt aq̄osis. Pus autem subpingue magis reuuit miscellam. Denique nisi illa materia habeat consistentiam mellis, bonum non est pus, etiamſi ex pure fit formata, sed ad Ichorem convertitur, qui minus salubris est ulceribus, & abscessibus. Talem materiem-purulentam generari sola actione vitæ, & ex humore gelatinoso bono, vel prius commutato in lentorem supra (Apb. 72.) demonstravimus.

II. Sanguinem manere sanum, & fluorem conservare in arteriis, venis, cavis cordis, & quibusdam cavernis, & thalamis, id soli circulationi vitali est tribuendum, iisdem enim in locis stagnans primo concreſcit, & si maneat in calore,

An Genæ pars ten-  
guis?

An præ-  
putium?

Suppuratio quid  
sit.

An san-  
guis in  
cavitati-  
bus effu-  
sus

semper  
suppuratur?

362

MEDICINA HIPPOCRATICA Aph. 285.

ut est calor nostri corporis, sensim superveniente spontanea putredine resolvitur in liquamen foetens acre: hoc etiam verum est de sanguine retento in quodam vase clauso, si foveatur simili calore per aliquod tempus. Itaque sanguis ex propria sua natura, si sibi relinquitur, nunquam transit in pus, sed, si adjunctam retineat humiditatem, convertitur in putrilaginem: si autem parte tenuiore interim privetur, compingitur in massam quasi solidam, & nigram. Ex quibus colligitur, Puris sectionem ex sanguine non esse mutationem sanguinis spontaneam, sed esse liquorem productum per actionem vitæ. Si ergo effusus sanguis hæreat præter naturam in cavo ventris, pectoris, vel capitis, aut alicubi in cavitatibus vi morbi factis, uti in parte confusa per propriam mutationem in istis locis non potest commutari in pus, sed in ichorem. Hoc etiam experimur, si vulneratus effusus habet sanguinem in quadam corporis cavitare, nunquam observaverunt Chirurgi, istum sanguinem abiisse in purulentiam, sed semper in humorem corruptum. Quod autem in parte inflammata sanguis abeat in Pus, illa commutatio non fuit facta, postquam fuerit sanguis effusus in eo tumore, sed dum adhuc hærebat in vasculis minimis magis dilatatis, & actione vitæ validissime agitatis, quo formato dein Pure vascula disrumpuntur, & colligitur Pus in cavitare vi morbi facta. Contrarium autem videtur fieri in pulmonibus post hæmoptysin, quæ dein generat puris sputum. Hæc autem observatio non docet, nec evincit, sanguinem in vesiculis pulmonalibus restantem abiisse in pus; sed quia sanguis ibidem stagnando corruptus, ut & vasculum disruptum, formant in eo loco pulmonis vomitum purulentam teclam, qua dein rupta exspuitur pus. Neque magis adstrui potest sanguinis degeneratio in Pus in parte quadam confusa, nam vascula in loco confuso lacerata formant eo in loco ulcus teclum, quod Pus suppeditat. Ex his rationibus adductis consentirem Galeno, vocabulo suppurationis hoc in loco potius accipiendum esse omnem spontaneam sanguinis corruptionem.

L I B. VI. A P H. XXI.

286. **I**nſanientibus, si varices, aut hæmorrhoides supervenerint, insanie solutio fit.

Quæ Insan-  
iæ species  
solvitur  
varicibus  
aut hæ-  
morrhoi-  
dibus?

**I**. Varias esse Delirii species, exposuimus in particulari libro, quare non opus ea repetere. Galenus atque alii Commentatores hoc loco existimant, intelligi debere Melancholiam, quoniam supra (Aph. 276.) Auctor dixerat, Melancholicis hæmorrhoides supervenientes, bonum. Verum hos duos morbos omnino distinguit Hippocrates (Aph. 99. II.) Quare credere non possum, perspicacissimum, & in arte medica exercitatissimum virum Auctorem nostrum posuisse unum morbum pro alio, sed hoc in loco intellexisse eam Delirii speciem, quam Maniam vocant, minime vero Melancholiam. Neque responderet observationibus prædictis, quia melancholia non solvitur Varicibus, sed Hæmorrhoidibus: quia levatur sanguine fluente ex vena portarum, non vero ex vera cava, in ejus ramis nascuntur Varices. Quales autem Varices, & Hæmorrhoides hoc loco intelligit, an clausas, vel apertas, facile est hariolari. Si enim homo ex sanguinis abundantia, & impetu majore ad caput adigatur in Insaniam seu Maniam, multum conferret, si sanguis flueret ex aliqua vena, tam ex vena portarum, quam ex vena cava: sed illæ intumescentiæ venarum, quæ varices, & hæmorrhoides etiam vocantur, parum conferre potuissent ad detrahendam tantam sanguinis copiam, quæ sufficeret ad minuendam totius quantitatem, vel impetum. Sed si fluant eodem modo, ut iterata venæ sectio, ita valent sistere impetum, & derivationem majorem ad caput, ut non amplius ex hac causa turbari possit æqualis motus cerebri, qui Insaniam hujus est causa. Quotiescunque igitur coniceretur possu-

possumus, Infaniam fieri majore impetu ad caput, nihil præstantius erit, quam fecare venam in pedibus, ut non tantum minuiatur impetus, verum etiam ut fiat derivatio a capite ad partes inferiores.

## L I B. VI. A P H. XXII.

287. **Q**ue ruptiones ex dorso ad cubitum descendunt, venæ sectio solvit.

I. **V**ENÆ sectionem in validioribus contusionibus summopere prevenire doloris incrementum, & instantem suppurationem, res est notissima, quoniam sanguinis illa evacuatione minuitur nimis impetus ad partem contusam, si ergo in hoc loco intelligatur quædam species contusionis vel divulsionis, quod permittit significatio *πρὸς ἄνω*, res esset plana; Sed de hujus ambigua significatione admodum disputant Commentatores, & ipse Galenus contendit, Ruptiones descendere non posse ex dorso ad cubitum, propterea maluit hoc loco intelligere Dolores. Pace tantorum virorum ego tamen puto, Rptionis significationem servari posse, & honum servari hujus Aphorismi sensum. Quotiescunque enim per causam aliquam distendentem solvit vel membrana, vel fibra, vel caro musculo-fa, pars etiam talis rupta dicitur. Si igitur in palestra vehementi conatu membrorum quædam fibræ musculi vel tendinis in dorso fuerint ita ruptæ, ut Dolor hujus læsionis usque ad cubitum protendatur, signum est, Dolorem per consensum etiam partes remotiores afficere: ut nunc illa doloris propagatio minuiatur, qui ex Ruptione fuit natus, admodum conducit sanguinem mittere, quo compescitur motus ex consensu talis productus. Qualis vena autem sit aperienda, non indicat Auctor, sed quia ad motum majorem compescendum optimum est proximæ venas aperire, ut ita eo in loco maxima fieret depletio, non inconveniens videtur, venam istius cubiti esse aperiendam, ad quem dolor descensum fecit. Si vero esset humor tenuis, & acer, qui ex dorso descendit ad cubitum, uti in morbis catarrhosis, minus conducere arbitror venæ sectionem, quamvis Commentatores in ea sint sententia, tunc venæ sectione educi humorem acrem, quum humor acris non latitet in sanguine arterioso, qui rediturus est per ejusdem brachii venam, verum potius in succo nervoso, qui humor non facile evacuari potest sanguine evacuato ex aliqua vena.

Quomodo  
solvit ve-  
næ sectio  
ruptiones,  
quæ ex  
dorso ad  
cubitum  
descen-  
dunt?

## L I B. VI. A P H. XXIII.

288. **S**i metus, & tristitia multo tempore perseverant, melancholicum id ipsum.

I. **A**N hoc loco per Melancholiam sit intelligenda illa animi affectio, quam Melancholiam vocare solemus, an vero materia ipsa Atrabiliaria, non consentiunt Commentatores (vid. Aph. 99. II. & Aph. 109. II.) Hujus dictionis est ambigua significatio: nam qui metuunt vel tristes sunt longo tempore ex aliqua evidenti causa, tandem veri fiunt melancholici, id est pertinaciter cum tristitia delirantes. Hinc Metus, & Tristitia multo tempore perseverantia Melancholicum est, id est melancholiam inferunt; sic solent medici sæpe exprimere causas morbum aliquem inferentes. Itidem Melancholicum est, quando Metus, & Tristitia diu durant sine manifesta causa, hæc tunc animi pathemata declarant, materiem melancholicam esse in corpore. Quomodo autem Tristitia & Metus inferant materiem melancholicam, & quomodo materia melancholica inferat vicissim Tristitiam, & Metum, paucis videbimus. Inter animi pathemata, & motum particularem venæ portarum, atque motum organi chylopoietici maximum

consensum detegimus, quoniam sæpe observavi, ex oborto timore vel tristitia vel terrore intestina, & ventriculum ita inordinate moveri, ut venter distenderetur flatibus, concitaretur præcordiorum anxietas, colicus dolor, vomitus, & diarrhoea interdum bilis æruginosæ, ipso momento vigens appetentia convertebatur in fastidium, & multa similia signa indicantia turbatum motum peristalticum, quæ symptomata toties exacerbabantur, quoties novum tale ingruerat animi pathema: quare dubitare non possumus, quin motus vermicularis se accomodet animi pathematibus. Illa igitur pathemata, quæ motum minorem faciunt spirituum, ut Metus, & Tristitia, diu perdurantia tandem etiam faciunt, ut in vena portarum sanguis minus propulsus integre fere subsistat, atque ita stagnando producat materiem melancholicam, quæ nata ipsam animæ melancholiam inferat; adeo ut illi, qui antea externam causam erant timentes, & tristes, denique sine causa ea, sed ex nata mala dispositione in corpore, maneant melancholici. Quomodo autem ex materia Atrabiliaria sanguini circulanti tradita animæ melancholia formetur, non nisi per analogiam probari potest, quum inveniamus, Opio animam sopiri in his regionibus; Daturam inferre Delirium speciale; spirituosam inducere Ebrietatem; morsum canis rabidi inferre aquæ timorem: quæ omnia sunt mera observata specialis mutationis mentis ad certam mutationem in humoribus, quamvis nesciamus, qualis sit facta specialis mutatio, quæ necessario inferat mentis degenerationem: atque sufficit in scientia medica pervenire ad talem regulam generalem; nam inde scimus, nos non posse emendare Insaniam, nisi tollatur ea materia e corpore. Nemo utique valet aliquem ab ebrietate liberare manente spiritu fermentato in vasibus; ita non valemus melancholiam curare, quocumque etiam modo ipsi ægri obnuntiant, si in corpore maneat materia atrabiliaria. Propterea monemur per hunc Aphorismum, ægros post Metum, & Tristitiam perseverantem lapsuros in veram melancholiam, quare dehortandi sunt, ut relinquunt ea animi pathemata, ne in eum morbum incident: atque scimus, nos debere Melancholiam natam curare evacuando, & emendando materiem melancholicam.

## L I B. VI. A P H. XXIV.

289. **S**I ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, non coalescit.

I. **V**ulnera tenuium intestinorum neque coalescere, neque augeri, supra inter aliarum partium læsiones ( Aph. 283. VI. ) annumeravit, quare non opus eandem rem repetere.

## L I B. VI. A P H. XXV.

290. **E**rysipelas foris quidem intro verti, non bonum: intus vero foras, bonum.

Erysipelatis definitio.

**Q**uidam morbi definiuntur ex causa, alii vero ex phænomenis, sed quoniam causa ut plurimum latet, suis phænomenis detegenda, non parvi tali in definitione nascuntur errores: alii vero ex phænomeno appellati, quoniam medici ut plurimum unum phænomenon proferunt, multi morbi idem phænomenon habentes confunduntur, non sine multo damno scientiæ medicæ. Qui enim dicunt, Erysipelas esse Bilem adustam ad aliquam partem depositam, nihil equidem tribuunt cognitioni: nam si tiro medicus vocetur ad ægrum, talis æger neque novit, neque indicat, se laborare bile adusta acri, & si proferat, hoc ex incertis principiis deducit: neque junior medicus tam firmam habet memoriam, ut possit statim ex conspectu in ægro signis ratiocinando invenire, ea signa ex Bile adusta acri proveni-

venire; ideoque observat signa, sed nescit, quale sit istius morbi nomen, & propterea non potest consulere Auctores practicos, quid sit in tali morbo agendum. Ideoque magis conducere ad detegendum morbi nomen, solummodo ex phaenomenis definire morbum; ut quoties in practicis inquireret tale phaenomenon, potuisset invenire morbi nomen. Hac autem in re duplicem petgo errorem, nam qui volunt ex unico phaenomeno definire morbum, multos morbos natura diversos idem phaenomenon habentes inter se miscet, cum magno acri damno: alii autem tot phaenomena congerunt, quae vel propria, vel accidentalia sunt, ut onerent memoriam. Id equidem in Erysipelate definiendo comperimus; qui enim dicunt, bilem esse adustam, & acrem, herpetem, icterum, febrem biliosam, & multos alios morbos confundunt, & non praebent veram ideam morbi indocto, quod per Definitionem fieri debebat. Qui ex Rubedine vocant Erysipelas, hi nullam faciunt inter Inflammationem, Epiphlogisma, Phlogosin, Maculam rubram, & Erysipelas differentiam. Quare Rubedo debet esse ad flavedinem accedens, late dispersa, ut ita distinguatur a Maculis: quae cedit rubedo prementi digito, quo distinguitur ab Inflammatione: quae conjunctam habet intumescentiam aliamque, ut differat a Phlogosi, & Epiphlogismate (*Aph.* 216. IV.) in quo calor est urens, sed non semper rubedo, neque tumoris elevatio. Si ergo conjuncta signa Erysipelatis perpendamus, tunc tandem concludere possumus, tali in parte esse majorem motum vitalem, qui partis calorem auget, impletionem extremitatum arteriarum cruentarum, & lymphaticarum, ex qua pars rubet ex sanguine majori copia collecto, & sero in vasis arteriosis lymphaticis retento. Denique ex natura Erysipelatis, quod facile priorem partem relinquit, & aliam occupet, colligere possumus, materiem esse acrem stimulantem, & meabilem, quae ex uno loco facile duci potest in alium, & quam partem occupat, eam in tumorem aliumque cum calore, & rubedine flavescente attollere.

II. Materia Erysipelatis generans in quadam parte rubedinem, ardorem, & aliamque intumescentiam, non videtur compingi posse in lentorem immeabilem, neque in materiem purulentam, nam observamus in eo morbo perseverante, materiem illam stimulantem viribus vitae instigatam acriorem, & tenuiorem fieri, & tandem commutari in tenuem rodentem humorem. Inde hujus materiae translatio est facilis. Si ergo haerit in vasculis cutaneis, erat in loco, ubi evacuari potuit, & in parte, cujus laesio sine mortis periculo potuit tolerari. Si ergo inde feratur, & ut signum, & ut causa malum portendit: loca enim interna eliminare nequeunt morbosam materiem; & illarum partium functio turbata, vel abolita per materiem hanc in ea collectam, mortis causa esse potest. Neque sponte valentibus vitae viribus morbosa materia unquam interna petit, sed semper ad exteriora truditur: si autem morbosa materia intro vertatur, signum est, vitae vires tam debiles esse, ut non valeant aliena pellere ad corporis peripheriam, quod in omni morbo periculosum est. Neque laudabile est per externa frigida, & adstringentia ad interiora trudere Erysipelatis materiem, ob recensita pericula.

III. Si vero Erysipelatis materia primo occupaverit partes interiores, & dein ducatur ad exteriora, signum est, vim vitae valere, ut se liberet ab eo hoste infesto, & eo deducta materia minus nocere potest cuti, quam priores partes, atque spes est, tandem totam eliminari, propterea valde bonum est, si natura hoc faciat. Inde tamen non licet argumentari, nos debere in morbo erysipelatoso dare calefacientia sudorifera, quae materiem trudent ad corporis ambitum, quum materia erysipelatosa ex altera parte magis redditur acris per medicamenta calefacientia. Quare non debemus prodesse expellendo, & magis nocere acrem reddendo materiem, sed refrigerantia, & temperantia conducunt, quae juvant deductionem ad cutim, non faciunt acriorem materiem, sed simul aliquo modo infringunt acre id biliosum, illudque blande incassant.

**LIB.**

Erysipelatis translatio ad interna, non bonum.

Erysipelatis translatio ad externa, bonum.

## LIB. VI. APH. XXVI.

291. **Q**uibus in febre ardente tremores fiunt, delirium solvit.

Unde tremores in ardentibus?

I. **F**ebrem Ardentem (Aph. 109. VIII.) habere validum motum circulatorium, quo supra modum pellitur sanguis per arterias, nemo dubitare potest, qui modo semel exploravit pulsus, & attendit ad respirationem; hic motus vehementior, ut sæpe observamus fieri in ira vehementi, non solum concutit organum vitale, sed etiam spirituum animalium nervos, ut spiritus per hos non æquali ut solent fluxu, fluant, sed motu quodam perturbato; qui ita fluentes in musculos inæqualem seu trementem motum faciunt. Tremunt enim partes, si musculi se sine valida contractione contrahunt alterne, nam si valida simul contractio, Convulsio vocatur. Uterque motus fit ab inordinato spirituum influxu in musculos, sed Tremores simul arguunt potius spirituum defectum cum motu inordinato, dum Convulsio simul indicet, spiritus majore impetu pelli in musculos. Si igitur in ardentibus motus vitalis fiat vehemens, ut simul perturbet spirituum fluxum per nervos motus animalis, exinde fit motus perturbatus. Tremor, vel Convulsio; sed quando spiritus simul deficiunt, fiunt Tremores: unde Tremores in Acutis, & Ardentibus sunt mali ominis, denotantes spirituum defectum cum motu turbato.

Quomodo Delirium solvit Tremores in ardentibus?

II. Ex perspectis Delirii causis (Aph. 27. III.) constat, motum cerebri perturbatum Delirium inferre posse. Ergo causa eadem, nempe motus vitalis validior, & inæqualis si ipsum cerebrum in consensum trahit, paracopen seu mentis aberrationem inferre potest. Hoc autem fit, si ipsa cerebri moles inordinate moveatur: sæpe hoc accidit, si principia nervorum inordinate moventur, ubi statuitur animæ sedes in Cerebro, quod nervi ad motum animalem destinati, ex eadem cerebri parte provenientes, copiosiores accipiant spirituum influxum, quo Tremor ex defectu spirituum natus evanescat, aut commutetur in Convulsionem. Ita quidem cessat Tremor superveniente paracope, sed homo non liberatur a toto morbo, ut multi putant. Ergo solvere hic notat cessare Tremorem, non vero commutationem in sanitatem, quum Delirium superveniens non sit bonum, sed potius malum signum.

## LIB. VI. APH. XXVII.

292. **Q**ui suppurati aut hydropici uruntur, aut secantur, hi pure, aut aqua acervatim effluente, omnino moriuntur.

Cur pus acervatim effluens infusuratus mortem intert?

I. **D**uobus modis Veteres solebant pus aut aquam in quadam cavitate collectam evacuare, nempe secando, quæ operatio hodie vocatur Paracentesis, vel urendo, hæc autem nimis crudelis operatio, quum omnes timeant ferrum ignitum, rarissime hodie adhibetur, sed ejus loco per corrodens applicatum formatur eschara, post cujus separationem fit apertura transmittens pus, vel aquam. Quia vero Auctoris scopus non est hos loco tradere ipsam operationem, sed quæ mala post institutam operationem sequuntur, igitur scopum Auctoris sequemur, videndo, cur si in Empyematicis acervatim evacuetur Pus, æger ut plurimum moriatur. Non debemus ab hac regula excipere spontaneam puris eruptionem, quia non moritur æger, quum sit seclus, vel ultus, sed quia acervatim evacuavit pus, quod æque in spontanea eruptione fieri potest, quam post sectionem, vel ultionem. Galenus dicit, quia tolluntur opercula arteriarum, unde multi spiritus simul exhalant. Alii autem adstruunt, calorem innatum exhauriri, quum post talem evacuationem corpora summo opere refrigerentur, & in animi deliquium incidunt.

dant. Constat ergo ex hac sententia, non esse abrogandam pectoris perforationem, sed in ea facienda nos non debere permittere omnis puris effluxum. Videtur autem hæc observatio impingere regulæ generali, materiem morbosam cito esse auferendam, ut corpus prompte liberetur. Hæc utique regula manet firma, modo per subitanæ evacuationem non inferamus majus malum, quam erat retentio istius humoris, quod in hoc casu fit. Quippe si omne pus affatim evacuo, magnam intus relinquo cavitatem, cujus latera a præcedente pure fuere erosa, & macerata: vasa in his lateribus hærentia a pure contento sustentabantur; nunc vero omni illo sustentaculo orbata, ab interno naturali impetu ea vasa distenduntur, atque implentur sanguine, quæ interdum non satis valentia ferre impetum, disrumpuntur, unde loco puris illa iterum cavitates implentur sanguine. Hæc fieri non possunt, quin reliquum corpus suo adhuc bono cruore privetur, qui collectus stagnat, vel in vasis supra modum dilatatis, vel effusus in pectoris cavitate: hinc in principio ex sanguinis defectu in reliquis arteriis, & venis generatur animi deliquium, & corporis refrigeratio. Sanguis ille vel in vasis dilatatis, vel cavo pectoris subsistens sensim abit stagnando in corruptelam; & format febrem hecticam, ex qua pereunt. Itaque in omni eruptione puris, sive sponte fiat, sive per sectionem, sive per unctionem, cavere debemus, ne nimis magna quantitas unica vice emittatur, sed pedetentim parva portio simul est evacuanda.

II. Quid Medici per Hydropem intelligant, notavimus (Aph. 273. II.) hoc autem loco illa species est concipienda, quam Asciten vocant, nempe collectionem magnam aquæ in inferiore ventre, quæ hac in specie solebant secare, & urere, quod aliis in speciebus non erat consuetum. Hanc operationem hodie quoque vocant Paracentesin. Eadem cautio est observanda in perforatione ventris, quæ adhibita fuit in pectoris empyematici paracentesi; imo eruptio spontanea per umbilicum æque quam paracentesis mortem inserit, si æceratim permittat evacuationem aquæ. Ratio mortis per dentum sustentaculum a præcedente non differt; sed in hac cavitate possidemus auxilium, quod in pectore adhiberi nequit. Pectus enim costis firmatum externa compressione non potest angustari, ventrem autem laxum, & compressilis artificiosa cinctura ita potest adduci, ut post ablatum sustentaculum aquæ, æque sustentari possit, ac si aqua non fuisset evacuata. Felici igitur cum successu, tam in spontanea eruptione aquæ per umbilicum, quam in instituta paracentesi hac artificiosa ventris cinctura sum usus, modo illa statim in principio adhibeatur, nam si sero novum hoc sustentaculum adhibemus, postquam sanguis vel stagnat concretus in vasculis dilatatis, vel effusus in ventris cavitate, cinctura hæc prævenire nequit collectionem, & corruptionem sanguinis. Propterea statim dum effluit aqua, laxum abdomen est sustentandum, priusquam sanguinis collectionem fecit, ad præveniendi omnia illa mala. Non tamen per hoc auxilium certam curationem promittere audeo: sæpe enim illa fuere macerata, & corrupta ventris viscera, ut, etiamsi sustentetur venter, viscera, & humores corrupti mortem inferant. Ex hac observatione judicari potest, quid sit sentiendum de nimia illa evacuatione continuata per purgantia, qualis methodus a multis ita extollitur.

Cur aqua æceratim evacuata in hydropicis mortem inserit?

## LIB. VI. APH. XXVIII.

293. Eunuchi non laborant podagra, neque calvi fiunt.

I. Quoniam his in regionibus nulli inveniuntur Eunuchi, per experientiam observare non datur, num Podagra laborent, vel non. Quod autem Hippocratis tempore non, vel rarissime laborarunt Podagra, ex iisdem forsan



san fuit caufis: quibus his temporibus ruflici, alique viles homines raro Podagra corripiantur; victus enim parvus; & multus labor, etiamfi prædifpofitio podagræ fit in corpore, ejus ulteriorem generationem intercipit; dum vita laeta, & otiofa, luxuria, intemperantia, ut & ftudia feveriora Podagræ parentes fint. Obfer-  
vavit itaque Galenus fuo etiam tempore, Eunuchos Podagra corripì. Quare non  
poffumus argumentari, podagricam materiem ex femine formari, cujus genera-  
di potentia Eunuchis omnino eft intercepta. Si ex analogia effet ratiocinandum,  
feminis materia non poteft accufari, quum feminæ etiam inveniantur Podagra  
laborantes, in quibus semen non generatur, nifi quis haberet ovula in ovario  
nata pro femine, qui liquor a femine virili multum diftat. Num Eunuchi fiant  
Calvi, non videtur mihi tanti momenti, ut mereatur attentionem; multa qui-  
dem fiunt in Eunuchis, quæ aliter obfervantur in perfectis hominibus: fed quo-  
niam nihil facit ad cognitionem, vel curationem morborum, tota hæc senten-  
tia omitti potuiffet. Miratus fæpe vidi hanc fententiam nullius momenti omnium  
frequentiffime ab Auctoribus fuiffe allegatam, & copiofiffime expofitam, quam  
ego propter parvum in ea ufum licco pede tranfibo.

## L I B. VI. A P H. XXIX.

294. **M**ulier non laborat podagra, nifi menses ipsi defecerint.

I. **H**Æc fententia, fi continuata obfervatione effet probata, majoris effet u-  
fus, argueret enim fexus fequioris felicitatem, fed etiam temporibus his  
tam mulieres quam viri podagra corripuntur. Multo autem frequentior eft viris  
morbus, quam mulieribus. Videtur hæc fententia arguere quandam latentem podagræ  
caufam, nempe semen præbere podagræ materiem, quod etiam veteres concefferunt  
feminis, hoc semen corruptum fi ftatis temporibus cum menftruo fanguine eli-  
minaretur, exiftimarunt, materiem podagricam generari non poffe. Tota autem  
illa doctrina obfervationibus hujus temporis corrui, quum etiam feminæ eodem  
morbo laborent. Quod autem poft menfium fuppreffionem frequentius corripian-  
tur, quam dum menfes ordinate fluant, confans eft obfervatio; forfan quia acre  
id podagricum aliquo modo fimul expurgetur, vel quia retentis menfibus morbofa  
illa caufa citius popullulet. Fateor, me non ita perfectam habere materiæ po-  
dagricæ cognitionem, ut inde argumentari poffim, ex quoniam humore fano for-  
metur. Invenio quidem in corpore latitare poffe fine ullo indicio, fed quando  
fævire incipit, regulariter primo aggredi ligamenta articuli pollicis pedis cum ve-  
hementi dolore, dein quoque invadere ligamenta aliorum articularum tam pe-  
dum, quam manuum, denique, fi vetuftior fiat, aggredi internas partes, ubi loco  
doloris summam anxietatem inducit; nunquam abire in fuppurationem, fed in-  
terdum in calculofam concretionem; etiamfi pars fimili fere tumore, & rubore  
afficiatur, ac fi locali inflammatione fuiffet tentata; unumquemque paroxyfimum  
confare ex aliis minoribus, qui omni vefperi magis intendi folent; tandem,  
poftquam varios articulos occupavit, ceffat totus paroxyfimus, relinquens debili-  
tatem articuli cum aliquo dolore, fi articulus ille movetur; denique, nifi nimis  
valida fuit podagra, vel frequentius aggrega fuit eundem articulum, perfectam  
relinquit fanitatem, atque interdum ultra annum durat priusquam novum paro-  
xyfimum formet: fed fi vetuftior fuit, bis, terve in anno redit, & in quibufdam  
non dimittit, nifi æftate media, deftruens omnem articularum ufum. Has pro-  
prietates vifibiles non invenio in ulla alia materia acri, quæ ejus fpeciem in-  
dolem exprimit, fed ex his intimam materiæ naturam non valeo eruere, & ita  
diftinguere a Rheumatismo, Arthritide atque doloribus Catarrhosis, ut aliis hanc  
ma-

materiem depingere valeam. Invenio quidem quasdam visibiles proprietates hunc morbum a ceteris distinguentes, sed ex his elicere velle intimam hujus materię naturam, nimis arduum mihi videtur. Hoc autem elicere possum, non esse impossibile inveniri posse antidotum, sed istud a priori invenire non datur, forsitan medicaster, vel agyrta aliquis periclitando tale inveniet, ut detectum est antidotum febris intermittētis, & luis venereę. Hucusque nulla innotuit hujus materię subactio vel extinctio, nisi per vires vitę moderate agentes: nam si calefacientibus has vires instigamus, Podagra eo magis sævit; si minuamus actionem per refrigerantia, & stupefacientia, diutius protrahitur, & majus articulo damnum infert.

L I B. VI. A P H. XXX.

295. **P**uer non laboras podagra ante veneris usum.

I. **E**X eodem principio hic etiam videtur deductus Aphorismus, feminis materiem præbere materiem podagricam, quoniam ante pubertatem non formatur materia feminalis in corpore, etiam si omnia organa sint formata, & adferantur omnes humores. Hęc observatio est satis firma, novi tamen Pueros ex podagricis natos, qui ante pubertatem podagra fuere correpti: quare constat ut supra monuimus in Eunuchis, & Mulieribus, liquorem feminalem non esse eum humorem, qui in materiem podagricam degenerat. Hoc magis patere potest, si perpendamus, abstinentes maxime obnoxios esse debere morbis ex semine corrupto provenientius, dum tamen nihil magis promoveat podagram, quam nimia feminis evacuatio. Ergo semen non præbet materiem podagricam, quum major ejus evacuatio provocet podagram, & illi, quibus non generatur semen, tamen a podagra corripiuntur: Textus innuere videtur, veneris usum inferre Podagram, quia puer ante veneris usum podagra non laborat. Si statuitur, ablationem seminis generare podagram, itaque tunc quam maxime Eunuchi, & Pueri Podagra laborarent, in quibus major est hujus materię defectus. Si contendimus, debilitatem ex seminis profusione natam inferre podagram, certe hoc etiam non responderet experientię, quum homines robusti frequentius quam debiles Podagra tententur. Contenti itaque esse debemus pronuntiando, nos latere naturam materię Podagrę, sed istius esse naturę, ut vegetos, & crapulis & lubricationibus deditos, severiora studia exercentes, divites, seu laute, & otiose viventes magis afficiat, nosque hoc solummodo scire constanti observatione practica.

L I B. VI. A P H. XXXI.

296. **O**culorum dolores meri potus, aut balneum, aut somentum, aut venę sectio, aut purgatio solvit.

I. **O**culus multis ex partibus, & humoribus compositus tot varios præbet morbos, ut apud Ægyptios, & Romanos haberentur Medici oculares, qui solis doloris morbis oculorum medebantur; non solum enim Oculi bulbus visus organum, verum etiam reliquę partes auxiliatrices Oculorum nomine veniunt, quod morborum numerum augeat. Inde hoc loco non solum bulbi, sed & palpebrarum dolorem intelligere debemus. Quum multę sint causę his partibus dolorem inferentes, nemo mirari potest, Hippocratem tam varia citasse medicamina, quę observavit lenimen doloris attulisse. Hęc autem omnia auxilia simul adhiberi nequeunt, neque omnia sine discrimine attulerunt levamen: quare prudens medicus debet ex præcipuis his eligere unum, vel alterum, quod causę inventę magis

A a a

re-

respondet: non vero empiricorum more, nullo habito respectu causæ, hoc vel istud tentare: si autem quædam auxilia fuere tentata, priusquam vocatur medicus, ille poterit ex iuvantibus, & lædentibus sciscitari, qualisnam fuerit doloris causa. Non erit opus quærere doloris signa, ipse æger enim indicabit sibi dolere oculos, & petere lenimen, & curationem, sed magni momenti est invenire istius doloris causam, quæ suam specialem curationem exigit: nam etiam si haberem cuncta medicamina, quæ dolores oculorum leniunt, & curant, illa nullius essent usus, quamdiu latet causa; tentando enim omnia facile periret visus. Si cunctas perpendimus causas, illæ possunt (1) referri ad causas externas lædentes, sed illæ hoc in loco non sunt perpendendæ, quum tali in casu simul indicari soleat illa manifesta causa lædens. (2) Internæ quia latent, suis conjunctis signis sunt distinguendæ. Hæ sunt vel Tensio vehemens fibrarum nervosarum, vel Compressio, vel Rosio ab aliqua acrimonia. Dolor enim est vehementissimæ species sensus, qui his modis formatur. Quia vero Auditor varia auxilia profert, inquirendæ sunt ex dictis generibus causæ speciales cum suis signis, quæ hoc, vel illo auxilio tolli possunt, & debent.

Qualis o-  
culorum  
dolor cu-  
ratur men-  
potu?

II. Vinum potum suo stimulo spirituosum majorem facere circulationem cum corporis incallescencia, omnibus notum est: talis ergo meri potio valet talem subigere, & excutere doloris causam, quæ ex minori circulatione fuit nata, hæc enim materia a majore circulatione agitata & subigitur, & expellitur. Hanc autem causam in Oculorum doloribus suis signis detegere, non est facile. Hoc vero constat, acrimoniam ex minori motu natam sensim generari, quæ spontaneæ mutationes lente augentur. Acre tale natum infert quidem rosiorem, sed vel nullam, vel exiguam incallescenciam inducit, quum proxime accedat ad acrimoniam nitrosam: plerumque simul adjunctam habet viscositatem, quæ ex minori motu generatur. Si ergo aliquis diu laboravit oculis dolentibus sine multa rubedine, quorum oculorum palpebræ levis fordescent, simulque effluunt humores acres frigidi catarrhosi, his imperanda est meri potio, quæ ancila circulatione solvit viscosum, & emendat acre spontaneum catarrhosum frigidum: conduceret quoque hoc in casu palpebras abluere spiritu vini. Si his adhibentur emollientia, laxantia, anodyna fomenta, fieret quidem doloris levamen, quia his diluitur id acre, & ita temperatur, & fibræ motrices fiunt minus agentes ad impingendum id acre; sed augeretur his deinceps dolor, quia humoribus concessa diuturniori stagnatione, simul conceditur major acrimonia.

Qualis per  
balneum?

III. Per Balneum, quo corpus totum incalcescit, & abluitur, suisque forditatibus purgatur, promoveri insensibilem perspirationem, humoresque tenues magis determinari ad cutim, observavimus in Aphorismis de *Insensibili perspiratione*. Si ergo Oculorum dolores oriantur ab humore acri, qui solitus erat per Insensibilem perspirationem exhalare, sed cohibitus continuo deponitur ad oculos, istis infert dolores: hujusmodi dolores tolluntur reducta materia ad naturale suum organum excretorium, ut per istud educatur. Quia vero his in regionibus nullus est Balnearum usus, in eorum locum substitui possunt Sudorifera, & Diaphoretica, sed in pertinaciori malo sudare potest corpus accenso alcoholæ stragulis tectum. Requiritur in hoc casu, ut non sit vitium locale ex deficiente actione ipsius organi, vel ex stagnante, & corrupto humore in partibus oculorum, sed ut sit humor acris per totum corpus dispersus, & dein ad oculos depositus, & natus ex prohibita perspiratione. Si ergo antecesserint causæ prohibentes insensibilem perspirationem, quas in proprio illo libro recensui, & signa adsint humoris acris oberrantis per totum corpus, vel per Balneum, vel ea quæ promovent perspirationem, ille oculorum dolor est curandus.

Qualis per  
fomentum?

IV. A Balneo differt fomentum, quod solummodo actuali calore admoveatur par-

parti affectæ, dum Balneum applicetur toti corpori, vel parti remotæ. Talia fomenta ex variis medicamentis componi possunt, quæ sunt eligenda secundum causam acrimoniæ lædētis, quod in hoc loco nimis copiosum esset. Quod si inveniamus, oculorum partes admodum tumere, rubere, & dolere, ex quibus conjicimus, sanguinem ferri majore impetu ad oculos, & ita distentas fibras inferre dolorem calidum pulsantem, admodum conducit per fomenta humida laxantia, & actu calida oculos fovere, ut relaxentur fibræ tensæ, & minuatur impetus.

V. Si autem oculi rubent, tument, dolent, quia sanguis majore impetu feratur ad caput (vid. *Comp. T.* 32. VII. & 46. XIII.) præprimis in juvenibus, plethoricis, opipare viventibus, quibus solita sanguinis evacuatio fuit suppressa, præsens est auxilium mittere sanguinem, ut ita minuatur totius quantitas, & temperetur impetus. Hoc in principio solum valet absolvere curationem, sed si diu duraverit, & partes per continuatum impetum fuerint destructæ, talia sunt adhibenda topica, quæ post specialem mutationem inducunt usus docuit præstantissima esse.

Qualis per  
vrem se-  
ctionem?

VI. Hoc loco intelligi alvi ductionem per medicamentum ore datum, nullus dubitat, quomodo autem eo possumus curare Oculi dolorem, non omnes consentiunt. Supra (*Aph.* 282.) autem notavimus cum Audore nostro, alvi profluvium prodesse Ophthalmia laborantibus, quia ab oculis ad alvum conveniens fit derivatio. Hoc etiam in his Oculorum doloribus est tenendum fieri per artificiosam alvi evacuationem. Sed præprimis talia alvum ductentia conveniunt, si simul signa cacochymiae habeantur in corpore. Ex purgantibus tunc eligimus refrigerantia, si oculi dolentes simul calent.

Qualis per  
purgatio-  
nem?

Plura hic potuissent utilia adduci auxilia ad curandos oculorum dolores; ut setacea, fonticuli, vesicatoria, anodyna, emollientia, sed quia Auctoris scopus erat præcipua recensere, quæ observavit, fuisse oculorum dolores, horum expositione quoque contenti esse possumus.

## LIB. VI. APH. XXXII.

297. **B.** Albi longo alvi profluvio maxime corripiuntur.

I. **Q**uamvis *τραυλοι* proprie notat tales, qui literam T, vel R pronunciarere nequeunt, videtur tamen Auctor intellexisse omnes, qui in quavis litera, vel syllaba deficiunt, vel in media dictione, uti Balbi, Blasii, & lingua hæsitantes. De his observavit, istos maxime corripere alvi profluvio longo. Non dubito, quin hoc fuerit ab Hippocrate observatum. Ego quoque multos novi Balbutientes, & Blasios, & inter istos duos fratres, qui vix unam Syllabam articulatam proferre potuerunt, quibus tamen alvus satis fuit adstricta. Sed tales Balbutientes, qui continuo os plenum habent saliva, ut præ oris humiditate vix articulare loqui potuerint, his erat alvus laxior. Hujusmodi in hominibus non est mirum alvum laxiorem esse propter majorem humorum confluxum; sed qui ex solo defectu linguæ sunt Trauli, Balbutientes, vel Blasii, nulla est ratio, quamobrem alvum haberent laxiorem. Hoc enim linguæ vitium est vitium in musculis motus animalis, quæ actio nihil commune habet cum motu peristaltico intestinorum. Quare hanc observationem inter rariora, & incerta locarem, & quæ vix quidquam utile scientiæ medicæ præbent.

## LIB. VI. APH. XXXIII.

298. *A*cidum ruſtantes non admodum pleuriſici ſiunt.

I. *A*cidum ruſtum oriri ex liquore, vel maſſa acida in ventriculo hærente, quæ emitit aerem acido imprægnatum, ſuperius delibavimus (Aph. 206. II.) Quibus conſtitit, talem Ruſtum formari ex alimentis aſceſcentibus aſſumtis ſponte in acidum abeuntibus: ergo ſemper arguit debiliorem ventriculi actionem, & minorem ſaponacitatem alcalinam in bile, ſucco ſtomachico, & pancreatico, quibus aliis aſſuſcentibus humoribus cohibetur ſpontanea aſſumptorum degeneratio in Acidum. Pleuritis (Aph. 109. IV.) autem morborum acutorum ſpecies eſt, quæ dicitur vera, ſi ex Inflammatione naſcatur (Aph. 109. IV.) Hæc ſemper majorem vitalem motum arguit, quo omne acidum fermentatione natum exſtinguitur, quamvis multi acidum Pleuritidis cauſam eſſe ſtatuant, quod ita pugnat cum omnibus experimentis, quam quodvis alieniſſimum. Quibus igitur debilis eſt organorum chylopojeticorum motus, raro accidit, ut in reliquis organis ex motu majore generetur morbus. Inter debilitatis huius ſigna certiffima eſt Acidus ruſtus, & Pleuritis ex motu majore naſcitur, inde mirum erit, ſi tales homines Ruſtu acido laborantes Pleuritide corripiantur. Non tamen hæc obſervatio ita absolute vera eſt, ut omnino fieri non poſſet, quin motus perſtalticus, & motus vitalis ſint duo motus diſtincti, quorum unus debilis eſſe poſſet, dum alter ſit nimis valens: atque non omnis dolor lateris ab inflammatione naſcitur, humores enim acres in pleuram depoſiti etiam interdum inferunt Pleuritidem notham, ſed multo minus frequens eſt ille pleuræ dolor, quam qui ſit ex Inflammatione.

## LIB. VI. APH. XXXIV.

299. *Q*ui calvi ſunt, hiſ varices magni non ſiunt. Quibus vero dum calvi ſunt, ſuperveniunt varices, hi capillati ſiunt.

An Calvi  
ſunt  
varices  
magni?

I. *T*umentia interſtitia venarum Varices vocari, ex Chirurgia repurgata noſtra 694. colligi poſteſt, ubi cauſas, & curationes ſimul expoſuimus: nondum tamen notavimus hanc mirabilem Hippocratis obſervationem, qua adſtruit vult, Calvis non generari magnos varices, quum in Calvis ſemper majores detexi, quam in junioribus: ſenibus enim, ſive calvi ſint, ſive ſolitum colorem capillorum ſervent, maxime tumentes ſiunt Varices, horum enim corpora laxiora facilius magis tumentes venas producunt. Si vero *Galenus* notat Capillorum deſuvium, hoc itaque ſi fiat ex ſenectute, non impediret intumeſcentiam Varicum. Sed ſi humor morboſus generet Capillorum deſuvium, quando ille morbus ex auctoritate Galeni vocandus eſſet Madarosis, forſan potuiſſet impedire Varicum magnitudinem, ſed quia in tota mea praxi talem obſervationem colligere non potui, hanc ſententiam Auctoris Auctoritati relinquo. Neque facile credere poſſum tale quid frequenter contingere, quia Varices præcipue naſcantur ex laxitate venarum, vel impedito reditu ſanguinis per iſtus venæ truncum, quæ cauſæ non interceptiuntur deſitione materiæ verſus caput, qua interceptiuntur capillorum nutrimentum, & incrementum.

An Calvi  
ſunt  
capillati  
a  
ſuſcipientibus  
varicibus?

II. Hippocrates hic intellexiſſe capillorum deſuvium, patet ex hac altera parte Aphoriſmi, nam ſi coloris mutationem intelligere voluiſſet, dixiſſet Capillos ad naturalem colorem redituros a varicibus ſupervenientibus. Videtur in hoc Textu adſtruire velle quandam naturalem metaſtaſin humoris, qui delatus ad radi-

radices capillorum, istas corroderet, sed ad tunicas venarum, istas tumere faceret, qualem ego nunquam in praxi observare potui; an vero Auctor in sua regione hoc observaverit, negare non possum.

## L I B. VI. A P H. XXXV.

300. **H**ydropsicis tussis superveniens, malum.

**I.** Revis sed utilis, & magni momenti Aphorismus, ex quo colligi potest, quid mali sit expectandum, si morbus morbo superveniat; hoc in loco solummodo dicit malum, sed infra pronuntiabit, lethale esse. Si duos hos morbos inter se comparemus, facile liquebit, quid sentiendum erit de Tussi superveniente hydropicis. Hydrops enim est morbus ex humorum abundantia qua vasa lymphatica, & cellulæ pinguedinosæ turgent, & simul enervantur, & macerantur. Hujus laticis naturalis indoles est blanda, benigna, sola sua abundantia peccans, nullo modo irritans. Tussis autem arguit humorem acrem irritantem laryngem, scimus ergo ex Tussi superveniente, humorem Hydropis jam aliquam suscepisse acrimoniam, qua vix pejus in Hydrope expectari potest: adest enim humoris abundantia in corpore debilitato, qui nunc suscepit acrimoniam; hæc autem acrimonia ex spontanea corruptione nata, a debili hac actione emendari non potuit, unde hujus acrimonie majorem progressum expectamus. Tussi insuper validissime concurret corpus ita liquore oppletum, cujus vasa macerata vix ferunt aliquem impetum; periculum igitur est, ne conquisitione hac aliquod vas rumpatur, & ita latex hucusque vasculis coercitus, in corporis cava effundatur, & ita augeat morbi periculum. Neque pulmo est organum excretorium, quo eliminari potest illa aqua hydropica nam tussunt sine memorabili excretionem, atque edunt ægri frustranea conamina, quibus magis debilitantur. Denique signum est, Pulmones ab eo latice obrui, unde intercipitur istius organi, actio, quod præparare debebat humores, & libera in respiratione agitari, nunc vero multitudine laticis acrioris obfessi Pulmones, defectu præparationis majorem generant laticis copiam, & tandem totius pulmonis oppressio, & corrosio est expectanda. Propterea meretur Tussim supervenientem maxime damnare, præprimis quum præcipuam curandi indicationem intercipiat: Tussis enim laxantia, & mucilaginosæ exigere ad leniendum, quæ Hydropicis sunt vetita.

## L I B. VI. A P H. XXXVI.

301. **U**rine difficultatem venæ sectio solvit: secunda vero interna.

**I.** Stranguria, Dysuria, & Ischuria in causis tam parum differunt, ut non mereatur distinctis titulis describi; nam quæ causa Urinæ difficultatem inferre potest, si major fiat, integram suppressionem producere potest; si autem simul guttatum exit urina, Stranguria vocatur. Propterea in his speciebus omnibus videndum erit, num Vena sit secanda. Quoniam hi tres morbi, quod sæpe diximus, oriuntur ex variis causis, quia nomen obtinuerunt ex phænomeno, Venæ sectio prodesse, & nocere potest. Quia vero Hipp. observavit Dysuriam curatam fuisse sanguinis missione, hanc observationem inter generales Aphorismos prædicos locare voluit, eo fine, ut posteri quoque potuissent tentare hoc auxilii genus, non vero quod existimaverit, venam secandam esse in omni Dysuria. Tali enim modo fere omnes sunt ejus descripti Aphorismi. Sed quoniam non adiecit signa, quibus hanc speciem distinguit a ceteris, æque potest junior Medicus peccare venæ sectione, quam

quam professe. Multi dubitant, num hic sit genuinus Hippocratis Aphorismus, qui putant, Venæ sectionem nunquam conducere posse, quia frequens dysuria sit senibus (Aph. 110. IV.) catarrhosis, calculosis, quibus non conducit venam secare. His auctoribus omnino est concedendum, Venæ sectionem non conducere; sed observavit etiam noster Auctor ex Intestino recto, vel Utero inflammato (Aph. 251.) Stranguriam seu Dysuriam generari, in istis utique casibus quam maxime conduceret mittere sanguinem: atque post eum etiam Rilverius, Sydenham, & nos observavimus frustra tentatis omnibus auxiliis, urinae suppressione, & difficultatem curatam fuisse sanguinis missione. Ut nunc sciat junior Medicus, qualis in specie Dysuriæ mittendus sit sanguis, debet signa inflammationis applicare ad vaginam, intestinum rectum, vel & urethram: ea signa satis desinient, sanguinem esse mittendum. Quod autem suadeat, internas venas esse secandas, hoc facile condonari potest, quia tunc temporis ex ignoratâ circulatione, magis quam par erat, fecerunt sectionem venarum, quæ aperiendæ erant. Si autem dixisset, venæ inferiores scilicet in pedibus sunt aperiendæ, non ita recederet a communi observatione, neque impugnaret circulationem inventam, ex cujus doctrina patet, venas proximas esse aperiendas, quales sunt venæ in pedibus ab ihacis provenientes.

## LIB. VI. A P H. XXXVII.

302. **A** Angina detento tumore fieri in collo, bonum: foras enim morbus vertitur.

Metastasis  
observatio  
Generalis.

**G**eneralem regulam translationis (Aph. 290.) hoc in loco speciali observatione conatur firmare: sed in Translatione seu Metastasi semper debemus observare, ut sit perfecta, id est, ut omnis materia ex uno loco feratur ita in locum alterum, ut prior pars multum levetur, vel integre liberetur. Atque ut bona sit, materia illa morbosa ferenda est a loco, qui utilior est vitæ, & qui difficile ejicere potest materiem, ad alium locum minus utilem, quique commodius materiem morbosam evacuare potest. In observatione hac omnino cavendum, ne symptoma, vel alius morbus superveniens non fiat ex Consensu (Aph. 258. I.) sed ex vera Translatione materiæ de loco in locum.

In angina  
tumorem  
fieri in  
collo, bo-  
num.

II. Quod Angina indicet talem colli morbum, quo difficilior reddatur, vel omnino impediatur Deglutitio, vel Respiratio, vel utraque simul superius (Aph. 95. VII.) notavimus. In textu habetur *αὐτὸν*, seu species Anginæ, quæ tunc dicitur præsens, si causa illa hæreat in interioribus laryngis, sine signis externis, difficilem, & suffocantem respirationem inducens, ac si nullo constringeretur collo, & interciperetur respiratio. Periculosissimus est morbus, nam si augeatur tumor in membrana interna laryngis, suffocatur homo: si abeat in suppurationem, generatur pulmo purulentus. In hoc morbo observavit, si externe in Collo tumor oboritur, bonum esse. Hæc autem observatio non est constans: potest enim tumor membranae internæ Laryngis latius dispergi etiam ad exteriores partes, sine diminutione partis interioris, quando designatur morbi augmentum. Sed si interiores partes deponunt ad exteriora colli morbi materiem, valde bonum est, quum partes exteriores tumentes non inferant mortis periculum, satis enim magnum conceditur spatium tumori. Constat ergo, duo adesse debere requisita, ut talis apparens in Collo tumor sit bonus. Primo ut sit talis morbi materia, quæ metastasin facere potest, uti materia Catarrhosa, & Erysipelatosa, nam Inflammatio, & Oedema harum partium non tam facile locum mutant, sed potius, si partes exteriores simul tumere incipiunt, designant morbi augmentum. Alterum est, ut sit perfecta Metastasis, quam conjicimus, si una cum intumescencia externa libe-

liberior fieri incipiat Respiratio: quam, nisi Respiratio simul fiat liberior, signum est, imperfectam fieri Translationem, quæ semper mala est. Neque bonum erit signum, si novus accedat tumor, manente priore.

## L I B. VI. A P H. XXXVIII.

303. **Q**uibus ocultri cancri fiunt, eos non curare melius est. Curati enim cito pereunt. Non curati vero longius tempus perdurant.

I. **A**n tequam pronunciare possumus, num Cancer occultus sit curandus, vel relinquendus, constare debet, quid proprie per Cancrum occultum sit intelligendum. Generalem Cancri Definitionem exhibuimus in Chirurgia repurgata 1484. Quibus constat, speciem esse tumoris, qui fere semper aliquam glandulam occupat, nunquam vero ille tumor abit in veram suppurationem seu purulentiam sed in humorem ichorosum admodum corrosivum: neque totus humor Cancri ita commutatur, sed relinquit semper partem aliquam tenacem acerrimam, quæ a reliquis partibus firmis separari nequit, atque novum humorem affluentem brevi tempore in similem corruptelam invertit, ut nunquam hujus materiæ finis habeatur, vel ita redditur liquidus, ut omnis exprimi possit. Mira est hujus materiæ corruptæ natura, nam neque est acida, neque alcalina, quam nullo cognito antidoto extingui possit: an vero unquam invenietur antidotum, vix sperare possumus. Videtur tamen originem habere ex pinguedine nostri corporis, quæ in cellulosis spatiis glandularum hærens, sensim in toxicum hoc acre convertitur. Statim autem in principio non ita sævit, sed compacta hæret materia in glandula substantia, quam inæqualiter distendit, ut sit talis glandula aspera, dura, inæqualis, aliquo modo dolens, qui dolor augetur ab omni attritu, & pressione. Sed si accedat humiditas, vel admittatur aer nudus, illa materia concreta liquefcere incipit, simulque fit acerrima, unde doloris augmentum, & corrosio partium circumjacentium: & quia omnis materia non liquefcit, scaturigo perpetua hujusmodi ichoris in hoc loco manet. Et quod pessimum est in hoc ichore, si misceatur sanguini, vel pinguedini bonæ adjacenti, brevi tempore istos humores in similem corruptelam convertit, sanguinemque nigro colore inficit. Venas igitur, & Arterias partium circumjacentium illo inquinato sanguine nigro impletas pro pedibus Cancri veteres habuere. Talis nunc tumor ita in corpore latens, ut signa nulla externe appareant, occultus est Cancer, sed si Cutis perrofa est, vel externe in cute illa vasa nigra conspiciuntur, Cancer est apertus, vel manifestus.

Quid sit  
Cancer  
occultus.

II. Præcipit Auctor, Cancrum occultum non esse curandum, quia curatus citius interit, quam non curatus. Nisi hoc in loco certa species curationis intelligatur, omnino falsa esset monitio. Nam non solum licitum est per Dietam interciperi Cancri progressum, qualis Dieta curationis nomine venit apud medicos, sed & valde necessaria est. Curatio autem Chirurgica per ablationem tanti est interdum momenti, ut si negligatur in Cancro occulto, postea in Cancro aperto prohibeatur. Nam quoties Cancer alicubi lateat in Mammis, labiis, vel & aliis partibus corporis, ubi integre tolli potest scissione, communi observatione chirurgica totus Cancer occultus est auferendus, & ita perfecte curantur homines, ut testantur hodiernæ observationes chirurgicæ: sed tunc cavendum est, ne aliqua portio relinquatur. Eadem autem in Cancro aperto raro bene succedit, quia tunc ut plurimum totus Cancer auferri non potest: itidem si plures Cancri sint in eodem corpore, quum uno sublato, reliqui magis sævire soleant. Atque vetatur ablatio, si Cancro adhæreat arteria, vena, nervus, vel alia pars nobilis, quæ scissione non permittit. Nam vel totus Cancer tunc tolli nequit, quod malum est, vel talis

An Cancer  
occultus  
non cu-  
randus?

pars



pars abscissa mortem infert. Tandem tertia species sequatur curationis per medicamenta applicata. In hac specie quædam medicamenta permittuntur in Cancro occulto, alia vero prohibentur: uti siccantia, indurantia, quæ Cancri progressum inhibent, faciunt, ut Cancer, qui sibi relictus brevi tempore sevisset, per longum tempus gestari possit sine multo incommodo, quum ablatione humidi corruptio Cancri inhibeatur. Sed si applicantur Corrodentia, quæ ex Cancro clauso faciunt apertum; vel Humefactantia, quæ Cancri materiem liquefcunt; vel Pingua, quæ suppeditant corruptibilem materiem, hæc omnia faciunt, ut ille Cancer, qui sibi relictus tolerari potuisset, brevi tempore ita furat, ut domari non possit. Hoc sibi proprium habet materia Cancrofa, quod nullis medicamentis emendari possit, nunquam abeat in bonum pus, & nunquam integre evacuetur. Unde Cancer occultus, nisi totus auferri possit secundo, est relinquendus, & exsiccandus; non tangendus acris, neque emolliendus humefactantibus. Si quis talia facit, is inficiet totam massam circulatoriam, faciet ex acri quiescente, acre agens, & ita homo, post multas miseras toleratas, peribit. Tali ergo in sensu curati cito pereunt, & non curati longius tempus perdurant.

## L I B. VI. A P H. XXXIX.

304. **C**onvulsio fit aut a repletione, aut evacuatione. Sic quidem etiam singultus.

Convulsio-  
nis & sin-  
gultus con-  
valescentia.

I. **D**uo proponuntur in hoc Aphorismo morbi, qui utrique oriri possunt ex Repletione, vel Evacuatione: quare isti, quamvis facie externa multum differant, ratione causarum admodum similes esse debent. Ex Convulsionis descriptione (*Aph.* 51. III. & *Aph.* 194. II.) satis patet, hoc phenomenon generari ex inordinato influxu spirituum per nervos in aliquem muscolum, qui propterea contrahitur. Hoc etiam fieri debet in singultu, ut habeatur inter hos morbos quædam similitudo. In Convulsionibus videmus quendam motum in membris, sed in singultu audimus aliquem sonitum aeris per laryngem intrantis, qui introitu in ipso veluti principio intercipitur; dum simul sentiunt ægri, Diaphragma subito, & involuntarie contrahi, quasi vi faceret inspirationem, sed tum simul clauditur larynx aeris ingressum intercipient. Igitur Convulsio, & singultus est involuntaria violent nonnullorum musculorum contractio, unde Singultus est quædam species Convulsionis, & quæ fit duntaxat in quadam speciali parte, dum Convulsio varias partes potest, & multas simul.

An Con-  
vulsio &  
singultus  
a sola re-  
pletione  
& evacua-  
tione?

II. A Galeno, & aliis passim hæc citata invenitur sententia, ut adstruatur, Convulsionem, & Singultum ex sola Repletione, vel Evacuatione oriri: & ut hanc tueantur sententiam, multa inania, & præpostera afferunt. Solius Galeni rationum delibabimus. Ille eximius vir adducit humiditatem, & siccitatem, quibus utrisque experimentis in chordis conatur adstruere hujus sententia veritatem. Siccitatem loco Evacuationis adducit, quia chorde exsiccatæ accuratur, ut patet, si igni admoveatur. Verum hoc experimentum non probat accuratorem per siccitatem, sed per adurentem ignis calorem; quum partes animalium fibrosæ ardenti calore sine humidi amissione corrugentur, ut patet, si caro in aqua coquatur; sine humidi enim defectu contrahuntur fibræ. Neque in corpore vivente tanta inducitur fibræ siccitas, ut inde fieri posset Convulsio, vel Singultus, neque inducitur Convulsio defectu humidi sensim acquisito, quum experimur marasmo consumptos raro convelli: sed si subito evacuatione sanguinis (*Aph.* 169.) vel & alia quavis evacuatione largiore destruitur æquilibrium, tunc frequentissime Convulsio, vel Singultus generatur. Neque accuratio per exsiccationem chordarum com-

comparari potest Convulsioni, quum accuratio illa procedat in rebus mortuis, sed Convulsio est actio dependens a vita, quæ in rebus mortuis imitari nequit. Multo minus appropriatum est experimentum ex chordarum humectatione desumptum. Frangitur quidem chorda humectata tensa facilius, quam modice sicca, sed non accurtatur: Chorda enim in organis musicis ad certum tonum tensa si humectetur, tonum formabit profundiorum, & in machinis physicis experimur, chorda humectatione prolongari, non vero accurtari. Quamvis contraria fierent in hoc experimento, nondum tamen hæc probarent, Exsiccationem, vel Humectationem generare in nobis Convulsionem aut Singultum, quoniam sunt morbi ab influxu spirituum vitalium pendentes, quæ actiones comprobari nequeunt experimentis rerum mortuarum. Interim tamen vera manet observatio, nimia evacuatione, & repletionem generari Convulsionem, & Singultum: inde autem argumentari velle, omnem Convulsionem, & Singultum a duabus his duntaxat causis oriri, nimis absurdum mihi videtur, quum in Compendio nostro (T. 27. & 30.) multo plures, & frequentiores causas assignaverim, quæ nullo modo ad repletionem, vel inanitionem referri queunt. Propterea Inanitio, & Repletio hoc loco sunt accipiendi inter causas Convulsionem, & Singultum inferentes, ut passim in aliis Aphorismis, sed nondum ut tales, quæ solæ hos morbos inferre possint.

L I B. VI. A P H. XL.

305. Q Uibus ad hypochondrium dolores sunt absque inflammatione, his febris superueniens solvis dolorem.

I. M Edici magis quam Literatores in vero loco indicando per voces sunt occupati, quum accurate scire debeant, qualis pars intelligatur, ut unam partem non habeant pro altera. Hypochondrium proprie denotat locum sub cartilagine, & si in singulari ponitur, ut plurimum significat in ventre inferiore partem superiorem lateralem, & magis anteriorem, quam posteriorem sub cartilaginibus costarum in dextro latere, ubi naturalis est hepatis situs: sed Hypochondria notant tam dextrum quam sinistrum latus. Interdum vero apud Hippocratem tam sinistrum quam dextrum latus intelligitur, uti in hoc loco, ubi mihi videtur, non solum intelligi dextrum, verum etiam sinistrum latus, eo autem sensu, ut assignetur Dolor in sinistro, vel dextro latere, non vero in utrisque simul, quod aliter fieri potuisset, si dixisset Hypochondria. Quibusdam Hypochondria, & Præcordia significant easdem partes, sed Præcordia proprie notant partem mediam anteriorem inter Hypochondria sub cartilagine ensiformi, ubi præcipue sentiuntur dolores ventriculi, quomobrem hæc loca accurate sunt distinguenda. Quamvis situs externus Hypochondriorum proprie pertineat ad Pectus, quia habetur sub cartilaginibus costarum, referuntur tamen hæc loca ad ventrem inferiorem, quum diaphragma ita sit elevatum, ut contenta viscera in Hypochondriis pertineant ad ventrem inferiorem. In Hypochondrio dextro hæret Hepar, quod etiam ad sinistrum hypochondrium pertingit: in sinistro autem Hypochondrio hæret Lien. Sed utrumque Hypochondrium occupat Intestinum Colon, adeo ut ex naturali situ harum partium facile judicare possimus, quodnam viscus fuerit affectum: & inde quoque cognoscimus, multos dolores pectoris ab affectu his visceribus fieri posse, qui dolores perperam referuntur ad Leuitidem. Detexi enim in quibusdam cadaveribus, Diaphragma ita fuisse convexum, ut ventris inferioris cavitatis altius interne protenderetur, quam est papillæ locus externe in mammis.

II. Illa hypochondria si pe corripuntur doloribus, sed ut sciamus, num Febris in hujusmodi doloribus malum sit allatura, & num curanda sit: an vero bonum,

Que partes dicantur Hypochondria.

Qui de lares Hypochondria.

rum sine  
inflammatione, sol-  
vuntur se-  
bre?

178

# MEDICINÆ HIPPOCRATICÆ

Apb. 305.

& permittenda, duas cauteles adjicit Auctor, nempe ut sit sine inflammatione, & ut Febris superveniat, id est ut dolor, & Febris non incipiant eodem tempore, sed primo dolor, & deinceps Febris. Generalis est observatio dolorum, omnes dolores ab inflammatione, Erysipelate, & Bile acri natos cum febre incipere; in his, quo febris est vehementior, eo majus est periculum, quum febris illa sit signum eorum morborum, qui eo sunt majores, quo signa sunt vehementiora, ergo ex perdurante hujus febris nihil boni expectare possumus. Sed si febris superveniat, certi sumus, dolores Hypochondriorum non esse natos ex recentis morbis, sed ex aliqua causa morborum chronicorum, quæ frequentissima est materia cruda in aliquam corruptionem conversa. Si ergo materia cruda in nobis nata per febrem potest subigi, clare constabit hujus Aphorismi veritas. Talem exposuimus observationem in Convulsionibus (Apb. 51. V. Apb. 167. I.). In febre Cacochymica (Apb. 197. I.). Omnes enim materia Cruda deficiente corporis actione nata, subigitur motu vitali majore, qualis sit in febre superveniente. Unde monemur, nos non debere per refrigerantia, vel sanguinis missionem, vel per quædam antidota hanc febrem extinguere, sed eam permittere, aut medicamentis calefacientibus excitare febrem artificialem. Hoc tamen in praxi contrarium a multis fieri observo, qui omni ope conantur hanc febrem refrigerantibus extinguere cum summo ægi detrimento, sed præsentis infideli levamine.

## L I B. VI. A P H. XLI.

306. *Quibus suppuratum quid in corpore existens nullum sui signum prodit, his propter crassitudinem puris, aut loci, signum non exhibet.*

**I.** *Locis, vel puris crassitudo suppuratio nem inter nam occultat.* Quid sit Pus (Apb. 215. II.) ex qua materia formatur (Apb. 72. III.) & per quamnam actionem vitæ producitur, (Apb. 72. II.) superius demonstravimus. Si istud pus sit factum, & in quadam parte collectum, necesse est ut exeat: nam si ultra tempus contineatur, exuet suam blandam, & mistam indolem in corrodentem acrimoniam. Si ergo lateat profunde, ut vis vitæ non valeat istud per naturalia emunctoria eliminare, vel per morbosam aliquam aperturam factam, necesse est, ut Medicus, vel Chirurgus viam pandat. Hæc autem via artificialis fieri non debet, nisi sciamus, num pus eo in loco contineatur. Quod si locus pauca carne, & tenuibus integumentis sit testus, & Pus satis sit fluxile, facile detegi potest attractu, nam alterna pressio concitabit fluctuationem, & intumescet sine multa rubedine tali in loco detegeretur, Pus in tali loco contineri. Sed si locus multa carne sit testus, aut si hæreat in quadam corporis cavitate, attractu non valeamus fluctuationem concitare: neque fluctuat, si Pus ipsum nimis spissum est. Si utraque illa simul adsint, peritissimus Chirurgus pus invenire non poterit, num Pus subtus hæreat. Interim si maneat eo in locatu invenire non poterit, num Pus subtus hæreat. Interim si maneat eo in loco pus, omnes partes adjacentes sensim in putrilaginem converteret, atque denique liquatum pus venis absorptum, totam massam circulatoriam inficiet: quare admodum conducit ex probabili conjectura rimari, Pus intus latere, & dein ex adiunctis Phenomenis determinare partem, ut possimus ad Purulentiam totam internam curationem dirigere, & pus latens per factam aperturam elicere. Ut in his obscurissimis coniciamus, pus intus latitare, varii modi sunt adhibendi. Pus enim colligitur in quadam parte speciali post inflammationem, quæ abiit in purulentiam, quæ simul non fecit exitum puris per sputum, vel urinam. Si ergo constat, antecessisse febrem ardentem inflammatoriam, (Apb. 161. II.) quæ reddit urinam tenuem, & coloratam longo tempore, & dein commutatur in febrem remittentem (Conf. Comp. Tr. 47. XVII.) facile erit judicare, materiem phlogisticam

sticam abiisse in purulentiam. Corpus autem nostrum ita invenitur creatum, ut valeat pus sanguini circulanti mistum segregare, istudque eliminare separatim, vel per urinam, vel sputum, aut alicubi deponere, aut formetur Abscessus ex collecto tali modo pure, qualis depositio puris a medicis sæpe vocatur metastasis, sed potius Collectio vocanda. Si ergo tali in morbo purulento non invenimus Puris aliquam evacuationem, sed quadam in parte generari dolorem, gravitatem, anxietatem, vel tumorem, judicamus, ad partem eam pus colligi. Simili etiam modo ratiocinamur in Abscessu locali, qui pro magnitudine sua non fundit pus; & evanescere videtur sine critica, id est purulenta evacuatione, dum simul in quavis alia parte dolores, molestias, anxietates, & similia symptomata inferit, judicandum est, pus ex priori loco receptum, & ad aliam partem translatum esse, quæ mutatio metastasis purulenta vocatur. Denique si alicubi est ulcus, fistula, sinus antea fundens pus copiosum, nunc vero omnem evacuationem supprimens, judicandum tunc quoque, si in alio loco sentiantur dolores, & reliqua signa puris latentis, pus ad partem eam translatum fuisse. Certius est indicium, ex retento pure fieri metastasin, quam ex alia materia retenta, quum pus istius sit naturæ, ut nunquam ita assimuletur, ut sub forma sudoris, vel urinæ pellucidæ evacuari possit: quare si pus est intus, semper visibili evacuatione vel puris, vel ichoris exire debet: & quoties sub tali forma non exit, judicamus, Pus retineri, & ad aliquam partem deponi debere. Quæ tunc pars dolorem, tumorem, molestiam, & gravitatem accipit sine rationali causa, tali in parte judicamus collectum esse pus.

## LIB. VI. APH. XLII.

307. **I**N ictericis hepar durum fieri, malum.

**E**X quibus phænomenis cognoscimus Ictericum, superius (Aph. 172. l.) exhibuimus, ubi dein (Aph. 174. l.) demonstravimus, Ictericum ex febre cum hypochondrio dextro duro, non bonum esse, quia durities illa significabat, Hepar esse infarctum. Hoc nunc loco demonstrandum est, si in Ictericis Hepar durum fiat, malum esse. Ex textu patet, eum Ictericum non esse natum ex Hepate duro, quia Hepatis durities hic notetur tanquam symptoma superveniens: neque ille Ictericus nascitur ex Hepatitide, quia tunc durities, & Ictericus eodem tempore generantur, & febris nulla mentio invenitur, quæ in omni hepatitide adest. Ergo videndum, ex quibus causis nascitur Hepar durum, dum Ictericus est præsens, ut ex assignata causa præsagium malum formare possimus. Ictericus tunc semper nascitur, si Bilis naturalis exitus intercipiatur in duodenum, & regurgitare cogatur in venam cavam, ut ita totam massam sanguinis sua flavedine tingat. Igitur vesicæ fellæ est morbus, quæ interdum clauditur a calculo, vel spasmodica constrictione, qui morbi non faciunt tumere, vel indurescere hepar. Sed si nunc in dextro hypochondrio tumor durus sit, signum est, novum accedere morbum, qui per se factus malus est, & qui sua intumescencia valet exitum Bilis ita sistere, ut omnis exitus sit interclusus, qui referari nequit manente Hepatis tumore duro. Quia vero omnis durities hepatis curatu est difficilis igitur nullam fere spem curationis promittere possumus.

## LIB. VI. APH. XLIII.

308. **Q**ui lientia a dysenteria corripiuntur, his longa superveniente dysenteria, hydrops supervenis, aut lientaria, & pereunt.

380  
Lienosi qui  
dicuntur.

**Q**Uum Veteres ignorarunt Lienis usum, multa præpostera Lieni in morbis adscriperunt, adeo ut vix constet, quinam morbus proprie Lienosus sit vocandus: communi autem consensu talis Lienosus est, qui in sinistro hypochondrio laborat tumore aliquo a Liene magis tumente, & infarcto. Quum tali in infarctione Splenis cesset omnis ejus functio, & partes adjacentes a tumente Liene premantur, propterea multi sunt morbi, qui partim pendent a destructo usu Lienis, partim a compressis partibus adjacentibus: unde tam varia citantur in Lienosis symptomata, quæ sæpe magis a compressis partibus vicinis dependent, quam ex abolito Lienis usu. Non melius possumus invenire Lienis usum, quam si examinemus ingredientem, & excurrentem sanguinem. Invenimus sanguinem allatum per arteriam splenicam, eandem naturam concrescibilem habere, uti in reliquis arteriis; sed qui exit sanguis, ita invenitur solutus, ut stagnans non concreseat, ille omnis sanguis ita præparatus effunditur in venam portarum transiturus per hepato, ut dein in hepate conficiatur, & separetur bilis. Igitur Lienis usus primarius est ita solvere sanguinem, ut in lentissimo motu per venam portarum, quasi stagnando non concreseat, & præbere materiem, ex qua hepar præparare, & separare potest Bilem bonam. Si nunc Lien sit infarctus, obstructus, & tumens, illa sanguinis solutio fieri perfecte non potest, & propterea manet sanguis venæ portarum magis coagulabilis, qui facile ipsum hepar etiam obstruere potest: neque satis prævia est facta materiæ bilis præparatio, unde generatur bilis morbosa, plerumque nigrioris coloris. Hinc functiones a bona bile pendentes depravantur, ut patet ex malo elaborato chylo, & tandem tota massa hæc livefcente materia inquinata, in cute aliquem livorem atque cachecticum colorem præbet. Unde Hypochondrii sinistri tumor, mala alimentorum ingestorum confectio, & color sublividus inter præcipua Lienosi symptomata sunt recensenda.

Cur Dysenteria longa in Lienosis mala?

**II.** Ex Dysenteriz descriptione (Aph. 134. l.) satis constat, si veniat in Lienosis, eam generari ab humore acris ad intestina delato, qui intestina stimulando cogit in perpetuam defectionem cum ventris torminibus. Sed ut sciamus, num omnis humor ille acris sit ablati, cessare quoque debet Dysenteria, quæ ab affluxu hujus humoris pendebat. Verum persistit Dysenteria, ergo signum est, non cessare confluxum hujus humoris acris, quare in Liene est perpetua scaurigo cum humorem præbens, quod malum est. Hoc autem malum signum non habetur, si Lienosis Dysenteria superveniat, ut infra constabit. Inde in Coacis prænotionibus, (H. a. 507.) *Dysenteria non longa splenicis commoda est, longa vero mala: desinente enim, si Hydrope aut Lienteria fiant, lethale.*

Lienosi dysenteria longa laborantes. nationis nulla spes est, nam per talem evacuationem continuam summopere debilitabitur corpus, omnesque humores boni ejicientur. Si tunc insuper accedat Hydrope vel Lienteria, signum est, increvisse Lienis tumorem, ut etiam reditus lymphæ in sanguinem intercepti, & chyli via sit intercepta, quod facile ex ætatomicis demonstratur. Omnis enim lymphæ ex ventre inferiore ducitur in cisternam lumbarem, ut redeat per ductum thoracicum in sanguinem circularem. Si vero Lienis tumor ita increvit, ut cisterna Lumbaris a Liene compressa non transmittat lympham redeuntem, necesse est, ut illa colligatur in ventre inferiore, & pedibus, atque producat Hydropem, qui morbi augmentum declarat; hæc persistens causa comprimens, & simul aucta tantam facit denique compressionem, ut totum lymphæ circuitum intercepti, & ita tandem mortem inferat. Simile quoque signum est Lienteria (Aph. 101. IX. & Aph. 266. l.) nam si tumens Lien premit cisternam lumbarem, quæ transmittere debet chylum in ductum thoracicum, vasa lactea jam chylo turgescencia nihil amplius imbibunt, sed confectum

fecum chylum in cavo intestinorum relinquunt per alvum exonerandum, inde copiosa chyli dejectio sine ullo levamine, sed arguens chyli viam esse interceptam. Ex tali denique chyli interceptione necessario peribit homo. Quare illæ Veterum in morbis observationes comprobantur hodiernis anatomicorum inventis, sine quibus ex suo fonte hæc præfagia non potuerit intelligi: propterea omnes Commentatores, antequam detecta fuit hæc circulatio, ita laborarunt, ut invenirent rationes horum signorum.

## L I B. VI. A P H. XLIV.

309. *Quibus ex Stranguria ileus supervenis, in septem diebus pereunt, nisi, febre superveniente urina abunde fluxerit.*

**I** Omnes Commentatores vehementer laborant in expositione hujus Aphorismi, ita quidem Galenus insurgit, ut non credat, hunc morbum unquam visum fuisse ab Hippocrate, sed ab alio quovis hunc Aphorismum intrusum fuisse, quoniam talia fieri non posse dicit, quæ hic Aphorismus complectitur. Hanc litem nostram non faciemus, videbimus dumtaxat, quali modo eadem causa, quæ Stranguriam generat, etiam inferre possit Volvulum. Differentiam ponunt inter hunc Aphorismum, & alterum, qui continetur in Coacis, (H. a. 568.) ubi dicitur *In Stranguria*. Sed poto eandem esse sententiam, quia In, & Ex Stranguria eadem est significatio, quum Ex Stranguria in hoc loco non designatur, Stranguriam abisse in Volvulum, quod satis patet, quoniam dum Volvulus nascitur, remaneat Stranguria, sed si quis Stranguria laboret, & insuper corripiaur Volvulo, tunc peribit septem diebus. Utriusque morbi superius dedimus definitionem, & demonstravimus, Stranguriam generari posse ab acrimonia succi præteritum, & aliarum viarum urinae (Aph. 110. IX.) Item Volvulus (Aph. 101. XIV.) generari potest ab acrimonia succi intestinorum. Aut si hæreat in succo nervoso quædam acrimonia, illa si deponatur in urinae vias, Stranguriam infert, & si feratur ad intestina fiunt tormina, & motus intestinorum inversus, qui morbus vocatur Volvulus, ut motus inversus ventriculi solius dicitur vomitus. Inde non ita est absurdum, ut, si acrimonia succi nervorum feratur per nervos in vias urinae, idem ille humor in eodem plexu nervi formatus etiam feratur per alium nervi ramum ad mesenterium, & intestina, in quibus etiam, & ventriculo naturalem motum peristalticum irritando invertat, quo omnia intestinorum contenta rudantur sursum versus ventricolum, qui dein eadem vomitu ejiciat.

II. Satis itaque comprobavimus, eandem causam, quæ generat Stranguriam, etiam generare posse Volvulum, sed quoniam causa non est levis, quæ valet intestinis non solum inferre vehementes dolores, verum etiam motum inversum; igitur si Volvulus supervenit, scimus, magnam copiam humoris acrioris esse in corpore, qui nunc etiam ruit ad intestina, ubi evacuari non potest, & in viis urinae, per quas erat evacuandus, parit evacuationis difficultatem: Igitur retentus ille humor sensim fit acrior, concitans ingentem motum inversum per totum tractum intestinorum, & per ventriculum, quo motu valido percutiatur, cum effusione omnium quæ per os ingeruntur, & intestina atque ventriculum confluent, summa nascitur debilitas exhaustis spiritibus, & defectus humorum continua violenta illa evacuatione. Igitur mirum non est, si homo sit impar ferendi hæc omnia per septem integros dies, ut prius succumbat vehementia morbi. Hinc non dicit Auctor septimo die perire, sed in septem diebus, id est raro persistere possunt ultra septem dies.

III. Eum tamen morbum periculosissimum, qui intra septem dies mortem min-

Quomodo ex Stranguria Volvulus?

Cur septem diebus pereunt, quibus ex Stranguria supervenit Volvulus?

Quomodo liberamur?

382 *MEDICINA HIPPOCRATICA* *Apb. 309.*  
*tur, si febris* nabatur, observavit curatum fuisse a febre superveniente, & urina abunde fluente. Vix credere possunt, febrem adferre posse lavamen, qui statuunt ex sola inflammatione intestinorum generari Volvulum: neque concipere possunt alvi faeces obstruentes intestina, vel nodum intestinorum curari posse a febre superveniente, aut per urinam copiosè fluentem: sed si statuamus acrimoniam crudam in succo nervoso, tunc talis est frequens in aliis etiam morbis observatio; quum motus vitalis major, qui hucusque non adfuit, accedens humorem illum acrem subigat, & ad naturalia emunctoria ducat. Illa autem febris accedens si simul non faciat copiosam urinæ evacuationem, non curaret dirissimum illum morbum, sed tunc esset solum signum. Volvulum non fuisse natum ex inflammatione intestinorum, cui ab initio abfuisset febris, sed ex materialia acri, quæ irritando tandem febrem excitat, Volvulum, & Stranguriam producta fuisse. Si igitur motus vitalis instigatus hunc succum nervosum acrem commoveat, eumque ducat ad renes, & sub urinæ copiosæ forma eliminet, certe spes est, talem hominem liberari posse ab illa irritante acrimonia. Si medicus tali in casu vocaretur, antequam urina fluere incipit, admodum difficile foret veram invenire indicationem curativam. Puto tamen nos imitari debere monstratam a natura viam, nempe dare medicamenta diuretica calefacientia, quibus concitatur febris, & promovetur urinæ fluxus. Id autem observamus, nos non semper idem medicamentis posse præsari, quod natura faciat ad conservationem suam; nam quamvis promoveamus urinæ fluxum, non tamen certo sequitur, eum humorem acrem per urinæ vias eliminari, quod tamen fit, si sponte talem evacuationem molietur. Hoc autem verum est, nos non posse propius accedere ad veram curationem, etiamsi semper non ex voto bonum effectum fortiaur.

# L I B. VI. A P H. XLV.

310. *U*lcera quæcunque annua fiunt, aut longius tempus occupant, necesse est os abscedere, & cicatrices cavas fieri.

*Ulcera vetusta.* *I.* Quid Medici, & Chirurgi Ulcus vocent (*Chir. 1293.*) & quot variz inveniantur species, exposuimus (*Chir. 1295.*): ergo restat videre, quando dicantur Ulcera vetusta; & ex quanam causa tam diu durare soleant. Omnia Ulcera, quæ simul aliquam consumptionem partium facere, satis longum tempus exigunt, antequam pars amissa nova carne sit oppleta, & cicatrice obducta: hoc autem in unius vel alterius mensis spatio absolvitur, sed si ulcera talia ultra annum, vel & diutius aperta maneant, & interdum etiam majora si fiant quam in principio: vel quæ cicatrice obducta, sine læsione externa denuidentur iterum, & excaventur, talia omnia vocantur Vetusta, & arguunt adesse causam, quæ consolidationem impedit. Tales multæ sunt causæ: nam si stagnans in marginibus humor non convertitur in Pus, sed in Ichorem, vel Sordiditatem, Ulcus carne impleri nequit, neque cicatrice obduci. Idem humor morbosus acris ex toto corpore in ulcus confluens bonam consolidationem intercipit. Denique putridus, ichorofus humor in partibus vicinis natus per ulcus evacuandus non solum ulceri consolidationem impedit, verum corrodendo istud magis latum, & profundum facit. Quamvis ulcus ex tali causa natum obducatur cicatrice, humor ille interim intus retentus, stagnando acrior factus, tale ulcus expectare facit.

*Ulcera vetusta an semper os abscedere statuant?* 11. Necesse est, inquit Auctor, Os abscedere. Credo equidem Auctorem hoc sæpe observasse, uti etiam nos, sed videmus etiam ulcera multorum annorum, in quibus os incorruptum mansit: quare non ita absolute pronunciare possumus, os adiacens esse corruptum; si Ulcus habeatur vetustum. Periculum tamen est, Os corrumpi posse ab adjacente Ulcere vetusto. Humor enim ille acris consolidatio-

dationem impediens facile potest simul corrodere perioſteum, quo Os privatum cariem contrahit; poteſt etiam ille humor corruptus Offi communicari, & ita inficere ejus medullam, ut os corrumpatur. Sed ſi Os ſubjacens corruptum ſit, tale ulcus tarde ad curationem deducitur, quum Os in ſuis cellulis rigidis humore corrupto impletum, non facile poſſit eum evacuare humorem, rigiditas enim illarum partium extruſionem, & expulſionem materiæ corruptæ impedit, quæ facilius fieri poteſt in partibus mollioribus.

III. Magis autem conveniens eſt, ut Ulcera vetuſta relinquant cavas Cicatrices, & raro perfectæ erit curatio in hujusmodi Ulceribus, niſi habeatur excavata Cicatrix. Nam portio offis carie conſumpta non renaſcitur: inde eo in loco non ſolum relinquitur in Offe fovea, cui cicatrix firmiter adhæret, verum etiam partes molles in eo loco per diuturnum ulcus conſumptæ magis excavatam cicatricem relinquant. Si vero os ſimul non fuerit corroſum, multæ tamen fibræ carneæ conſumptæ a diuturnitate Ulceris, quæ poſtea non renatæ, excavatam partem relinquant.

Cur ulcera  
vetuſta re-  
linquant  
cicatrices  
cavas.

### LIB. VI. A P H. XLVI.

311. *Qui Gibbi ex aſthmate, aut tuſſi fiunt ante pubertatem, pereunt.*

I. **G**ibboſitatem ex ſpinæ dorſi incurvatione provenire, cuius notum eſt. Qui cum tali morbo naſcuntur, vel deinceps generatur per cauſam violentam externam, ſatis diu etiam vivunt, & decrepitem ſenectutem attingunt, quod communi obſervatione firmatur: hi autem ut plurimum aliquo pulmonis aut reſpirationis virio laborare ſolent, cum peſtoris cavitas male figurata minus amplum pulmonibus ſpatium relinquat, Quibus autem ex Aſthmate vel Tuſſi ante pubertatem ſit Gibbus, hi perire ſolent ante pubertatem, vel non multo poſtea. Uterque ſenſus ex Textu elici poteſt, qui enim dicit, gibbum fieri ex Aſthmate vel Tuſſi, eumque ante pubertatem perire, intelligit mortem fieri, antequam talis gibboſus pubertatem attingit. Si vero dicatur, qui Gibbi ex aſthmate vel Tuſſi fiunt, ante pubertatem pereunt, is intelligit, eum hominem perire non diu poſt adeptam pubertatem. In utriſque ante pubertatem naſcitur Gibbus, ſed in priore caſu ante pubertatem, in poſteriore autem paulo poſt initium pubertatis, quod in ſenſu non magnam differentiam præbet. Meretur igitur inquirere rationem, cur Gibbus ex his cauſis præmaturam magis mortem præſagiat, quam ſi Gibboſitas generetur ex nativitate, vel per cauſam externam. Aſthma (Aph. 161. XII.) & Tuſſis (Exerc. de Tuſſi) duo ſunt morbi pulmonum, in quorum primo inhibetur ſeu moleſtetur redditur alterna dilatatio pulmonum, in altero autem pulmo irritatus vehemens ejiciendi conameu edit. Neque ex hoc neque illo morbo patet, ſpinam dorſi incurvari debere: ſi autem ante pubertatem ex Aſthmate, vel Tuſſi incurvetur ſpina dorſi, admodum verſimile eſt, horum morborum in pulmonibus, & ſpina dorſi æconomem eſſe cauſam, eamque tam validam eſſe, ut valeat ſenſim perturbare naturalem figuram offium in ſpina dorſi, ex qua figura mutata non parum læditur medulla in hac ſpina contenta. Quoties vero morbi, qui debilitatem arguunt, uti eſt mala conformatio offium, circa pubertatem (Aph. 70. Aph. 107. III.) quando ſummus vigor eſſe debebat, admodum incrementum ab interna cauſa, tale incrementum admodum malum præſagium præbet. Dein mala peſtoris conformatio, & pulmonis valida affectio in ætatis eo tempore, quando Phthiſi (Aph. 202. I.) admodum ſunt obnoxii, rarum eſſet, ſi eo morbo, ex quo poſtea moriuntur, non corripereantur.

LIB.



## L I B. VI. A P H. XLVIII.

312. *Quibus vena sectio, aut purgatio conducit, his vere convenis venam secare, aut purgationem facere.*

Curatio  
præserva-  
toria.

**I.** Tres species curationis inveniuntur. Prima est, quæ adhibetur in corporibus sanis, in quibus expectamus morbum ex inevitabili causa, vel in quo corpore morbus est certo tempore rediturus, quemadmodum in podagricis: quando tunc per certa auxilia prævenimus morbum, vel paroxysmum instantem, illa Curatio dicitur Præservatoria, vel Prophylactica. Altera est Curatoria quæ morbum præsentem tollit. Denique in morbis non curabilibus quædam adhibetur Curatio, quæ mitigat urgentia symptomata, morbique progressum inhibet, non vero ipsum morbum tollit, hanc vocant Curam Palliativam. Ex his sola prior in hoc Aphorismo traditur: supponit enim corpus sanum, quod certo anni tempore expectat morbum, in quo vult imperare Alvi ductionem, vel Sanguinis missionem, ut instantes morbi præveniantur. Experientia comprobatum est, quosdam morbos venæ sectione, alios autem purgantibus melius præveniri, vel quavis alia medicatione. Ex his solummodo eligit Auctor solos istos morbos instantes, qui solent præveniri Purgatione, vel Sanguinis missione, & quoniam hæ curationes variis anni temporibus institui possunt, indicare voluit anni tempus opportunissimum ad eam medicationem faciendam, non ut reliqua tempora excludat, si necessitas urgeat, sed ut indicet, nos eo tempore certiori effectû posse promittere curationem Prophylacticam. Inde quibus, inquit, Venæ sectio aut Purgatio conducit, his vere convenit Venam secare, aut Purgationem facere. Ergo morbi futuri prius sunt determinandi, in quorum Prophylaxi medici solent cum successu adhibere Venæ sectionem, vel Purgationem: dein si hoc constat, illa auxilia sunt potius adhibenda vernali, quam alio tempore anni. Igitur videndum, quinam morbi præveniuntur Venæ sectione aut Purgatione, & cur deinde illa auxilia vere sunt adhibenda.

Quibus ve-  
re conducit  
venam se-  
care?

**II.** Dum præcedens Hyems aeris frigidityte accumulavit multos in corpore collectos, & excrementitios, & etiam morbosos, subsequens Ver stagnantes, & lentescentes suo calore majore movet, dispergit, & solvit, multi ex hac mutatione inducta nascuntur morbi, (*Apb. 99.*) qui præveniri potuissent debita, & satis matura adhibita curatione præservatoria, qua tollitur vel abundans, vel corrigitur id alienum, prægressa hyeme collectum, antequam in verum morbum erumpat. Hac ergo Curatione præservatoria præveniuntur morbi vernaes. Idem, quia subsequitur Æstas, quæ suo majore calore, & naturali anni mutatione suos proprios producit morbos, (*Apb. 100.*) debita adhibita curatione circa finem veris, isti quoque morbi præveniuntur. Omnes autem isti recensiti morbi neque sola Sanguinis missione, neque sola Purgatione per alvum præveniri nequeunt, sed pro natura sua diversa varium genus auxiliorum exigunt: itaque ex memoratis debemus eligere istos, qui venæ sectione præveniri debent. Sanguinis missio nihil aliud facit, quam solam minuire copiam massæ communis sanguinis circulatorii, qui enim educitur per venam sanguis, non est peioris conditionis, quam qui relinquitur. Si ergo sanguis morbosam materiem admixtam habet, non valet sanguinis missio elicere solam materiem malam, & relinquere sanguinem bonum, non enim fit separatio boni a malo, dum sanguis ex vena secta fluit. Igitur Venæ sectio solos illos morbos prævenire potest, qui præcedente Vere, vel Æstate ex sanguinis abundantia sunt propullulaturi. Si summo Vere sit facienda sanguinis missio, ut curatio præservatoria ex morbis Vernaliibus, illi sunt eligendi,

di, qui sanguinis prægressam abundantiam arguunt. Uti Sanguinis fluxiones (Aph. 99. V.) Angina (Aph. 99. VI.) Pustulæ ulcerosæ, (Aph. 99. XII.) Phymata (Aph. 99. XIII.). An autem Articulorum dolores, quos Podagram vocant, uti præcipit etiam Galenus, venæ sectione vernali tempore sint præveniendi, vehementer dubito, quum his temporibus quidem experiamur, a venæ sectione celebrata summo Vere paroxysmum solito tempore non rediisse, sed sequens tunc paroxysmus in corpore ita magis debilitato multo magis productus fuit, & majoris periculi. Neque invenio veram rationem, qua potuisset Venæ sectio tollere materiem podagricam, quum non sit morbus ex sanguinis abundantia, quæ sola venæ sectione tollitur, sed morbus ex acrimonia speciali, quæ missione sanguinis non tollitur, ut superius monuimus. Hinc Venæ sectio detrahens vires inhibere potest maturitatem materiæ podagricæ, ut debito tempore non erumpat, sed eadem diutius retenta, & nova simul accumulata eo magis, & gravius deinceps sæviet. Progrediente autem Vere tandem expectamus ex sanguinis abundantia morbos æstivos, uti febres Continuas Ardentes (Aph. 100. II.), Ophthalmias siccas (Aph. 100. VI.), & Sudamina (Aph. 100. X.). Quos omnes conduceret prævenire Venæ sectione, ne sanguis abundans in corruptelam conversus, amplius venæ sectione patiatur emendari. Quibus ergo in corporibus adsunt signa plethoræ, præcessit victus lautus, opiparus, & vita otiosa, quique solent Vere, vel initio Æstatis hujusmodi morbis corripri, admodum his conducet satis mature celebrare venæ sectionem, ad præveniendos imminentes hos morbos.

III. Plura observanda sunt in Alvi ductione, quam in memorata missione sanguinis; his enim medicamentis non solum minuere possumus copiam totius massæ, verum etiam eliminantur intestinorum contenta, omnesque humores, uti succus ventriculi, intestinorum, bilis, & forsitan etiam sanguis ex vena portarum, per quos humores evacuatos varii possunt præveniri morbi; atque fit simul derivatio a cure versus intestina. Eligemus igitur ex morbis Vernalibus, & Æstivis quosdam, in quibus videbimus, quantum conferant purgantia ad dictos morbos evitandos. Mania, & Melancholia Vere rediens (Aph. 99. III.) evacuatione facta per alvum materiæ in vena portarum prius collectæ sæpe prævenitur. Epilepsia autem (Aph. 99. IV.) raro his præveniri potest, quum ut plurimum vitio nervorum inducatur, quorum morbi alvi ductione intendi solent. Sanguinis fluxiones (Aph. 99. V.) ratione generalis diminutionis, uti per sanguinis missionem præveniuntur. Angina (Aph. 99. VI.) tam ex diminutione generari, quam ex derivatione ad intestina a purgante dato ut plurimum prævenitur. Gravædines (Aph. 99. VII.) potius largiore perspiratione, & dato sudorifero præveniuntur, quam per purgans, si oriantur ex prohibita perspiratione, ut fere semper fit. Ravedines, & Tusses (Aph. 99. VIII.) a dato purgante magis aggravantur, quum morbi pectoris alvi fluxu intendi soleant, & sistatur sputi excretio, quæ utilissima est in his, sed diuretica magis convenient. Leprem (Aph. 99. IX.) Impetiginem (Aph. 99. X.) Vitiliginem (Aph. 99. XI.) Pustulas ulcerosas, (Aph. 99. XI.) & Phymata (Aph. 99. XIII.) purgantibus præparatis mercurialibus iunctis præveniri, citatis locis indicavi. Iisdem quoque purgantibus conati sunt Arthritidem & Podagram Vere redeuntem prævenire multi. Hos autem morbos ita inter se convenientes inveniri, ut a quibusdam confundantur, probant practicoꝝ libri, istos autem in natura materiæ differre, demonstravi supra (Aph. 94.). Experientia didici, Arthriticos dolores aliquo modo præveniri posse datis purgantibus vernali tempore, multo autem melius per Diaphoretica, quæ humores istos acres per cutim eliminant. Sæpe etiam idem tentatum fuit in Podagricis, & experti sunt præsens levamen, sed nõs scit magnus ille Sydenham experti sumus, materiem Podagricam per intestina eliminari non posse, paroxysmum quidem eo tempore non

An con-  
ducatur po-  
dagricis.

Quibus  
Vere con-  
ducit al-  
vum du-  
cere?

An con-  
ducant  
Arthriti-  
cis & po-  
dagricis.

fuisse abortum, sed deinceps eo graviore paroxysmo plestebatur non sine discrimine vitæ, atque magis erat æger ille cachecticus, œdematosus: igitur nemini Auctor esse volo, ut suadeat in Podagricis alvum esse ducendam ad præveniendam Podagram. Morbi autem multi æstivi, qui proveniunt ex cacochylia, vel bile corrupta, vel ex materia melancholica retenta, calore movenda (App. 110.), uti tertianæ plurimæ, quartanæ æstivæ, vomitus, alvi fluxus, ut plurimum præveniuntur repetita alvi ductione, qua materia corrumpenda, aut corruptela suscepta e corpore eliminantur.

## L I B. VI. A P H. XLVIII.

313. **L**ienosis dysenteria superveniens, bonum.

I. **H**ic Aphorismus contrarius videtur priori (App. 308.) ubi tradit, si superveniat dein Hydrops, aut Lienteria, ægrum perire, sed illa tamen habetur differentia, quod in hoc loco agat de Dysenteria superveniente, quæ levamen adfert, & in priore de Dysenteria continuata. Si enim quædam fiat evacuatio cum tumoris, vel morbi diminutione, signum est, morbi materiem hac via evacuari; sed si eadem evacuatio perseveret sine præcedentis mali levamine, signum est, in priore loco esse scaturiginem perpetuam, quæ tandem omnes corporis bonos humores, & vires exhauriet. Ita etiam Dysenteria, id est alvi copiosior egestio cum dolore, notat fieri evacuationem humoris acris: qui si ex Liene veniat, & non relinquat Lienem corruptum, evacuato omni illo humore, sponte cessabit ille alvi fluor & dolor, & potest ita restitui perfecta sanitas. Secus vero si ille fluxus continuetur, ut supra exposuimus, solummodo illa difficultas restare videtur, per quam viam humor ex Lienosis per alvum possit exonerari, quum nulla inveniat viam ex Liene ad intestina, sed naturalis sit via versus hepar. Concedendum utique est, in sanis sanguinem semper talem servare cursum, & nullam esse viam naturalem ex Liene ad Intestina tendentem; sed in morbis non semper humores solitum servant cursum, non raro per idem vas motu retrogrado urgentur: ita ex ventriculo ad intestina, ex iis versus anum naturalis est contentorum directio, sed in vomitu, & vulvo contrarium experimur. Ita etiam vena portarum valvulis carens accipit sanguinem ex venis meseraicis, & ducit eum per hepar: sed si hæc vena Melancholica materia turgent, non raro motu retrogrado receptum sanguinem urgent ad venas hæmorrhoidales, & meseraicas in intestinis, ubi contentum sanguinem evomunt. Hac via igitur motu inverso non est absurdum humorem acrem in Liene confectum, ad venam portarum prius delatum exonerari posse, & quia acris est, dejectionem dolorosam infert. An vero ex hac naturæ directione monemur, nos debere in Lienosis dare purgantia, non sine ratione statuitur, quia natura nobis demonstrat viam. Id autem discriminis est, quod natura tunc molitur, si sibi apertam paravit viam, sed dum datur purgans, hanc simul non possumus expeditam nobis viam comparare. Verum hoc egregium inde habemus, nos non debere diu continuare in usu purgantium, cum dysenteria talis continua hydroperem inferat, & mortem.

## L I B. VI. A P H. XLIX.

314. **Q**ui podagrici morbi sunt, hi sedata inflammatione in quadraginta diebus decedunt.

I. Ut

**I.** **U**T semina plantarum singularia suum proprium tempus servant tempus germinandi, crescendi, & florendi, qui terminus temporis non omnibus seminibus est communis, ita etiam semina morborum sua specialia tempora crescendi, & agendi servant; ut non valeamus ex periodo morborum inflammatoriorum cuiusvis morbi tempora limitare. Habet quidem Podagra multa communia inflammationi, sed in sua natura a morbo inflammatorio maxime distat: nunquam enim observare potui, Podagram etiam sevisissimam abesse in purulentiam, quæ commutatio inflammatoris est frequentissima: neque vidi, particularem inflammationem abesse in calculosam articularum excrescentiam, quæ concretio tamen nodosæ Podagræ dedit nomen. Quare morbus Podagricus est morbus specialis ab omnibus morbis distinctus, & non necesse est, ut dies suos criticos faciat eodem tempore cum morbis acutis, quorum ultimus terminus statuitur quadraginta dies. Ex hac forsitan doctrina Auctor, & qui eum secuti sunt, deduxerunt hunc temporis terminum. Debemus autem ex ipsa observatione Podagricorum hoc tempus terminandi desumere. Si propriam praxim consulo, & Sydenhamum, qui non ex hypothese accepta, sed ex observatis in aegris nobis reliquit monumenta, invenio in levissima podagra, quæ prima vice occupat articulum pollicis pedis, in corpore ceteroquin sano, & robusto, dolorem abesse intra triduum, quibusdam intra septimanam, relicta quadam molestia in motu, quæ sensim quoque evanescit. Quos vero sæpe aggressa fuit Podagra, hi jam in hoc, jam in illo articulo vexantur dolore, ut totus ille paroxysmus ex multis minoribus quasi congregatus, ultra mensem unum, vel alterum extendatur. Denique in vetustissima Podagra, quæ corpora admodum debilitavit, minuitur quidem severitas doloris, sed longitudine compensatur, ut isti per integrum interdum annum vel leviori, vel graviori tormento doloris, vel anxietatis vexentur, nisi quod quibusdam mensibus æstivis utcumque valetudinariis, & misere vivant, destructis fere omnibus articulis. Igitur terminus temporis ab Auctore propositus non admodum respondet hodiernis observatis, sed desumendus est ex propria morbi historia, quæ præcedentia a nobis allata discit.

Quo tempore finitur morbi podagræ?

## L I B. VI. A P H. L.

315. **Q**uibus perscissum fuerit cerebrum, his necesse est febrem, & bilis vomitum supervenire.

**I.** Superius notavimus cum Auctore, Cerebri seu Encephali vulnera lethalia esse (Aph. 283. III.) & hujus rationem dedimus: hoc nunc loco duo symptomata notat, quæ fere semper nascuntur ex Cerebro læso, nempe Febrem, & Bilis vomitum. Hæc autem symptomata seorsim perperna non sunt talia critica, ut quoties habeantur, indicent mortem esse expectandam: observaverunt enim Chirurgi, & etiam Ruyschius, homines fuisse servatos post capitis concussionem, quibus supervenerunt hæc symptomata, neque omnis Vomitus Bilis cum febre indicat semper, læsum esse Cerebrum. Meretur ergo inquirere causas hæc symptomata inducentes, ut inde aliquid certi deducere possimus; & præterea inquirere, num omnis Cerebri læsio hæc semper symptomata inferat. Nunquam a causa externa secante lædi potest Cerebrum, quin simul perscindantur Meninges, quarum læsio simili modo, ut læsiones aliarum membranarum in principio paulo majorem motum faciunt ex laceratione hac, dein sensim ille motus fit violentior, ut pars illa læsa circumquaque inflammetur: perleverante illa causa sensim totum organum motus vitalis in consensum trahitur, ut fe validius movere incipiat: quare ex omni læsione membranarum sequitur motus circulatorius major,

Ex Cerebri vulnere febris, & bilis vomitus.

qui a causa tali concitatus vocatur Febris. Hoc quam maxime fit in læsis, & irritatis meningibus, quia est membrana, cui omnes nervorum capsulae sunt continuatae, & quoniam meningum agitatione non solum totum organum vitale in consensum trahitur, veluti reliquæ etiam membranae inflammatae, verum adiacens Cerebrum, & Cerebellum ab inflammatione meningum magis, quam inflammatione aliarum membranarum, agitur, ut inde major sit ratio motus circulatorii aucti, quam ex inflammatione aliarum membranarum. Inde confectum est in vulneribus encephali, ut post unum alterumve diem accendatur febris. Interdum vero validiore meningum agitatione generatur Convulsio, vel Delirium, dum nempe ita Cerebrum commoveatur, ut omnis æquabilis circulatio Cerebri turbetur, vel si simul a meningibus nimis constrictis, vel compressis fiat spirituum effluxus, non raro generatur sopor, apoplexia, vel paralysis. Inde Febris unum est ex symptomatibus læsi Cerebri, sed & possunt multa quoque alia accedere symptomata, quæ hoc loco noluit recitare Auctor. Bilis autem vomitus non ita necessario sequi videtur, quoniam fit a motu inverso ventriculi, organi alicujus remoti a Cerebro. Sed inter motum vermicularem ventriculi, & Cerebrum tantus observatur consensus, ut ex læsione Cerebri tanquam pathognomicum signum habeatur bilis Vomitus. Ad Bilis vomitum duo requiruntur: primo ut vesica fellea se exoneret in duodenum, non ex pressione ventriculi pleni, sed per motum in propriis suis fibris: & alterum est, ut ventriculus, & intestinum duodenum simul laborent motu inverso; nam ita extruditur bilis ex Vesica fellea in duodenum, ducitur in cavum ventriculi, & dein vomitu redditur. Igitur nihil aliud est hoc loco demonstrandum, quam quod ex læso Cerebro fieri possit motus inversus harum partium. Hoc autem facillime ex nervorum cursu demonstrari potuisset, sed quoniam nulla est corporis pars, quin nervos habeat ex encephalo, non possumus hanc theoriam huic parti magis, quam cuivis alii applicare. Sed quoniam invenimus, nullam partem tam facile consentire, quam ventriculus, & vesica fellea læso Cerebro, hanc observationem inter specialia criteria Cerebri læsi locare possumus. Interim tamen ille bilis vomitus non tam absolute est capiendus, ac si non potuisset fieri ab ulla alia causa, quum omnes causæ reliquæ, quæ motum inversum his partibus inducere possunt, quæ multæ sunt, etiam Bilis vomitum inferre solant. Summum dubium aliis videtur nasci, cur Bilis, & non pituita, vel aliorum humorum generetur Vomitus. Hoc autem mihi non multum momenti videtur; Bilis enim suo colore flavo se manifestat magis, quam reliqui humores pellucidi, qui simul ejiciuntur; Bilis satis magna copia collecta invenitur in vesica fellea, qualis locus nullus humoribus invenitur; nullus etiam humor tanta copia fecernitur, quam bilis, qui in ventriculum potuisset fundi, & per vomitum reddi, totum enim Hepar magnum bilis secretioni est destinatum. Hinc in principio vomendi redduntur ventriculi contenta, succus stomachicus, & pancreaticus, pergente tandem vomitu, qui humores parva quantitate respectu bilis interim fecernuntur, & qui secreti sunt, bilis flavedine tinguntur, quidquid redditur postea, mera bilis videtur. Possumus ergo ex his omnibus colligere, Febrē, & Bilis vomitum numeranda esse inter Cerebri læsi signa, sed quæ etiam possunt ab aliis causis generari, atque multo plura quoque fieri symptomata a læso Cerebro provenientia, ut non fit uni alterive signo confidendum; sed plura conjungenda sunt, priusquam terti sumus, Cerebrum esse læsum.

316. **Q**uibus sanis dolores derepente fiunt in capite, & statim muti fiunt ac stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit.

**I.** Capitis dolorem ex variis causis oriri posse, supra (Aph. 275.) observavimus, præterea ex ebrietate prægressa aliquis relinquitur capitis dolor: ut ergo certam speciem doloris definiat, duo criteria adijcit, antequam ex subsequentibus symptomatibus conclusionem formet. Primum est, ut corripit hominem sanum, scilicet talem, in quo non detegitur ante doloris invasionem aliquis morbus, atque talem, qui non laborat crapula. Alterum est, ut fiat derepente, sine ulla prophasi, vel cognita aliqua causa. Ergo talis debet esse causa interna dolorem capitis inferens, quæ non solum recensito modo adoriri potest, sed quæ insuper Aphoniam, & Stertorem producere potest. Talem non possumus invenire causam, nisi prius constet, quomodo, & ex qua causa formatur Aphoniam, & Stertor. Qui loqui non possunt, id habent ex musculari vocem formantibus convulsis, vel paralyti correptis, quum rima glottidis ita debeat angustari per suos musculos, ut transiens aer sonum formet, quæ requisita angustia in convulsis, & paralyticis muscularis impeditur. Itidem Stertor oritur a transeunte aere inter respirandum, dum palatum mobile ad posteriora foramina narium a transeunte aere concussum, aliquem sonum obscurum faciat, observatur ille Stertor in apoplepticis, soporosis, & dormientibus, nimis laxatis, & paralyticis muscularis hoc Palatum moventibus; vel in iisdem convulsis, uti in epilepticis, & hysterics. Igitur causa harum apparitionum est Paralysis, vel Convulsio musculorum in faucibus, qui musculi nervos habent ex medulla oblongata cerebri. Quia vero causa doloris, & convulsionis sæpe est eadem, sed raro ab eadem causa fit Paralysis, & dolor; itaque verisimile est, Aphoniam, & Stertorem nasci ex convulsione eorum musculorum. Atque talia quoque subito fiunt, si aliquid acre applicetur principiis illorum nervorum, qui ad musculos faucium tendunt. Ex quibus omnibus comparatis colligi potest, humorem acrem aliquem deponi ad medullam oblongatam cerebri inferentem dolorem capitis, quæ causa aucta tandem infert Convulsionem musculorum faucium, ut inde fiat Aphoniam, & Stertor.

**II.** Ex textu concludi potest, istum Capitis Dolorem cum subsequente Aphoniam, & Stertore non oriri ex causa febrili; quum dicat, si febris apprehenderit, id est postea veniat. Ergo id acre dolorem capitis inferens, & reliqua symptomata ex convulsione nata, est materia Catarrhosa cruda. Illa autem materia si convulsionem inferat, ut monuimus (Aph. 167.), subigi potest a motu febrili subigente, & expellente, quum Spasmus aut Tetanus ex hac causa natus a febre superveniente tollatur (Aph. 51. V.). Sed si maneat, non concitata febre, sensim majori copia collectus, totam medullam oblongatam premens, mortem infert. Eandem quoque observationem habet in Convulsis ex ebrietate, qui simul muti fiunt (Aph. 198.). Ut aliquem temporis terminum adderet, dicit intra septem dies, quia si diu manent illa symptomata, major est facta accumulatio humoris prementis, quam ut viribus vitæ possint discuti humores; & signum vires vitæ ab accumulato humore supprimi, alias enim multo prius vis vitæ irritata concitasset febrem. An vero tali ex observatione possumus elicere certam regulam curationis, meretur attentionem. Febris si non veniat, moritur homo, si veniat, sæpe servatur: interim tam certa non est prognosis ex superveniente febre, ut possumus curationem certam promittere; observavit quidem Auctor a febre superveniente hominem fuisse servatum, sed non dicit, semper servari: sensus

Ex qua causa vocis defectus & stertor post Capitis dolores derepente natos in sanis?

Cur & moriuntur inter septem dies, nisi febris apprehenderit.

390  
fus enim est, nisi febris superveniat, peribit, sed hoc non indicat, semper a febre superveniente fervari. Interim hoc ad curationem elicere possumus, nos debere per medicamenta calefacientia concitare febrem artificialem, quia natura demonstrat, se tali modo interdum fervare.

## LIB. VI. APH. LII.

317. *Considerare vero etiam oportet oculorum subitus apparentia in somnis. Si enim albi quid, palpebris commissis, subitus appareat, cui id non ex alui profluvio est, aut ex potione purgante, primum signum, & valde letale.*

Oculi in  
somo ob-  
servandi.

I. **N**ulla est corporis pars, nullusque evacuandus humor in corpore, quin præbere possit indicia causæ latentis, quare medici præpostere agunt, qui sola signa petunt ex urina, vel pulsu, aut alio speciali signorum genere, cum omnia sint perpendenda, quia morbi diversi non semper in uno genere signorum sua indicia præbent, sed jam in hoc, jam vero in illo signorum genere; ita sunt morbi periculosissimi, qui interdum neque in urina, neque pulsu ullum indicium præbent, ut propterea coacti simus alia in corpore phænomena consulere. Neque contenti esse debemus signo unico, quod e multis causis pendere potest, sed semper debemus omnia consulere phænomena, eaque inter se comparare, ut eo certiores simus in assignanda causa, ejusque periculo. Sæpe tamen Auctor hoc vel istud signum ponit, & inde format præslagium, quum observarit post tale signum semper aliquid mali, vel boni fuisse secutum: qui autem cum vera fide signis uti vult, non unicam sed omnia simul perpendere debet. Inter illa nunc signa numerat. inspectionem oculorum, & quidem in somno, quoniam in dormientibus omnes actiones animales cessant, & palpebre tunc non moventur ad arbitrium, sed naturaliter in dormientibus debeat esse clausæ; si ergo palpebre non bene commissæ sunt, hoc certe dependet ab aliqua morbosa causa. Excipiuntur ergo omnes, qui sani palpebris non bene commissis obdormiunt, quod etiam monet, si quis in ventrem decumbat, non consuetus, alicujus causæ signum est; ita qui non consuetus oculis conniventes dormiat, si tamen istud morbo pressus faciat, aliquam causam internam latentem indicat.

hæc quæ  
causa oculi  
conniven-  
tes in som-  
no?

II. Ob duas præcipue rationes Deus voluit, ut in dormientibus oculis bulbus palpebris esset rectus: ut nempe ita interciperetur agitatio radiorum lucis supra retinam, qua turbaretur somnus æqualis, & præcipue ut impeditur corneæ exsiccatio, quæ exsiccata amitteret pelluciditatem, sed vero a palpebris clausis retinetur humida, & munitur contra injurias externas. An vero claudantur palpebre dormientium defectu actionis musculorum, ut reliqua membra in dormientibus laxantur, an vero speciali contractione musculi claudantis palpebras, ex aliis morbis est desumendum. Experimur in moribundis, leipthymia, & convulsis, palpebras raro clausas esse, sed sæpe semper quamdam portionem albi oculorum inter palpebras conniventes videri posse. Ergo perfecte cessante actione musculorum non clauduntur palpebre, sed sæpe manent apertæ. Qui ergo morbo oppressus dormit, & habet conniventes palpebras, huic manent palpebre conniventes, vel propter summam debilitatem, vel propter convulsionem.

Cur oculi  
conniven-  
tes sine al-  
vi fluxu  
vel ductio-  
ne præ-  
gressa, le-  
debilitas  
thale?

III. Observavit Auctor in ægris, quando propter debilitatem videbantur dormire, si palpebre non bene commissæ servantur, ut in somno naturali fieri solet, istum somnum non esset somnum naturalem, sed abolitionem sensuum defectu spirituum, & inde ægros plerumque mori: adeo ut palpebre ita conniventes arguant tantam debilitatem, quæ a morte non multum distat. Hæc autem debilitas inducta si fuit per copiosorem evacuationem, non est tanti periculi quam

quam si fiat a degeneratione humorum: subito enim facta evacuatio valet ita minuire sanguinis fluxum ad cerebrum, ut homo sensibus privetur, sed sensim contractis magis vas iterum ducitur sanguis ad cerebrum, & homines servantur, quod fieri non potest, si ex degeneratis spiritibus illa debilitas inducta fuerit. Inde oculi ita in dormientibus conniventes post quamcumque largiorem evacuationem, non magnum periculum portendunt, ut inde mortis prælagium faciant. Quod autem Auctor dixerit post Alvi fluxum & Alvi ductionem, non vero post quamcumque evacuationem, inde est, quia quod observavit, posteritati reliquit, & quia forsitan non ita detexit oculos conniventes in ægris post alias evacuationes, noluit hanc sententiam generalem pronunciare. Ego autem in praxi detexi hoc etiam post hæmorrhagias largiores, & inde magis generalem regulam de oculis conniventibus formare possumus.

## L I B. VI. A P H. LIII.

318. *Deliria cum risu accidentia, securiora: cum studio vero periculosa.*

I. **D**elirii definitionem, & generales causas exhibuimus (Aph. 27.), ex quibus colligi potest, Deliria magis minusque periculosa esse, secundum causas Deliria inferentes: atque variaz quoque sunt Delirii species cum risu, studio, audacia, timore, aliisque animi pathematibus. Observavit Auctor, & hodierna experientia confirmatur, majoris periculi esse Delirium cum studio, vel audacia, quam cum risu: istud autem periculum est desumendum vel ex causa hanc speciem Delirii faciente, vel ex ipso ita dicto animi pathemate. Invenimus humores corruptos varios non semper eandem Delirii speciem inferre, quod etiam invenimus in phlitis datis. Si ergo observatum fuit per praxin, cum humorem alienum, qui infert Delirium cum risu, facilius subigi, & expelli posse viribus vitæ, quam genera reliqua, ex hac observatione constante inferri potest deinceps talia Deliria securiora esse, etiamsi nos lateat reliqua natura istius causæ. Vel majus minusque periculum desumi potest ex adjuncto animi pathemate, quum ridentes ex causa quadam risum movente, non vero ex convulsione, uti in Risu Sardonio, nihil mali meditantur, & distis facile obtemperant, ut quævis auxilia adhiberi possint, & tali in lætitia minus consumuntur spiritus: si vero cum studio fiat, quasi semper profunde meditantur, hi homines non tam securi sunt; animas enim secum meditantur, atque illa mentis agitatio in sanis etiam spiritus magis consumit, neque ita patiuntur duci in recta curatione, sed proprium quasi ingenium sequuntur. Periculosissima autem sunt Deliria cum furore, quia nemini obtemperant, sibi aliisque damnum inferunt, neque noctu neque die sibi quietem vel somnum concedunt.

## L I B. VI. A P H. LIV.

319. *In acutis affectionibus, quæ cum febre sunt, luctuosa respirationes, malæ.*

I. **Q**uænam dicantur Acutæ affectiones exposuimus (Aph. 24. III.); in quibus quænam sunt sine febre, aliæ autem cum febre, uti in hoc loco indicantur. Omnibus his vitalis motus est validior propellens sanguinem; quare majore potentia urgetur sanguis ex ventriculo etiam dextro cordis per arteriam pulmonalem in Pulmones. Si sanguis non multum ex sua natura degeneraverit, compactusque fuerit, & vires satis valeant ad faciendam respirationem, tunc tanto frequentior, & profundior sit Respiratio, quanto majori vi ur-  
ge-



391. **MEDICINA HIPPOCRATICA** *Apb. 319.*  
 getur sanguis ex corde per arteriam pulmonalem, quod etiam experimur in sanis corpus suum moventibus, motu majore musculari. Ergo in Acutis affectionibus ex ratione est, ut intendatur Respiratio: sed propterea non debet esse Luctuosa *κλαυδαις*, id est respiratio gementium, plorantium, quæ quasi in media actione subsistit, & renovatur. Hujusmodi Respirationes sunt ab animi pathemate in sanis, quæ aliquam spasmodicam constrictionem arguunt. Hippocrates igitur in antecedentibus (*Apb. 178. l. i.*) dixit, Spiritum offendentem indicare Convulsionem: & quoniam Convulsio febrî superveniens (*Apb. 51. VI.*) periculum portendit, hoc in Aphorismo per constantem observationem pronuntiare potuit, malum esse.

**LIB. VI. A P H. LV.**

320. **Podagrici morbi vere, & autumnæ moventur ut plurimum.**

**I.** Materiem Podagricam diu in corpore posse latitare, ut femina mala, quæ natura facta propullulant, observavimus (*Apb. 294.*). Mirabilis est hujus materię proprietates, quod ita in nobis latitare possit, ut in nulla functione, vel secretionē aliquis detegere possit aliquod vitium: hoc autem morbosum tandem sævire incipit, & iterum post toleratos dolores evanescit, sæpe sine ulla visibili evacuatione. Mirantur multi, febres tempore pyrexie corpus quoad signa externa relinquere perfecte sanum, sed hoc etiam observatur in Podagricis, & Epilepticis, nisi adsit paroxysmus, istud corpus observatur perfecte sanum. Hoc autem proprium est materię Podagricæ, quod prima vice adoriri solet Februarii mense (*Apb. 314. l. i.*) ex communi observatione; si autem adolevit, Vere, & Autumno redire solet. An vero ille reditus seu exacerbatio dependeat ex propria natura materię, an vero ex anni mutatione, mihi videtur nimis subtilis questio, & parum fructuosa. Detegimus autem, vitam intemperatam provocare paroxysmum, quare maxime cavere debent, ne temporibus his præprimis indulgeant comotationibus, vel committant errores in dieta, & ut his temporibus, antequam paroxysmus ingruit, istis utantur medicamentis, quæ usus docuit excellere in præveniendâ Podagra.

**LIB. VI. A P H. LVI.**

321. **Morbis melancholicis ad hæc periculosi sunt humorum decubitus, aut corporis fidevationem, aut convulsionem, aut insaniam, aut cæcitatem significant.**

Morbis melancholicis periculosi decubitus humorum.

**I.** Si ex signis constat, in corpore esse materiem melancholicam, (*Apb. 132. II.*) illa, si quacunq̃ in parte decumbat seu colligatur, semper periculum infert: imo si sursum vel deorsum erumpat, morbis quibusvis incipientibus, lethale pronuntiatur (*Apb. 132.*). Materia enim illa neque sponte, neque viribus vitæ ita immutari potest, ut sanis assimiletur, semper servat suam propriam naturam, sensimque, si retineatur, redditur acrior. Quamdiu autem ætinetur in vena portatur, non multum mali facit, nisi reddatur acerrima, vel nimia copia accumulatur; potest tunc per hæmorrhoides evacuari, vel deposita per venas mæseraicas in intestina, modo non possideat nimis magnam acrimoniam, eliminata fuit. Sed si venæ cavæ fuerit tradita, & ita tandem in aliqua corporis parte decumbat, periculosos infert morbos. Ubique enim hæret, non potest emendari, sua tenacitate adhærente non facile illam partem relinquit, & acrimoniam suam, atque qualitate aliena, functiones illarum, partium miris modis perturbat, unde recentij in textu morbi, & multi alij sunt.

No.

II. Nomine Apoplexiæ intelligi abolitionem sensus, & motus animalis, remanente actione vitali, superius (*Aph.* 67. l.) notavimus; hoc autem loco dicitur Apoplexia seu Sideratio corporis, igitur videtur hæc species differre a generali Apoplexia. Invenitur etiam apud nostrum Audorem Apoplexia alicujus partis. Necessè ergo erit ex phænomenis colligere, qualis corporis effectio per Apoplexiam intelligatur. Generalis Apoplexia tunc vocatur, si homo privetur omni sensu interno, externo, & motu animali: inde Apoplexia corporis erit, si solus sensus externus, & motus animalis exstinguatur per totum corpus, remanente motu vitali, sensibus internis, sive mens constans maneat, sive simul delirare homo. Apoplexia ergo alicujus partis tunc vocatur, si sensus, & motus animalis istius partis abolentur subito, ac si haberetur in quodam parte paralytis cum insensibilitate. Constat per experimenta, ex Cerebro oriri nervos ad sensum externum, & motum animale destinatos, hos solos nervos affici posse sine mentis perturbatione; nervos autem motus vitalis oriri ex Cerebello; si ergo materia Melancholica tenax sine acrimonia opprimat in encephalo istos nervos, qui ad sensum externum, & motum animale sunt destinati, habetur in toto corpore insensibilitas, & Paralytis, qualis morbus vocatur in hoc loco Apoplexia corporis. Talis autem morbus ex Materia Melancholica decubitus natus non caret periculo, quia nascitur ex materia a vi vitæ non superabili, quæ occupat principia nervorum, quæque propter tenacitatem non facile discuti potest, quæque sæpe majore copia collecta etiam motum vitalem exstinguere potest, ut ita pereat æger.

Ex Melancholia Apoplexia corporis.

III. Si autem eadem nervorum principia in encephalo tangantur a materia Melancholica acriore, quod sæpe fit, corpus diris convulsionibus epilepticis agitur. *Asrabiliarii etiam comitali morbo corripri plerumque solent.* (Hæ. 823.) Qualis etiam morbus ob allegatas rationes periculosissimus est: nam non facile superatur, & si augeatur copia vel acrimonia materiz melancholicæ, etiam morus vitalis turbatur, aut exstinguitur.

Ex Melancholia Convulsio.

IV. Ex Cerebro oriri nervos ad motum animale, & sensus externos, constanti observatione ex experimentis deducta ita est confirmatum, ut nullus hodie dubitare possit: simili etiam modo ex Cerebri compressione, & agitatione constat mentis actiones exstingui, vel perverti. Si ergo illa materia Melancholica acris ad eam cerebri partem feratur, quæ naturaliter agitur a sensibus internis, talis homo delirat, seu insania corripitur, quæ mentis alienatio tam diu durat, ac illa materia hanc partem agit: quia vero materia ea admodum simul est tenax, non facile depellenda, mania melancholicorum pertinacissima esse solet, & sæpe recurrens.

Mania.

V. Inter sensus externos etiam numeratur visus, qui autem per specialem nervum ex cerebro natum exercetur: quoties ergo Nervus Opticus a materia Melancholica ita opprimitur, uti supra exposuimus in nervis Tactus, talis tunc æger Visu privatur. Veteres existimarunt, nigredinem materiz suffocare transitum radiorum luminis ad mentem, sed quoniam hodie satis demonstratum fuit, omnem causam ita comprimentem vel implemtem nervos opticos, ut liber spiritum fluxus ex cerebro per nervum opticum ad oculum interceptiatur, visum exstinguere, non erit opus ex nigredine materiz melancholicæ Visus privationem deducere.

Cæcitas.

VI. Egregium quidem est omnes hos morbos in melancholicis præfagire posse, & ex conspectis his cognoscere causam mirabilem effectuum: præstantius autem foret hos morbos tollere posse. Quare in his omnibus, quamvis facie admodum diversa conspiciantur hi morbi, talem facere oportet curationem, qualis a nobis in Medicina Dogmatica, Titulo Delirii, tradita est.

Curatio.

## LIB. VI. APH. LVII.

322. **A** *Poplectici autem fiunt maxime aetate ab anno quadragesimo usque ad sexagesimum.*

Apoplexia  
ex Melan-  
cholia quo  
aetatis  
tempore  
praecipue  
generatur?

**I.** **I**n precedente Aphorismo quosdam morbos citavit nomine distinctos, a Melancholia tamen unica natos, ex quibus per praxin detexit, illam Apoplexiam raro fieri nisi inter quadragesimum, & sexagesimum aetatis annum; sed propterea non excludit reliquos morbos ex Melancholia natos; solummodo enim indicare voluit, se expertum esse eo aetatis tempore talem Apoplexiam generari. Duo in hoc loco notanda sunt; primum, hic agi de Apoplexia corporis ex Melancholia; alterum, hanc Apoplexiam frequentius eo aetatis tempore generari, quam reliqui morbi ex Melancholia nati. Omnes causae, quae ita possunt comprimere cerebrum, ut liber spirituum fluxus inhibeatur per nervos ad sensum, & motum destinatos, omnesque causae, quae ita invertunt spirituum indolem, ut inepti fiant ad istas functiones peragendas, illae omnes Apoplexiam inducere valent; quia vero multae sunt causae, quae talem mutationem inducunt, & unaquaeque suam propriam naturam servat, inde necesse erat simul indicare materiem, quae apoplexiam inducebat, hoc fecit per particulam *si*, ne cogeretur prior sententiam repetere, & dein solam Apoplexiam excipere. Quaevis aetas suos quasi proprios habet morbos, uti Rhachitis in Infantibus, Pueris Variolae, Juvenibus Phthisis, Senibus Catarrhus, ita materia Melancholica praecipue generatur inter quadragesimum, & sexagesimum aetatis annum; & si aliis aetatibus generetur, non ita solet Apoplexiam inferre. Quare dictum Hippocratis pura est singularis observatio practica, quod etiam dici potest de praecedentibus morbis cuicumque aetati propriis.

## LIB. VI. APH. LVIII.

323. **S** *Si omentum exciderit, necesse est putrescere.*

In ventris  
vulneri-  
bus omen-  
tum pro-  
lapsum  
cur citius  
putrescit?

**I.** **C**onstat ex Anatomicis, Omentum anterieus obtegere intestina, pendulum hzere a ventriculo, & intestino colo in anteriore abdominis parte, inter intestina, & superficiem internam peritonaei locatum, magis minusve protendi ad pubem, prout majore, vel minore pinguedinis copia fuerit impletum, ita ut in macilentis vix attingat umbilicum, sed in obesis usque in pelvim abdominis descendat, ut observaverunt in Epiplocele. Hoc Omentum paucis componitur vasibus, & membranis, sed ingenti pinguedinis copia impletum est: igitur in eo debilissimus esse potest motus vitalis, quia ille habetur in partibus firmis, non vero in pinguedine. Si ergo in Ventris vulneribus accidit, ut portio Omenti prolatabatur cum, vel sine intestinis; Omentum multo citius mortificatum erit, quam intestinum prolapsum, in quo motus vitalis validior. Quia vero in parte vivente non fit putredo, sed in parte mortua, inde in Omento, cujus actio vitalis citius, & a leviori causa exstinguitur, multo citior fit putredo, quam in partibus reliquis. Prudentes ergo debent esse Chirurghi in repositione Omenti: nam si mortificatum fuit, & dein reponitur, vita parti repositae non redibit, & perget putredo in cavo abdominali, unde multa mala: neque in reponendo duriter trahere debent Omentum, quod valde lacerabile est, nam si inter reponendum videtur vividum, sed interim laceratum fuit, post repositionem tamen corruptum. Ut sciat Chirurgus, num Omentum prolapsum sit mortificatum, ad sequentia haec atten-

attendere debet. (1) Si novit, Omentum aliquandiu fuisse prolapsum, aerique frigido, & exsiccati expositum, conjicere potest ex debili cognita actione vitali in Omento, & concrefcibili pinguedine, portionem eam prolapsam mortificatam esse. (2) Hoc magis firmatur, si inveniat partem amisisse naturalem colorem, eumque commutatum esse in lividum, vel nigrum, quem acquisivit ex concreto in vasculis sanguine, & incipiente putredine. Talia si detegit, non erit tutum reponere in ventrem eam portionem Omenti: nam pars ea mortificata, etiam si fuerit reposita, non recuperabit vitam, sed in malignam corruptelam commutabitur. Conducit ergo tali in casu abscindere partem eam, ut nihil mortui remaneat, antequam reponitur; si vero magnum aliquod vas in ea parte detegitur, præstantius erit in parte adhuc vivente ligare Omentum, & tunc quicquid mortuum est abscindere, ante repositionem: postquam repositio fuit facta, fili ligantis portio extra vulnus pendere debet, ut hujus ope portio ligatura intercepta, & dein mortua educi possit per vulnus, quod interim turunda filo alligata servandum est apertum. Ut distinguamus filum turundæ a filo ligaturæ, adhibenda sunt fila coloris diversi. Ex dictis patet, non semper Omentum putrescere, si exciderit, sed si aliquandiu prolapsum fuerit, quali modo hic Aphorismus est intelligendus, ne aliquis in recenti prolapsu abscissionem suadeat. Inanis incessit timor quibusdam, Omento ablato impediri ventriculi, & intestinorum coctionem, quum existent exempla contrarium probantia. Hoc autem verum est, Omentum locatum inter intestina, & peritonæum faciliorem permittere harum partium motum, quæ partes alias motu peristaltico agitate, tangentes peritonæum nudum, majorem attritum faciunt, quo aliquo modo inhibetur harum partium actio. Conducit ergo, si fieri potest, relinquere Omentum integrum, ut intestina humectet, suppeditet pinguitudinem venæ portarum pro bilis confectioe, & se interponat inter partes terentes ad evitandum attritum.

## LIB. VI. APH. LIX.

324. **Q**uibus a diuturno coxendicis morbo vexatis coxa excidit, & rursus incidit, his mucus innascitur.

I. **N**ullibi in toto corpore invenitur articulus major, quam in Coxa, profundissime enim recipitur non solum femoris caput in Coxæ acetabulo, verum etiam præter ligamentum cingens, aliis etiam articulis commune, per aliud teres, & tenax in media hujus cavitate femoris os colligitur, & retinetur in sua sede: invenerunt quoque Anatomici satis magnam glandulam in hoc articulo, quæ mucus naturalem deponit, ut non solum hic articulus lubricetur a transfundente medulla, sed etiam a mucro hoc naturali medullæ misto. Humores hi actione articuli, vel diuturniore mora attenuati iterum absorbentur, concedentes locum novo affluentiori humori, ut hoc in articulo perpetua maneat lubricitas. Hoc in articulo magis quam in reliquis generatur dolor, qui proprio nomine vocatur *coxitis*, & hoc loco vocant Coxæ morbum. Ille autem dolor generatur a dolentibus dictis ligamentis, vel si Mucus ille naturalis aliquid acre contineat, vel si glandula in eo acetabulo locata tumeat, & doleat. Omnes autem hi morbi non permittunt os femoris excidere, & incidere: nam dolentia ligamenta tantam prolongationem non permetterent, ut os femoris excidere posset: & glandula tumens extrusionem faciens, reditum impediret. Sed acetabulum mucro opplerum excidere & incidere permittit articulum, quod paucis videbimus.

II. Coxæ morbus diuturnus non significat, omni tempore adefse dolorem, sed unde muci quando dolor aut molestia quævis diu, vel continuo, vel per intervalla vexavit

illum articulum, Ligamenta illa articulum neſcientia per tam longum tempus vexata morbo tandem amittunt contraſilitatem, quod etiam in aliis articulis verum eſt: ſed illa laxitate ligamentorum non excideret os femoris ex hoc acetabulo, cingitur enim caput offis femoris ligamento, quod omnem ingreſſum liquoris externi intercepti. Conſtat experimentis phyſicis, ſi quis haberet cavitatem firmam acetabulo coxæ ſimilem, corpore rotundo impletam, ut implet caput offis femoris hoc acetabulum, exterius circumquaque obductum accurate impervia membrana, ut ligamenta hunc articulum cingunt, fieri debere validam vim tendentem, antequam quis poruiſſet diſtulum corpus rotundum ex cavitare ea extrahere; tanta enim debere fieri tenſio, quæ valeretur ſpatium vacuum formare in ea cavitare. Igitur non eſt conceptu facile, ſi maneat illa cavitare vacua, manentibus ligamentis integris, quod tam facile excidere, & incidere poſſit ille articulus. Sed ſi haberet ſimilem machinam, aqua vel alio liquore plenam, qui liquor contineretur in loco eo a laxa ambiente membrana, facile potuiſſet iſtud corpus excidere, & incidere: nam ſi excideret corpus iſtud ſeu caput offis femoris, cavitare, ſeu acetabulum coxæ impleretur illo ambiente liquore, & ſi rediret, cederet iterum ille contentus humor in loca vicina, quod minima vi fieri poteſt. Reſte igitur ratiocinatur Auſtor, quando concepit acetabulum mucosum impletum eſſe, ſi offis femoris caput tam facile incidere, & excidere poſſit, quum ſine liquoris huius præſentia hoc phaenomenon non facile demonſtrari poteſt, & quia ille humor, qui tunc eo in acetabulo continetur, eſt mucus naturalis, vel in morboſam indolem converſus.

L I B. VI. A P H. LX.

325. **Q**uibus a diuturno coxendicis morbo vexatis coxa excidit, bis crus tabeſcit, & claudicant, niſi uſti fuerint.


Quomodo  
claudica-  
tio, & ta-  
bes cruris  
in ſpon-  
tea coxæ  
luxatione?

An hi u-  
ſtione cu-  
rentur?

I. **D**um diuturna illa cauſa implens acetabulum Coxæ, & laxans ligamenta fecit ſpontaneam Coxæ luxationem, non eſt mirum, quod nervus adiacens etiam relaxetur, & mucosus oppleatur, quo ſpirituum fluxus ad muſculos moventes crus, & eorum, qui deſtinati ſunt ad actionem nutritionis, aliquo modo retardetur, ut inde hæ actiones fiant languidiore, ſeu fiat claudicatio in motu animali, & defectus nutritionis in motu vitali, hoc etiam fieri poteſt prolongato nimis illo nervo, & arteria, ut inde minor influxus ſpirituum, & ſanguinis habeatur ad eum pedem, quum vaſa prolongata ſimul ſint anguſtiora.

II. Vehementer dubito, an uſtione illa mala poſſint præveniri, vel præſentia tolli: nam ſi urendo aperiretur capſula ligamentosa articuli, ut collectus mucus poruiſſet effluere, continuum haberetur ſtillicidium, & ligamenta ita uſta deinceps non facile conſolidarentur: neque accuratio ligamentorum uſtione nara relinqueret eam partem vitalem. Quamobrem fatius eſſe exiſtimo per medicamentum reſolventia, & diſcutientia tentare curationem, quam ſubire truculentam operationem Uſtionis.

M E D I C I N A  
H I P P O C R A T I C A,  
E X P O N E N S  
A P H O R I S M O R U M  
H I P P O C R A T I S  
L I B R U M S E P T I M U M.  
P R Æ F A T I O.




Ultimus nobis Liber erit Septimus, alii autem Octo Libros numerant, sed quoniam iste Liber Octavus a multis habetur spurius, & ab aliis omnino repudiatur, multasque completitur sententias in antecedentibus traditas, loco hujus Libri ad finem adjeci quosdam Aphorismos interjectos ex Libro defunctos, qui in præcedentibus non fuerunt traditi, ut quidquid laude dignum, & scitu necessarium erat, nostris Commentariis illustraretur. Ne autem in hoc Septimo Libro numerorum seriem abrumperem, si occurreret Aphorismus antecedentibus similis, eum etiam curavi imprimi cum adjecto loco antecedente, ubi idem explicatus inveniri potest. Breves completitur sententias, at ad praxin medicam utilissimas: hic etiam Liber magis quam antecedentes exhibet symptomata seu morbos alius morbis supervenientes, ut inde formari posset præsagium.

Ita ad finem sententiarum pervenimus, quæ nomine Aphorismorum per tot sæcula superbiebant, & ita incluserunt, ut nullus sit Liber frequentioribus Commentariis illustratus, majorique in pretio habitus. Multi quidem ita huic Libro fuerunt addicti, ut contenderent totam medicorum scientiam fere in eo contineri: sed si inspiciamus Coacas prænotiones, Librum Prædictorum, & multos alios facile constabit parvum tantum specimen totius scientiæ in his Aphorismis contineri. Eodem itaque ordine, & methodo, si Deus largiatur vitam, sanitatem, & otium, consitimi ceteras Hippocratis breves sententias nostris Commentariis ornare.

APHOR.

## A P H O R. I.

326. **I**N morbis acutis extremarum partium frigus, malum.

**I.**  **B**servavimus (Aph. 24. III.) Acutos morbos absolute positos denotare morbum brevem, vehementem, periculosum, cum adjuncta febre continua calida. Tali in morbo si Extremarum partium frigiditas observatur, malum est, inquit Auctor. Per partes Extremas intelligunt manus, & pedes cum suis digitis, tota etiam membra, atque stares, & aures, quæ nempe partes remotissimæ sunt a corde, & ipsum truncum corporis non constituunt: hæ partes quoniam magis expositæ sunt aeri externo, citius refrigerantur, quam truncus ipse, si causa naturalis calefaciens, id est motus vitalis sit debilis. Ut intelligatur, ex qua ratione frigus extremarum partium sit malum signum in Acutis, perpendendum est, omnes morbos Acutos febriles habere vehementem circulationem per totum corpus, quare omnes partes inveniuntur calidissimæ seu urentes. Tali ergo in motu vitali aucto per totum corpus frigus extremarum fieri nequit, nisi istis in partibus diminuat vitalis actio ultra modum; nam si minuat, causa morbi Acuti, extrema quidem magis temperatum calorem acquirunt, sed nunquam eo usque minuitur, ut dici possit frigus; atque in hoc casu calor totius corporis simul minuitur, quando non dicitur frigus Extremarum. Hæc igitur phrasis notat, Extrema fieri frigida non cessante calore in trunco, & frigus fieri sine diminutione morbi. Hoc, inquam, est periculosissimum: nam si maneat morbi causa, & minuat circulatorio in extremis, quod ex refrigeratione cognoscitur, signum est vires vitæ a morbi materia validissime irritata tam debiles esse, ut non valeant in partibus extremis proportionatam servare circulationem, quod fieri nequit sine virium summa debilitate. Si nunc hæc duo inter se conferantur, morbus nempe validus, & vires corporis debiles, rarum erit, si æger emergat; ergo hoc signum satis magnum periculum portendit.

## L I B. VII. A P H. II.

327. **E**x offe ægrotante caro livida, malum.

**I.** **U**T intelligamus, ex qua ratione dicatur malum, si Caro livida fiat ex Offe ægrotante, constare debet, qualis assium ægritudo intelligatur, & dein quæ sit hujus Livoris causa in carne, ut ex causa perspecta, & comperta ad propositum morbum formare possimus malum prælagium. Os ægrotat variis morbis, ut exposuimus in Chirurgia repurgata, hoc autem in loco talis capiendus est morbus ossis, qui aliquam corruptionem, vel cariem in offe format, ut ex morbo eo caro circumjacens ita afficiatur, ut suum colorem naturalem commutet in livorem. Carnis autem naturalis color in Livorem commutatus, si sanguis ruber in vasibus contentus concrecat: hoc experimur etiam in tubulis minimis vitreis sanguine calenti impletis; nam si sanguis ille diu hæsit in illo tubulo, donec globuli rubri sanguinis soluti in massam concreverint, dimittentes liquorem pellucidum non conrescibilem, color antea ruber in livorem commutabitur sponte. Carnis quoque color ruber livescit, imo tandem nigrescit, si superveniente putredine corrumpatur. Ergo Livor in adjacente carne signum est, sanguinem stagnan-

gnantem esse concretum, & ita esse ineptum circulationi; talis autem fieri nequit, nisi tantus sit defectus in circulatione, ut sanguis fluidus servari nequeat: itaque Livor est signum defectus virium vitalium, & concretionis sanguinis. Verum talis status diu durare nequit, quin pars ea moriatur, & in putrilaginem abeat, unde tunc formatur ulcus sordidum cacoethes. Neque minori momenti est, si Livor oriatur ex sanguine corrupto, quia nunquam corrumpitur, nisi partis vitalis actio sit extincta, ut nimis debilitata. Igitur si ex Osse ægrotante talis fiat caro, sive quod Os corruptum ita inficiat Carnem, sive quod Caro adjacens ita sponte moriatur, in utroque casu malum est, nempe generabitur ulcus sordidum Cacoethes ex carne corrupta, & osse mortificato, vel carioso, qualia ulcera difficulter curari possunt. Ipsa Caro Livida facile præfagire potest etiam Ossis corruptionem; nam quia significat ea in parte subsistere circulationem, periosteum ex carne accipiens vala circulatoria, privabitur etiam motu vitali, quare os subiectum, quod ex periosteum hoc vitales humores accipit, defectu ejus morietur, & ita lenta carie consumetur.

## L I B. VII. A P H. III.

328. **A** Vomitus singultus, & oculi rubri, malum.

**I.** Duo numerat symptomata conjuncta, quæ si vomitui superveniant naturaliter, vel a vomitorio excitentur, malum præfagium præbent, quæ autem se junctæ a Cælo proponuntur. Utraque sententia est vera, sed pejus est, si duo mala symptomata superveniant, quam si unum accedat, imo si insuper accedat Delirium, lethale est signum. Hippocratis tempore in consuetudine erat sæpius propinare Vomitorium, ut quoque monuimus supra de purgantibus, quam consuetudinem ab Ægyptiis acceperunt; & inde magis necesse erat necessarias caute-las adicere, quam hoc tempore, quando rarus Vomitorium est usus. Olim enim magnum auxilium in Vomitu locarunt, sed sine ratione, quum vix quidquam boni præstet Vomitorium, nisi exonerare ventriculi contenta, vel etiam interdum bilem corruptam; sed si vitium hæreat in ventriculi lateribus, vel dispersum, Vomitorium malignum illum humorem eliminare nequit, sed potius irritat crabrones. Egregie summus vir in praxi medica Sydenham observavit in diversa constitutione epidemica Dysenteriam præveniri posse dato vomitorio, si nempe oriatur a bile corrupta relicta, sed alio tempore augeri periculum, si similia signa adsint, sed ex Erysipelate, vel Inflammatione ventriculi. Ex signis in hoc Aphorismo traditis de malo illo eventu Vomitus facile judicare possumus: nam si esset humor morbosus, qui concitavit Vomitus, eo evacuato, cessaret non solum vomendi conatus, sed & corpus liberatum ab illo alieno, sentiret se liberatum. Ita etiam a Vomitorio dato si omne medicamentum fuerit exantlatum, nullamque ventriculo læsionem intulerit, neque Singultus, neque Oculi rubicundi remanebunt. Sed si in Vomitu a natura excitato non fuerit materia morbi expulsa, aut si Vomitorium læsionem ventriculo intulerit, quadam symptomata relinquantur, inter quæ numerat Singultum, & Oculos rubicundos, quæ malum præfagium proferunt. Si enim superveniat Singultus, inducitur species Convulsionis (Aph. 304. I.) hic ut signum, & ut causa malum infert. Quippe singultus fatigationem inducit sine levamine mali; & signum est, vel nimiam fuisse sædum evacuationem, ut monuimus etiam in Purgatione (Aph. 197.) & sanguinis fluxu (Aph. 196.), vel vomitorium intulisse læsionem, ut notavimus in Helleboro (Aph. 194.), vel ipsum ventriculum fuisse inflammatum, vel erysipelate tenentem, quæ omnia si Singultum post vomitum inferant, augmentum mali declarant. Oculi rubicundi fere semper sunt in valide vomentibus, sed debet rubedo illa brevi postea



postea cessare; si autem rubicundi manent oculi, indicantes sanguinem urgeri in tunicam adnatam oculi per motum auctum in encephalo, facile fieri potuit, ut ex cerebro laeso ille Vomitus fuerit concitatus (Aph. 315. l.), quod pessimum est signum, quum vomitus talis nunquam adferat levamen, sed magis urgeat sanguinem ad caput, & cerebrum magis opprimat.

## L I B. VII. A P H. IV.

329. **A** *Sudore horror, non bonum.*

**I.** **N**ULLA frequentiore evacuatione eliminatur morbi materia, quam sub forma Sudoris: est enim evacuatio totius corporis, quæ per totum corporis ambitum eliminat humorem. Sed ut sudor sit bonus, debet quantitate conveniens esse, ut ita eliminet omnem morbi materiem, & tamen non tanta copia, ut pariat bonorum humorum defectum; fieri debet prævalentibus viribus vitæ, nam si fiat vi morbi, non eliminabitur materia morbi, sed potius humor sanus; si fiat ex colliquatione, bonus, & malus humor sine prægressa separatione evacuat, & ita liberare non potest corpus a materia morbi. Quod si fiat Sudor criticus auferens morbi materiem, & non nimis magna quantitate, corpus tale se levatum sentiet alieno humore liberatum. Si vero omnis materia non fuit evacuata, aut si Sudor sit colliquativus, vel vi morbi expulsus, materia remanens Horrorem inducit, quum omne alienum nervis applicatum Horrorem inferat. Ergo si post sudorem nascatur Horror, unum ex his antecedentibus significat in corpore. Verum periculum non est idem in omnibus his designatis causis; id autem commune est omnibus, nihil ex his bonum esse; nam si omnis materia non sit eliminata, subsequente sudore eliminari potest, ergo non valde magnum malum: sed si ex Colliquatione Sudor fiat; Horror subsequens absolute malus esset dicendus. Quare Auctor non potuit secundum experientiam dicere, Malum, sed dicere debuit, Non bonum, quum pro diversitate causarum talis Horror post Sudorem majus, & minus malum præsignat.

## L I B. VII. A P H. V.

330. **A B** *Insania dysenteria, aut hydrops, aut mentis emotio, bonum.*

Ex mania  
Dysente-  
ria bo-  
num.

**I.** **H**IPPOCRATEM per maniam intelligere Delirium vehemens sine febre (Aph. 96. lll.), & per Dysenteriam alvi copiosam ejectionem, & frequentem cum ventris torminibus (Aph. 135. l.) supra observavimus. Ex quibus colligere possumus, utrumque morbum generari posse ab humore acri, qui in encephalo inæqualem cerebri motum facit, & ita maniam inducit, sed in intestinis, dolorem, & ejectionem copiosam. Si ergo præcedat Dysenteria & dein mania, significare potest, materiem illam acrem ferri ex intestinis ad caput, quod pessimum signum; sed si feratur a cerebro ad intestina, inter quas partes maximus est consensus, valde bonum est, quia fertur materia acris a parte magis principe, & ex qua non potuit evacuari ad partem minus principem, & ubi satis commode evacuari potest. Ex hac observatione actionis naturæ monemur, nos debere in mania, si nascatur ex humore acri, sollicitare alvum medicamentis purgantibus, ut eo deriveretur humor, & evacuetur.

Ex mania  
hydrops,  
bonum.

**II.** Observavit etiam Auctor, Hydropem supervenientem fuisse maniam. Non videtur ille morbus (Aph. 273. l.) ullam convenientiam habere cum mania. Hydrops enim est morbus ex abundantia lymphæ, cum motu partium firmarum languidiore, laxitate solidorum, dum vero in mania habetur humor acris stimulans, vires

vires corporis ingentes, motus circulatorius major. Si tamen nascatur Hydrops, ille morbus significare nequit humoris acris translationem, quam in Dysenteria observavimus, & propterea bonum præfagium dedimus. Sciendum autem est in praxi, omnem mutationem morbi non fieri per materiæ translationem: sæpe etiam mutatur materia in sua indole, & quando signa docent bonam fuisse factam mutationem, ea tunc quoque signa bona dicuntur; ita apparentia signa suppurationis in morbis inflammatoriis dicuntur bona, quia bonam mutationem materiæ morbi indicant. Tali etiam modo Hydrops ex mania bonus dicitur, quia notat acre stimulant Maniam faciens fuisse mutatum in vappam, quum Hydrops generari non possit, quamdiu manet id acre stimulant, quod non permetteret tam languidum motum vitalem, & lymphæ collectionem. Ergo quoties ea signa, quæ ab Hydrope separari nequeunt, apparent, toties quoque ex istis colligere possumus, id acre substantum esse. Disputant autem præctici, num sit ea mutatio bona dicenda, quum Hydrops sit morbus non minus periculosus, & difficilis quam mania. Fatendum est, quædam Hydropsis species non minus periculosas inveniri, sed qui Hydrops generatur ex sola laxitate fibrarum, & motu languidiore, ut sæpe experti sumus finitis morbis sine relicta obstructione, vel induratione aliqua partis, ea Hydropsis species sæpe sponte evanescit, vel facillime cedit diureticis, & roborantibus. Quia vero talis species Hydropsis sequitur Maniam, inde recte bonum est dicendum.

III. Tres species in Ecstasi distinguunt Veteres; (1) qui nihil loquuntur, neque movent sua membra, uti fanatici, quasi alta meditatione abrepti, & artoniti hærentes: (2) qui etiam nihil loquuntur, sed tamen inquieti sunt, continuo locum mutantes, ut ne quidem per momentum in eodem loco quieti manere possint, quod melancholicis frequens est: (3) qui furiosi sunt, continuo loquentes, & inquieti, ut in phrenitide. Qualem autem speciem ex his intelligat Auctor, facile conicere possumus: nam signum debet esse, materiam acrem irritantem miscere, minusque agitare cerebrum: igitur crederem, in hoc loco intelligi speciem primam, quia mania majorem cerebri agitationem significat, quam observatur in prima illa specie Ecstasis. Adeoque ea mutatio facta in mentis alienatione, quæ declarat minorem acrimoniam materiæ, bonum signum est, quum præbeat spem perfectæ curationis.

A mania  
Ecstasis,  
bonum.

L I B. VII. A P H. VI.

331. **I**N morbo diuturno, appetitus prostratus, & meracæ dejectiones, malum.

**G**ENERALIS morborum divisio ex duratione est in morbos Acutos ( Aph. 24. III. ) qui ita dicuntur usque ad quadraginta dies, & in Chronicos, qui ultra terminum istius temporis excurrunt. ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΣ ergo est morbus, qui istud tempus multum superat. Hujusmodi morbi Chronici sibi similes sunt a principio usque ad tam longum tempus; vel subierunt aliquam mutationem, ut si materia cruda, vel pituitosa transeat in corruptelam, ita ut ex una specie morbi Chronici fiat altera: vel morbus Acutus interdum transit in morbum Chronicum. Omnibus his in morbis Chronicis habetur corruptio spontanea, nam si vires vitæ valent, intra quadraginta-dies materia morbi vel est superata, vel expulsa, si autem vitæ vires sunt debiliores, vel morbi materia tenacior, vel copiosior, quam ut viribus vitæ superari possit, ultra istud tempus protrahitur morbus, & materia illa retenta sensim in spontaneam corruptelam magis vergit, quia vitæ vires non valere bonos fervare humores, neque emendare alienos. His nunc in morbis, qui habent humores spontanea mutatione corruptos, cum virium debilitate, pronunciat Apoptiam malum esse. Antequam hoc possumus intelligere, repetenda sunt ea, quæ exposuimus in Exercitatione nostra de fame; famem nobis datam

In Chronicis  
Apoptia  
malum.

E e e esse,

esse, ut indicaret, num defectus esset alimenti in nostro corpore; eam fieri posse minorem, abolitam, & cum fastidio, quales species vocant *arrosæ*, *arrosæ*, & *arrosæ*, a multis causis; victum tenuem non convenire Chronicis (Aph. 4. VI.) omnem causam minuentem, & abolentem malum esse. Igitur Apositia ut signum, & causa malum portendit. Denotat enim, corruptos esse humores in corpore, qui in ventriculum confluentes appetitum naturalem extinguunt, & inde, licet ingerantur alimenta, ea corruptis mista non commutantur in bonum chylum: & quia debita quantitas alimentorum requiritur, ut sustententur vires in tam longo morbo, illa quantitas suppeditari nequit propter inappetentiam, vel fastidium; aut si ægri ingerant, ingesta non convertuntur in bonum succum. Itaque in Convalescentibus, & morbis Chronicis tuti non sumus, quamdiu appetitus naturalis non redeat, quia est Cacoehylæ signum (Aph. 127. II.).

Et meracæ dejectiones malum.

II. Num duo hæc symptomata Apositia, & ejectiones Meracæ sint jungenda in Chronicis, ut malum prænuñcient, non consentiunt Commentatores. Ego vero puto separatim, & conjunctim præfigere malum, sed ex generali regula majus malum est, si duo mala signa jungantur, quam si unicum habeatur. Hippocrates passim inculcat, Meracas dejectiones malas esse, sive sint pituitosæ, biliosæ, melancholicæ, vel sanguineæ, quia recrementa alimentorum fecibus mista faciunt, ut nunquam meracæ conspiciantur nisi ex morbosa causa. Quod autem in Chronicis cum Apositia conspiciantur Meracæ dejectiones, illæ notant, tantam esse morbosorum humorum copiam in intestinis, ut ne quidem recrementa alimentorum conspici possint: vel quod ingesta alimenta, antequam deponunt sua recrementa, ita fuerint corrupta, ut exhibeant massam putrescentem corruptam ubique sibi similem. Ergo malum est signum, sive respiciamus ad multitudinem materiæ morbosæ, sive ad corruptelam inductam.

## L I B. VII. A P H. VII.

332. **A** Multo potu rigor, & delirium, malum.

I. **V**itia, & mores sui temporis non parum perfringit multis locis. Græci enim excelluerunt potationibus, lucubrationibus, & ut mala ex his nata tollerent, frequens fuit vomitorii, & purgantis usus: his in omnibus annumerat mala, simulque tradit cautelas. Hoc in loco indicat mala, quæ observavit provenire ex multa potatione; cogitandum est hic intelligi potum vini, vel spiritus inebriantis, ex cujus potionis abusu his etiam temporibus observavimus Rigorem, & Delirium fuisse nata, istaque mala perseverasse usque ad mortem, in aliis autem diu perstitisse, qui postea convaluerunt. Ut strenui illi bibitores intelligant, se non semper impune corpus implere, scire debent, spiritum fermentatum ita interdum obruere cerebrum, istudque perturbare, ut brevi tempore apoplecticæ pereant, vel convulsione extinguantur (Aph. 198. II.), vel per longum tempus stolidi, & paralytici maneant, quod etiam nimis frequenter observavi. Hoc autem loco duntaxat videndum, quomodo Rigor, & Delirium ex nimio meri potu possit generari, & cur sentiatur malum. Mirantur multi multum destillatum vappam exhibere, & potum non inducere ebrietatem, sed post fermentationem præbere destillatum spiritum ardentem, atque tunc potum inebriare: qui autem assequitur experimenta Chemica, ille facile hanc mutationem concipit, quia oleum vegetabile fermentando redditur volatile, exiit suam non miscibilem naturam in liquorem aquosis miscibilem; & tunc demum assumtum inducit ebrietatem; adeo ut oleum vegetabile fermentatione mutatum, tandem hanc specificam virtutem acquirat; atque non differt, ex quovis succo vegetabili formatur; imo decocta eodem

dem modo fermentata similem spiritum producent, ut patet in Zytho, & etiam in Hydromele. Igitur oleum vegetabile fermentatione attenuatum istud est, quod potum ebrietatem inducit. Regula ergo est generalis, Rigorem, & Delirium nata a majore ingestione spiritus fermentati esse malum. Dum istud spirituosum mediori copia fuit ingestum, suo stimulo calefacit; sed si majore copia ingeritur, vis vitæ ab hoc alieno ita obruitur, ut Rigorem (Aph. 156. II.) inferat: quod periculo non caret, fieri enim interdum observatur, vim vitæ suppressam eludari non posse. Igitur malum est signum Rigor, quia notat, alienum esse applicatum nervis, & simul vires corporis opprimi. Huic si accedat Delirium, mali indicium augetur, nam tunc non solum agitur, & oppressum est organum vitale, & motus animalis, verum etiam ita simul est deturbatum cerebrum, ut mens non amplius constet. Hinc omnes encephali functiones sunt turbatae, quod non nisi valida fieri potest causa, quam superare interdum actio vitalis non valet.

## L I B. VII. A P H. VIII.

333. **A** Tumoris intus ruptione, exsolutio, vomitus, & animi deliquium.

**I. T**umor seu Tuberculum græcis dicitur *σῶμα*, præprimis si pus contineatur in quodam sacco vi morbi facto: est ergo Abscessus purulentus quodam in parte corporis, qui lapsu temporis rumpi potest interne, vel externe, id est Pus in eo sacco membranaceo contentum ruptis repagulis effunditur in loca vicina minus resistentia. Dum enim pus continetur in quadam parte dilatata, ille sacculus ab omni ambitu non æqualiter sustentatur, unde contentum pus more omnium humorum ea latera, quæ minus firma sunt, & minus sulca, distendit, unde sensim dehiscuntibus fibris eam partem constituentibus, magis magisque secedunt, admittuntque puris ingressum in earum interstitia, quod liquecendo, & corrumpendo tandem quasdam fibras solvit, & ita sibi viam exitui pandit: quod si ad loca interiora minor sit firmitas hujus sacci, vel minor sustentatio, pus ad interiora erumpit funditurque in cava quædam naturalia, uti in pectoris, ventris, ventriculi cavitates. Ita quidem homo liberatur a dolore eo, qui ex tensione producebatur, & ita videtur levari, sed quia pus non emittit, id stagnando magis corrumpitur, & accedente novo pure, ille locus magis impletur nova inducit mala; hoc ut sciamus, quædam observavit Auctor phænomena, quæ monent, talem abscessum, vel tumorem intus rumpi.

Ex qua  
causa tu-  
mor in-  
tus rum-  
pitur.

II. Quia Tumor intus disrumpens sæpe externe nulla dat signa ruptionis, necesse est, ut ex aliis inductis mutationibus cognoscamus, num talis interna ruptione sit facta: ex multis aliis primo numerat *ἐκλυσις*, quod Exsolutio exponitur, refertur in hoc loco ad actiones animales, vitales, quando homo hucusque vix quiescere potuit, nunc quasi viribus privatus languidus decumbit; cujus pulsus ex Irritamento erat satis valens, invenitur languidior, & debilior: tensio enim illa in lateribus tumoris, rupto illo, prompte cessat, unde cessante illo irritamento omnia quiescunt, sed infideli signo, quæ antea agitata se validissime movebant. Alterum signum est Vomitus, qui a multis causis concitari potest, ut passim observavimus, omnes autem hæ cause non agebant immediate in ventriculum ipsum, sed interdum etiam in remotioribus partibus, modo ex causis istis generaretur motus ventriculi inversus tam validus, qui potest musculos abdominales in consensum trahere, ut ita conspirantibus his binis actionibus, contenta ventriculi reddantur per os; nam neque solus inversus ventriculi motus, neque sola musculorum abdominis contractio Vomitus facere potest, sed his binis cooperantibus. Hoc quidem signum interdum provenit ex rupto abscessu ad interiora, sed incon-

A tum ore  
intus ru-  
pto Exso-  
lutio, Vo-  
mitus, &  
Animi  
deli-  
quium.

stans est: sæpe enim observavi ruptionem internam sine Vomitu superveniente: nam qui in empyemâ incidunt ex rupta Vomica pulmonis, vel pleuræ, raro a vomitu vexantur: quare si accedat, significare potest, tumorem fuisse ruptum circa, vel in ventriculo. Denique sequitur Animi deliquium, ἀπολογία ex intus rupto tumore, quando ita minuitur sensus, & motus animalis, ut homo vix mente constet, & totus fere motus vitalis cesset. Hoc quidem fieri potest nimia facta evacuatione, qua vasa cingentia tumorem sustentaculo orbata, tantam in se recipiunt sanguinis copiam, ut in reliquo corpore non remaneat sufficiens ad circulationem continuandam. Raro autem istud fit a rupto interno abscessu purulento, sed si intus fuerit Varix, aut Aneurysma, horum ruptione, quia ita effunditur sanguinis ingens copia, facile fieri potest Lypothymia, & etiam Syncope.

## L I B. VII. A P H. IX.

334. **A** Sanguinis fluxus delirium, aut etiam convulsio, malum.

**I.** Nisi experientia constaret, homines ex nimio sanguinis fluxu incidere in Delirium, & Convelli, plane videretur negari debere, quum in Delirio, & Convulsione major videatur esse corporis actio, quam in sanis, quæ actio semper debilitatur sanguinis fluxu: atque constans est mos in Delirantibus multum sanguinis detrudere, ut minuatur ille impetus. Observatio tamen practica Hippocratis dicta confirmat, & sæpe etiam in praxi observavi, præcipue post lothiorum profluvium in puerperis, quæ interdum per longum tempus delirarunt, aut convellebantur. Quomodo ex nimio sanguinis fluxu generatur Convulsio, superius (Aph. 106.) exposui, quare hoc loco videndum, quali modo generatur Delirium. Ut mens in nobis constet, boni spiritus esse debent in cerebro, & qui moventur æquabili fluxu, nam si spiritus modo inficiantur per quædam assumpta, vel morbosam materiem, uti in Melancholicis experimur, generatur Delirium; & solo motu cerebri turbato, quemadmodum in capitis læsionibus, & meningum inflammatione detegimus, mens quoque delirat. Igitur solus motus turbatus si fieri potest per nimiam sanguinis evacuationem, ille valet Delirium generare. Verum quoties ita destruitur æquilibrium in viventibus, toties turbatur etiam motus, & inde mirum est, quod non frequentius Delirium generetur post copiosam evacuationem. Hoc boni inde habemus, ut reddamus cautiore in imperanda venæ sectione, sed ut inde discamus, nos debere per analeptica, & corroborantia restaurare vires, ut ita compescamus Delirium.

## L I B. VII. A P H. X.

335. **A**B ileo vomitus, aut singultus, aut convulsio, aut delirium, malum.

Ab Ileo  
Vomitus,  
malum.

**I.** Vehementem Intestinorum tenuium dolorem, in quo status veluti circumvolvuntur, & urgentur sursum, vocari Ileon seu Volvulum, supra observavimus (Aph. 101. XIV.). Hujus causæ multæ sunt, sed semper validissime, ut nunquam, vel rarissime aliquid deponatur per anum, sed omnia urgeantur sursum, imo suppositoria, & clysmata injecta. Ergo non est necesse, ut contenta rejiciantur per os, quemadmodum multi statuunt. Hoc satis ex Textu constat, nam dicit Auctor; si Volvulo Vomitus superveniat, malum. Si enim Vomitus perpetuo adest, non esset signum malum, neque supervenire posset. Nunc autem Vomitus superveniens propterea malum signum præbet, quia indicat non solum Intestina in motum inversum cieri, sed & ipsum etiam ventriculum, quare ab

ano

ano ad œsophagum motus peristalticus habetur inversus cum dirissimis doloribus, quod peius est, quam si sola Intestina fuissent affecta: atque Vomitus ille interceptit omnem applicationem medicamentorum, quæ ad Volvulum curandum ore dantur, nam statim ac ingesta fuere. Vomitu tunc rejiciuntur, ut istis nihil efficere valeamus. Inde Vomitus est malus & ut signum, & quia interceptit curationem necessariam.

II. Singultum fieri ab affectione Oesophagi, quando diaphragma spasmodice inde trahatur deorsum, supra (Aph. 304. I.) notavimus. Si ergo motus inversus intestinorum non solum propagetur ad ventriculum, sed etiam ad œsophagum, signum adhuc est peius, quam si solus Vomitus adesset, quia latius dispersus est morbus, plures partes in consensum trahit, & inducere incipit Convulsionem, ut nobis ex Singultu patet, qui species Convulsionis est.

III. Singultus quidem est species Convulsionis, sed qui a leviori causa generatur, quam Convulsio totius corporis, & qui ex affectis tenuibus intestinis facilius per consensum potest generari, propter continuitatem membranarum, quam Convulsio totius corporis: propterea si superveniat Convulsio, majus significatur malum, quam prædici potest ex superviente singultu.

Ab Ileo Singultus, malum.

Ab Ileo Convulsio, malum.

## L I B. VII. A P H. XL

336. **A** Pleuritide peripneumonia, malum.

I. **P**leuritidis (Aph. 109. IV.) & Peripneumoniæ (Aph. 109. V.) definitionem dedimus, ex quibus colligitur, Auctorem, si absolute hos morbos ponat, intelligere Pleuritidem, & Peripneumoniæ inflammatoriam, vel erysipelatofam. Tribus modis a Pleuritide fieri potest Peripneumonia. (1) Si valida sit Pleuritis, quæ sensim aucta etiam in consensum trahit Pulmones, ut diximus, singultum, & convulsionem fieri ex Ileo. Tunc manent æque valida, & interduum validiora symptomata Pleuritidis, & insuper accedunt signa Peripneumoniæ, quod pessimum est, quia tunc æger laborat duobus morbis simul, quorum accedens periculosior est præcedente. (2) Si materia inflammatoria, vel erysipelatosa imperfectam translationem faciat ex Pleura in Pulmonem, levatur quidem aliquo modo a dolore lateris, sed magis aggravatur in respiratione, & anxietate. Hæc mutatio quidem minus est periculosa, sed tamen pejor, quam si non accessisset Peripneumonia, quum omnis imperfecta metastasis sit mala; & majus malum est, pulmones esse affectos quam pleuram. (3) Si vero perfecta fiat materis translatio ex pleura in pulmones, ut æger integre liberetur a lateris dolore, sed aggravetur in respiratione, & anxietate, neque illa perfecta metastasis laudabilis est, quia fertur materia a parte magis principe, & minus utili ad partem magis principem, & vitæ utilissimam. Galenus dicit quibusdam in exemplaribus, malum adjectum inveniri, eo scopo ut solummodo indicaretur unius morbi in alterum commutatio: sed si istud malum inveniat adjectum, sive non, ex data descriptione semper tamen malum est signum, in quocunque casu accipiat. Multi autem disputant, fieri non posse ex pleura in pulmones translationem, quum sint duæ partes distinctæ, at illi nesciverunt, arteriam bronchiale plerumque ex intercostalibus oriri, & quia arteriæ valvulis carent, facile esse, partes utrasque ex eodem trunco arterias habentes communi morbo laborare posse: neque attendunt, omnem sanguinem totius corporis per pulmones ferri debere, quare pulmones facilius, quam quævis alia pars, eo morbo corripi possunt.

Translatio triplex,

## L I B. VII. A P H. XII.

337. **A** *Peripneumonia phrenitis, malum.*

**I.** **Q**uod statim observavimus de translatione materiæ ex Pleura in Pulmones, hoc etiam est observandum de translatione ex Pulmonibus ad Encephalum, ut ibi faciat Phrenitidem (*Aph. 109. VII.*). Videtur tamen ob stare, Pulmones æque esse organum vitæ necessarium, quam partes in Encephalo: verum si quædam fuerit morbi materia collecta in Pulmonibus, illa tamen potest reddi per sputum: dum vero ex Encephalo vix datur locus pro exitu. Est etiam inter Metastasis regulas receptum, omnem translationem ex loco, ubi evacuari potuit, ad locum ubi non potest evacuari materies, esse malam; neque laudanda translatio ab inferioribus ad superiora. Neque per Phrenitidem supervenientem constat totam Peripneumoniæ fuisse sublatam: quum raro inter has partes perfecta habeatur metastasis. Denique si soli pulmones sint affecti, æger mente constans, & morigerus permittit, ut omnia auxilia adhiberi possint; sed si in Phrenitide mente sit captus, non solum periculosior morbus, ex recensita metastasi, verum etiam æger respuit omnia auxilia adhibenda, neque concedit quietem corpori, ut morbi materia ad maturitatem deduci possit, atque continua corporis agitatione admodum consumit spiritus. Recte igitur dixisset Auctor, pessimum esse signum. Hanc autem translationem adscribere cum Galeno, & ejus Affectis, vaporibus ex pulmonibus elevatis, cerebrum opplentibus, observationibus anatomicis non respondet. Hoc autem istis est condonandum, quibus circulatio sanguinis per arterias, & communis nervorum & membranarum consensus non satis fuit cognitus. Sed materia Inflammatoria, vel Erysipelatosa, quæ aggreditur pulmones, ea etiam potest per alias arterias ferri ad Encephalum, ut partium contentarum motum perturbet; vel ita agitare nervum, ut alter coherens, sed ad aliam partem tendens, in consensum trahatur, quod passim in his operibus observavimus.

## L I B. VII. A P H. XIII.

338. **A** *B ardoribus vehementibus convulsio, aut tetanus, malum.*

**I.** **L**item nostram non facimus, num Ardor *καύμα*, vel Vulnus *τραύμα*, sit legendum, quum utraque sententia sit vera. Duntaxat observaturi, quomodo ex Ardore vehementi dicta mala generari possint. Tribus modis vehemens Calor corpori conciliatur, actu calidis, vel potentia calidis applicatis, vel ab interna causa morbosa. Hunc ultimam speciem Auctorem hoc loco intelligere autumo, quum versetur in tradendis regulis, quæ indicant mala, si unus morbus alteri superveniat. Videndum ergo erit, quomodo causa interna possit inducere Ardorem vehementem. Constanti observatione comperimus, causam circulationem facientem pari passu cum aucta circulatione augere calorem; omnis enim causa, quæ auct circulationem, ea quoque auct Calorem nostri corporis naturalem, & vicissim ex languidiore circulatione generatur corporis frigiditas. Hoc autem loco non est concipienda sola velocitas, quum motus circulatorius validius esse possit cum parva velocitate, quando ad extrema arteriarum simul habeatur fluxus impediendum. Quare hic accipiendus est impetus, quo urgetur sanguis, ut transeat per vasa, non vero ipsa velocitas, qua pergit. Et quod memorabile est, eandem causam petens cum posito impedimento ad extremitates, majorem calorem faciet, quam si libere persuere possit. Arteriae enim tunc magis sanguine turgent

tes faciunt, ut earum fibræ motu virali agitatae, cum majori applicatione ad se invicem compresse, validiorem attritum faciant. Igitur ex solo motu virali validiore, vel ex sola resistentia ad extremitates arteriarum majore intenditur corporis calor, sed fit vehemens, si utraque hæc causæ simul operantur. Si autem solum obstaculum sit causa, tandem nimis magna copia sanguinis collecti in arteriis opprimuntur vires, quando calor major convertitur in frigiditatem. Sed si motus vitalis intenditur sine impedimento ad extremitates arteriarum, is motus sensum majorem Calorem concitabit, qui tamdiu continuabitur, donec consumti sint spiritus, vel sanguis ita compactus, ut transitui sit ineptus; quod in febribus Ardentibus sæpe experimur. Constat ergo ex his, Ardorem vehementem semper exigere vires vitæ instigatam per stimulum quemcunque. Si tunc tandem ex Vehementibus Ardoribus generetur Convulsio, aut Tetanus, qui morbi generantur ex motu animali involuntarie validius agente, signum est, stimulum istum non solum agitare motum vitalem, qui facile a stimulo quovis movetur, verum etiam motum animale, qui non nisi ex valida causa contra voluntatem nostram patitur moveri. Ergo ex Convulsione, & Tetano superveniente, quoniam illa actio non tollit stimulantem causam, & quia designat illam causam admodum esse magnam, atque motum animale in consensum trahi, hæc symptomata supervenientia malum præsignium præbere debent.

## L I B. VII. A P H. XIV.

339. **A** Plaga in caput, stupor, aut delirium, malum.

**L**EX Anatomicis constat, in cranio contineri Cerebrum, & Cerebellum molle, pulposum, multis vasis tenerrimis intertextum, ex quibus partibus incipiunt omnes canaliculi nervosi ad sensum, & motum destinati: invenerunt accuratissimi hodierni Anatomici, canaliculos nervosos ad motum destinatos duriores, & tenaciores esse, quam qui sensibus inserviunt; quare hi canaliculi nervosi, qui ad sensum sunt destinati, facilius destrui, & turbari possunt a causa externa concutiente, quam qui ad motum pertinent. Si ergo concutiat Caput, sive sit simplex concussio, sive Contusio, sive Vulsus fieri facile potest, ut Encephali contenta perturbentur, aut vasculum aliquod disrumpatur, ut contentum sanguinem evomat. Unde ex Capitis plaga multa sunt mala, ut etiam levissima plaga capitis sit periculosior, quam magna contusio, vel vulnus aliarum partium: inter hæc mala symptomata multa, quæ indicare possunt, contentum Cerebrum esse læsum, citat Stuporem, & Delirium: non quod plura accedere nequeant signa mala, sed quia observavit ex his supervenientibus ægram post plagam periisse. Stupor *ἡπληξ* tunc dicitur præsens, si organa sententia affecta non faciant, ut mens nostra illam affectionem percipiat. Talis Stupor est universalis per totum corpus in omnibus sensibus simul, vel est particularis in quodam organo, quadam corporis parte, quando diversa accipit nomina, uti surditas, cæcitas, adipsia, dolorem non sentire &c. Hoc autem loco intelligi debet privatio omnium sensuum, ut ægri apertis oculis jaceant non videntes, nec audiant strepitum, neque vellicati sentiant, sed tamen moveant, vel movere possint musculos motus animalis. Signum ergo est, eam partem cerebri vel esse compressam, vel turbatam, ex quoriam nervi ad sensus destinati. Homo autem delirat, quando per nervos sensuum externorum adferantur motiones, quæ non fuerit concitate in organo sentiente, sed alibi, & mens tunc simul ratiocinatur ex his alienis perceptis, quod tunc quoque fit, si illa pars cerebri afficiatur, cui mens nostra consentit. Ideoque tam in stupore generali quam in Delirio tali videtur eodem cere



cerebri pars affecta, nempe ea, cui Deus voluit ut mens nostra consentiret: sed in Stupore omnis communicatio per canaliculos medullosos, vel nervosos videtur intercepta; in Delirio autem eadem partes inordinate ab interna causa videntur agitatae. Sive ergo hic, vel ille modus sumatur, semper signum est, aliquam Cerebri partem esse affectam, & quia certe scire non possumus, num causa illa comprimens, vel turbans superari possit, ea signa supervenientia post plagam capitis periculosissima sunt.

## L I B. VII. A P H. XV.

340. **A** *Sanguinis sputo puris sputum, malum.*

**I.** Sanguis ruber ita coercetur in suis vasculis cruentis, ut in statu sano ne guttula exeat; si ergo expuitur sanguis, signum est, vel fines arteriarum aut venarum ita esse dilatatos, ut sanguinem transmittant, vel aliquid vas arteriosum aut venosum fuisse ruptum. Experimur omnibus in partibus, si modo excipiamus pulmones, sanguinem emissum per vascula dilatata non relinquere ulcus, nam vasculis contractis iterum recuperatur perfecta sanitas illa in parte. Si autem ex vasculis ruptis exstillet sanguis, istud vulnusculum plerumque purulentiam aliquam producit, cujus auxilio partes illae separatim consolidantur. Quoties ergo post sanguinis emissionem generatur Pus, signum est eam evacuationem fuisse factam per vasorum lesionem, quae vasa tempus consolidandi exigunt, quod semper pejus est, quam ex vasculis solis dilatatis. In pulmonibus autem, ut diximus, hoc non semper procedit, quia sanguis in pulmonibus effusus sponte effluere nequit, uti ex partibus reliquis; sed quia attollendus est contra naturalem gravitatem, subsistens in bronchiis, & vesiculis pulmonum corrumpitur, qui dein sanguis acris factus, corrodens adjacentes partes, ulcus format, quod pus exhibet; hoc autem non ita verendum in aliis partibus, nam si proveniat ex naribus, vel faucibus sine vasorum lesione, ut & in ventriculo, & intestinis istis in locis non tamdiu stagnabit, ut suscepta corruptela ulcus forinare possit. Si autem in his partibus sanguis manat ex vasculis ruptis, tunc tandem pus formatur, & ejici potest, quod interdum quoque observavi in sanguinis sputo ex faucibus per lesionem vasorum. Ergo generaliter verum est, a sanguinis sputo puris sputum esse malum, quia designat relictum fuisse ulcus purulentum in partibus internis, vel sanguinem ex pulmonibus fuisse evacuatum, ubi pessima sit sanguinis effusio ex ratione superioris data. Quia vero omnium maxime post sanguinis sputum ex pulmonibus expuitur pus, inde ex hoc phænomeno apparente malum praesagire possumus, nam nullibi ulcera difficilius curantur, quam in pulmonibus, quia non conceditur quies ad consolidationem, & pus confectum difficulter sursum expurgari potest.

## L I B. VII. A P H. XVI.

341. **A** *Puris sputo tabes, & fluxus. Postquam vero sputum retinetur, moriuntur.*

A. Puris  
sputo,  
tabes, &  
fluxus.

**I.** Pus per os ejici nequit, nisi intus lateat aliquod ulcus, quod in se Pus format, & dein mittit versus os, ut ita ejiciatur. Istud autem ulcus haerere potest in pulmonibus, ventriculo, faucibus, & aliis locis, & sinibus internis, qui confectam morbosam materiem in fauces deponere possunt. Semper ergo puris exspitio significat internum latens ulcus. Si autem hujusmodi puris exspitio continuetur, ut hic indicatur, notat ulcus istud internum perseverare, quando tandem continuata puris confusione corpus debilitatur, sed praecipue in omnibus

bus ulceribus internis id fit, quod pus ita confectum bonis misceatur humoribus, & istos inquinat. Hoc speciale in Pure est observandum, quod, etiam si humor ex morbofis optimus, & semper laudetur in abscessibus, ulceribus, & vulneribus, nunquam tamen, si retineatur in corpore, per actiones vitæ ita possit assimilari, ut bonum præbeat nutritium humorem, vel ita attenuari, ut invisibiliter exeat, sed retentum tandem convertatur in humorem ichorosum acrem rodentem, raro autem in materiem spissam concretam. Si ergo quadam in corporis parte fit ulcus, vel abscessus Pus generans, plerumque ejus puris quædam portio retenta in Ichorem conversa, absorpta, massam circulatoriam inquinat, unde tunc generatur febris hæctica, qua sensim extinguatur naturalis cohærendi potentia in humoribus, pinguedo liquefcit, sic sensim emaciatur corpus, (Aph. 89. III.) quando vocatur Phthisis. Denique vero ita liquefcunt, & degenerant humores, ut qua data porta effluant. Sepe autem pereunt alvi fluxu, & capillorum defluvio, (Aph. 205. I.) ut & sudoribus colliquativis. His enim evacuationibus in corpore emaciati tanta demitur humoris copia, ut id quod remanet, non sufficiat ad vitam sustentandam; atque signum est, ita esse solutos humores per corruptelam, ut inepti sint ad solita munera præstanda. Igitur per Tabem in hoc loco intelligitur emaciatio ingens, & morbofa, & per Fluxum omnis illa copiosior evacuatio colliquatorum humorum, quæ utraque generantur a pure corrupto sanguini circulanti misto.

II. Recentia illa mala Phthisis, & Fluxus generabantur a pure corrupto sanguini misto; quamdiu autem satis libere pergebat Puris rejectio, parva tantum portio puris miscebatur sanguini, quæ concitabat febrem hæcticam, reliqua vero pars puris nati emittebatur: si vero tandem hæc etiam emissio subsistit, & minuitur, non ex minori puris generatione, quod bonum esset, sed ex impedita evacuatione, illa materia viribus vitæ non superanda retenta sensim in maligniorem indolem convertitur, quia & copia majore tandem pars integre corrumpitur, & destruitur, atque multitudine opprimitur. Igitur sedulo attendendum in Puris minuta evacuatione, & suppressione, num fiat ex minori Puris generatione, an vero ex confectis Puris retentione. Optimum equidem est in Ulceribus, & Abscessibus, si sensim puris copia minuatur ex bona causa, nam subito illa generatio nunquam ex bona causa subsistit; sed si minuatur vel sistatur non ex minori generatione, sed ex facili retentione, plerumque mortem instare expertus sum in ulceribus internis.

Sputum  
retentum,  
in his  
mortem  
instare si-  
gnificat.

## L I B. VII. A P H. XVII.

342. **A**B hepatis inflammatione singultus, malum.

I. Superius (Aph. 251. IV.) cum Auctore observavimus, Hepati inflammato Singultum supervenire, ubi supposuimus, illam Inflammationem esse cognitam: hoc autem loco, quia præfagium malum est formandum ex singultu superveniente (Aph. 304.) per phænomena primo constare debet, num æger ille laboret Hepatis inflammatione, quia ægri hoc non indicant, sed a medicis inflammatio latens est eruenda; dein videndum, ex qua ratione malum elicitur præfagium ex Singultu superveniente. Theoretica contemplatio facile suggerere videtur signa Hepatis inflammati, modo enim generalia signa Inflammationis applicentur ad Hepar, in promptu videtur, juniores medicos eam inflammationem cognoscere posse. Si vero hi ad praxin veniant, non parum ipsis hæret aqua, præcipua enim characteristica signa Inflammationis non apparent, quum lateat hoc viscus sub integumentis, & musculis abdominis, quo absconduntur omnia signa, quæ oculis deteguntur in externarum partium inflammatione: atque pulsus frequentior, & durior, omnium internarum inflammationum perpetuus comes, in Hepatis inflam-

matione reddi solet mollis, & debilis: neque tantus dolor in Hepate quam aliis partibus inflammatis detegitur: denique partes adjacentes, & ipsum Hepar affectum multa anomala signa inferunt. Quare non facile est determinare, num Hepar sit inflammatum. Præcipua sunt, febris continua, anxietas hypochondriorum, color ictericus per corpus, tumor in dextro præcipue hypochondrio, cum pulsatione hac in parte. Et quoniam Hepar magnum est viscus, si ejus pars sima inflammata sit, ventriculus maxime consentit, ut cibis descendens ventrem torquere videatur, ægri sint nauseosi, & vomitantes cum anxietate summa. Sed si pars gibba superior magis affecta sit, diaphragma, & respiratio magis afficitur simul, dolorque usque ad jugulum extenditur. Si ergo ex his signis nobis constat Hepar esse inflammatum, Singultus certe malum præsagium afferre debet. Demonstravimus enim, Singultum esse speciem convulsionis (*Aph.* 304.), ergo signum est, diaphragma, & œsophagum consentire, seu latius extendi morbum, & scimus motu illo intendi inflammationem, atque per illum motum materiem morbi evacuare non posse. Sed si veniat Singultus, non raro simul inducit suffocationem.

## L I B. VII. A P H. XVIII.

343. **A** *Vigilia convulsio, aut delirium, malum.*

**I.** *Vigilia* ~~αγρυπνία~~ non simpliciter significat vigilantem hominem, sed, uti in hoc loco, si æger morbo correptus per longum tempus dormire non potest. Quia in sanitate somnus, & vigilia se alterne excipiunt, quando ergo homo debito tempore dormire non potest, signum est, aliquam adesse morbosam causam, quæ somnum intercipit. In morbis Chronicis rarum est, quod homines post diuturnas vigilas vel convelluntur, vel delirant: adeoque hoc symptoma est accipiendum in Acutis. In morbis autem Acutis intercipitur somnus, si sanguis feratur majore impetu ad caput, vel materia biliosa acris ad encephalon delata perturbet motum æquabilem, qui ad somnum capessendum requiritur. Eadem etiam causæ, sed validiores, & majores generant Convulsionem (*Aph.* 214. II.), & Delirium: quando nempe partes in Encephalo motu validiore ita agitantur, ut spiritus inordinate, & cum impetu commoti, Convulsionem, aut Delirium generent. Quia ergo illa symptomata indicant majorem perturbatum motum, necessario malum præbent signum.

## L I B. VII. A P H. XIX.

344. **A** *B* *offis denudatione erysipelas, malum.*

**I.** *Non* semper Offis denudato supervenire Erysipelas (*Aph.* 290. I.) quotidie experimur in chirurgicis, si autem superveniat, malum erit signum tam quoad causam, quam effectum. Tunc enim præprimis accedit Erysipelas, si humor ichorosus ex offe nudo effluens ad partes molliores applicatus istas irritat, tumere, & rubere facit, qualis rubedo a multis impericiis pro Inflammatione accipitur: sed quoniam talis tumor ruber magis est pruriens, & non convertitur in pus, sed in Ichorem, atque exigit medicamenta, quæ Erysipelati adhiberi solent, & respuat laxantia, & humida, quæ egregie opitulantur inflammatis, necesse erit, ut hanc rubedinem supervenientem vocemus Erysipelas. Hoc autem generatur, si medulla offis corrupti incipit, ergo signum est malum, quum sit corruptionis indicium. Et mala quoque est causa, nam si putrescat medulla, Os nudatum non solum in loco denudato peribit, sed etiam pars reliqua a medulla corrupta inficietur: atque medulla corrupta intercipiet omnem consolidationem, quia

quia materiem purulentam, quæ alias consolidationem promovet, commutabit in Ichorem rodentem, solventem omnes affluentes humores in putrilaginem.

## L I B. VII. A P H. XX.

345. **A** B Erysipelate putredo, aut suppuratio, malum.

**I.** Erysipelatis materiem esse tenuem, acrem, & calefacientem, nemo dubitare potest, qui superius dicta (Aph. 290.) perpendit. Optimum est si materia ea per insensibilem perspirationem exeat, relinquens partem prius obfessam sanam, istius enim detegitur naturæ, ut nunquam sanis assimilari possit, vel in pus commutari, sed retenta sensim reddatur acrior; propterea tanto cum successu adhibent Chirurgi sicca, & siccantia, atque absorbentia ad Erypelatis curationem, quibus id tenue auferunt. Si vero illa materia relinquitur in loco calido, & humiditate diluta, prompta est ejus mutatio in Putrilaginem, qua non solum boni affluentes humores liquefunt, verum ipsæ etiam partes firmæ, & præcipue pinguedo: tunc non amplius sufficit insensibilis exhalatio, verum quod ita per Putredinem fuit mutatum, simul debet auferri. Quare morbi status pejor est post conceptam illam putredinem, quum declaret causæ augmentum, & promittat difficiorem, & tardiorum curationem. Igitur, cavendum est, ne pars Erysipelate affecta disponatur ad Putredinem. Atque malum est, si Erysipelas abeat in Suppurationem (Aph. 285.). Videtur ex hac observatione nostra sententia destrui, qua statimus materiem Erysipelatosam nunquam abire in purulentiam; sed re penitus inspecta clare constabit, materiem Erysipelatosam semper abire in Ichorem, si non evacuetur, nunquam vero in Purulentiam. Eodem modo de hac materia est ratiocinandum, ut superius (Aph. 285. 11.) fecimus de sanguine effuso. Dum enim acris materia Erysipelatosa irritat partes adjacentes, in his generat localem Inflammationem, quæ pus producit, adeo ut in eo loco habeatur materia Erysipelatosa irritans, & materia purulenta, qualis morbus a veteribus dicebatur Erysipelas Phlegmonodes. Mirum videri alicui potest, quod praxis constanter doceat, mutationem Inflammationis in suppurationem esse bonam, dum tamen Inflammatio ex Erysipelate nata si transeat in purulentiam, in hoc loco dicatur malum. Sed si pura simplex adfuit Inflammatio, quæ commutatur in suppurationem, pus confectum erit blandum, & consolidans: sed si ex Erysipelate adjuncta materia illa biliosa acris admisceatur Puri, istud tunc Pus non manet blandum, & consolidans, atque hoc ichorosum Erysipelatosum non desinet irritare, novamque Inflammationem in ambitu concitare, ideoque malum est, & semper evitandum a chirurgis, ne Erysipelas maturantes convertant in purulentiam.

## L I B. VII. A P H. XXI.

346. **A** Forsi pulsus in ulceribus sanguinis eruptio, malum.

**I.** Observavit Auctor, & quidem nos in quotidiana praxi Chirurgica, sanguinis fluxum ex ulceribus non semper magnum malum portendere, cum vascula in ulceribus semicorrota, & minus sustentata facile erudiant sanguinem: sed si prægrediatur fortis pulsus, id est Pulsatio in ulcere, ubi in sanis non sentitur arteriarum agitatio, tunc sanguinis eruptio facta non caret periculo. Hoc ut ex suis fundamentis intelligatur, præsciendum erit ex quamvis causa generetur illa Pulsatio in ulceribus; dein videndum quodnam malum indicet. Omnes arteriæ non solum moventur a sanguine implente propulso actione cordis, verum etiam

in suis fibris muscularibus donatæ sunt motu vitali, quod demonstravimus in particulari exercitatione De Motu Vitali. Ille autem motus vitalis per omnes arterias in sanis corporibus tam moderatus est, ut nullibi, nisi in quibusdam partibus, ubi arteria satis magna nudius hæret, sentiatur. Sed si quidam Arteriæ ramus, cujus motus antea percipi non potuit, validius moveri incipit, tunc tali in loco non consueto sentitur motus aliquis pulsui respondens, qui hoc loco Pulsus Fortis vocatur, sed a nobis Pulsatio, ut distinguatur a pulsu forti, qui in locis consuetis manu medici exploratur. Hanc Pulsationem fere omnes deducunt ex obstructione, quum arteria ligata supra vinculum validius vibret: ego autem talem causam in his ulceribus invenire nequeo, quia omnia minus in ulceribus sunt sustentata, & experimur omne irritamentum, & lesionem inferre posse pulsationem, in quibus ne vestigium obstructionis potest concipi. Quare mihi indicium est, hoc in ramo arteriæ per irritamentum factum fuisse motum majorem, quem innuimus (*Apb.* 149.), qui ita exagitat arteriam, ut nunc in loco non consueto sensibilem pulsationem faciat. Hoc fundamentum positum evidentissime demonstrabit, Pulsum Fortem in Ulceribus producere posse sanguinis malam eruptionem. Ipsa enim pulsatio fortis indicat, vel quod acre irritans habeatur in ulcere, vel partem inchoasse novam inflammationem, quæ utraq; causæ exasperabunt ulcus: & quia pulsus fortis indicat magnum arteriæ ramum ita agitari, non erit mirum, si ex illo impetu, quem accipit sanguis in eo ramo arteriæ contentus, disfringantur rami arteriosi in ulcere minus sustentati, atque ita evomant sanguinem. Sed si ex tam magno ramo arteriæ, quod nobis constat ex pulsu Forti, ejicitur sanguis, non ita erit in potestate Medici, vel Chirurgi hanc compescere hæmorrhagiam; est enim tunc in ulcere ac si aliquod aneurysma fuisset ruptum. Recte ergo monet Auctor malum esse, si post fortem pulsum in ulceribus sanguis erumpat, quia non potuit semper compescere illam hæmorrhagiam, atque illa evacuatio sanguinis non conducebat consolidationi ulceris: antea enim potuit per balsamica applicata promovere ulceris consolidationem, & modice sustentare partem, nunc vero applicanda sunt styptica ad compescendam hæmorrhagiam & firmior adhibenda est cinctura, atque ita retardatur ulceris curatio, & relinquitur timor recrudescentiæ hæmorrhagiæ.

## L I B. VII. A P H. XXII.

347. **A** Dolore diuturno partium circa venam suppuratio, malum.

**I.** **D**olores diuturniores tandem desinere in suppurationem, sæpe etiam in praxi observavi, sed multi passi fuere diuturnos dolores sine subsequente suppuracione: quare non est constans observatio, omnem dolorem diuturnum abire in suppurationem. Neque hoc indicare voluit Hippocrates: ita passim profert singularia observata, quæ ab ejus Commentatoribus reducuntur ad regulas generales, unde praxin exercentes sæpe falluntur in præsagiendo. Inveniuntur enim humores acres, & tenues per annos dolorem inferentes, uti dolores catarrhosi, & rheumatici, qui nunquam in suppurationem convertuntur. Sed si doloris causa irritando inferat inflammationem, hæc tunc tandem in suppurationem abiens purulentiam exhibet: hoc etiam fit, si ex corrosione materiæ acris fiat vasorum destructio, & ita ulcus internum, hoc tunc pus generat. Quare non est judicandum eandem materiem, quæ tam longum dolorem fecit, abiisse in purulentiam, sed pus natum esse ex superveniente inflammatione, vel ulcere. Hanc nunc suppurationem pronunciat malum esse, quoniam signum est, materiem dolorem inferentem tam acrem esse, quæ potuit destruere partem. Neque suppuratio facta tollit

tollit præcedentem morbum, & raro exhibebit bonum pus, nam corrodens istud puri mistum invertet puris blandam indolem in ichorem rodentem. Ut enim ex prægressa inflammatione producat bonum pus, intra viginti, & ad summum quadraginta dies Suppuratio pus effundere debet: sed si ex alia causa natus fuit dolor diuturnior, ut monuimus, & dein Abscessus, vel Ulcus pus præbens, complicatus est morbus: si vero dolor diuturnior natus fuit ex inflammatione, ex qua non nisi post diuturnum tempus prodit pus, certi sumus quidem multo prius pus fuisse natum, sed quia non fuit evacuatum, diuturniori illa mora pus erit corruptum, & in ichorem rodentem conversum, qui circumjacentes partes corrodit, atque ita post eruptionem relinquit Abscessum, vel Ulcus fordidum. Hæc omnia mala esse, non est opus adstruere. Hæc ergo observatio est generalis ubique in corpore, sed Auditor, quia hoc observavit factum in partibus circa Ventrem, locum simul adjecit,

## L I B. VII. A P H. XXIII.

348. **A** Meracæ dejectione Dysenteria malum.

I. **Q**uando dicantur Meracæ Dejectiones (Aph. 331. II. & Comp. T. 90. LXI.) & qualis morbus sit Dysenteria (Aph. 134. I.) ex locis citatis colligi potest: hoc loco videndum, cur sæpe post meracam Dejectionem generetur Dysenteria, & cur hoc sit malum. Meracæ fieri nequeunt dejectiones, nisi unicus humor tanta copia confluat ad intestina & deinceps evacuetur, ut in Excrementis reliqua ciborum recrementa non appareant. Hinc Dysenteria ab atra bile incipiens, lethale (Aph. 134. II.). Ita alvi egestio viscosa meraca atque alba, mala est. Spumosa Meracæ, Biliosa Meracæ, Sanguinea Meracæ passim observatæ sunt ab Hippocrate, & omnibus Præclicis. In his omnibus copiosissima fuit alicujus humoris depositio, vel vasis ruptis, vel dilatatis, vel natura stimulata ad faciendam copiosiores secretionem. Verum raro accidit, ut in continuato tali fluxu non adsit quædam acrimonia, vel non superveniat; hinc sæpissime post continuatam eam Dejectionem ab humoris acrimonia sensim incipiunt intestina corrodi, & instigari ad frequentiores dejectiones, qualis morbus vocatur Dysenteria. Hæc vero si veniat, malum est signum, nam quamdiu aberat dolor in copiosiore dejectione, signum erat, eum humorem non possidere acrimoniam, sed ex dolore superveniente cognoscimus, istos humores insuper acrimoniam accepisse, quod malum est: atque eadem acrimonia vellicantur magis intestina, ut copiosiores dejectiones faciant, quam antea. Ergo ut signum, & ut causa malum est, si Dysenteria superveniat.

## L I B. VII. A P H. XXIV.

349. **A** B esse percusso delirium, si in vacuum penetraveris.

I. **H**ucusque Aphorismis addiderunt Malum, quod brevitatis gratia Hippocrates non adjecerat: quomobrem etiam huic non addatur, nullam invenio rationem, nam etiam in sequentibus Auditor pergit citare symptomata supervenientia mala, & lethalia: atque sensus hujus Aphorismi hoc exigit; nam si ossa cranii ita fuerint percussa, ut scissura ad interiora encephali, id est in vacuum penetret, Delirium tunc superveniens malum est signum, quod hodierna observatione chirurgica confirmatur. Auditorem intelligere hoc loco ossa Cranii, nullus dubitare potest, nam reliqua ossa fracta, vel percussa usque in cavum, quod medullam contingit, rarissime Delirium inferunt, sed si vulneratur Cranium, ut simul lædantur contenta Encephali, sæpe Delirium generatur. Qui pro vacuo accipiunt

414. *MEDICINA HIPPOCRATICA* *Aph.* 349.  
 cipiunt sinus frontales, vel & Diploen, maxime errant, quia hæ partes non magis inferunt Delirium, quam reliquæ ossis cavitates medullares læsæ. Omne autem vulnus in cavum cranii penetrans Delirium non infert, nam nisi simul afficiantur meninges, quæ suo tunc motu inordinato delirare faciunt hominem, sæpe fit, ut homo mente maneat constans, quod constat multiplici experientia chirurgorum in Cranii fracturis. Sed si Delirium superveniat, periculosissimum est symptoma, indicans partes encephali esse læsas, & motu perturbato agitari.

L I B. VII. A P H. XXV.

350. *A* Purgantis potione convulsio lethale.

I. *M*edicamenta Purgantia, vel majore evacuatione (*Aph.* 196. I.), vel sua virulentia (*Aph.* 126. III.) (*Aph.* 194. I.) periculosas Convulsiones inducere, exposuimus, quare non opus repetere.

L I B. VII. A P H. XXVI.

351. *A* Dolor vehemens partium circa ventrem extremarum frigus malum.

I. *Q*uæ dicuntur Partes Extremæ (*Aph.* 326. I.), & Partes circa ventrem (*Aph.* 347. I.) exposuimus: ubi simul notavimus, hanc particularem observationem generaliter accipi posse, quod etiam hoc loco est faciendum; nam siue vehemens dolor corripiat partes circa ventrem, siue quamvis aliam partem, modo superveniat frigus extremarum partium, malum erit signum. Quod autem Auditor hic posuit casum particularem, non vero generalem, inde est, quia inventores a particularibus tandem ad generalia pervenire possunt: sed si continuata observatione etiam in aliis partibus idem experimur, tandem ex multis specialibus unicam regulam generalem deducimus. Hoc autem hodie facere possumus, quoniam edocui sumus, cujuscumque partis dolori vehementi si superveniat frigus extremarum, malum esse. Multi putant hoc loco intelligi dolorem inflammatorium, qui, si abeat in frigiditatem, indicaret commutationem inflammationis in sphacelum. Sed tunc non tantum signum malum, verum lethale, quia non novi aliquem supervivisse, cujus interna viscera inflammata abierunt in sphacelum: atque tunc dolor ventris, & frigus extremarum non habentur simul, sed tunc evanescit dolor sine ratione. Itaque hoc loco intelligendus est dolor vehemens, qui sua vehementia inducit Extremarum frigiditatem, non vero ex commutatione in sphacelum. Hujusmodi dolores sæpe observavimus, & nobis quoque semper fuisse suspecti. Invenimus enim in nobis viventibus illam legem generalem, omnia irritantia dolorem facientia in consensum trahere motum vitalem circulatorium, ut inde fiat circulatio, & calor major per totum corpus, cum pulsu frequentiore, & duriore. Unam autem speciem doloris detexi in Praxi, qui quo magis intenditur, eo magis minuit motum vitalem, & naturalem corporis calorem, quem sentio oriri ex Acrimonia nitrosa frigida (Vid. *Perisp. Cap.* VII. §. XXI.). Utraque species, nempe dolor calorem inferens, & frigiditatem producens, si sit vehemens cum extremarum frigiditate, malum est signum. Nam si dolores, qui calorem inferre solent, faciant extremarum frigiditatem, signum est, vim vitæ superari magnitudine morbi, & anceps est status, num vires dein instigatæ magis hanc magnam causam superabunt, quod sæpe tamen experimur in paroxysmis febrilibus, qui cum frigore incipiunt: atque perseverans frigus non superabit doloris causam, quum illa superanda sit actione vitali, quæ exercetur in majore, non vero

vero in minore circulatione. Igitur frigus in hujusmodi doloribus vel periculum, vel longitudinem portendit. In altera autem specie doloris, qui semper adjunctum frigus habet, quo major est dolor, & majus extremarum frigus, eo majorem copiam acrimonie quoque declarat, quod etiam malum est.

## L I B. VII. A P H. XXVII.

352. *M*ulieri in utero gerenti tenefmus superveniens, abortire facit.

**I**Dum concepit mulier, naturale est, ut tamdiu ejus os uteri maneat clausum, & foetum retineat viventem, donec omnia ejus membra sint perfecta, ut possit alimentis ore sumtis proprium suum nutrimentum conficere, & in lucem prodians respirare: raro ante septimum mensem ad eam perfectionem venit foetus humanus: si ergo prius in lucem prodeat, quam ut illa organa habeat perfecta, sive foetus prodians sit vivens, vel mortuus, illa exclusio vocatur Abortus, qui est partus maturior quam quo potest vitalis manere infans. Si vero post istud tempus, usque ad legitimum partus tempus excludatur foetus sive vivens sive mortuus, potius illa exclusio vocatur Partus praematurus, quo tempore exclusus foetus omnia membra eoque habet perfecta, ut potuisset a matre separatus vivere. De tali ergo exclusione hoc loco agit Auctor, quae fit ante tempus, quo potuisset foetus exclusus a matre separatus manere vitalis. Multae sunt causae talem Abortum facientes, quae nimis copiosae sunt, quam ut hoc loco recensentur, sed solus Tenefmus hic assignatur, qui Abortum minatur. Quare in Gravidis si adveniat, Abortum praedicere possumus. Meretur hoc loco examinare, quali modo Tenefmus Abortum facere possit. Si intestinum rectum a quavis causa irritatur, in ejus fibris muscularibus aliquis concitatur motus, qui contenta non solum hujus, sed etiam intestini coli determinat versus anum, & ita ejicit: & ut haec ejectio validiore potentia peragatur, naturali lege muscoli abdominis in consensum trahuntur, qui non solum tunc quasi contra voluntatem nostram constringuntur, sed etiam faciunt motum determinantem deorsum: praeterea cogimur sacra summa inspiratione retinere animam, ut diaphragma magis complanatum posset recessum visceris sursum impedire, quo majore potentia urgerentur contenta intestinorum versus anum. Si tunc adsunt faeces intestinorum, illae ejiciuntur, quando vocatur Alvi egestio. Sed si in intestinis nullae restent faeces, & hoc tamen intestinum ab aliqua causa irritatur, eadem sunt conamina sine dejectione faecum, nisi quod violenta illa compressione extrudatur aliquid mucosi ex lacunis intestini recti. Hic conatus saepe rediens sine dejectione faecum vocatur Tenefmus, seu crebra cupiditas egerendi alvum. Intestinum rectum ad talem ejectionem instigatur, vel a causa irritante ipsum intestinum, vel ita moveretur per consensum, uti experimur in calculosis, si calculus haereat ad urethrae orificium, & in stranguria virorum. In feminis autem, quia uterus intestino recto adjacet, ab eo affecto etiam intestinum rectum consentire potest, quando tunc non amplius in recto intestino sunt faeces, illa femina laborabit Tenefmo. Igitur femina gravida Tenefmo laborat ex causa irritante intestinum rectum, vel per consensum cum utero seu vagina. In utroque casu Abortus instat, si fiat ante legitimum pariendi tempus. Si enim causa illa instigans in utero, vel vagina haereat, nemini mirum esse potest, quod tunc per validissimum conatum, uti in parturientibus, foetus immaturus excludatur. Si fiat autem per irritationem ipsius Intestini, non solum conatus in Tenefmo valide urget contenta uteri, ut ejus internum orificium aperitur, & ita excludantur; verum ipse uterus tandem etiam in consensum trahitur, ut se accingat, quemadmodum in parturientibus, profu-  
fuadere



416 *MEDICINÆ HIPPOCRATICÆ* *Aph. 352.*  
fundere contentum immaturum fœtum. Ex his satis constat, quam cauti esse debeant medici in propinandis purgantibus, in dandis suppositoriis, vel glandibus, & injicientibus clysmatibus feminis gravidis, atque summa cura prompte curare debent feminis gravidis Tenesimum, & Dysenteriam, ne subsequatur iterato conamine egerendi Abortus.

L I B. VII. A P H. XXVIII.

353. *Quodcumque os, aut cartilago, aut nervus in corpore dissectus fuerit, neque augetur, neque coalescit.*

**I**Totum hunc Aphorismum superius (*Aph. 284.*) explicatum invenire poteris.

L I B. VII. A P H. XXIX.

354. *Si Leucophlegmatia detento vehemens diarrhœa superveniat, morbum solvit.*

**I**Ntequam definire valeamus, quomodo vehemens Diarrhœa superveniens solvere possit Leucophlegmatiam, constare debet, qualis sit Hydropis species (*Aph. 101. VI.*), & ex qua causa nasci soleant. Qui homines per totam diu retinet, hi dicuntur Leucophlegmatici: habent ergo hi in cutis substantia, & tunica cellulosa subiecta magnam humoris viscosi, & albi coloris copiam, quo implentur vascula minima, & cellulæ: talis autem tumor in quadam speciali parte apparet rectius vocatur Oedema: si color pallidus commutetur in quemcumque alium, tunc ad Cachexiam refertur: si absit viscositas, potius generale nomen Hydropis retinet. Idea igitur hujus morbi formatur, si concipitur cutis substantia laxior, & minori motu vitali donata, in qua tunc colligitur humor sanus aquosus, seu potius gelatinosus conerescibilis, qui stagnans, vel minus propulsus, sic dictam pituitam, vel phlegma præbet. Ex loco sæpe vocatur Anasarca, & Hypofarca, atque aqua inter cutem. Quando itaque collecto humori accedat paulo major motus vitalis, tunc vascula hunc humorem continentia, magis moventia viscosum eum humorem in fluorem redigent, quum duntaxat cohzreant, quia minus moventur; eodemque motu protruduntur alias stagnantes in venas, & circumducuntur cum aliis. Ita si veniant ad intestina, generabitur vehemens, id est copiosissima evacuatio per alvum, quæ auferet abundantem illam nunc lympham, & restituet corpori sanitatem, quod etiam supra notavimus (*Aph. 270.*). Etiam si experimur in hac specie Hydropis, solutionem fieri vehementi Diarrhœa, hoc autem non procedit in reliquis Hydropis speciebus: nam si Pituitosum Hydropicorum abiens in putriliginem vehementem Diarrhœam faciat, post liquoris evacuationem peribunt ægri itidem Diarrhœa nata ex obstructis glandulis mesenterii, vel cisterna lumbi transitum lymphæ per ductum thoracicum intercipientem, quo fit copiosior, eo citius moriuntur ægri. Neque semper procedit in particulari hydropse, qui oriri potest ex hac, vel illa vena compressa, quod fieri nequit in generali Leucophlegmatia, talis enim obstructio, vel compressio non semper tollitur alvi fluxu superveniente. Neque præbet constantem regulam, omnem Hydropem, vel Leucophlegmatiam curandam esse purgantibus; variz enim sunt Hydropis cause, quarum quedam respuunt purgantia; & quando in Leucophlegmatia non prius fuit solutus humor per alvum educendus, per purgans scilicet.

licietur humor bonus, & fluxilis, relicto viscoso in tunica cellulosa, & cute, qui ad intestina venire nequit.

## L I B. VII. A P H. XXX.

355. *Quibus spumosa egestionis in alvi profluviis, his de capite pituita defluit.*

**I**EX experimentorum defectu multa præpostera protulerunt Veteres de egestionibus spumosis, quæ eorum sequaces non solum amplexi sunt, sed & multis alienis sententiis ornarunt. Si vero rimamur solummodo, quæ nobis experientia suggerunt, multa egrègia, & scitu necessaria petere possumus ex his spumosis egestionibus. Constat experimentis, aerem in intestinis, & ventriculo collectum motu vermiculari æquabili ita uniri humoribus, ut plane evanescere videatur; sed motu inordinato earum partium, etiam si nihil aeris ingeratur, tantam aeris copiam generari, seu potius separari ab adherentibus humoribus, ut non solum intestina, & ventriculus turgant, verum etiam totum abdomen instar tympani tendatur; & quamvis multi ructus, & crepitus emittantur, venter tamen non subsideat, quasi generationis aeris nunquam esset finis. Generatur etiam in intestinis aer, uti extra corpus nostrum ex fermentatione, vel putrescentia contentorum, si ventriculi, & intestinorum adio debilior non valeat spontaneam hanc mutationem arcere. Tali modo natus aer si viscosus, vel pinguis humoribus misceatur, exhibet liquorem spumosum: sed aquosis meris mixtus statim se extrinxis non producit spumantem liquorem. Ut igitur spumosa egestionis fiant in alvi profluviis, requiritur præsentia humoris subpinguis, saponacei, vel glutinosi, qui aeris bullulas retinere potest, atque intestinorum motus inordinatus, qui aerem producit, ut monuimus, & qui simul copiosorem dejectionem facit; nam in tali motu aucto concipi nequit, fieri posse vel fermentationem, vel putredinem spontaneam ex deficiente motu intestinorum. Spumosa ergo egestionis semper significant motum intestinorum perturbatum, sed prout color, odor, & consistentia variat, ita est humor morbosus diversus, qui ex aere admixto spumantem egestionem præbet. Nunquam in praxi observare potui, spumosa egestionem dedisse bonum præsagium, quia semper indicat motum perturbatum, & corruptionem humorum.

II. Quum Auctor accuset Pituitam, inde concludere possumus, eum hoc loco intelligere feces albicantes, seu pallidas, & spumosas, quas etiam sæpe observavimus emissas esse cum capitis dolore. Hoc etiam cum observaverit Hippocrates, existimavit eam pituitam spumosa, quam conspexit egestam per alvum, natam esse in capite, & inde cum impetu delatam ad intestina, & ita ejectam. Multi, nescio quibus rationibus, sed absurdis, adstruere hanc sententiam conati sunt; alii vero eandem ob magnam absurditatem repudiarunt, inferentes talem pituitam spumantem cum impetu ferri non posse ex capite ad intestina, obstrare pulmones, diaphragma, & intestina, quæ exterius in se nihil recipiunt: adeoque judicarunt hanc observationem esse falsam. Nos autem aliquoties experti sumus in capitis doloribus huiusmodi factas fuisse egestionis spumosas, quas puto provenire a succo nervoso acriori præmissis in Encephalo nato, & capsulis nervorum, sensim secundum nervorum cursum ad intestina delato, ibi præbere humorem dictum pituitosum, qualis observatur in gravedine. Si hic humor in cavum intestinorum depositus fuerit, simulque intestina vellecet, motu tunc inordinato intestinorum non solum generatur aer copiosior, verum etiam eodem motu ita miscetur huic Pituitæ, ut præbeat recentitas alvi egestionis spumosa cum multis ventris torminibus.

G g g

LIB.

Spumosa egestionis quæ dicantur, & unde oriantur.

An spumosa egestionis ex pituita a capite defluente?

## L I B. VII. A P H. XXXI.

350. *Quibus febricitantibus, in urina subsidentiæ sunt crassiori farinæ similes, longam infirmitatem significant.*

Urinæ sedimentum farinosum longam infirmitatem significat in febris.

Urinæ inspectio necessaria.

I. **S**i in fundo uroscopii, quod continet urinam in quiete refrigeratam, detegitur Sedimentum farinosum, quod non multum distat a sedimento albo, & bono in febris, quoad externum conspectum, nisi quod illæ partes sint majores, minisque æqualiter distributæ, quam in sedimento albo. Quoniam hæ partes farinosæ non apparent in calente urina, neque tam magnæ ire possunt per tubulos renales, certe constat, istas formari in refrigerata urina. Illa ergo materia hoc Sedimentum formans possidet majorem concrescendi potentiam, quam quæ observatur in Sedimento albo æquali, qua concrevit in grumulos. Quum vero omnis materia Sedimentum formans sit materia morbi, quia illa in sanorum urina non apparet, concludere possumus, tali in febre morbi materiem in corpore adhuc oberrantem pronam esse ad concretionem, & inde viribus vitæ non facile separari posse. Per febres intelligere solet febres continuas, vel quæ non intermittunt, alias enim dici solet in Intermittentibus: quare hoc in loco prælagium fumendum ex urina inspectione, ut promittamus longam infirmitatem. Hoc Auctor noster non desumpsit ex speculatione theoretica, sed quia observavit in ægris febricitantibus, si talis prodiret urina, longam mansisse infirmitatem, quod etiam nos sæpissime observavimus. Quamobrem non omnino inutilis est urina inspectio, ut multi ignorantes urinae arcana rimari contendunt, neque soli urinae inspectioni, uti agyrtæ, & impostores, est fidendum, nam idem urinae signum in omni morbo non præbet idem prælagium. Propterea addit Auctor hoc loco in febris: nam materia febris continuæ salubriter evacuari solet sub forma sedimenti albi, & æqualis, quod sedimentum tantum valet in febris, ut dicatur criticum. Si vero referat farinam crassiorem, in febris significat mæphlogisticam, ex majori motu febrili natam, non abiisse in materiem suppurulentam albam, & æqualem, quæ a natura facile eliminatur, sed in materiem talem tenaciorem, quæ non facile ope renum a tota massa segregari potest, & inde in corpore manens morbum protrahit: aut si postea deficientibus viribus per spontaneam supervenientem corruptelam immutetur, frequentissime novum morbum Chronicum producit. Quamobrem ex tali conspecta urina non solum cum respondente effectu prædixi morbi longitudinem, verum etiam ejus commutationem in alium morbum chronicum.

## L I B. VII. A P H. XXXII.

357. *Quibus autem biliosa subsidentiæ, superne tennes, acutum morbum significant.*

I. **L**iquorem colorem flavum exhibentem, etiamsi non sit vera Bilis, a Venteribus vocari Biliosum, tam frequens occurrit, ut nullus dubitare possit: ita enim omnia excrementa, & humores morbosii flavescerent dicuntur Biliosi, quia non ex omnibus Bilis proprietatibus hoc nomen invenitur impositum, sed ex solo apparente colore. Itaque si id, quod ad fundum uroscopii in urina refrigerata fertur, habet colorem flavum, hoc loco Hypostasis biliosa vocatur. De tali Urina superne Tenui maxime disputant Commentatores, etiam ante Galeni tempora, quidam *arudis*, superne, retulerunt ad Tempus, alii ad Locum,

Locum, quod ultimum ego amplector, quoniam in exercitatione practica talem sæpe conspexi urinam, quæ postea exhibuit morbum Acutum, id est validum, & vehementem. Si modo Commentatores propriam praxin seu observationes in morbis consulerent, facile potuissent sensum, & veritatem Antecessoris nostri intelligere, & confirmare: nam quod posuit Hippocrates, id non ex suo cerebro finxit: sed ex experientia medica defumit, quod etiam deinceps a nobis praxin exercitibus observari potest, ut est illa urina in parte superiore tenuis in fundo sedimentum flavum biliosum habens, post quam conspectam febris vehemens Acuta sequi solet. Si rimamur materiem hanc urinam præbentem, facile erit conceptu, morbum Acutum sequi debere. Materia est Biliosa, id est materia ichorosa flavescens, nata ex materia purulenta, vel inflammatoria corrupta, est enim gravior reliqua urinæ massa, quia fundum petit, qualis major specifica gravitas non invenitur in Bile, quæ spernaretur. Ergo signum est in febribus materiem febrilem non mutam esse in materiem albicantem criticam, sed in ichorosum acrem, & stimulantem humorem, qui in corpore remanens, (nam omnis non ita per urinam emittitur) stimulo suo febrem intendit. Quia vero separatur a reliqua massa urinæ, signum est, hanc materiem Biliosam non ita miscibilem esse communi vehiculo humorum aquoso, unde difficiliter eliminari in posterum poterit. Urinæ superne tenues non significat urinam aquosam, sed pellucidam, & etiam coloratam, nam æque inveniuntur urinæ tenues coloratæ quam decolores: & quam ego vidi in hujusmodi morbis urinam, illa erat colorata flavescens, & superne pellucida, indicans in communi illa massa nihil de materia morbosa contineri.

## L I B. VII. A P H. XXXIII.

358. *Quibus autem urinæ distantes sunt, iis vehemens est in corpore turbatio.*

I. *Quæ mutationes in corpore nostro latentes fiunt, non nisi per phænomena externa detegi possunt; illa autem sunt tradenda, ut nulla de sensu phænomeni restet ambiguitas. Brevitas autem sententiarum, & varia significatio verborum non parvam sæpe parit obscuritatem, quæ totam prædictionem incertam facit. Assumo, hoc in loco agi de urinæ inspectione, quæ reddita suis ab ægro febricitante, quod ex nexu hujus cum præcedentibus Aphorismis desumo, de quo nullus dubitare potest. Sed quæ dicantur urinæ distantes *distances ou épa*, non consentiunt Auctores. Significationem hujus vocis Litteratoribus relinquo: ego autem quod in praxi observavi, & per hanc vocem exprimi potest, proferam. Si Urina in febricitantibus emissæ, refrigerata conspicitur, & invenitur quædam materia ruditer, & inæqualiter concreta, dispersa per totam urinæ massam, talem ego vocarem Urinam Distantem, Divulsam, Separatam, & Inæqualem in hoc loco. Alia autem habetur etiam species urinæ inæqualis ratione temporis, sed tunc potius dicitur urina varia aut inconstans: Talis definita Urina Distans notat, morbi materiem cum reliqua massa urinæ emissam inæqualiter per totam massam esse distributam: & quia urina declarare solet naturam miscellæ materiæ morbi cum humoribus circulatoriis, quod raro in urinæ inspectione fallit, ut passim sumus demonstraturi, tuto concludere possumus ex Urinæ inspectione, qualis sit materiæ morbi status in corpore; nempe morbi materia turbata est, & mixta humoribus circulantibus, quæ nunc viribus instigatis, vi quasi ante debitam coctionem extruditur, nunquam enim cruda nisi valida vi extruduntur. Quoties ergo talis divulsa emittitur urina, inter certissima signa magnæurbationis accipi potest. Hoc ulterius ma-*

Urinæ distantes  
vehementem  
turbationem  
significan-

niffetabitur ex pulſu, anxietate, & inquietudine ægri. Et ſcimus talem urinam non præbere bonum præſagium, quum cruda emiſſa non levent.

# LIB. VII. A P H. XXXIV.

359. **Q**uibus vero in urinis bullæ ſuperſtant, renum affectiones ſignificant, & longam fore invaletudinem.

Ex qua  
cauſa uri-  
na ſpu-  
moſa.

I. **U**Rina per urethram emiſſa, vaſculo recepta, ſi ſit perfectè ſana, aerem, quem deſcendens urina ſecum duxit, prompte dimittit, ut fere inſtar aque puræ effuſæ vix bullis, vel ſpumam per minimum tempus retineat: aer enim cum urina deſcendens ſub recipientis urinæ ſuperficiem ſe in guttulas urina leviores colligens, ſuſum aſcendit, formatque in urinæ ſuperficie bullulas, vel ſpumam non diu perſiſtentem: eodem modo etiam aer conſuaſſando urinæ ſi miſceatur. Si vero illæ enatæ Bullæ, vel Spuma per longum tempus perſiſtant, copioſius generentur, vel omnino non evaneſcant, talis dicitur Urina ſpumofa, vel cui Bullæ ſuperſtant. Experimenta docent, aquam etiam ſpumofam tali modo fieri admiſto glutinoſo, vel ſaponaceo, atque Urina ſtagnando corrupta, conquaſſata, etiam magis ſpumofa redditur. Urina ſpumofa evacuat, ſi in itinere corumpatur, ſi ei admiſceatur viſcoſum, aut ſi proveniat ex putrefactis noſtri corporis humoribus: inde tam frequens in febris colliqvatiſ, putridis, hæclicis, phthiſi, & omni nimia emaciatione corporis, calculoſis, omnibuſque morbis, qui faciunt exire liqueſcentem pinguedinem e corpore noſtro. Adeoque multo plures ſunt morbi in quibus invenitur Urina ſpumofa, quam qui ab Auctore citantur, quod juniores Medicos decipit, exiſtimantes Hippocratem in aphoriſmīs omnes morbos citafſe, quibus redditur Urina ſpumofa: ſed ita ſolitus eſt Auctor loqui, ſi unum alterumve caſum expertus ſit, iſtos abſolute ponere, non quod non haberentur plures, ſed quia iſtos in praxi detexit. Ego autem ex cunctis locis Auctoris collectis, & ex propria experientia multo plures cauſas inveni, quam quæ hic ab Auctore citantur, quas omnes pertrahere nimis extra ſcopum excurreret. Talis igitur urina viſcoſa, ſaponacea, vel pinguedine imprægnata, permittit quidem bullulas aeris urina leviores aſcendere, ſed hæc ſi ad ſuperficiem venerint, totam non relinquunt maſſam, ſed obteguntur tenui expanſa pellicula ex tali urina facta, quæ ſemper indicat aliquam in urina eſſe tenacitatem: atque quo ſpuma eſt copioſior, diutiusque perſiſtens, eo majorem tenacitatem in urina arguit. Quare non ſolum ex urina ſpumante præcedentia dignoſcere poſſumus, verum etiam magnitudinem, & parvitatem mali.

Urina ſpu-  
moſa cur  
renum af-  
fectiones  
ſignificat?

II. Talis urina cum, & ſine febre evacuari poteſt, ut obſervavi in Acutis, & Chronicis morbis: ſed quoniam obſervavit Auctor ſæpe reddi in affectis renibus, inde ex conſpectu tali urina quoque intulit, ſignificari Renum affectiones. Si enim aliquis renum calculo laborat, duplici ex cauſa urinam ſpumantem reddit. Calculus enim ſemper effluente urina perſuſus ſpeciem corruptionis inducit, quare calculoſi etiam reddunt urinam fœtentem, hoc putrefactum urinam ſpumofam facit, uti patet ex urina ſana dein putrefacta. Calculus etiam continuo terendo abradit naturalem viarum mucilaginem, quæ urinæ miſta, & ſimul exiens, urinam magis glutinoſam facit, & inde magis ſpumantem, inde etiam Calculoſi reddere ſolent urinam craſſiorem, & contentis ſaturam. Si vero pinguedo in corpore liquefacta, & acrior reddita per urinæ vias emittitur, in ſuo tranſitu quoque dolorem renibus inferre poteſt, omnibuſque viis urinæ, quibus abradit ſeu abtergit mucilaginem hæc vias naturaliter tegentem, ita illa urina ex ſua natura acrior, nudas tangens partes, dolores nephriticos inſert, quod ſæpe in febris putridis obſervatur.

111. Si

III. Si quis febre laborans reddere incipit Urinam spumofam, ſemper ego quod in praxi obſervavi, iſtos ægros tarde recuperaffe priſtinam ſanitatē: quod etiam rationibus eſt conveniens, nam omnis febris commutatio in putredinem morbum prolongat, quum viſ vitæ neſciat putrefaculum emendare, & carem organo putrefaculum ſeparante a bono; hinc diu durat, priuſquam omne putrefaculum ſuit evacuatum: quod alio modo fit in materia purulenta, & critica, quam natura novit eliminare. Hinc per nullum emundorium invenimus humorem corruptum evacuatū fuiſſe criticum; imo ulcera quandiu putrefacta emittunt, non conſolidantur. Quæ vero ſpumofa urina ſignificat mutationem materię febrilis in putrilaginē; ex generali lege putrefacti longa eſt exſpectanda invaletudo.

Cur longam fore invaletudinem ſignificat?

L I B. VII. A P H. XXXV.

360. **Q**uibus autem pingue eſt, & conſertum quod ſupernatat, his affectiones nephriticas, & acutas ſignificat.

I. **A**lterum phænomenon, quod in febricitantium urinz ſuperficie conſpici- tur, eſt Pingue, & Conſertum, *ἄσπν*, in unum collectum, coacervatum; ſi nempe brevi tempore in urinz emiſſe ſuperficie formatur collectio pinguedinis, neque guttatim, neque inſtar telæ aranearum, neque in modum ſpumæ, ſed conſertum, ſatis denſe ſtipatum, & collectum. Hoc fit, ſi ipſa pura noſtri corporis pinguedo cum urina exeat ſine prægreſſa putredine: nam pingua urinz miſta quia leviora ſupernatabunt inſtar cremoris lactis, & obtegent brevi tempore totam urinz ſuperficiem; ſed ſi putrefacta ſint, & ita aquoſis miſcibilia, ſpumantem faciunt urinam, & non ſeparantur a reliqua urinz maſſa. Talis ergo Urina ſignum eſt, veram pinguedinem in corpore liquatam cum urina reddi.

Unde pingue, & conſertum ſupernatans?

II. Pinguedinem corporis in tunica cellulofa collectam, a vehemēti calore liquatam, & circulatione aucta propulſam, ſanguini primo venoſo miſtam, & ita ad cor delatam, non ſolum in ſubito ſuperveniente febre acuta ardente, verum etiam in motu muſculari validiore, præprimis in obefis, obſervant multi Medici: ex Calore aucto enim fit pinguedo fluxilis, naturalis ei eſt via ex cellulis in venas, ut docet Anatome, & aucta circulatione hæc promovetur protruſio. Igitur non eſt mirum in ardentibus Acutis morbis, ut pinguedo ſanguini miſceatur magna copia. Sed ex aucta illa circulatione ſequitur, Pinguedinem receptam evacuari cum urina: niſi enim motus particularis renum major ſimul accedat, recepta pinguedo in ſanguine cum urina evacuari nequit, ut ſæpe obſervamus in Ardentibus. Ut illa ergo pinguedo exeat, neque ſola circulatio major cum ardore ſufficit, quia his non generatur pinguedinis tranſitus per Renes; neque ſola actio renum valet talem producere Urinam, quia ſi cum ſanguine arterioſo copia pinguedinis non adferatur, renes eam excernere nequeunt. Recte igitur obſervavit Auctor has duas conjunctas affectiones, nempe Nephriticas, & Acutas. Quod opponunt in Marafmo, & Phthiſi non eſt alicuius momenti, quod his non reddant talem Urinam, etiamſi pinguedo totius corporis conſumatur: his enim pinguedo non conſumitur forma pinguedinis, ſed quando Pinguedo in his corrupta fuit, & degenerata evacuatur. Quamobrem his frequentior eſt urina ſpumofa, quam quæ habet Pingue conſertum ſupernatans.

Cur talis urina ſignificat affectiones nephriticas, & acutas?

L I B. VII. A P H. XXXVI.

361. **Q**uibus vero nephriticis exiſtentibus, prædicta ſigna accidunt, & dolores circa muſculos ſpinales fiunt, ſi quidem ad exteriora loca fiunt, abſceſſum

*ſceſſum exſpecta futurum extrorſum. Si vero dolores ſiant magis ad interna loca, etiam abſceſſum magis introrſum fore exſpecta.*

**I.** **N**on omnes Nephriticas affectiones (Aph. 110. VI.) oriri a renum calculo, imo ipſos renes interdum immunes eſſe, ſupra obſervavimus (Aph. 276. II.). Iſtud etiam in hoc loco eſt tenendum, nam qui renum calculo laborant, nunquam reddunt urinam, cui pingue conſertum ſupernatat, ſed urinam ſcetentem, fabuloſam, purulentam, vel & merum ſanguinem mingunt. Quare Nephritis hoc loco eſt generaliter accipienda pro lumborum dolore, & circiter loco ubi Renes hærent. Nulla eſt in toto corpore pars dolens, quæ ingenia etiam peritiſſimorum magis fatigat, ad designandam partem affectam, quam Dolor lumborum, ipſa enim medulla ſpinalis ejuſque membranae cingentes, & nervi inde nati, meſenterium annexum, renes accumbentes, muſculi ſpinales moventes, ſi doleant, eodem in loco doloris ſenſum faciunt; ſed in effectibus toto cælo differunt: inde tam difficile eſt a priori definire, num Lumborum dolor ſit a renum calculo, vel quavis alia cauſa. Noſter quidem Auclor tanquam Divino ingenio præditus retinuit quidem Nephritidis nomen, ſed bene intellexit hunc dolorem non generari ex Calculo, ſed voluit ex perſeuerante Lumborum dolore præſagire Abſceſſum vel internum, vel externum, qualem quoque caſum in quodam etiam viro obſervavimus, ut de veritate huius obſervationis minime ſit dubitandum, ſed potius mirandum, Noſtrum ſenem in rimandis phænomenis, ut ex iis formaret præſagium, neminem habuiſſe parem. Equidem fateor, etiamſi ſimilem traclavi caſum, me non potuiſſe, niſi ab Auclore monitum, talem formare prædictionem. Poniſt Auclor aliquem, qui diu Lumborum dolore laboravit, ſed nullam mentionem calculi, vel difficultatis urinæ mentionem facit, qualia quoque in caſu noſtro non fuere obſervata; potuit ergo illa doloris cauſa hære in partibus lumborum circa renes. Quando illa materia acris ibidem ſatis diu hæſit, tandem auſta acredine circumjacentes partes magis vellicare incipit, ut inde circa locum hunc concitetur inflammatio: huculque incerti fumus, quamam ſit pars dolens, & quid ſit exſpectandum; multæ tunc a medicis ſunt conſecturæ, ſed obſtueſcunt ab eo dolore non reddi calculum, neque urinæ difficultatem fieri, vel reddi cum urina quædam aliena. Hoc nunc in ambiguo ſtatu ſi concitatur febris acuta, & redditur urina, cui pingue, & conſertum ſupernatat, ex monitu Aucloris, certum præſagium ſormare poſſumus, circa hunc locum futurum eſſe abſceſſum vel externum, vel internum. Nam ſi doloris exacerbatio taſtu externo non exaſperatur, verendus eſt Abſceſſus internus, quia tunc inflammatio alius latet: ſed ſi taſtu levi intendatur dolor, ſpes eſt, externe fieri poſſe Abſceſſum, quia locus inflammatus cuti propior eſt. Iſtud nunc acre circa lumbos hærens inflammationem localem faciens, per conſenſum generat febrem Inflammatorium ardentem per totum corpus, uti aliæ magnæ inflammationes locales, qua febre ardente, ut ſuperius monuimus, liqueſcit pinguedo, & traditur circulanti ſanguini. Et quoniam Renes proxime adjacent, ab eodem ſtimulo etiam agitantur, ut non ſolum urinam copioſius extrudant, ſed & etiam pinguedinem tranſmittant. Quando igitur poſt Dolores lumborum diuturniores accedat Dolor circa Muſculos ſpinales, febris ardens per totum corpus, & cum tali deſcripta urina, ſignum eſt, acre id tamdiu latitans in partibus adjacentibus concitaſſe validam inflammationem localem, quæ in abſceſſum deſinere debet: nam ſi cauſa inflammationem produciens manet, ut ſit in hoc humore acri, concitata Inflammatio ſemper abire debet in purulentiam, & nunquam critice reſolvi poteſt. Pus dein factum in hoc Abſceſſu nato per renes reddi æquit, quia extra renus ſubſtantiam fuit formatum;

tum; si vero ipsi Renes inflammantur, sæpe redditur cum urina pus, quod in hoc casu fieri nequit. Inde sequitur necessario puris collectio vel in parte cellulosa externa peritonæi, quando dicitur Abscessus internus; vel in tunica cellulosa sub cute, quod melius, quando formatur abscessus externus. Fieri etiam potest, ut pus colligatur in tunica cellulosa inter musculos lumborum, quod rarius. Huiusmodi abscessus interni periculosissimi sunt, siue maneant in sacco dilatato peritonæi, & se exonerent per longam fistulam externe, quod etiam observavi, siue interne rumpantur, fundentes pus in ventris cavitatem, ubi dein Tympanitidem producant. Nam fistula talis inter musculos decurrens difficile aperta servari potest, & clausa relinquit pus intus; & quamvis aperta maneat, saccus internus formatus vix depurari poterit, suppeditans continuam Puris, vel Ichoris scaturiginem.

## L I B. VII. A P H. XXXVII.

362. *Qui sanguinem vomunt, si quidem sine febre, salutare; si vero cum febre, malum. Curandum autem refrigerantibus, & adstringentibus.*

I. **T**antam fidem, & candorem in Auctore nostro passim detegimus, ut nulli observationem practicam ponat, quin eam in ægris detexerit, in theoreticis autem hinc inde a veritate recedit, non vero malo animo, sed quia præcepta theoretica defectu experimentorum non satis fuere eruta. Quamvis igitur paradoxum videatur, Vomitus cruentum esse salutarem, si fiat sine febre, quum superius (Aph. 135. II.) dixerit, malum esse omnem sanguinem sursum emissum, non tamen credo, hanc sententiam potuisse sine salubri detecto effectu: quod nempe homo abundantia sanguinis laborans per vomitum cruentum supervenientem fuerit liberatus ab istis urgentibus symptomatibus. Verum huiusmodi casus tam rari sunt, ut vomitus cruentus sine febre contingens non mereatur salutaris dici. Sed si comparetur ad hæmoptysin, censendus est minus periculosus, quia sanguis in ventriculo restans commodius per inferiora etiam potest emitte, quam sursum ex Pulmonibus: atque satis longa quies ad consolidandum concedi potest Ventriculo, quæ Pulmonibus non est concessa. Neque tam absolute hic vomitus salutaris potest dici ex mente Auctoris, quum in fine addit curationem cohibentem ulteriorem vomitum cruentum.

An sanguinis vomitus sine febre, salutaris.

II. Sanguinis fluxum curare febrem (Aph. 170. II.), & prævenire abscessum (Aph. 184. II.) demonstravimus, quod autem idem sanguis per vomitum redditus in febris malum significet, ex aliqua accedente ratione venire debet. Qui enim sanguinem in febre vomunt, his signum est impetum ferri ad interiora viscera, quod malum est, dein conatu vomendi, ex quo nullum sit levamen, & agitatione febrili simul fatigatur; denique portio sanguinis in ventriculo restans calore febrili promte in corruptelam convertitur, quæ nova ingesta etiam corrumpere valet. Igitur etiam si salutaris sit hæmorrhagia narium in febris, vomitus tamen cruentus ratione organi, & accidentium rerum, malus esse solet.

Sanguinis vomitus cum febre malum.

III. Generalem curationem in sanguinis vomitu hoc loco proponit, quia non determinat, an sit adhibenda in vomitu illo cum vel sine febre. Absolute ergo monet, adhibenda esse adstringentia, & trefrigerantia, qualis curatio adhiberi solet in omni sanguinis profluvio; atque invenio, omnes quoque practicos hanc Methodum sequi. Postquam vero bene omnia ponderaveram, quæ in tali vomitu cruento fiunt, & experiebar hanc methodum non bene procedere, ob graves aliquas rationes eam methodum in meis ægris repudiavi, & aliam institui, quam reticere in publicum commodum nolui. Si ab acerbis assumtis generetur sanguinis Vomitus, ne aliquid de eo acri restaret in ventriculo, danda est potio di-

Sanguinis vomitus an adstringentibus, & trefrigerantibus curandus?

luens



luens quæ vomitu rejecta id acre simul aufert, sed si fiat a causa interna, vomendi conatus compescendus parva quantitate vini rhenani diluti cum citri succo, & laudano liquido, cavendum ab omni adstringente, & coagulante: hæc enim sanguini in ventriculo effuso mista, eum in thrombum contrahent, qui vomitu difficile potest reddi, & sua duritie, & tandem acrimonia laceffet ventriculum, & ad novum vomitum instigabit, dum interim coagulans datum contentis ventriculi, ut & sanguini mistum, ad contrahendum vasculum apertum sanguinem fundens nihil præstare possit. Quare adstringentia magis obfunt quam profunt in sanguinis vomitu: sed retentus ventriculus vacuus ita contrahet vasculum antea apertum, ut sponte sistatur sine damno effluens sanguis, & ita adducta vasculi latera inter se consolidantur. Quare præcipua curationis pars est facere, & servare ventriculum quantum fieri potest vacuum per aliquot dies, ingerendo alimenta liquida tam parva copia, & partitis vicibus, ut vita servari possit, evitando omnia duriora acria, & copiosiora. Quibus continuatis sponte cessabit sanguinis vomitus, quod adstringentibus facile fieri non potuit.

## L I B. VII. A P H. XXXVIII.

363. **D**estillationes in ventrem supernum, in viginti diebus suppurantur.

Destillationes in  
pectus quo  
tempore  
suppurantur?

1. **C**atarrhorum theoriam omnium maxime invenio intricatam, & multis obscuritatibus obutam, tam ratione originis, quam exitus, & cursus. Maxima pars medicorum catarrhos e capite provenire, in eo generari contendit, uti in organo destillatorio condensatur aquæ vapor frigiditate capite, quum cerebrum frigidius assurgens vapores condenser, & dein destillare faciat: hæc autem sententia per demonstrationes anatomicas diu refutata fuit, quia assurgentes ex ventriculo per œsophagum, & ex pulmonibus per tracheam vapores ad cerebrum pertingere nequeant. Neque conveniunt de exitu catarrhorum, arteriæ enim oppositum cursum servant, & venæ materiem omnem ducere ad cor, sed non cogitant, nervos quoque ex Cerebro oriri, & varias adire partes. Si igitur in eo succo, qui humectat, & nutrit partes encephali, aliqua generatur acrimonia, illa capsulis nervorum a dura, & pia matre mutuatis ad varias partes duci potest. Quare de origine, & cursu catarrhorum nulla obstat via, quin duci possit ad varias corporis partes, & ita etiam ad ventrem superiorem seu Pectus, qualis pars hoc loco intelligitur. Sed tunc illa restat summa difficultas, quomodo materia catarrhosa acris lymphatica possit in suppurationem commutari, quoniam experimur, catarrhos in nares, vel fauces, vel pulmones descendentes raro purulentiam proferre, sed mucum, aut tenuem humorem corrodentem, vel magis spissum, uti experimur in Coryza, Brancho, & tussi ex catarrho natis: nisi velimus per suppurationem hoc loco intelligere materiem huius tenuioris degenerationem in materiem crassiorem, & albicantem, qualem mutationem frequentissime in catarrhis observamus, non vero commutationem in verum pus. Materia enim acris, & tenuis nullibi in verum pus commutatur, sed in materiem albam tenaciorem, quæ quoad adspæctum non multum a pure differt. Quod autem partes catarrho vexatæ tandem verum pus proferant, istud non fit ex mutata materia catarrhosa in purulentiam, sed si ista materia corroserit partem, & ulcus formaverit, quod pus fundit, sicuti etiam superius in materia Erysipelatosa (Aph. 345.) observavimus. Igitur deducere ex hac observatione, quod etiam praxi respondet, materiem catarrhosam in ventrem superiorem destillantem, intra viginti dies commutari in materiem albam magis coherentem, seu concoqui.

L I B.

364. **S**I quis sanguinem, & grumos mingat, & stranguriam habeat, & dolor incidat ad perineum, & imum ventrem, & pectinem, partes circa vesicam laborare significat.

I. **T** Otus hic superius (Aph. 190.) invenitur, quare non opus repetere.

365. **S**I lingua ex improvise impotens fiat, ut aliqua corporis pars siderata, melancholicum hoc ipsum fit.

I. **M**ateria morbosa in corpore hærens, uti est Melancholica, (Aph. 119. II.) Ex melancholia quædam constantia infert symptomata seu phænomena, ex quibus dete-  
 ctis cognoscimus, illam materiem intus latere: alia autem interdum superveniunt, interdum vero non conspiciuntur: hæc adduci possunt ad majorem firmitatem, ut hoc loco Linguz impotentia, & pars corporis apoplectica: cognoscimus hæc symptomata ex melancholia venire, si homo melancholia laborans, & nullo alio morbo, ex improvise corripitur Linguz impotentia, & Apoplexia partis. Illa autem observatio videtur inutilis, quia jam constabat, ægrum laborare melancholia, & propterea non opus esse ex reliquis advenientibus symptomatibus hanc detectionem causæ adstruere. Alio autem modo fit in exercitatione practica; si enim inficius sim, Linguz impotentiam, & Apoplexiam partis oriri posse a materia melancholica, & consular de his duobus simul subito obortis symptomatibus, quæ curanda sunt ablatione causæ, incertus hæreo, quid sit præfagiendum, & faciendum, nisi sciam monitus, hæc oriri posse ex materia melancholica. Sed si monitus fuero hanc observationem, ulterius inquirere valeo, num characteristica melancholiæ signa (Aph. 288. I.) adsint, quæ si invenero, hæc symptomata ut morbum melancholicum curare (Aph. 119. III.) debeo. De his ergo symptomatibus statim pronunciare valeo, periculum esse, quia omnis materiæ melancholicæ decubitus periculosus est (Aph. 321. I.). Nam Linguz impotentia <sup>in parte</sup> notat debiliorem, & minus validum motum, quam qui ad loquelam formandam requiritur. Illa autem linguz impotentia, qua delirantes absurda effutunt, species delirii est, in quo sensu hic non videtur accipi, quia addit Apoplexiam allicujus partis (Aph. 321. II.), quod notat defectum sensus, & motus animalis in quadam parte. Quia vero superius demonstravimus (Aph. 321.), materiem melancholicam in encephalo ad principia nervorum applicatam interdum earum partium, ad quas tendunt hi nervi, extinguere, vel turbare motum & sensum animale, eodem etiam modo hæc duo symptomata ex melancholia nata sunt intelligenda.

366. **S**I senioribus nimium purgatis singultus superveniat, non bonum.

I. **E**X Hypercatharsi (Aph. 197.), & ex Helleboro (Aph. 194.) Singultum effectum malum demonstravimus. Hoc autem loco determinat ætatem, quod in præcedentibus non fecit, forsitan quia detexerat, in Senioribus malum fuisse, si Singultus superveniat, & postea detexit hoc omni ætati competere. Obstare videtur,  
 H h h quod

quod hic Aphorismus serius veniat, & inde fundamentum prioris esse non poterit. Verum Aphorismi non sunt eo ordine temporis scripti, uti observationes serie temporis fuere factæ: collectionem horum aphorismorum fecit Auctor in summa senectute ex iis, quæ multo antea fuere observata, quare forsitan posterior Aphorismus multo prius fuit inventus, quam Aphorismus prior. Hoc solummodo addere possumus, omnes species Convulsionis, ut est singultus, periculosiores esse in Senioribus, quam Junioribus, & omnium minime periculosas in infantibus, & Pueris.

## L I B. VII. A P H. XLII.

367. *Si febris, quæ non est a bile, detineat, aqua multa, & calida in caput affusa, febris solutio fit.*

Qualis Febris non ex bile nascitur.

**I**nter omnes morbos Febrim, propter apparitionem, & causarum multitudinem omnium difficillime definiri posse, superius (Aph. 153 I.) demonstravimus. Inter istas omnes debet esse una species, quæ ex Bile generatur, & iridem altera, quæ non generatur ex Bile. Ut igitur cognoscamus, num multa aqua calida in caput sit affundenda ad curationem, scire oportet, qualis Febris nascatur ex Bile, ut in ea hanc medendi methodum evitemus. Multo certior, & evidentialior fuisset curatio, si non per denegationem, sed per positionem causa proposuisset speciem febris: nam fieri potuisset, quod esset etiam alia febris species non ex Bile nata, quæ quoque hoc auxilium non admitteret, quod demonstrare conabor in sequentibus. Omnes febres, quæ ex humore acri tenui, & calefaciente in corpore nato generantur, dicuntur apud Veteres a Bile oriri, inter quas febris tertiana intermittens primas partes tenet: an vero febris ardens, putrida, hæctica, & symptomatica ex Bile nascatur, non consentiunt. Igitur incertus sum, num in memoratis febribus, atque in quotidiana, & quartana, quæ dicuntur oriri ex pituita, & melancholia; caput perfundendum sit multa aqua calida ad curationem. Proinde incerta hoc loco proponitur curatio. Credo igitur, Auctorem observasse, quandam speciem febris egregie solvi hac aqua calida perfusa, sed & expertum esse, in Febribus Biliois nocuisse.

Qualis febris solvitur multa aqua calida in caput affusa.

**I**I. Quæcunque pars nostri corporis multa aqua calida fovetur, & abluatur, ab actuali illo calore paulo magis eo tempore incalcescit, atque liberatur a sordidatibus cuti adhærentibus, simulque laxatur, & humedatur: sed si destinat ille calor actualis, relinquatur pars frigidior, & laxior, quam erat ante suturem, vel affusionem eam: Si vero illa pars ultra modum incalcescat, & sicca sit ante hanc affusionem, ut experimur in partibus inflammatis, ab affusione hæc lenietur urens calor, humefcabitur pars, & tensio laxabitur. Facile ergo erit ex his conicere, quam in specie febris hæc methodus valeat; nempe si ex insolatione caput incalcescit, & siccatum fuit: siccitas enim, & humor tenuis acer ex insolatione natus humefcabitur, atque concedetur liber exitus humori illi, & qui resistabat in poris, simul auferetur. Aut si quis ex laboribus durioribus propter expulsiorem humoris tenuioris, & compactum sanguinis febricitet, hac capitis abluitione calida ejus humores compacti resolvuntur, suppeditabitur mitis, & tenuis humor aqueosus, & solida contracta sicca humefcabuunt, & laxabuntur. Denique quibus ab aeris frigiditatem, vel ventum prohibita fuit perspiratio, & materia illa retenta febriculam concitat, his per aquam affusam calidam liberior conceditur perspiratio, qua id, quod febrem excitat, eliminatur ex corpore. His ergo in febribus conducit aqua multa calida in caput affusa: sed si materia sit biliosa, uti experimur in morbis erythipelatosis, per affusionem calidam his augebitur bilis corruptio.

L I B. VII. A P H. XLIII.

368. *Mulier ambidextra non fit.*

I. **M**iror sane rem nullius momenti in arte medica, & quæ quotidiana observatione comprobari, & refutari potest, tot verbis, & auctoritatibus agitatam fuisse ab Auctoritatibus, quod fieri possit, vel non, & an sit vera, vel falsa. In re omnibus obvia non est opus uti auctoritate; siue enim Veteres hoc dixerint, siue negaverint, perinde habetur; quotidiana observatio comprobat, multas mulieres, uti etiam viros, utrisque manibus sua opera absolvere posse, & tot invenimus mulieres sinistra manu promptiores, quam viros; ideoque dubitare possum, an ab Auctore nostro, qui res magni momenti posteritati relinquere voluit, hic aphorismus sit relictus.

L I B. VII. A P H. XLIV.

369. *Qui suppurati uruntur, aut secantur, si quidem purum effluat pus, & album, evadunt. Si vero subcruentum, & cænosum, ac graveolens, pereunt.*

I. **Q**uid sit Pus, ex iis, quæ antea exposuimus (Apb. 215. II. & 285. I.), satis colligi potest. Constat ex iis, esse certum specialem humorem morbosum, sed ex omnibus mitissimum, qui suo focu, & blanda indole promovet consolidationem, quippe sanguini mistus facillime vel cum urina emittitur, vel per sputum redditur: inde omnia vulnera, ulcera, & aliz læsiones non consolidantur, nisi bonum pus sit præsens. Hoc loco dumtaxat duæ notiones boni Puris proferuntur, nempe Purum, & Album, reliquas dedimus (Apb. 285.). *Purum*, id est sincerum, merum, nullis aliis humoribus mistum, tunc enim notat, tali in abscessu, vel cavitate corporis omne alienum in Pus fuisse convertum, non affluere ulterius humores in Pus commutandos, neque Pus ibidem tam diu fuisse collectum, ut abiisset in ichorem; nam siue sit immaturum, siue aliis humoribus mistum, siue in putrilagine fuerit convertum, exiens Pus non erat purum. Alterum est, ut sit *Album*, quibus addi potest, ut sit Inodorum, quod alibi notavit Hippocrates, & nos quoque per praxin experti sumus. Uti cuiusvis humori suus naturalis est color, ita quoque Puri, quod, nisi sit Album, nunquam est bonum; ita sanguis debet esse ruber, bilis flava, qui colores sunt inter notiones bonitatis. Unde autem ille color dependeat, non litigo; in posterum forsitan opportunior dabitur disputandi locus. Hoc autem asserere audeo contra multos, albedinem eam non pendere ab acido oleosis misto. *Inodorum* necessarius debet esse, quia sætoris præsentia declarat corruptionem. Contraria vero numerantur tria signa, licet plura sint, quæ Puris malignitatem declarant. *Subcruentum*, *grævis* non est valde malum signum in Pure, si appareat in sputo tussiendo emisso, aut in effluente pure ex aliquo abscessu; signum enim est, vasculum aliquod exiguum adhuc esse apertum sanguinem fundens: sed si pus collectum fuit in cavo pectoris, malum est signum, quia designat pus tunc corrodens læsionem vasorum intulisse, quia hic hæret in naturali, non vero in cavitate: vi morbi facta, ubi naturale est, ut quædam vascula sint aperta. *Cænosum*, *βρωχιδος*, tunc dicitur, si loco puris albi, æqualis, & puri, reddatur materia purulenta fordida, lutosâ, limosa, quæ partim est crassa, partim tenuis, coloris alieni; talis nascitur, quando sanguis reliquique humores Puri admisti non per vim vitæ convertuntur in materiam purulentam, sed per corruptelam convertuntur in talem materiam

Puris boni & mali signa.

partim spissam, & partim tenuem: signum ergo est, spontaneam corruptelam prævalere, quæ nunquam aliquid boni portendere potest. *Graueolens, durabilis*. Pus, licet omnes reliquas boni Puris notiones habeat, semper censetur malum, quoniam indicium est; vel ipsum Pus esse putrefactum, vel ei putrefactos humores esse mistos; quo vero foetor est gravior, minusque tolerabilis, eo pejus est indicium, quia significat eo maiorem puris corruptionem.

Suppuratis scilicet vel ipsis ex pure puri potest portendit signum.

II. Sive Suppurati *ipso* sint homines pus continentes in cavo pectoris, qualis est communis significatio, sive in quavis alia naturali corporis cavitate, vel in cavitate vi morbi facta, quando Abscessus appellari solet, si Pus sponte, solutis integumentis, vel facta sectione aut unctione, evacuetur, ex ejus qualitate judicare possumus, num sanitas, vel mors sit expectanda. Ex descriptione Aulicioris patet, istis temporibus secando, & urendo fieri aperturam; hodie autem, si sponte non aperiatur abscessus, vel erumpat ex cavitate naturali Pus, nunquam ferro ignito aperturam faciunt, sed secando, vel applicatione corrodentis viam parant exitui Puris. His autem omnibus modis, & sponte, si exiens Pus sit malum, ipsa evacuatio tandem mortem infert. Supra (Aph. 292.) notaverat in similibus casibus mortem instare a pure acervatim affluente, hoc nunc loco prognosin petit ex Puris qualitate, & detexit, si Pus bonum exeat, sanitatem expectari, sed si Pus malum conspiciatur, instare mortem. Pus enim exiens nobis non solum præbet indicium Puris remanentis, verum etiam partium circumjacentium, quæ pus sustentant. Quod si Pus bonum exeat, signum est ex puris qualitate aliena nihil verendum esse, partes ambientes ab actu hujus puris facile consolidari posse, ergo in tali casu nihil est verendum ex pure, nisi quod possit nimis magna quantitate evacuari, quod evitari debet, & potest, vel quod ejus evacuatio intercipiatur; quando stagnando corrumpetur; quare sedulo cavendum, ne boni Puris exitus intercipiatur: ejus enim est natura (Aph. 341. I.), ut nunquam assimiletur bonis humoribus, vel invisibiliter evanescat. Sed si exiens sit Malum, residuum intercipit consolidationem, inficiet bonos circumstantes humores, & corrumpet partes firmas cingentes: postquam satis diu fatigavit hominem febre hectica, & consumptione humorum, homo corruptis tandem omnibus humoribus, & privatus viribus peribit.

## L I B. VII. A P H. XLV.

370. **Q**ui ad hepatis suppuratum uruntur, aut secantur, si quidem purum effluat pus, & album, superfluitates evadunt: ipsis enim pus est in tunica. Si vero effluat velut amurca, pereunt.

Ex Hepatis abscessu pus bonum salutem portendit.

**H**epatis duplicem exercet functionem: habet enim arteriam hepaticam motu vitali donatam, ut omnes corporis partes; atque exercet motum particularem ad Bilis secretionem, & secretionem. Observamus regulariter ab actione vitali generari inflammationem, & produci purulentiam ubique in corpore: sed an quævis organorum specialis actio etiam conficiat pus, non satis præcipuum confirmatum est; invenimus quidem organa speciali motu donata suppurari, sed invenimus etiam frequentius abire in putrilaginem, si afficiantur, quam partes reliquæ, in quibus peculiaris non detegitur motus. Si ergo in parte externa hepatis, ubi præprimis ludunt rami arteriæ hepaticæ, abscessus generatur, is saccum formare potest inter communem a peritonæo tunicam, & propriam hepatis, quod etiam observavit Aulicior; ipsis enim, inquit, pus est in tunica. Si pus ex sacco eq per exteriora corporis integumenta fundatur, quod etiam sponte, ut ego etiam observavi, vel incisione, aut unctione fieri potest, exiens pus est

est observandum, nam si sit bonum, (Aph. 369. I.) æger æque quam ex abscessibus aliorum locorum fervari potest.

II. Sed si Abscessus alterius penetrat in Hepatis substantia, ut portio ipsius organi destruat, formatur materia partim ex Pure, partim ex partibus firmis organi cholepoietici, & sanguine venarum portarum atque bile. Inde materia illa ira mista, quia refert recrementum olivæ, vocatur Amurca. Quoties ergo Pus velut Amurca exit, signum est, ipsam Hepatis substantiam consumi; & quoniam Hepar parvo motu vitali donatum est, se non facile potest liberare, atque humor alienus Puri mistus consolidationem impedit; quare lenta tabe cum flavo, vel subluteo colore ægri consumpti tandem pereunt. Talem autem abscessum in dextro hypochondrio perruptum vidi sanatum in quadam Matrona; sed hæc exempla tam rara sunt, ut, si observamus talem Abscessum, pronunciare possimus, si non sit lethale, tamen esse periculosissimum.

Pus velut  
Amurca  
mortem  
prælagit.

## L I B. VII. A P H. XLVI.

371. **I**N doloribus oculorum, postquam merum bibendum dederis, & multa calida laveris, venam secato.

**V**erba hujus, & Aphorismi præcedentis (Aph. 366.) vix inter se differunt, sed tamen sensus est diversus, quia in præcedente varia genera auxiliorum tentanda proposuit, in hoc autem auxiliorum ordinem proponit. Quibusnam in causis ad Oculorum Dolores varia illa auxilia sunt adhibenda, dicto loco exposuimus; sed si deberem certam aliquam causam dolorem oculorum inferentem proferre, eandem darem cum Galeno responsionem. Si quis nos docere possit affectionem, cui tria hæc remedia sint opus, ei profecto gratiam habituri sumus. Quamdiu autem Aphorismum ut germanum, & legitimum recipient, & explicabunt, nec, quænam ea sit affectio, docebunt, non facile eorum expositionibus fidem adhibebimus.

## L I B. VII. A P H. XLVII.

372. **H**idropicum si tussis habeat, desperatus est.

**T**otum hunc Aphorismum, & ejus explanationem invenies (Aph. 300.), ut non sit opus repetere.

## L I B. VII. A P H. XLVIII.

373. **U**Rinae fistulicidium, & urinae difficultatem vini potus, & vene sectione solvit. Secunda vero interne vene.

**S**tranguriam venæ sectione solvi, & secandas esse internas venas, supra (Aph. 301.) exposuimus. Restat ergo hoc loco videre, quomodo vini potione, ~~duplex~~ curari potest Stranguria, & Dysuria. Stranguriæ (Aph. 110. IV.) definitionem dedimus, & ab ea non multum distat Dysuria, quando cum difficultate, vel dolore urina reddi debet. Ex his colligi potest, utrumque morbum generari posse ex variis causis, & propterea curari non posse eodem genere auxilii. Hoc etiam expertus est Auctor, quia duo diversa auxilia tradit, quæ observavit levamen attulisse, nempe Venæ sectionem, quæ minuit motum, & Vini potionem, quæ augeat corporis calorem. Si ergo junior medicus utroque genere auxiliorum uti

Strangu-  
ria & 1  
Dysuria]  
solvitur  
vini potus.

450 **MEDICINA HIPPOCRATICA** *Apb. 373.*  
 uti vellet, tantum noceret, quantum proderet: ne igitur in posterum faciamus pe-  
 riculum, videndum est, num ex motu languidiore generetur Stranguria, & Dysuria,  
 tunc largior Vini potatio est concedenda; sed si experimur adesse ardorem, signa fe-  
 bris, vel inflammationis, a Vini potu abstinendum, sed Vena secanda est.

**L I B. VII. A P H. XLIX.**

374. **A**B angina detento tumor, & rubor in pectore superveniens, bonum: foras  
 enim vertitur morbus.

**I. S**ensus hujus sententiae expositus est (*Apb. 302.*).

**L I B. VII. A P H. L.**

375. **Q**uibus cerebrum sphacelo fueris affectum, in tribus diebus pereunt: si ve-  
 ro hos effugerint, sani fiunt.

Sphacelus  
 quid sit.

**I. P**riusquam prognosin formare possumus, constare debet, quid per Sphace-  
 lum sit intelligendum: perspicimus autem auctores, & ipsum Galenum opti-  
 mum Hippocratis interpretem, tot invenio tricas, & ambiguas significationes, ut  
 vix constet, qualis morbus per Sphacelum sit intelligendus. Foetus multa loca  
 collegit, ex quibus patet, Sphacelum indicare Ossis fiderationem; omnium partium  
 corruptionem seu fiderationem; vitiatam carnem in ulcere; partis internecionem  
 inchoatam, sed non firmatam; Inflammationem tendentem in corruptionem: im-  
 moderatum, & vehementem dolorem; convulsionem ex nervorum inflammatione,  
 fortem tensionem; putredinem, & multa alia mala. Dolendum utique est, tot  
 res diversas eodem vocabulo indicari, quia tunc semper dubii haeremus, qualis  
 morbus sit intelligendus. Nos autem ad omnem ambiguitatem evitandam, in  
*Chirurgia Repurgata* (623.) per Sphacelum intelleximus universalem mortificatio-  
 nem alicujus partis, & distinctionem fecimus inter Sphacelum, Gangrenam, &  
 Escharam, quam significationem ubique teneo, ut semper constet, qualem mor-  
 bum intelligo per Sphacelum. Nostra autem significatio hoc loco admitti nequit  
 quum dicat Auctor, si triduum effugerint, sani fiunt, dum pars Sphacelata nun-  
 quam in vitam redeat, & si Cerebrum tali Sphacelo esset correptum, nullus  
 servaretur. Igitur plane alium morbum Hippocrates hoc loco intellexit, quem  
 potuit aeger superare, ut redeat in sanitatem.

Ex quali  
 Cerebri  
 Sphacelo  
 post tri-  
 dum sa-  
 ni fieri  
 possunt.

**II.** Observavit Hippocrates (*H. a. 344.*), Si aestas sicca existat, & borealis, seu  
 quens vero autumnus pluviosus, & australis, capitis dolores ad hyemem expectare  
 convenit, & cerebri corruptiones, ampliusque ravedines, gravedines, & tusses,  
 aliquibus etiam tabes. Ex tali tempestatum vicissitudine generari humorem cru-  
 dum, & acrem, demonstravimus (*Apb. 92.*), qui hoc loco encephali sphacelum  
 inducit. In Coacis *H. a. 538.* Cerebro corrupto alii in tribus diebus, alii in se-  
 ptem moriuntur. His vero si effugerint, servantur. Has Auctor deduxit generales  
 regulas ex Libro de Morbis: nam (*H. b. 39.*) Si cerebrum inquit, corruptum fue-  
 rit, dolor ex capite spinam occupat, & ad cor animi deliquium procedit, & sudor  
 est, & somni expertus est, & ex naribus sanguis fluit. Saepo etiam sanguinem vo-  
 mit. Infra addit: Hic tertio aut quinta die plerumque perit. Atque *H. b. 31.* Si  
 Cerebrum corruptum fuerit, dolor ex cervicis nervo ad spinam tendit, & ad cor  
 frigus descendit, & repente novus sudor adest, & per nares sanguis fluit. Vo-  
 mitum quoque multum. Hic triduum moritur. Si vero septem dies transgrediat, &c.  
 Pau.

Pauci huiusmodi morbum effugiunt. Dein H. b. 98. Si cerebrum corruptum fuerit, dolor caput tenet, & per collum procedit ad spinam, & eger non audit, & frigus ad caput devenit, & totus intumescit, & repente privatur voce, & ex naribus sanguis fluit, & livida fit. Quod si morbus leviter corripit, ubi sanguis discessit, melius habet. Si vero vehementer corruptus fuerit, cito perit. Huius mutationes per odorata inducitur, & alium purgato &c. Præter hos morbos internos Ossis corruptionem indicat  $\sigma\sigma\alpha\chi\alpha\sigma\iota\varsigma\ \gamma\gamma\alpha\phi\alpha\lambda\iota\varsigma$ . Nam si corruptio, inquit (H. b. 53.), Cerebrum invaserit, dolor tenet maxime anteriorem capitis partem, paulatim etiam intumescit, & livida fit: & febris, & vigor apprehendit. Quum ita habuerit, se cave oportet qua parte intumuit: & perpurgato osse, ipsum vadere, donec ad secundam laminam perveniat: deinde velut fracturam curare. Ex istis locis allegatis possumus deducere Causam, Phænomena, Moriendi, & Sanitatis tempus atque Curationem. Nam per Autumnum pluviosum, & australem, & materia præcedente ætate sicca compacta, retenta sensim hyeme fuit facta acrior, atque ita induxit morbos catarrhicos acres, quæ materia ad pulmones magis deposita inducebat Tussim; ad membranam pituitariam delata Gravedines: sed ad interiora encephali deposita Cerebri corruptionem: nempe ab hac materia partes in Encephalo compressæ, & corrosæ mortem intulerunt, sed etiam superam, & expelli potuit non tamen sine periculo materiam ea, quia nonnulli ita affecti superstites manserunt, uti ex hoc Aphorismo, & locis allegatis constat. Unde legitime concludere possumus, perfectam non semper intelligi ab Auctore mortificationem alicuius partis, uti hodie per sphacelum intelligimus, sed aliquam dispositionem, quæ in mortificationem abire potest. Phænomena huius materiæ delatæ ad Encephalon sunt Capitis dolor ad spinam descendens, Vigilæ, Cordis frigus, & Animi deliquium, Sudor repente obortus, Auditus, & Vocis privatio, Capitis frigus, & intumescencia, sanguis fluit ex naribus, & sanguinem vomunt, ex quo videntur levare, qui vehementia hæc habent symptomata, cito pereunt, sed leviter affecti diutius vivunt, & servantur. In una specie Auctor laudat irritantia, in altera autem refrigerantia. Ex quibus collectis iudicare possumus, materiam illam acrem crudam retentam ad interiora capitis delatam magis minusque esse calefacientem, & acrem corrodentem. Constat ergo Cerebri Corruptionem his locis vocari ab Hippocrate, si materia acris, quæ occupare potest internam laryngis membranam, vel pituitariam narium, occupet Duram matrem, & ejus prolongationem per medullam spinalem, non vero huius patris mortificationem. Hoc probant etiam omnia phænomena: nam si materia illa feratur ad nares, sternutamentum facit cum refrigeratione totius corporis, & quadam febricula, atque effluit in principio humor copiosus tenuis, irritans nares, & labia; interdum etiam hæmorrhagiam patiuntur. Si vero ad interiora laryngis feratur, fit etiam ex irritatione Tussis, quæ multum mucum ejicitur, atque tumente ex membrana fit difficilior respiratio; per totum reliquum corpus refrigeratio, horripilatio, febricula. Eadem nunc materia ad Duram matrem delata, si Dura mater eandem exertet actionem, uti partes recensitæ, eadem quoque fierent phænomena, sed ex ejus loco, & usu diverso alia omnino symptomata conspiciuntur. Nam tumente, & irritata illa membrana homines vigilant, vel compresso aliquo modo nervo acustico æger non audit, & quia illa materia membranosis applicata sensum frigoris inducit, hoc frigus ad caput devenit, atque dolet: continuata illa membrana per medullam spinalem, huic parti etiam infert dolorem, & refrigerationem. Si etiam ad posteriora Encephali veniat, ubi locum est cerebellum, id aliquo modo a tumente membrana compressum facit, ut cor se minus moveat, id est languidiore motu refrigeretur, & denique per tempus subsistat, qualis morbus vocatur. Animi deliquium. Quomodo autem sanguinis fluxus

fiat



432 **MEDICINA HIPPOCRATICA** App. 375.  
 fiat per Nares, facile intelligitur, quia in Coryza hoc quoque observatur, sed sanguinem vomere majoris videtur difficultatis: verum quia sæpe fit, si in faucibus sanguis fluat: quod talis homo deglutitum sanguinem rejiciat, credibile mihi videtur, hoc etiam fieri in nominato morbo. Quemadmodum in reliquis catarrhorum speciebus levamen fit, non vero curatio per hæmorrhagiam, hoc etiam fieri observavit Auctor in Cerebri Sphacelo: propterea non monet venam esse secandam: sed potius esse cohibendum sanguinis fluxum. Si vero, inquit, *plus justo sanguinem vomere tibi videatur, aut ex naribus ipsi fluat, a vomitu quidem bibe farinam trimestris vitrici in aqua inspersam: si vero ex naribus fluat, venas & in brachio, & in temporibus splenis suppositis deligato. At si neutrum horum ipsi adfuerit, doleat autem cervicis nervum, & collum, & spinam, & frigus ad cor processerit, cum erxo pectora, & dorsum, & cervicis nervum, & collum calefacito. Nam his factis maximam utilitatem capere poteris* (H. h. 51.). Quibus patet, cohibere velle sanguinem fluentem, & calefacientibus absorbentibus conari ablationem humoris istius crudi, & acris. Ergo certe constat, hæc symptomata in Cerebri corruptione non oriri ab inflammatione tendente in sphacelum verum, sed provenire ab acri crudo irritante meninges, cujus acrimonia si sit valida, & copia magna cerebrum ita opprimitur, ut æger moriatur vel post tres, quinque, vel septem dies. Sed si ille humor reddi incipit per nares, vel sputum, vel urinam, ægri liberari solent.

## L I B. VII. A P H. L I.

376. **S**ternutatio fit ex capite, percalefacto cerebro, aut perhumectato, quod est in capite, vacuo. Aer enim, qui intus est supra modum (i. e. vi.) feras effunditur. Strepit autem, quia per angustum ipsi est transitus.

Sternutationis causa.

**I**N nobis viventibus ex irritatione facta in cavis narium fit quidam morus involuntarius validus convulsivus, quo aer pulmonibus receptus vi truditur in superiora faucium, palatum mobile, & cava narium, eviens partim per os, partim per nares cum sibilo. Ut illa actio majore robore fiat, atque majorem aeris copiam trajiciat, antequam inchoatur, pectus, quantum fieri potest, dilatatur, & ore aperto magnam aeris copiam recipit: dein facta violenta constrictione omnium musculorum, tam abdominalium, quam aliorum, qui angustare possunt pectoris cavitatem receptus ille aer magna vi extruditur per laryngem ampliatam: ita ruit in fauces, tonsillas, palatum mobile, basin cranii, posteriora narium foramina, exitum sinuum, qui obteguntur membrana pituitaria, & cava narium, ut ita cum sibilo exeat. Hac aeris concussionem, & valido transitu omnes hæ partes quatuntur, & mucus, qui in earum lacunis hæret, excutitur, aut si externe aliquid adhæreat; abripitur, & una cum aere exeunte sæpe extruditur, ut id irritans, vel in lacunis hærens auferatur, quemadmodum tussiendo excluditur alienum in trachea hærens. Hac actio involuntaria tussiendo mechanice concitari potest quavis irritatione facta ad membranam internam narium vestientem per plumelam, pilum, evulsionem vibrissarum, attractionem pulverum, vel vaporum stimulantium cum aere: sine manifestata causa tamen simili modo generatur ab humore acri hic stagnante, vel huc confluente ex sinibus se hoc loco exonerantibus. Ergo Causa sternutationis est irritans hanc membranam, sive sit externa, sive interna.

Sternutatio fit ex capite.

**II.** Facile intelligitur, Hippocratem hoc loco tradere velle causas Sternutamenti ex causa interna, sine ulla cognita causa externa, ut possent medici ex Sternutamento in morbis veniente præagere, quid sit sentiendum ex oborto hoc phæ-

nomen, & quid esset agendum. Primam causam dicit esse Cerebrum percalefactum, id est, si motus vitalis in encephali partibus validior nimium calorem concitavit, arteriæ in membrana pituitaria magis agitate, sua actione stimulantur faciunt tale irritamentum in hac membrana, ut sit a calefacientibus pulveribus, vel vaporibus naribus attractis, qua commota membrana naturali lege concitatur sternutamentum. Inde in impetu majore sanguinis ad caput toties generatur sternutamentum, quod iterata concussione tandem sanguinem extrudit, ut illa vascula disrumpit, atque facit hæmorrhagiam narium, qua illa vasa deplentur, & minuitur impetus, in quo casu sternutamentum est præsignum bonæ hæmorrhagiæ. Sed si ab inflammatis meningibus per consensum pituitaria membrana agitetur, vel si ipsa membrana inflammetur, molesta, fatigans, & iterata sit sternutatio, sine hæmorrhagia subsequente, qua agitatione pars inflammata magis exasperatur. Inde intelligitur, cur in quibusdam morbis acutis atque epidemicis interdum salutaris, aut interdum lethalis observatur sternutatio. Altera causa erat perhumectatum, quod est in capite, vacuum. Veteres, in Anatomicis non satis periti, existimant humores in capitis vacuo spatio, id est, in cerebri ventriculis collectos expurgari per nares, quæ sententia diu fuit firmata; sed postquam Anatomici demonstrarunt, nullam ex ventriculis cerebri ad nares esse viam, hæc sententia omnino fuit repudiata. Observatio autem prædica eam viam adstruere videtur, quoniam cerebrum humiditate, uti videtur, oppressum liberetur copiosiore evacuatione muci per nares, & gravitas cerebri levetur sternutamento, quo multum muci elicitur: verum si membrana pituitaria multo mucositate oppleta, aggravatur etiam caput, & ille potest facile per nares expurgari. Quamvis autem demonstrari possit per aliam viam fieri posse talem evacuationem, hoc tamen non demonstrari, fieri non posse evacuationem ex encephalo. Qui contendunt duram matrem accurate obtegere Os Ethmoidem, ut nihil humidi perflueret possit ex encephalo ad nares, illi non concipiunt, nervos Olfactorios ire per hoc os ad cava narium, in quo transitu negari nequit, aliquid etiam humidi permeare posse. Sive ergo concipiatur, in sinibus frontalibus, vel ephippii hædere mucum, qui in cavum narium destillat, sive concipiatur humiditatem encephali secundum Olfactoriorum cursum in nares descendere, in utroque casu homo sentiet cerebrum seu caput aggravatum, quæ gravitas minuetur humidi evacuatione per nares. Si hic mucus, vel humor tenuior sit mitis, non concitabit Sternutamentum, sed si quædam acrimonia adsit, illa vellicans internam narium membranam sternutamentum concitat, quo elicitur ex hac membrana, quæ & interne vestit sinus recensitos, muci abundantia, cujus evacuatione tollitur ille humor aggravans.

percalefacto cerebro, aut perhumectato, quod est in capite, vacuo.

III. Rationem reddere satagens Auctor, quomodo cerebro calefacto, ex spatio vacuo tanta vi extrudatur in sternutantibus aer, putat humidum in ventriculis cerebri contentum a cerebri caliditate commutari in vaporem, uti aqua in lebetæ, vel vase clauso ab igne subtrato, si tunc alicubi formatur apertura, exibat aer cum impetu. Experimentum utique est verum, sed falsa est facta analogia: nunquam enim cerebrum ita incalcescit, ut est ignis gradus, qui aquam ebullire facit, & in vaporem convertere, neque via tam patula, per quam potuisset ille vapor per nares emitti. Atque ille aer qui in sternutantibus exit, non venit ex encephalo, sed ex pulmonibus.

Aer intus vi foras effunditur.

IV. Vera est observatio, Aerem vi per angustum actum edere strepitum: nam aer pulmonibus pulsus magno comamine in nares angustiores strepitum edit: sed concipere illum strepitum fieri ab aere in ventriculis cerebri hærente, & expanso, omnino anatomicis observationibus repugnat. Hoc autem existimant veteres, quoniam videbant tantam simul humiditatem ejici, sed non conce-

Aer strepit, quia per angustum ipsum est transitus.

L I B. VII. A P H. LII.

377. *Quibus hepar circumcirca dolet, bis febris superveniens; dolorem solvit.*

**I.** *H*ic Aphorismus verbis multum videtur distare a præcedente (*Aph. 305.*), sed sensu tam parum differunt, ut præcedens illa explicatio etiam ad hunc applicari possit, modo hepar circumcirca dolens, & hypochondriorum dolor idem denotet, uti revera hæc sunt accipienda; nam si hepar circumcirca doleat, ille dolor in hypocondriis, ubi hepar hæret, sentitur, & æque per hypocondrii dextri dolorem internum intelligimus Hepatis dolorem, ac si verbis ipsis exprimeretur. In præcedente Aphorismo hi dolores dicuntur fieri sine inflammatione, antequam febris supervenit: sed & hoc loco idem intelligitur, aliter non addidisset Auctor, si febris superveniat. Quare totus sensus ex allegato Aphorismo desumi potest.

L I B. VII. A P H. LIII.

378. *Quibus sanguinem de venis auferre conducit, bis vere venam secare oportet.*

**I.** Totam hanc sententiam supra (*Aph. 312. II.*) exposuimus.

L I B. VII. A P H. LIV.

379. *Quibus inter septum transversum, & ventrem pituita concluditur, & dolorem exhibet, in neutrum ventrem habens transitum, bis per venas in vesicam pituita versa, morbi solutio fit.*

*Hydrops  
omentis  
solvitur  
urina mul-  
ta.*

**I.** Inter Auctores non constat, qualis locus hic ab Hippocrate intelligatur, sed nullam partem huic loco magis convenientem invenire potui, quam Omentum, quod etiam pituita sæpe oppletur, uti observavi sæpissime in praxi. Istud enim Omentum sub Diaphragmate locatum est, & non semper attingit fumen, quod pituita oppletum in parte superiore ventris inferioris sub pectore tumorem pituitosum, & mollem format. Djutissime hic hæzere posse pituitam sine ullo dolore, & sine mutatione coloris in facie, aliquoties observavi, tandem vero sensim acriore facta pituita dolor generabatur. Quod si cellulis ruptis effundatur pituita, Ascites formatur: si vero sensim magis increseat, ita premit adjacentia viscera, ut ad munera peragenda incapacia fiant, & ita lentam mortem inferant. Talem nunc collectionem pituitæ observavit Auctor curatam fuisse per urinam multam. Quod verum esse nos quoque experti sumus, etiam si multi negant viam. Sed quando per venam epiploicam in venam portarum, & ita in venam cavam conceditur lymphæ transitus, nulla restat obscuritas viarum, per quas illa lymphæ antea collecta potuisset venire ad renes, & ita nomine urinæ evacuari. Experimur quoque, omnem nimiam humiditatem sanguini circulantem mistam commodissime eliminari per renes; quare nullam invenio difficultatem, cur etiam hæc lymphæ, ita sanguini tradita, non eliminaretur. Quia vero hanc novimus naturalem solutionem, arte hoc etiam tentandum est, ut primo resolutionem, & frictionibus tentemus pituitæ stagnantis solutionem, & propulsio- nem, atque dein per diuretica promoveamus educationem...

L I B.

## L I B. VII. A P H. LV.

380. *Quibus hepar aqua repletum ad omentum eruperit, his venter aqua impletur, & moriuntur.*

I. **F**orsan detexit Hippocrates in cadaveribus eorum, qui ex Ascite perierunt, magnam fuisse lymphæ collectionem in ventris cavitate, atque simul hepatis superficiem hydatidibus quibusdam integris, & quibusdam ruptis scatere, ex quibus inventis hunc Aphorismum composuit. Hoc autem in viventibus cognoscere, & prælagire non tam facile est. Nam si hepar aqua repletum fuerit, simul etiam totus inferior venter tumere incipiet, quia via non satis libera per hepar concessa, lymphæ non potens ire per hepar, colligitur in venâ portarum, & in tota ventris cavitate; sed tunc simul aliquis cachedicus, vel ictericius color aderit ex vitiata bilis confectione, vel ejus impedita excretionem, tument tunc hypochondria in naturali hepatis loco. Si tanta sit hepatis obstructio, ut inde impleatur venter inferior, vix ulla spes supererit; nam etiam si ex umbilico tumente, & rupto, aut etiam ex scroto collecta lymphæ exoneraretur, vel per paracentesin auferretur, quia relinquitur in hepate novæ collectionis causa, talis lymphæ ablatio ut plurimum mortem accelerat. Hydatides in vasis lymphaticis nascuntur, quia truncus istius vasis se exonerare nequit, si ergo ex hydatidibus ruptis effunditur lymphæ, nunquam erit stillicidii finis, atque ita tandem corpus continuo privatum lymphæ moritur.

Ex hepatis  
hydropes  
ventris  
hydrops  
lethale.

## L I B. VII. A P H. LVI.

381. *Anxietatem, oscitationem, horrorem, vinum par pari aqua potum, solvit morbum.*

I. **P**assim monui, Auctorem nostrum, ut & Practicos detexisse summum levamen in hoc, vel illo medicamento dato in morbis, qui nomen ex phænomeno habent, quod auxilium postea datum nihil valet: unde admodum incerta habetur curatio. Hoc etiam experimur in hoc Aphorismo: quidam enim Anxii a potu vini aqua diluti statim levantur, atque inveni me Vino rhenano aqua temperato, cum adjecto succo Citri, egregie Anxietatem levare potuisse. Alii autem multo melius curabantur spirituosius aromaticis. Nonnulli liberabantur vomitu, & alii iterum alvi fluxu, aut hæmorrhagia. Hæc autem auxilia non sine discrimine levamen attulerunt, sed prout erat causa varia anxietatem inferens. Igitur ex sola Anxietate non est petendum remedium, sed ex causa Anxietatem inferente. Experimur, causas Anxietatis, & doloris non multum differre, sed si causa dolorem inferens, quæ agebat in nervos sentientes, applicetur ad nervos motus particularis, uti ad pulmones, ventriculum, intestina, loco doloris Anxietatem infert. Omnes causas Anxietatem inducentes non est huius loci agitare, ea sola est perferenda, quæ vino diluto curatur. Quod si in ventriculo aliquid putrefactum hærens anxietatem infert, istud tali misto vino accescente dilutum, non amplius anxietatem, & fastidium inducit; si autem bilis corrupta in ventriculo delata anxietatem induceret, magis conferret eam materiem vomitorio, vel purgante dato eliminare.

Vino aqua  
diluto sol-  
vitur an-  
xietas.

II. Quod statim notavimus in Anxietate, hoc etiam observandum est in Oscitatione, quæ fit, dum homo instigatur ut valide, & lente aperiat os, hauriatque aerem copiosorem pulmonibus, ut actione ea lentius moti humores constri-

Solvitur  
oscitatio.

ctiōne musculorum os aperientium, atque majore pulmonis dilatatione per musculos motus animalis propellantur, quod in lethargicis, somnolentis, principio febrium, & ventriculi impletionē est frequens: qui etiam evigilant hac actione Oscitandi propellunt lente a somno progredientes humores. Si stagnantes in ventriculo humores in spontaneam corruptelam abire incipiant, & frequentem Oscitationem faciant, hujusmodi Oscitationes egregie minuuntur tali potu vino diluto, quo simul ventriculi motus blande instigatur; sed inde non sequitur, omnem Oscitationem hac potione curari.

Solvitur  
horror.

III. Levis contremiscentia cum frigoris sensu vocatur Horror, qui frequens sit a materia cruda partibus nervosis applicata, vel a materia perspirabili retenta: hoc in casu si bibendum detur vinum aqua dilutum, & calefactum, id crudum, & perspirabile retentum egregie diluitur, & per insensibilem perspirationem eliminatur, qua materia expulsa, cessat etiam illa causa irritans.

# L I B. VII. A P H. LVII.

382. **Q**uibus in urinaria fistula suberculum sit, his suppurato eo & perrupto, solutio fit.

I. Idem Aphorismus superius ( Aph. 192. ) invenitur.

# L I B. VII. A P H. LVIII.

383. **Q**uibus cerebrum concussum fuerit ab aliqua causa, necesse est, eos statim mutos fieri.

Ex cerebri  
concussio-  
ne apho-  
nia.

I. **D**um aer pulmonibus receptus, constrictione pectoris urgetur per angustam glottidis rimulam, formatur sonus, ut transiens aer per fistulam pneumaticam, ille dein aer in cavitatem oris veniens, varia figura palati, & dentium, atque modulatione linguæ & labiorum varias voces formet. Tota hæc actio est voluntaria, seu peragitur musculis, qui voluntate nostra moventur. Quoties ergo influxus spirituum ex ea parte cerebri in nervos, ad istos musculos tendentes, intercipitur, tota hæc actio voluntaria cessat. Hoc fieri potest, si cerebrum molle ita concutiat, ut destruat ejus medullosa substantia, quæ est horum nervorum principium. Naturale autem est in omni valida Cerebri concussione, ut æger ejulet, vociferet, vel alium sonum edat præ nimio dolore ex concussione nato; si vero mutus maneat, signum certissimum est, Cerebrum esse destructum eo in loco, ubi oriuntur nervi ad vocis organa tendentes. Eadem autem concussio in alia Cerebri parte surditatem, vel cæcitatem facere potest: quare omnis Cerebri concussio, quæ tollit vel sensum, vel motum animale, illa est periculosissima, quia semper denotat Cerebri destructionem, vel compressionem.

# L I B. VII. A P H. LIX.

384. **C**orporibus humiditas carnes habentibus famem inducere oportet: fames enim siccat corpora.

Fames  
corpora  
siccat.

I. **N**ostrium corpus tali modo a summo Creatore est creatum, ut sua actione, quamdiu vivit, semper aliquid expellat per naturalia emunctoria, & ne fieret humidi defectus, nobis concessit desiderium hauriendi humidum, sub

forma cibi, vel potionis. Desiderium exigens cibum proprie vocatur Fames, quod autem petit liquidum, proprie dicitur Sitis. Quamvis *limbi* proprie designat alimentorum desiderium, credo tamen hoc loco potius concipiendum esse desiderium potionis, quum abstinencia a potu magis siccet, quam cibi penuria. Naturalis famis sensus non siccet, sed abstinencia a cibo humido; igitur hoc loco non est ille sensus intelligendus, sed abstinencia a cibo liquido; vel potione. Hoc enim defectu non suppediatur tantum liquidi, quantum naturali exhalatione, & excretionem eliminatur. Quare per abstinenciam diu continuatam generatur humidi defectus in corpore, seu corpus per talem Famem exsiccatur, quum partes firmæ non tam cito pereant, quam aufertur humiditas.

Famem  
inducere  
oportet  
corpori-  
bus hu-  
midis  
carnes ha-  
bentibus.

II. Quæ medicamenta Famem deletam excitant, hoc loco intelligi nequeunt, quia non tollunt nimiam carnis humiditatem, sed talia, quæ naturaliter Famem, & Sitem faciunt, uti abstinencia major a cibo & potu, atque corporis frequens exercitatio, quibus suppediatur minor copia humidi, & promovetur ejus exhalatio. Hæc sunt facienda, si quædam morbosa humida constitutio habetur in toto corpore, uti in leucophlegmaticis, hydropicis. Caro enim tunc dicitur humida, si sit laxior, succulenta, & multa humiditate perfusa: tales partes frequentiore musculorum actione fiunt duriores, ut omnes partes firmæ exercitatz occalescunt, atque eodem motu exprimitur id tenue, quod inter fibras in tunica cellulosa per quietem colligitur; sic caro humido tenui privata fit durior, & siccior. Hoc etiam verum est in detractioe cibi, & potionis; nam pergens insensibilis perspiratio, & urinæ emissio, sine additione humidi novi, fit ablatio humidi ex partibus firmis. Hanc ablationem humidi tenuioris faciendam esse, monet non cuius, sed cui Carnes sunt humide, quum ablatio tenuioris in corporibus sanis generaretur morbus ex Siccitate.

## L I B. VII. A P H. LX.

385. **U**Bi in toto corpore mutationes, & corpus perfrigeretur & rursus calefit, aut color alius ex alio permuetetur, longitudinem morbi significat.

I. **E**Andem sententiam superius (Aph. 150.) invenies.

## L I B. VII. A P H. LXI.

386. **S**udor multus, calidus aut frigidus, semper fluens, humidi redundantiam habere significat. Educere igitur oportet, robusto quidem superne, debili vero inferne.

I. **A**Utor supra (Aph. 152.) ex Sudore multo, frigido aut calido, formavit prædictionem majoris, & minoris morbi: hoc autem loco dicit indicare Humidi abundantiam; uti etiam (Aph. 166. IV.) in febribus Sudor superveniens, febre non deficiente, multam significabat humiditatem. Hoc quoque loco tradit Sudorem semper fluentem, & non facit mentionem febris, igitur hic intelligit Sudorem semper fluentem sine febre prægressa, vel conjuncta. Hujusmodi Sudores copiosiores sæpe observavimus in valetudinariis, & iis, qui nimis magnam alimentorum copiam ingerunt cum corporis nimia quiete. Valetudinarii enim defectu virium ingesta non potentes compingere in bonos humores, neque extrudere per insensibilem perspirationem, illam tamen abundantiam evacuant vel per urinam copiosorem, vel per Sudorem semper fluentem. Corpora enim sana vi-

Sudor  
multus,  
calidus  
aut fri-  
gidus,  
semper  
fluens,  
humidi  
redundan-  
tiam si-  
gnificat.

ribus

ribus valentibus, assumta alimenta compingunt in sanguinem crassiores, & quod compingi nequit, per urinam, sed præcipue per insensibilem perspirationem eliminant: at deficiente hac actione, minus compingitur, & perspiratur, quare horum loco generatur Sudor copiosior, quo corpora ea tamen servantur in eodem pondere. Recte itaque ex Humidi abundantia Sudor ille copiosior, & semper fluens generatur. Corpora autem sana, & satis valentia si habeant Sudorem copiosorem, & semper fluentem, hæc plus assument, quam ut possint solita actione vitæ subigere, & expellere per diaphoresin: igitur in his notat Abundantiam humidi ex assumtis natam. Denique invenitur in Valetudinariis quidam morbus colliquativus sine febre, in quo sine notabili vitio boni, & concrescibiles humores liqueunt in humorem tenuem, qui exit sub forma sudoris copiosioris, cum corporis emaciatione. In duobus præcedentibus casibus idem fere manebat corporis pondus, quamvis semper copiose sudabat; sed in ultimo casu generatur emaciation, quæ vocatur a multis Phthisis nervosa (Aph. 32. III.).

An hæc  
abundan-  
tia edu-  
cenda?

II. Quoniam Sudor hic copiosior, & semper fluens generatur deficiente actione vitæ cum mediocri ingestione, ex ingestione copiosiore, & ex deliquatione humorum, curatio in omnibus eadem esse nequit. Qui enim utcumque sani sunt, & ex mediocri alimentorum ingestione copiose sudant sine corporis emaciatione, signum erit, assumta alimenta non satis præparari: his conducit cacochoyliam in primis viis relictam per amarum purgans eliminare, sed dein stomachicis roborantibus promovere ventriculi actionem, atque corporis moderata exercitatione in reliquo corpore præparare humores atque eliminare per diaphoresin; quod indicare videtur Auctor his verbis, *Debili vero inferno*. Quibus vero robustis ex assumtorum abundantia generatur Sudor, quum hi solent saburram colligere in ventriculo, his conduceret dare Vomitorium, & deinceps se abstinere ab ingluvie. Sed si corpus simul extenuetur colliquatis humoribus, hoc corpus neque ferret purgans, neque vomitorium, sed per stomachica amara, & antiseptica tota curatio esset absolvenda, qui enim in colliquatis humoribus dat evacuens, bonum, & malum simul educet, & non emendabit tali medicamento humoris corruptionem, verum majorem debilitatem inducet, quæ colliquationem promovebit.

# LIB. VII. A P H. LXII.

387. **F**ebres non intermittentes si per tertium diem vehementiores fiant, periculose. Quocunque autem modo intermittant, significant periculi esse expertes.

I. **E**undem Aphorismum exposuimus (Aph. 153.).

# LIB. VII. A P H. LXIII.

388. **Q**uibus febres longe sunt, his aut tubercula, aut ad articulos dolores fiunt.

I. **H**unc etiam explicavimus (Aph. 154.).

389. *Quibus tubercula diutina, aut ad articulos dolores ex febris sunt, hi cibis utuntur copiosioribus.*

**L A T**que hunc Aphorismum invenies (Aph. 155.).

390. *Si quis febricitanti cibum det, convalescenti quidem robur, aegrotanti vero morbus fit.*

**I. S**copus Auctoris est hoc loco indicare, quando corpora febre vexata sunt nutrienda; atque triplex hic poni potest casus. (1) In febre ipsa, dum adhuc non dat signa finis. (2) Dum desinere incipit, sed corpus tamen adhuc agrotat. (3) Si vero febris desit, sed corpus tamen convalescens non satis est firmatum. In prioribus duobus dicit Cibum augere morbum, sed in posterioribus augere robur. Per Cibum dare non intelligit exhibitionem cibi facillioris digestionis, & in parva quantitate, quod debemus facere in omnibus febricitantibus, sicuti satis copiose exposuimus in secundo libro Aphorismorum, sed intelligit Cibum solutum, & in tanta quantitate, qualis exhibetur sanis hominibus (Conf. Aph. 35. III.). Qualis autem Refectio debeat fieri post Acutos (Aph. 32. IV.), & post Chronicos (Aph. 32. V.) exposuimus. Corpora febre adhuc vexata a solito cibo dato aggravari, demonstravimus (Aph. 42. III.). Convalescentium duplex est status: si enim febris desinit, sed relinquit multas impuritates, quæ solitam nutritionem respuunt (Aph. 35. IV.), quia corpora impura non sunt nutrienda, pauciora alimenta, & levis digestionis sunt ingerenda. Sed Convalescentia corpora pura (Aph. 42. IV.), quæ valent cibum assumtum in bonum chylum convertere, paulo largiorem cibum postulant, tali modo ut citato loco indicavi: si enim his corporibus dares tam parvam quantitatem, & levis nutritionis alimenta, uti in febricitantibus, vel corporibus impuris, convalescentes non potuissent defectu alimenti recuperare vires.

391. *Per vesicam prodeuntia inspicere oportet, an sint qualia sanis prodeunt. Quæ igitur minime his similia, ea morbosiora: Sanis vero similia, minime morboſa.*

**I. C**uncta, quæ ex Vesica per urethram emittuntur, Urinæ nomine recipi nequeunt, qualia hic ab Hippocrate traduntur; ita calculus, vermes, sanguis, & quæcumque aliena quamvis ex Vesica veniunt, nunquam Urina vocantur. Qui tamen de Urina tradunt regulas, hæc etiam aliena complectuntur. Igitur quæ per Vesicam prodeunt, in duo genera distingui possunt, nempe aliena ex urethra prodeuntia, & quæ urinæ nomine veniunt. Aliena semper esse observanda nullus dubitat, sed de iis, quæ urinam constituunt, maxime disputant. Invenio enim impostores miracula prædicantes ex conspectu Urinæ, atque medicos omnem urinæ inspectionem irridentes, non verentes publice profiteri, nihil certi ex inspecta Urina cognosci, & prædici posse, solummodo inspicere ad

Urinæ inspectione necessaria.



fallendum: sed ego miror illorum stupiditatem, & contendo artem non habere osorem nisi ignorantem, quod sæpissime hujusmodi cavillatoribus demonstravi. Hoc autem scio, impostores sine ullo fundamento signa, & præfagia formare ex urinæ inspectione, sed id quoque scio, me nullam in tota scientia medica invenisse luculentiorum signorum classem quam in uromantia: & contra istos, qui cum omni industria explorant pulsum, rehero, urinæ majorem quam pului habendam esse fidem, & multo plura, & certiora præbere signa. Hoc autem exemplis adstruere nimis longum foret, quare cum Auctore nostro duntaxat contendendo, urinam in omni morbo esse inspicendam. Quali autem modo inspectio debet fieri, non consentiunt: quidam ex impostoribus ne quidem dubitant degustare Urinam ad majorem fidem conciliandam, quasi plura gustu quam visu ex Urina peti potuissent; alii urinam coquunt; alii ex magna altitudine eam in aliud vasculum fundunt: denique quidam urinæ admiscunt quædam sic dicta arcana. Medici autem solent inspicere urinam in quiete refrigeratam, uroscopio receptam, ut ita vident, quamnam mutationem urina subit. Ego soleo colligere urinam calentem in vase vitreo conico, eamque calentem primo, & dein refrigeratam in quiete examinare: si morbus per paroxysmos lævit, urinam diversis temporibus emissam variis vasculis receptam simul examino, vel quando morbus aliquam subit mutationem, ut ita ex illa urina diversa possim judicium formare, quod mihi ad cognitionem, & prædictionem multi momenti fuit. Igitur omnes moneo, ne vilipendant Urinæ inspectionem, vel repudient, quia ab agyrtis hæc pars signorum quoque cum fallacia exercetur, sed ut cuncta, quæ in urinis detegunt, sedulo notent, istaque conferant cum iis, quæ ab Hippocrate traduntur: hoc si faciant, nullus dubito, quin summis encomiis Urinæ inspectionem laudabunt, tanquam signorum classem utilissimam.

Videndum  
an urina  
sit sanis  
similis vel  
dissimilis.

II. Vix valeamus exacte sanam describere urinam in quavis ætate, & vitæ genere: nam intenditur ejus color in robustis exercitatis, parum bibentibus; minuitur autem in debilibus, pueris, feminis, otiosis, multum bibentibus, augetur ejus quantitas in parum perspirantibus, & multum bibentibus, sed minuitur in parviori potu, largiore perspiratione, & quavis alia evacuatione copiosiore; & tamen illa omnis urina est sana. Sed si in oppositis causis, ætate, & viribus corporis, talis redditur urina, eadem quæ antea dicenda erat sana, nunc habetur morbosa; modice enim colorata in pueris est morbosa; pallida, & aquosa uti in pueris, a robustis viris reddita, iterum est morbosa, quia non respondet viribus naturalibus istius corporis. Hinc sciendum, quibus diversis in corporibus sanis urina sit emissa, ut sit sanis similis: sæpe enim accidit, ut corpora sana sibi non convenientem reddant urinam, sed tunc fruuntur instabili sanitate, quod ex inspecta urina videri potest, quæ tunc dicitur sanæ urinæ dissimilis, quamvis nulla morbosa notio adsit; nisi quod subiecto non respondeat. In morbis etiam redditur urina sana, & morbosa, quum omnes morbi particulares materiem morbi in affecta parte retinentes, atque morbi, quorum materia est invisibilis, nullam morbi notionem in urina proferant. Talis ergo urina in morbis conspicua hoc, vel illud indicat. Sed in morbis cum materia, ut loquuntur Veteres, si redditur urina sana, valde malum est signum, quia declarat morbi materiem retineri, si ne cuius evacuatione recuperari non potuit sanitas.

Urina sanis dissimilis, morbosa; sanis vero similis, minime morbosa.

III. Obstare autem videtur dictum Hippocratis, qui statuit Urinam sanis similem minime morbosa esse; atque sanis dissimilem esse morbosiorum: verum si vero sensu accipiat hęc sententia, puram veritatem ponit, & nobis non repugnat. In sanis enim, ut supra notavimus, urina respondere debebat ætati, viribus, & victui; itidem in morbis urina respondere debet morbo prævalenti, ut tandem urina optime cocta, cum similibus signis in alio morbo dicatur cruda. Inde urina in colore, consisten-

stentia, & quantitate respondens corpori proposito sano, & quæ convenit dein etiam morbo, illa minime morbosa est: quæ autem est dissimilis tam in sanis quam morbo laborantibus, illa temper mala seu morbosa est censenda: quum in sanis infirmam sanitatem declaret, & in morbis tali urina non evacuetur morbi causa.

## L I B. VII. A P H. LXVII.

392. **E**T quibus egestionis, si stare permiseris, & non moveris, subsidens veluti ramenta: & si pauca fuerint, parvus fit morbus: si vero multa, magnus. His confert alvum inferne purgari. Si autem non purgata alvo sorbitiones dederis, quanto plures aederis, eo magis lades.

I. **M**ulti Commentatores, inter quos excellit Galenus, dubitant, num germanus sit hic Hippocratis Aphorismus, multaque adducunt rationes: sed fere similem textum invenio in Libro de judicationibus, his verbis: *Alvi egestionis si in saem concedere ac consiliere permiseris, velut ramenta subsident: si pauca, modicus est morbus: si multa, multus: his infusum per clysterem adhibere conducit* (H. a. 443). Constat ergo, dictionem esse Hippocraticam, nili negare velimus, eum etiam Librum non esse germanum. Neque ita opus est auctoritate litigare, ipsa observatio practica veritatem docet, qua constat, Ramenta seu Strigmenta interdum inveniri in alvi excrementis, quæ in alvi egestionibus liquidis, & ita quiescentibus fundum petunt, & concresecunt, aut in excrementis durioribus externe reliqua excrementa obducunt. Quia vero Auctor monet, stare debere in quiete Excrementa, facile concipitur, eum intelligere Excrementa liquida, qualia in Cholera, Diarrhea, & Dysenteria emittuntur, quando intestinorum mucus utcumque liquidus cum Excrementis exiens, dein refrigeratus concresecit; & quoniam mucī specifica gravitas est major, dum Excrementa sunt liquida, ad fundum vasis descendit, & ibi stagnando refrigeratus concresecit in Ramenta seu Strigmenta, quæ effusis excrementis in fundo vasis conspiciuntur. Hujusmodi Strigmenta in Dysentericis sæpe observavi, ut & alii practici. Igitur de veritate hujus nullus amplius ambigere potest. Ex hoc nunc invento signo majorem, & minorem morbi magnitudinem deducit, quod experientia respondet. Naturale enim est in Alvi egestionibus, ut ille mucus non exeat; ergo quo major hujus est mucī evacuatio, eo major est morbus, quod verum est in omni evacuatione humorum præternaturalium: atque tanta abrasio, & emissio mucī facit, ut intestinum rectum omni mucō privato, tangatur ab excrementis, quæ tunc magnum dolorem concitant, & dejectiones augent.

II. Duobus modis Alvum inferne ducere solentius, vel per medicamenta ore data, quæ proprie dicuntur purgantia, vel per ea, quæ per anum injiciuntur, aut induntur. Experti sumus quoties in mucō intestinorum hæret acrimonia, intligans intestina ad frequentem dejectionem, nos non posse curare irritamentum; nisi ille mucus acris auferatur. Quamobrem ita in Dysenteria laudantur purgantia, non solum ore data, verum etiam per clysterem injecta, quibus ille mucus acrior abluitur, & expellitur: & ut nuda intestina minus vellicarentur, atque in motu concitata ad quietem ducerentur, post exhibitum purgans propinamus anodynum mucilaginosum molle; vel post ejectionem clysteris, injicimus novam liquorem mollem, mucilaginosum, anodynum. Quod si vero non evacuato illo mucō sorbitiones dederis, augebitur morbus, quia illa ingesta, mucō corrupto mista, augebunt corruptelam.

## L I B. VII. A P H. LXVIII.

393. **Q**uæ cruda deorsum secedunt, ab atra bile sunt: si plura, major; si pauciora, minor est morbus.

K k k

I. Quan-

442 **MEDICINA HIPPOCRATICA** *Apb. 393.*  
I. **Q**uamobrem hic Aphorismus ut præcedens non sentiatür germanus, videre nequeo, quum etiam Hipp. Lib. de Judicationibus hæc verba habet: *Quibus vero in egestionē inferne bilis atra subsidet, si copiosior, major est morbus; si paucior, minor* (H. a. 443.). Facile est ex comparatione locorum colligere, qualem cruditatem Hippocrates intelligat, nempe materiem nigram melancholicam. Hæc materia reliquis excrementis gravior, si exacte non misceatur, & excrementa sint liquida, fundum vasis petit. Quomodo autem hæc Nigra dici possunt Cruda, paucis enarrabimus. Cruditatis nomen multas diversas res designat; nam alimenta in ventriculo, & intestinis bene præparata si vel per vomitum, vel secessum deponuntur, cruda vocantur. Ita boni confluentes ad dicta loca humores, destinati ad alimentorum præparationem, si egeruntur, cruda faciunt Excrementa. Denique humores corrupti, & alieni egesti etiam crudi dicuntur. Inter hos omnes humores gravissimus est, qui vocatur Atra bilis, quamobrem etiam fundum vasis petit. Ex copia nunc materiæ Crudæ, vel Atræ bilis format magnitudinem morbi. Quia Atra bilis est humor morbosus, de ejus copia majore, & minore egesti ratiocinari possumus, ut jam fecimus de muco intestinorum; quo enim major copia egeritur, eo majorem quoque collectionem arguit. Quid autem sit sentiendum de egestionē Atræ bilis, superius ( *Apb. 131. 132. 133. 134.* ) satis exposuimus.

**L I B. VII. A P H. LXIX.**

394. **E**xcreationes, in febribus non intermittentibus, lividæ, & cruentæ, & biliosæ, & gravolentes, omnes malæ sunt. At rite secedentes, bonæ. Sic etiam per alvum, & vesicam, & ubicunque quid secedens resistit nec purgatum, malum.

I. **T**otus hic Aphorismus superius etiam ( *Apb. 157.* ) invenitur.

**L I B. VII. A P H. LXX.**

395. **C**orpore oportet, ubi quis purgare vult, facile fluxum reddere. Et si quidem velis efficere facile fluxum sursum, alvum sistere: si vero deorsum, buncctare.

Vomitus  
prepara-  
tio.

I. **D**uplex est in hoc Aphorismo scopus. Primus docere, quali modo corpus sit præparandum, antequam exhibetur medicamentum purgans: hoc absolvimus ( *Apb. 34.* ). Alter tradere præparationem corporis, si Vomitus sit concitandus: hoc exposuimus ( *Apb. 123. IV.* ), ubi traditur præparatio ante exhibitionem Ellebori. Hoc autem loco mentionem facit de omnibus Vomitoriis, & præcipit Alvum sistendam esse, quod in præcedentibus non fuit factum. Tenendæ sunt superius traditæ regulæ, si Vomitorium sit exhibendum, sed ut vomitus majore efficacia fiat, & reddatur copia contentorum major per Vomitum, recte monet Alvum esse sistendam. Duplex enim habetur motus directio in intestinis, & ventriculo; nempe deorsum, quæ promovet Egestionem, & minuit, vel sistit Vomitum, & sursum, quæ sistit alvum, & augeat Vomitum. Recte ergo præcipit Auctor, alvum esse sistendam, ne motu peristaltico aucto deorsum inhibeatur Vomitus, & convertatur in alvi fluxum.

## LIB. VII. APH. LXXI.

396. **S**omnus, vigilia, utraque modum excedentia, morbus.

I. **I**nter hunc, & superius traditum Aphorismum (Aph. 18.) nulla invenitur differentia, nisi quod ibidem in fine dicatur malum, hoc autem loco Morbus. Tota ergo explicatio ex allegato loco peri potest. Quod autem dicatur morbus, innuit excessum alicujus rei bonæ ad Auctoribus etiam morbum vocari, ut non sit opus, habereat semper novum phenomenon, quod in sanitate non conspicitur, ad designandum morbum. Equidem non parvus est morbus semper vigilare, vel dormire, quamvis vigilia, & somnus moderatus in sanitate requiruntur. Quali autem modo hi morbi sunt curandi, non est hujus loci exponere.

Naturalis  
actio au-  
cta vel  
minuta  
etiam  
morbus  
est.

## LIB. VII. APH. LXXII.

397. **I**n non intermittentibus febribus, si externa quidem sint frigida, interna vero urantur, & siim habeant, lethale.

I. **E**undem Aphorismum invenies (Aph. 158.).

## LIB. VII. APH. LXXIII.

398. **I**n febre non intermittente, si labium, aut nasus, aut oculus, aut supercilium distorqueatur, si non videat, si non audiat jam debilis existens: quicquid horum fiat, lethale.

I. **A**tque hunc Aphorismum invenies (Aph. 159.).

## LIB. VII. APH. LXXIV.

399. **L**eucophlegmatæ hydrops supervenis.

I. **L**eucophlegmatæ (Aph. 354.), & Hydropis (Aph. 273. I.) definitionem dedimus, ex quibus morbis comparatis constare potest, Leucophlegmatiam esse speciem Hydropis, quando humor viscosus seu pituitosus lentus, & frigidus huc reat in cutis substantia, & tunica cellulosa: sed quando absolute ponitur Hydrops, Hippocrates intelligere solet Ascitem seu ventris inferioris hydropem. Quomodo autem ex Leucophlegmatia generatur Ascites, paucis videndum. Ex Leucophlegmatæ descriptione (Aph. 354.) constat, motum vitalem languidiorem, & solidorum laxitatem retinere humores aquosos in vasculis cutaneis, qui ibidem stagnantes, & minus moti inviscantur. Quando talis morbus diu durat, tandem etiam motus vitalis peritonæi, & contentorum viscerum in eo languet, quemadmodum etiam relique corporis partes, quo impeditur efflui humoris ex cavo peritonæi absorptio; sic sensim ex depositis humoribus, non iterum absorptis, generatur in ventre inferiori Ascites. Sine motu vitali in nobis nullam fieri absorptionem, & cum eo languidiore motu minui absorptionem, infinitis experimentis adstrui potest, quod hoc loco suppono, alio in loco a nobis satis demonstratum; ex anatomicis; & physiologicis constat, continuo in omnes cavitates

K k k 2

corpo-

444 *MEDICINA HIPPOCRATICA* *Aph.* 309  
 corporis aliquem deponi liquorem, qui continuo etiam absorbetur in sanis: quod ergo illa minuitur, vel silitur absorptio, uti in Leucophlegmaticis, saepe fit ut in quadam corporis parte colligatur lymphæ, quæ in ventre collecta producit Ascitem. Si talis morbus superveniat, malum est signum, & tunc plerumque moriuntur Leucophlegmatici, quippe non generatur nisi laxitas solidorum, & inertia ita increvit, ut viscera ventris quoque in sua actione deficient. Si vero supervenisset Diarrhoea, qua eliminatur aqua illa, solveretur morbus (*Aph.* 354.). Igitur non ita sibi permittenda est Leucophlegmatia, ac si esset Morbus nullius periculi, sed statim ejus curatio est tentanda per evacuationem, & roborantia, priusquam in Ascitem degeneraverit.

L I B. VII. A P H. LXXV.

400. *A* Diarrhoea Dysenteria.

I. *Q*uomodo ex meraca defectione generatur Dysenteria, exposuimus (*Aph.* 348.). Hoc loco tradit Auctor, ex quavis Diarrhoea generari posse Dysenteriam. Ad certiorum prognosin, & majorem usum addere possumus, hic intelligi Diarrhoeam diuturnam, atque si tunc veniat Dysenteria, malum esse signum. Observamus enim in praxi, raro venire Dysenteriam post Diarrhoeam, nisi diu duraverit. Omnis enim Diarrhoea diu durans denotat constantem esse causam, quæ facit, ut humor perpetuo stillet in cavum intestinorum, & intestina infliget ad propellenda contenta. Tale perpetuum stillicidium, uti ubique in corpore, loca, quæ tangit, excoriat & exulcerare facit, ex quibus dein etiam corrosis locis sensum quoque stillare incipit ichor acrior, qui tangens partes pudas vellicat, atque ita dolore inferit cum augmento ejectionis materię variæ, qualis morbus tunc vocatur Dysenteria. Hæc veniens malum est signum: nam inde non minuetur præcedens morbus, & demonstrat malorum augmentum, ut patet ex accedente Doloře, Ejectione copiosiore, & exitu malignorum humorum, vel etiam sanguinis, corrosis vasīs.

L I B. VII. A P H. LXXVI.

401. *A* Dysenteria Lienteria.

I. *Q*uid sit Dysenteria (*Aph.* 134. I.), & Lienteria (*Aph.* 266. I.) exposuimus. Galenus contendit hunc Aphorismum esse partem præcedentis (*Aph.* 308.), sed rationem non invenio. Ibidem enim agitur de Lienosis, qui corripuntur longa superveniente Dysenteria, aut Lienteria, & ita pereunt: hoc autem loco agitur de iis, qui Dysenteria laborantes corripuntur Lienteria. Verum non addit, num sit bonum, vel malum signum. Ex comparatione autem cum prioribus conicere possumus, hic innui malum esse signum, quod paucis videbimus. Homo dysenteria laborans multum humoris, tam utilis, quam inutilis, ejicit, ut igitur vires corporis permaneant, necesse erit, ut corpori etiam suppeditetur nutrimentum in ventriculo, & intestinis tenuibus præparatum, & vasīs lacteis traditum; ita enim valet satis diu hanc ferre ejectionem. Si autem accedat Lienteria, quæ denotat eam materiem chylosam una cum reliquis ejici, certi esse possumus, corpus istud suo nutrimento privari, & inde impar fieri ferendis his copiosioribus evacuationibus. Videtur tamen æger a superveniente Lienteria doloribus levari, quia materia chylosa blandior, reliquos humores aciores diluens, minus vellicat intestina: sed infideles sunt induciæ, quum ut plurimum talis æger viribus exhaustis pereat. Multi putant propter inducias cicatrices per præcedentem

tem Dysenteriam chylum non amplius absorberi posse : verum nullam video veritatis similitudinem, quia humor acrior in Dysenteria transiens sensum latiorum excoriationem facit, & nullam consolidationem in cicatrice permittit. Verum intestina tam diu agitata stimulo Dysenteriae ita fatigantur, ut tandem deficientibus viribus non amplius valeant receptum chylum trudere in vasa lactea, sed permittant, ut ad inferiora devolvatur, & una cum corruptis humoribus exeat. Ex hoc observato phaenomeno multi fuere decepti medici, existimantes propter levamen doloris, & dejectionem humoris minus corrupti, aegrum esse in vado, dum tamen experiuntur aegrum brevi postea perire.

## L I B. VII. A P H. LXXVII.

401. **A** Sphacelo abscessus ossis.

1. **V**ariam Sphaceli significationem dedimus ( Aph. 375. I. ), & quid sit Ossis abscessus, ex supra traditis ( Aph. 310. II. ) colligi potest. Quomodo autem ex partis mollioris mortificatione profunda, uti fit in Sphacelo, Os etiam pereat, & Os mortificatum separari debeat, facile concipitur. Os enim se ipsam non nutrit, & manet vitale sine partibus ambientibus, sed ex istis in suo perio-  
steo accipit vasa vitalia, quae adducunt, & reducant sanguinem, ex quo perio-  
steum, & Os sua vasa vitalia accipit. Quoties igitur in partibus mollioribus am-  
bientibus sphacelatis sit extincta circulatio, ipsum Os circulatione hac privatum mori  
debet. Os quidem tali in statu satis diu manebit firmum, & stabile, etiam si vi-  
ta sit privatum, quia ejus durities diu persistere potest, antequam spontanea corru-  
ptione liquecat, quod brevi tempore fit in partibus mollioribus: attamen nun-  
quam manere potest superstes, lapsu temporis tandem cedere debet. Quamob-  
rem in sphacelo profundo morientem semper Chirurgi totam partem esse ampu-  
tandam, etiam si Os satis videretur stabile, quia didicerunt post longum tempus  
istud Os semper fuisse mortificatum. Ne ergo aeger inani spe laetaretur, Os servari  
posse post profundum Sphacelum, huac Aphorismus nobis reliquit Auctor.

## L I B. VII. A P H. LXXVIII.

403. **A** Sanguinis vomitu tabes, & puris purgatio sursum.

*A tabe, fluxus ex capite.*

*A fluxu alvi profluvium.*

*Ab alvi profluvio inhibitis purgationis sursum.*

*Ab inhibitione mors.*

*A sanguinis sputo, puris sputum, & fluxio. Postquam autem sputum inhi-  
betur, moriuntur.*

1. **V**idetur hic Aphorismus ex multis aliis praereffis constatus, ut habeatur continuatus successus morborum, qui morbi antea sigillatim sunt pro-  
positi. Id ergo solummodo a nobis est faciendum, ut indicemus loca, ex qui-  
bus hic Aphorismus desumptus est.

*A sanguinis sputo puris sputum ( Aph. 340. ).*

*A puris sputo tabes, & fluxus a capite ( Aph. 341. I. ).*

*A tabe detento alvi profluvium superveniens, letale ( Aph. 207. ).*

*Postquam sputum retinetur, moriuntur ( Aph. 341. II. ).*

Sola ratio cur sputum in Tabidis supprimitur, videtur restare, verum eam supra dedimus ( *Apb.* 207. ). Quod autem præterea adjectum invenitur, est solummodo repetitio prioris, ut indicaretur hoc loco non intelligi vomitum cruentum, sed hæmoptysin.

## L I B. VII. A P H. LXXIX.

404. *Qualia etiam in his quæ per vesicam, & in his quæ per alvum fiunt egestiones, & in his quæ per carnes, & sicubi alia naturæ via corpus exeat: si parvum, parvus morbus sit: si multum, magnus: si admodum multum, hoc ipsum lethale.*

Evacuatio-  
nis quan-  
titas esti-  
menda ad  
prædictio-  
nem.

1. *N*on solum qualitas, tempus, & locus evacuationis sunt in sanis, & ægris observanda, verum etiam cujusvis evacuationis quantitas. Quatuor præcipuas evacuationes numerat, (1) Urinam, (2) Alvi egestionem, (3) sudorem, (4) humores per præternaturales vias, uti per ulcera emissos. In his omnibus monet quantitatem esse considerandam. Particulares observationes horum omnium passim exhibuimus. Si per hoc, vel istud emundorium materia morbosa exit, quantitas continuo exiens notabit quantitatem etiam relictam in corpore seu magnitudinem morbi. Sæpe quidem accidit, ut nihil, vel parum exeat, dum tamen magna sit copia humorum morbosorum in corpore, quia via est interclusa, vel vires deficient ad expellendum: verum supponuntur viæ apertæ, & vitæ vires satis valentes; tunc possumus judicare ex quantitate exeuntis magnitudinem morbi. Ut si quis reddat urinam cum magna copia sedimenti, talis urina sæpe tollit morbum, sed tamen magnitudinem morbi declarat; si idem morbus adefset in alio ægro, sed lenior seu minor, urina quoque minorem copiam sedimenti haberet, & illa notaret quoque morbum minorem. In morbis chronicis multi laudant sedimenti copiam in urina, sed expertus sum eam copiam majorem declarare quoque morbi magnitudinem. Hoc etiam verum est in Alvi egestionibus, si multa excrementa aliena emittuntur, pejus est, quam si parum exeat, atque copia major periculum portendit, quod ex parva quantitate non ita est expectandum. Sudor roridus, calidus, & satis copiosus sæpe tollit febrem, sed continuo fluens magna copia malignitatem arguit, qui enim continuo, & perpetuo sudant, magnam copiam humorum morbosorum in corpore habent. Denique Puris, vel Ichoris ex Ulceribus copiosus effluxus magnitudinem morbi declarat. Igitur generalis est regula in evacuationibus humorum morbosorum, quo evacuatio est copiosior, eo major est morbus. Parva ergo evacuatio, quia arguit non multum intus esse, parvum morbum, & parvum periculum portendit, modo non cohibeatur effluxus, ut monui. Multum fluere majorem copiam arguit, & inde majorem morbum. Si vero valde multum effluat, significat, omnes fere humores corruptos esse, & propterea magnum quoque imminet periculum.

## A P H O R I S M I I N T E R J E C T I.

405. *Qui supra quadraginta annos phrenitici sunt, non admodum sanantur. Minus enim periclitantur, quorum naturæ, & ætatis morbus similis fuerit.*

Qui supra  
quadragin-  
ta annos  
phrenitici  
sunt, non  
admodum  
sanantur.

1. *M*ulti omnes sequentes Aphorismos omittunt; alii quosdam citant; neque idem fervatur ordo; Theodorus Janssonius ab Almeloveen, cujus ordinem, & interpretationem secuti sumus, Librum octavum ex istis fecit: Boetius paucos ex istis elegit, istos spurios seu nothos vocat. Incertum itaque est, num ab Hippocrate sint conscripti, vel ab aliis interjecti. Quia vero Veteres numero septenario maxime fuerant disti-

dicti, satius erit credere hunc Librum Oſtavum ab Hippocrate non fuiſſe conſcriptum. Quia vero noſter ſcopus fuit ſine auctoritate alicuius res obſcuriores in arte medica noſtris commentariis explicare, noſtra non reſert, ſive Hippocrates, ſive quis alius ſequentes Aphoriſmos poſteritati reliquit: hoc ſolummodo obſervaturi ſumus, ut ex iſtis eligamus, qui in antecedentibus aphoriſmis non ſunt expoſiti.

II. Phrenitis (*Aph. 109. VIII.*) vario ætatis tempore fieri poteſt, ſed non omni eo tempore æquale periculum inferit, quod etiam verum eſt in aliis morbis: experimur enim hodie adultos ex variolis, & convulſionibus magis periclitari quam pueros. Hoc deducendum eſt ex morbi natura comparata ad naturalem ætatis mutationem, qua eadem morbi cauſa majus periculum inferit. Phrenitis eſt morbus inflammatorius febrilis continuus, qui valide agitans cerebrum, perpetuum, & conſtans Delirium cum febre facit. In morbis inflammatoriis ſecundum ætates hoc generale obſervamus, iſtos ante quadrageſimum annum ſæpe finiri hæmorrhagia, & in juvenibus ex leviſſima cauſa generari, in ſenioribus autem plerumque abire in abſceſſum, & non niſi ex magna cauſa generari (*Aph. 14. VI.*). Ergo Phrenitis in tali ætate magnam cauſam arguit, quod periculum eſt, & ſi abeat illa meningum inflammatio in ſuppurationem, hoc quoque periculo non caret, quum pus in encephalo collectum difficulter evacuari poſſit.

III. Auctor rationem majoris periculi ex ætate, & natura ægri deducit, quod ſupra (*Aph. 59.*) pro generali regula poſuit, ubi etiam habitus & tempus ſimul annumerantur. Quomodo autem ex hac regula generali periculum in Phrenitide deducatur, paucis videndum. In recensita ætate, ut monuimus, non niſi ex magna cauſa generatur phrenitis, & ſi nata ſuit, plerumque abit in periculoſam ſuppurationem: ergo etiam in ea ætate ſæpe fiat Phrenitis, (*Aph. 109. VII.*) quia plerumque mortem inferit, periculoſa habetur, uti ſanguinis ſpuitiones, & phthiſes in juvenibus (*Aph. 108.*). Idem quoque ſentiendum eſt de Natura ægri (*Aph. 59. II.*): nam ſi corpora frigida, hydropica, debilia tententur Phrenitide, majus erit periculum, quia ea fieri in his nequit niſi a magna admodum cauſa.

Micrus periclitantur ætati, & naturæ morbus ſimilis fuerit.

406. **Q**uibus in febris quartanis exiſtentibus ſanguis ex naribus fluxerit malum.

I **O**mnis illa evacuatio eſt mala, quæ neque tollit, neque minuit morbi cauſam, & quæ diſponit corpus ad graviorē morbum, nam ſi inferat interdum mortem, lethalis ſolet dici. Si demonſtrari poſſit, Hæmorrhagiam narium neque minuire neque tollere cauſam febris quartanæ, verum corpus diſponere ad alios ſuſcipiendos morbos, recte pronunciari poteſt, malum eſſe, ſi hæmorrhagia ſuperveniat. Si in memoriam revoco, quæ obſervavi in conſtitutionibus epidemicis, nunquam memini me obſervare, febrem quartanam vel hæmorrhagiis, vel venæ ſectiōe fuiſſe ſublata, ſed qui multum ſanguinis effuſerunt, facti fuere leucophlegmatici, vel hydropici, habuerunt quidem illi paroxyſmos mitiores, verum ſimul diutius durantes, & magis periculoſos, ut febris illa vehemens videretur commutata in mitiorem, ſed malignam. Si ſecundum noſtram ſententiam febris quartanæ materia ponatur in ſucco illo artèriarum, qui latera artèriarum intus obteggit, quæque materia, uti femina malæ herbe, ad maturitatem veniens febris paroxyſmum concitat, facile concipi poteſt, neque hæmorrhagiam, neque venæ ſectiōnem tollere poſſe hanc febrem, ſed corpus diſponere ad ſuſcipiendos morbos ex debilitate virum, & defectu ſanguinis naſcendos. Si enim ſanguis fluit vel ſponte, vel arte, ille ſecum non educit ſuccum artèriarum, qui febris materiem continet, ſed ſanguinem purum, & bonum, & per artèrias, & venas fluentem. Qui morbi impetu majore ſua mala producant, ut morbi inflammatorii,

In febris quartanis hæmorrhagia narium, malum.



hi evacuatione sanguinis egregie compescuntur, sed febris quartana, vel simplex, vel duplicata, non infert mala majore circulatione, verum summo indulto potius frigore, non minuitur cum diminuta quantitate sanguinis, uti morbi instans mori. Igitur nunquam ex sanguinis fluxu in Quartanis curatio est speranda. Aque post-talem spontaneam, vel artificialem sanguinis evacuationem destruit aequilibrium, humores liquefcunt, solida laxantur, atque ita saepe sunt Leucoplegmatici, vel Hydropici, quod saepe in praxi observavimus, sub quibus dein morbis febris quartana latitat. Monemur ergo, non sine gravi ratione in febre Quartana venam esse secandam.

407. *Sudores in diebus criticis oborientes, vehementes, & veloces, periculosi: & qui expelluntur ex fronte, velut guttae, & aquae salientes, & frigidi valde, ac multi. Necessè enim est talem sudorem praedire cum violentia, & laboris excessu, & expressione diuturna.*

Sudor diebus criticis unde veniat.

I. Generalis est regula, Sudores criticis diebus (Aph. 146) venientes esse bonos, morbosque judicare, sed opposuit citato loco sudores in quantitate, & qualitate bonos, hoc autem loco docere vult, laudabiles istos Sudores, ex tempore solo judicatos, tamen malos esse posse. Propterea primo videndum, quamobrem Sudores criticis diebus venientes boni censentur. Constanti observatione in morbis acutis comperimus, morbi materiem viribus vitae subactam debito, id est Critico tempore omnino optime, e corpore sub sudoris forma eliminari: nam quoties eadem materia tempore alio eliminatur, nunquam tam bonum, & securum praebet signum, quod ex allegato loco colligi potest.

Sudores in diebus criticis oborientes, vehementes, & veloces, periculosi.

II. Hi autem Sudores ex tempore boni censendi, interdum mali esse possunt ex aliquo alio vitio accedente. Hoc vero loco numerantur omnes malae qualitates, sed solummodo si sint Vehementes, & Veloces, id est si Sudores aliquo die critico subito oboriuntur, & magna quantitate fluunt, tunc dicuntur periculosi, quod Auctor per experientiam practicam observavit, quia invenit post tales Sudores aegros non fuisse levatos, sed in pejus ruisse. Haec observatio rationi etiam est conveniens; quippe unico momento tanta non est preparata morbi materia, quae posset tam copiosum, & subito protrusum sudorem exhibere, sensim enim preparatur materia, & expellitur, sed non acervatim. Hoc etiam invenimus in urina, quae si subito magnam copiam sedimenti praebet, non habetur laudabile signum, quia tanta copia materiae morbi tam cito abesse nequit. Ergo Sudores vehementes, & veloces designant malos, & bonos humores simul nimia copia evacuari, qualis evacuatio semper debilitat. Hujusmodi Sudores praedire cum violentia, laboris excessu, & expressione diuturna recte putat Auctor, quoniam illa evacuatio boni, & mali fieri nequit nisi viribus vitae nimium instigatis, quae quicumque humorem ad organa excretoria venientem expellunt. Hinc ob duas rationes periculum imminet, primo, quia evacuat id, quod retinendum erat, dein a viribus ita instigatis maximum fit spirituum dispendium, quo vires deinceps languentes non valent materiem morbi reliquam preparare, & expellere.

Sudores in diebus criticis ex fronte velut guttae, & aquae salientes, & frigidi valde, ac multi, periculosi.

III. Alteram speciem Sudoris periculosi diebus criticis his verbis exprimit, qui inculcet non solum sudores copiosos calidos diebus criticis esse periculosos, verum etiam frigidos ex fronte guttatim, & copiose venientes. Cuncta haec sudoris phaenomena si scorsim examinantur, & dein inser se conferantur, certissimum periculum portendent. Qui sudores ex fronte copiosi profluunt, indicant, praecipuam morbi materiem haerere in capite: nam in qua corporis parte est sudor, ibi morbum esse significat (Aph. 148.). Verum nulla pars corporis majus periculum portendit,

tendit, quam caput morbi materiem recipiens. *Guttatim* instar aquæ salientis *frigidi* multi sudores notant, adesse materiem colliquatam copiosam, cum relaxatis poris cutaneis, atque defectu virium vitalium; profluunt enim tales sudores, quia non satis constrictis poris cutaneis retineri nequeunt, ut experimur in moribundis, & syncopticis; atque frigidi fiunt; quia motus vitalis corpus nostrum calefaciens deficit: in quo motu deficiente non extruditur materia sola morbosa, sed effluit quidquid ad poros cutaneos allabatur.

# 408. **Ex morbo diurno alvi defluxus, malum.**

I. **O**Mnes morbos ultra quadraginta dies durantes Chronicos vocari, observamus (Aph. 331. I.): In istis, dicit Auctor, Alvi defluxus esse malum, quod primo intuitu praxi hodiernæ non videtur respondere; in his enim morbis alvi egestio copiosior cacochyliam in intestinis collectam tollit, summumque levamen adfert, & purgantia cum magno effectu propinantur. Verum Alvi defluxus hoc loco non significat solam evacuationem contentorum in intestinis, quæ tollitur cacochylia, sed copiosiore, & continuatam dejectionem, quæ arguit, non solum evacuari ea contenta, verum etiam omnes humores bonos in intestina confluentes. Omnis ergo Diarrhœa, Dysenteria, Cholera, & Lienteria, quæ Alvi defluxus denominari possunt, in morbis Chronicis damnantur ob sequentes rationes. Si continuo ingens copia corruptorum humorum ejicitur, signum est, magnam etiam intus esse malorum humorum collectionem, quod malum præbet signum. Si vero hujusmodi corrupti humores ejiciuntur, quia boni humores in intestina confluentes cito convertuntur in corruptelam, hoc etiam malum est; nam ita est timor, ne omnes reliqui boni humores in corruptelam convertantur. Si vero boni humores continuo emittuntur, uti in Lienteria, & interdum in Diarrhœa, honorum nimia evacuatione corpus debilitabitur, in Cachexiam vel Leucophlegmatiam incidet, vel exhaustis humoribus emaciabitur, & tabe atque febre hectica consumetur. Conducit ergo in Chronicis, ut alvus liquefcens reddat Cacochyliam, sed fluxus non debet continuari: conducit etiam semel aut bis alvum ducere, ut corrupta ex cavo intestinorum, & ventriculi eliminentur, sed dampnanda est ea methodus, quæ contendunt continuo datis purgantibus totum corpus depurare.

Ex morbo  
chronico  
alvi de-  
fluxus,  
malum.

# 409. **Quæ medicamenta non sanant, ea ferrum sanat. Quæ ferrum non sanat, ea ignis sanat. Quæ vero ignis non sanat, insanabilia existimare oportet.**

I. **O**Mnis morbus in corpore vivente hærens sui ablationem exigit, quæ res est a sanitate perfecta distincta; illa ablatio variis auxiliis absolvitur. Vitæ enim actiones ita sunt creatæ, ut quidquid alienum, vel morbosum est, subigere, & expellere conentur. Verum interdum morbosa causa vel tam pertinax, vel copiosa est, ut viribus vitæ superari, & expelli non possit; aut per aliquas causas impediuntur vires vitæ, ut morbi causam expugnare non possint; in quo casu quedam auxilia sunt adhibenda, quæ mediantibus viribus vitæ, vel absolute morbi causam aut subigunt, aut expellunt. Prima ergo medicatio fit solis viribus vitæ; si vero sint impedimenta, quæ vitæ actionem impedire potuissent, illa secundum experientiam medicam sunt tollenda. Altera est, ut per auxilia instigantia, vel minuientia actionem vitæ talem concitemus motum, qualem experientia dicit omnium optimum esse: hæc vocatur methodica curatio, quæ tamen sola vitæ actione absolvitur, & tutissima est in morbis, qui motu eo superari possunt. Tertia est, quæ per Antidota morbi causam extinguit, quæ dicitur Em-  
piri-

Curatio  
nis ordo

pirica; sed quia contra omnes causas non habemus certa antidota. pauci sunt morbi, qui hac methodo curari possunt: non multum ab his distant Evacuantia; sed quia non satis detecta sunt Evacuantia omnem, & solam materiem morbi educantia, atque non omnes morbi ab humoribus dependent, hæc etiam sæpe frustra adhibentur. Denique accedimus ad auxilia validiora, quæ dicuntur Chirurgica, nempe tollenda est morbi causa, vel & tota pars effecta secando, vel urendo, quæ operationes non exigunt vitæ actiones, sed fieri possunt etiam reluctante natura.

Quæ medicamenta non sanant, ea ferrum sanat.

II. Per Ferrum hoc loco intelligere debemus Sectionem, qua pars quædam clausa resecatur, vel quædam pars præscinditur. Recte monet Auctor ab hac truculenta operatione non esse incipiendum, sed tum demum, si per medicamenta adjuvantibus viribus vitæ non possumus curationem obtinere. Non tamen semper præmittenda sunt medicamenta in morbis, de quibus scimus per medicamenta nihil præstari posse, sed statim tunc ad sectionem est accedendum, priusquam morbus, incassum adhibitis medicamentis, pejor factus, etiam sectione non possit tolli. In exemplis res clarius erit. Si aliquis laborat Abcessu, vel Empyemate pus continente, primo adhibenda sunt medicamenta, quæ maturationem, & ruptionem Abcessus promovent: his si obtinetur Abcessus ruptio, illa erit in convenientissimo ut plurimum loco: si autem non rumpatur, tunc secando pertundenda sunt repagula, ut puri concilietur exitus. Itidem in sphacelo incipiente medicamenta primo sunt adhibenda, quibus sæpe obtinetur curatio, si pars non perfectè fuit mortificata: si autem medicamentis servari nequit, tunc tandem pars mortua ferro amputanda est. In Cancro autem sine prægressu medicamentis applicatis ad Sectionem pervenimus, quia nullum est medicamentum cognitum, quod Cancri malignitatem extinguere valeat, & ea malignitas medicando sensim fit deterior. Si autem locus, vel magnitudo Cancri ablationem totam vetat, curatione palliativa medicamentis est cohibendus Cancer, ne nimis gliscat.

Quæ ignis non sanat, ea incombustibilia exstinguere oportet.

III. Quæ morbi causa neque medicamentis, neque sectione potest tolli, ad eam adhibebant Veteres urentia, quibus destruitur naturalis partium firmarum cohesio, & ita immutantur humores, ut priorem omnino naturam exuant. Hæc Urentia distinguuntur in Actualia, & Potentialia. Actualia illa habentur, quæ in se magnam ignis copiam collectam habent, ut ferrum, vel alia metalla ignita, atque omnia liquida, & solida ferventia. Hæc tam in cadaveribus quam viventibus suam operationem exercent. Potentialia vero non possident ita ignem collectum, neque ad thermometrum majorem caloris gradum exhibent, neque in cadaveribus partem, cui applicantur, comburunt; sed in viventibus cum sensu ardoris escharam formant. Actualia hoc loco ab Auctore intelligi confido, quia potentialia sæpe adhibentur, priusquam sectio instituitur; aut si æger sectionem timeat. Sed Actualia Urentia non nisi in rebus desperatis adhibentur, vel quando aliis auxiliis curatio obtineri nequit: ut si aliquis a venenato animali fuerit morsus, partem læsam urunt, ut ita exstinguatur omnis communicatio cum corpore reliquo, & invertatur venenatum communicatum. Comburendo etiam venenum pestilentielle in aere exstinguitur.

Quæ ferrum non sanat, ea ignis sanat.

IV. Quum etiam vehementissima, & omnia invertentia auxilia fuere adhibita ad tollendum morbum, qui tamen his non auscultat, certe nulla spes superesse potest, eum morbum unquam superari posse. Multi quidem sunt morbi, qui per ignem non possunt curari, qui tamen sunt sanabiles, uti omnes species febrium; sed quoniam auctor sensim ascendit ad validiora auxilia, concipit etiam præcedentia auxilia etiam frustra fuisse adhibita: atque hoc loco magis attendit ad morbos externos, qui a Chirurgis tractantur, quam ad internos, qui Medicis committuntur.

410. **L**ingua nigra atque eruenta, si quid bonum signorum abest, non valde malum: morbum enim minorem declarat.

I. **A** pud omnes fere practicos hanc generalem regulam invenio inculcatam, omnibus in morbis linguam esse inspiciendam, quia egregie statum humorum declarat: sed apud paucos ex proposito inveni Linguae signa ita descripta, ut junior medicus ex conspectu in lingua phaenomenis possit judicare, quid sit sentiendum ex conspectu mutatione. Certum quidem est quodcumque phaenomenon in Lingua detectum ex sua constanti causa oriri, ex qua inventa formanda est prognosis, & dirigenda curatio. Omnes etiam indocti, & qui nunquam medicinam exercuere, facile videre possunt in Lingua mutationes, sed ex istis eruere latentem causam, hoc opus, hic labor; & adhuc majoris est doctrinae, ex detecta causa formare praesagium, & methodum medendi: talis enim versatissimus non solum esse debet in eruenda causa ex phaenomenis, verum etiam ipsi cognita debet esse causa detecta cum omnibus suis mutationibus, ut nihil deficiat; quam cognitionem pauci possident medici, ex longa experientia in aegris ipsis erudendam, antequam aliquid certi pronunciare possint, vel ex arte aliquid agere. Si locus hic esset, ex Collectaneis nostris, quaecumque ex Linguae inspectione possunt peti, hic congerere potuissim, sed quoniam Auctor dumtaxat proponit Linguam nigram, & eruentam, extra scopum esset reliqua omnia, quae de inspectione Linguae sunt proferenda, hic enarrare, forsitan in posterum opportunior de his agendi occasio.

II. Non solum practici praesagia formare solent ex praesentibus phaenomenis, verum etiam saepissime, si hoc, vel istud phaenomenon non conspicitur: ita ex urina sana, corpore bene colorato, siti temperata, respiratione libera, & multis aliis, quae declarant hanc, vel illam causam non adeste, egregia signa desumunt. Ita etiam in hoc Aphorismo adducit Auctor Linguam nigram, & eruentam tanquam frequens, & malum signum, ex cujus absentia concludit morbum esse mitiorem. Meretur ergo videre, ex qua causa fiat talis Lingua in morbis. Dum inspicimus Linguae superficiem, & invenimus ejus colorem mutatum in nigredinem, vel rubedinem, ille color provenit ab ipsa linguae substantia, vel quia quadam colorata mucagine est tecta. Substantia autem Linguae nigra esse nequit, quin sit sphacelo correpta, & sic sensu omni privata, quod etiam verum est in aliis corporis partibus, Fieri autem potest, ut a liquore colore atro tingente inficiatur linguae superficies nigredine, sed hoc nec bonum nec malum signum praebet. Sed si mucus naturalis linguae, & palati atque faucium nigrum colorem induerit, & tam tenax sit, ut a Lingua colluendo auferri nequeat, signum est, morbi materiem abiisse in sphacelum, vel malignam corruptionem; unde etiam urina, & alvi excrementa nigra ex hac causa damnantur. In leviori autem malo mucus supra linguam haerens stagnando corruptus interdum aliquam nigredinem inducit. Cuncta ergo haec mala latentem causam indicant; & quando illa nigredo abest, certi sumus, istas malas causas non adeste, atque ita in morbis absentia nigredinis est mitioris morbi signum. Lingua Cruenta provenit ex ejus affecta substantia, quia non scimus confluere in os humorem, qui stagnando rubedinem acquirit; ipse enim sanguis ruber si tegeret Linguam, colorem nigrum acquireret stagnando. Ergo hoc signum denotat, Linguam esse inflammata, vel erysipelare affectam, quod in Angina, & Dysenteria pessimum est signum. Hujus ergo absentia in dictis morbis minus periculum arguit.

411. **T**estis dexter frigidus, & convulsus, lethale.

I. **O**bservavit Hippocrates, Testes, & pudenda revulsa malum significare: H. a. 571. atque ita revulsa dolores fortes significare, & periculum lethale:

L I I 2

H. a.

Lingua  
in omni-  
bus inspi-  
cienda.

Lingua  
nigra &  
eruenta  
quid no-  
tet.

H. a. 454. Hoc autem loco huic sententiae addit Dextrum testem frigidum. Totā hanc sententiam in observationibus practiciis fundata est, & a Veteribus propter ignorantiam anatomiae explicari non satis potuit. Duo phaenomena citat Auctor, nempe Frigiditatem, & Convulsionem, quae ab eodem organo non dependent: nam Calor corporis naturalis ab actione vitali dependet, quae languidiore, vel extincta, generatur tali in parte frigiditas, quod in Exercitatione nostra de Motu Vitali satis fuisse exposuimus. Igitur Frigus Testis dextri in acutis morbis idem designat, quod notavit frigus cuiuscumque partis (Aph. 149. II. Aph. 158. III. Aph. 351. I.) nempe defectum motus vitalis in ea parte. Convulsio autem, quae Testis revellitur ad inguines, in organo vitali esse nequit: vasanum spermatica ad testem tendentia motu vitali donata tam longa sunt, uti demonstrant hodierni Anatomici, ut si eorum fibrae necessantes solvantur, longitudinem aliquot ulnarum superent: haec ergo vasa in funiculo spermatico, & corpore pyramidalis testis ita intorte locata, si convellerentur, non tamen potuissent ad inguines elevari Testem. Sed musculus Cremaster ab annulo muscularum abdominalium supra pubem tensus, cingens funiculum spermaticum, & pyramidale corpus, ad anteriorem testis superficiem desinens, si convellitur, potest ei annexum Testem attollere, & ita ad suum punctum fixum seu dictum annulum elevare. Quamvis Cremaster inter musculos numeretur, non tamen est exiis, qui voluntati obtemperant, nullus enim homo pro arbitrio Testem movere potest, nisi forsitan unus aut alter, quod observasse dicunt Auctores: verum tam rara sunt exempla, ut nullus Anatomicorum huic musculo motum animale tribuat. Constat tamen hic musculus, ut reliqui, ex fibris, in quibus neque motus animalis, neque vitalis exercetur. Si solummodo destinatus fuisset ad sustentandum Testem, natura potius usa fuisset Ligamento, non vero fabrica musculari. Quare hic musculus destinatus videtur ad peragendum motum particularem in funiculo spermatico, corpore pyramidalis, teste, & epididymide, ut specialis in his partibus habeatur motus ad conficiendum semen, & propellendum ad vesiculas seminales. Revulsio ergo Testis ad inguines significat, Convulsionem fieri in musculo motus alicujus particularis, quod in morbis acutis magnum periculum arguit (Conf. Aph. 51. VI. Aph. 338. I.). Duo propterea mala signa si jungantur, Lethalia dici possunt. Quod autem Dextrum Testem nominat, multi quaesiverunt arcanum, quasi fieri non potuisset in sinistro. An vero haec differentia semper observetur, per observationes practicas detegere non potui. Hoc solum inveni, sinistrum Testem magis pendulum haerere quam dextrum; sinistrum etiam frequentius tumore corripri, sed in dextro inguine frequentiores inveniri hernias.

412. **U**ngues nigri, & digiti manuum & pedum frigidi, contracti, vel remissi, mortem in propinquo esse ostendunt.

Ungues  
nigri  
quando  
lethale  
signum?

I. **U**ngues corpora esse tenacia, elastica, & pellucida summitatibus digitorum adnata, omni fere colore carentia, norunt omnes: hi varios videntur accipere colores a liquoribus coloratis, qui sub unguibus haerent, & per pellucidos ungues videri possunt. Nigri igitur Ungues inde fiunt in morbis, si sub unguibus colligitur humor niger. Experimenta doceat, sanguinem in sinibus articularum, & principis venarum collectum stagnantem, corpore pellucido testum praebere colorem lividum, vel Nigrum, qualis color hic traditur. Quoties ergo Ungues livent, vel nigri fiunt subito in morbis acutis, quorum signa in his Aphorismis traduntur, designat ille color, sanguinem sub unguibus subsistere, & concretum. Hoc si fiat in principio paroxysmi febris quartanae, non valde periculosum est signum, nam subsequens calor stagnantem sanguinem in adum ducet: sed si fiat in febre acuta continua, tunc notat tantum defectum virium, ut san-

sanguis non amplius per vasa circulatoria duci possit, & quia tunc non possumus expectare incrementum caloris, qui stagnantem sanguinem movebit, vis vitæ sensim debilior facili permittit, ut tandem tota circulatio subsistat, & homo moriatur.

II. Quod alibi (Apb. 326. & 351.) Auctor generali nomine pronuntiavit de frigiditate Extremarum, id hic ad solos digitos manuum, & pedum applicat, qui sunt partes omnium maxime extremæ: quoniam vero istis locis rationem dedimus, cur frigus tam periculosum habetur, non erit opus hoc loco eandem rem repetere. Si præterea Digiti sunt contracti, vel remissi, quæ phænomena indicant, vitam, & circulationem omnino in digitis cessare, antecedentem pronosum confirmant, & denunciant mortem instare, quod etiam in multis, qui perierunt, observavi.

Digit  
frigidi  
contracti  
vel re-  
missi, le-  
thale.

#### 413. *L*abia livida, aut etiam resoluta & inversa, & frigida, lethalia.

I. *P*ræfens hic Aphorismus vix a præcedente differt, nam quæ hic phænomena tribuuntur Labiis, idem significant, quod supra in unguibus, & digitis, quum epithelium tegens prolabia tenerimum sit, vasculaque admodum pellucida, quæ transluentem sanguinem coercent, optime declarare possunt humorum transluentium colores. Si in his vasis subsistat sanguis ruber, lividus semper apparebit color, & in majori concretionem fit color niger. Interdum etiam ita livescunt labia, si reductus sanguis per venam jugularem intercipitur, quod interdum in angina, & tumore colli observatur; sed tunc cum livore tument Labia: quando autem ex deficiente actione subsistit sanguis, Labia simul resolvuntur, id est, amittunt omnem movendi actionem, & ita etiam invertuntur. Ex his igitur colligere possumus, vitalem, & animalem actionem esse extinctam, & ita homo morti proximus est.

#### 414. *A*ures frigide, pellucide, contractæ, lethales sunt.

I. *A*urium nomine illa dumtaxat auris pars intelligitur, quæ extra caput eminet, & visui patet, quæ plerumque Auricula appellatur, quoniam Anatomici Auris nomine plerumque intelligunt totum Auditus organum. Illa Auricula a causa interna frigida notat, uti reliquæ partes externæ, cessare in iis motum vitalem; sed si tales fiant auriculæ refrigeratæ ab ambiente aere frigido, nihil boni, vel mali indicant. Constant auriculæ cartilagine albicante, quæ cute tenera tegitur, in qua paucissima sunt vascula cruenta: quando tam parva sit circulatio, ut hæc minima vascula cruenta fiant inania, Auriculæ non solum defectu sanguinis pallent, sed & pellucidæ & contractæ fiunt. Hoc etiam verum est in omnibus membranis, si sanguis earum ruber eluatur, fiunt pellucidæ, & quia vascula depleta contrahuntur, tota quoque membrana redditur contracta. Ergo tales Auriculæ significant sanguinem per arterias non amplius adduci, qui impletur vasa cruenta, & rubedinem ipsis præberet. Hoc si fiat in morbis acutis, in quibus ex sua natura validissima esse debebat circulatio, mortem instare denotat: in febribus autem hæcicis, & marasmo est etiam lethale signum, sed non ita prope mors instat, uti in Acutis.

#### 415. *E*t tenebrosa vertigine laborans, & lucem averfans, & sonitus ac arduus multo detentus, desperatus.

I. *P*ost signa in partibus externis tandem pergit Auctor ad signa interna, quæ relatione æri dumtaxat cognoscuntur: inter illa numerat Vertiginem tenebrosam, de qua æger conqueritur morbo acuto decumbens. Hoc signum Medicus suis sensibus detegere non potuisset, sed æger dicit, sibi omnia ante oculis

Vertigo  
tenebrosa  
in A-  
cuto.

los in gyrum verti, simulque ejus visum obtenebrari, qualis morbus *oculorum* vocatur, ut exposuimus in nostra *Medicina Dogmatica* Cap. 2. Dux ad hunc morbum producendum concurrunt causæ internæ, nempe motus inordinatus spirituum, quo omnia circumverti videntur, & minor spirituum influxus in nervo optico, quo omnia obtenebrantur, quum sine spirituum in hos nervos influxu nullus fiat visus, quod citato loco demonstravi. Si ergo ex hoc signo, nempe Vertigine tenebrosa nobis constet, spirituum esse defectum, & motum inordinatum in morbis acutis, facile erit ex hac posita causa formare prædictionem. In morbi acuti principio, & vigore quando vehemens est circulatio, si observetur Vertigo tenebrosa signum est, sanguinem tanto impetu ferri ad encephalon, ut nervi optici majore copia pressi non permittant satis copiose fluere spiritus per dictos nervos ad oculos, & qui fluunt, non pergant æquabili requisito fluxu, sed motu inordinato: ergo omnia mala ex hoc signo præstigienda, quæ ex sanguinis majore impetu ad caput deduci solent, quæ omnia hic recenseri nequeunt. Si autem circa finem Acutorum veniat Vertigo tenebrosa cum pulsu debiliore, & diminutis viribus, tunc arguit summum spirituum defectum; quando mortem instare declarat.

Lucem a-  
versans  
in acutis

II. Alterum phenomenon in oculis dicitur Lucis aversatio, dum ægri ferre nequeunt ullam lucis agitationem supra oculi retinam, quin inde summopere lædantur. Experimur semper oculorum inflammatione laborantes, vel qui admodum sunt debilitati, ferre non posse, ut oculi tunica retina a luce agitur; quum in oculis inflammationis a retinæ agitatione intendatur dolor, atque in debilitatis, quia spiritus ad visum exercendum nimis consumuntur. Ex hoc igitur veluti ex præcedente phænomeno in Acutis ratiocinari possumus; nam ex impetu majore ad caput in vigore morbi acuti oculi bulbus in suis arteriis nimis impletus, non sine molestia hanc agitationem ferre potest, atque in fine Acutorum summum spirituum defectum arguit. Ergo in Acutis Lucis aversatio valde malum est signum.

Somno &  
A ardore  
multo de-  
tensus in  
Acutis, de-  
spertus.

III. Somnus exigit æquabilem spirituum motum per cerebrum, & Ardor multo validam circulationem arguit, duo autem hæc simul stare nequeunt: necesse igitur est, ut Somnus ille non sit naturalis ab æquabili, & tardo spirituum fluxu dependens, quod ex Nostra Exercitatione *De somno, & vigilia* colligi potest, sed productus ab illa circulatione valida in encephalo, quæ habetur in Acutis cum summo ardore. Si sanguis feratur magno impetu ad capitis interiora, quia cranium durum cedere nequit, sæpe fit, ut eo in loco, ex majore collecta copia ita opprimatur cerebrum, quo spirituum fluxus intercipitur ad organa sensus, & motus animalis, atque tali modo homo sopitus jacet, qui Sopor quoad signa externa vix differt a somno naturali, sed quoad causam maxime differt. Nam si ex cerebro ita compresso homo cum febre acuta, & ardore summo sopitus jacet, in magno versatur periculo, illa enim si parum augeatur causa compressiva, supprimetur omnis spirituum fluxus, & ita peribit æger. Omnia itaque recensita symptomata quoniam magnum periculum portendunt, si simul conspiciuntur, non erit incongruum, talem ægrum in desperato statu versari.

416. **E**T qui in rabiem actus fuerit intrepide, & non agnoscit, & neque audit, neque intelligit, jam moribundus est.

I. **D**elirium vehemens in Acutis hoc loco tradit, quod semper in mortem definit: non habetur enim vehementius Delirium, quam fuisse intrepide, designans cerebrum a morbosa causa validissime agitari, & quidem ita, ut non concedatur ullum mentis imperium, aut perceptio, nam neque audiunt, neque vident, neque intelligunt, quum cerebrum a morbo ita agitur, ut nulla fieri possit sensuum perceptio. Hujusmodi autem furor in maniacis, & melancholicis sæpe observantur, qui tamen superstites manent diu, atque

arque interdum ad se redeunt . Sed si morbus acutus febrilis talem rubiem inducit , mors inflat . Similis agitatio in quavis parte alia desineret in Sphacelum seu totius destructionem , quæ si fiat in cerebro , ubi habetur origo omnis motus , homo superstes manere nequit , sed ex cerebro destructo perit . Aliis autem in causis , quæ non ita sphacelum , vel cerebri corruptionem inferunt , fieri potest , ut ablata illa causa homo ad se redeat , quod maniacis , melancholicis , & in furore ex ebrietate sæpe experimur .

417. **M**oriturus signa hæc magis manifesta , & ventres attolluntur , atque inflantur .

**I.** Quo recensita signa in acutis magis sunt manifesta , eo causa est validior , & major , & quoniam homines hi moriuntur ex magnitudine causæ , inde quo illa signa sunt magis manifesta , eo certius mors est expectanda : tandem etiam ventres inflantur , & attolluntur , quoniam si quis ex morbo acuto pereat , morbus ille prius in sphacelum degenerare solet , qui si fiat in visceribus internis , ille transit quoque in putredinem , quæ producit multum aeris artificialis , ex cujus collectione , & accumulatione in multis generatur ventris elevatio , & tumor . Non autem censendum , omnem ventris inflationem instantem mortem indicare , quia sæpe ventres inflantur in morbis chronicis , qui postea subsident , & homines servantur ; atque tympanitici diu tumente ventre laborant , antequam pereant . Sed quando ex morbo acuto sphacelus fuit natus , qui superveniente putredine ventres attollit , nullus servari potest , & talis intumescencia paullo ante mortem fieri solet .

In mori-  
turis ven-  
tris infla-  
tio .

418. **T**erminus vero mortis est , si animæ calor supra umbilicum ad locum septo transverso superiore ascendit , & omne humidum fuerit combustum . Postquam pulmo , & cor humorem amiserint , calore in mortiferis locis coærvato , caloris spiritus confestim exhalat , unde totum cum toto constitit . Rursus partim quidem per carnes , partim vero per spiracula in capite , unde vivere dicimur , relinquens anima corporis tabernaculum , & frigidum , & mortale simulacrum , una cum bile , & sanguine , & pituita , & carne , deditione tradit .

**I.** Principia a Deo creata , quæ ex motu seu actione obtinere nomen , omnium difficillime definiri possunt , & de his variaz proferuntur sententia: hoc patet in descriptione Attractionis , Electricitatis , Gravitatis , & Motus corporum , ex quibusdam visibilibus proprietatibus , non vero ex intima cognita natura harum rerum fieri potest descriptio , & definitio : hoc etiam de Vita , & Morte dicendum est , etiamsi Vita nobis sit omnibus , atque aliis animalibus , & plantis , atque cuivis satis notum sit , differentiam esse inter res viventes , & mortuas : si tamen rogamus , quid sit proprie Vita , & quid Mors , & qualis inter duplicem hunc statum in corpore eodem sit differentia , vix duo Auctores consentiunt . Ne omnes , & varias proferamus sententias , solummodo Auctoris , & nostram sententiam exposaturi sumus . Auctor , uti ex textu patet , existimat , vitam esse animæ calorem , qui sustentari , & nutrirī debet quodam humido ; quando igitur ille animæ calor consummerit istud humidum , vel istud combusserit , ut sit ineptum sacrum ad nutriendum , & sustentandum eum calorem , sensum ille Calor se magis recipit ad Cor , & Pulmones , & si his in locis quoque istud humidum sit consumtum , tunc ille Calor se recipit in istis destructis partibus , quæ ad Calorem conservandum sunt ineptæ , & eum Calorem conservare nequeunt : hinc Animæ calor exit partim per spiracula , quæ sunt in capite , & partim per poros cutaneos , atque ita corpus Animæ calore privatum est cadaver . Ex quibus con-

Quomodo  
mors ex  
acutis .

con-



456 *MEDICINA HIPPOCRATICA* Aph. 418.  
 constat, Vitam haberi tamquam rem corpoream, quia exhalare debet, atque consistere in calore. Quantum a vero hæc recedit sententia, non proforsam, unicuique liberam philosophandi potentiam relinquens, sed ad firmiter firmandam doctrinam proferemus nostram sententiam, quali modo iudicamus morbos acutos Vitam extinguere. Inter corpora viventia, & mortua illam invenio differentiam, quod in viventibus invenitur aliquod principium movens a Deo creatum, quod etiam aliquandiu sine motu aliquo manere potest superstes, ut patet hyeme in Insectis, & Plantis, ex cuius præsentia accenduntur illæ mutationes spontaneæ, quæ in rebus mortuis sponte fiunt, uti omnes species corruptionis; & cuius actione multa fiunt in istis corporibus, quæ nulla arte imitari possunt. Hoc principium vitale in quibusdam simul concitat calorem, uti in nobis viventibus, & reliquis animalibus perfectis, in aliis autem, uti in piscibus, & plantis, nullum indicium caloris præbet. Calor ergo non est Vita ipsa, neque talis est vitæ proprietas, sine qua Vita existeret non potuisset. In nobis autem ceterisque animalibus perfectis invenimus, quod quo vitæ principium magis est agens, eo quoque major generatur in nobis calor. Hoc Vitæ principium ut agat, exigit organa, & humores aptos, quibus destructis, nimis mutatis, vel minutis, ipsa vita simul extinguitur, seu istud principium vitale a Deo creatum a nemine mortalium revocari potest. Quoniam infinitis modis organa, & humores mutari possunt, ut fiant inepta ad vitæ munera perficienda, infinitæ etiam sunt causæ, quæ vitam extinguere possunt. Inter has nunc est Morbus acutus, quem videmus quomodo Vitam extinguunt. Omnes morbi acuti febriles semper habent circulationem validam cum corporis ardore vehementi, principium vitæ a causa irritante morbosa instigatum validam tunc exercet actionem, quam actionem exercet in spiritus fluentes per nervos ad motum vitalem destinatos. Ut igitur motus vitalis circulatorius fiat major, spiritus hi copiosius fluere debent per nervos ad dicta organa, quæ tam valide moventur. Si aliquandiu ille motus continuetur, ita privatur corpus spiritibus his, qui agendo consumuntur, ut ex defectu horum corpus spiritibus exhaustis ineptum reddatur ad vitæ munera præstanda; atque ita moritur. Vel valida hac actione ita degenerant humores, ut fiant circulationi inepti, & non amplius suppeditare possint spiritibus materiem; atque ita etiam moritur corpus. Vel eadem hac actione aut destruuntur organa, aut humores ita in organorum vasculis infarciuntur, ut organa ad vitæ munera subeunda inepta fiant: qualis morbus in parte vocatur sphacelus, & in organo principali, vel toto corpore mors. Unum, vel alterum, vel omne simul fieri potest ex morbo acuto febrili, atque ita perit homo. Si quis nunc quærit, ubi vita manet, vel per quæ spiracula exit, inanem, & absurdam quæstionem proponit, quia sola est actio, quæ cessat, de qua dici non potest ubi manet, quoniam non est res corporea. Hæc erant, quæ dicenda erant de Magni Hippocratis Aphorismis, quæ si vergant in Artis Medicæ incrementum, & solamen ægrorum, speo meo satisfactum erit.

F I N I S.

INDEX

## I N D E X.

*Prior numerus Aphorismum, alser ejusdem  
Paragraphum indicat.*

## A

**A** Bortus frequentior quali vere. 91.  
 iv. an fit ex uteri cotyledonibus,  
 muco plenis. 238. i. periculum in  
 gravidis cur ab alvi fluxu inducitur.  
227. l. cur præfagitur ex mammis ex  
 improvifo gracilefcitibus. 230. ii.  
 Abscessus quomodo convalescentibus.  
142. i. recipit locus dolens. 143. ii.  
 qualem febrem finit. 161. ii. in fe-  
 bribus longitudinem præfagiens. 161.  
 iii. prædicatur ex laſtitudine per fe-  
 bres. 141. ii. hepatis ſi pus bonum  
 profeſt, ſalutem portendit. 370. i.  
 præfagitur nephriticis ex urina, cui  
 pingue conſertum ſupernatat, & do-  
 loribus circa muſculos ſpinales ſuper-  
 venientibus. 361. i. offis a ſphace-  
 lo. 402.  
 Abundantia an evacuatione immodica  
 minuenda. 3. ix. muci in coxæ ar-  
 ticulo unde, & quid faciat. 324. ii.  
 quibus morbum facit. 3. vi. eva-  
 cuationem exigit. 3. vii.  
 Acidum ruſtantes non admodum pleu-  
 ritici ſunt. 298.  
 Acidus ruſtus in lenteria diuturna bo-  
 num ſignum. 266. ii.  
 Aſlio naturalis auſta, vel minuta mor-  
 bus eſt. 396. l.  
 Acutæ febres juvenibus. 108. iv. cur  
 in aeris ſiccitatibus. 86. ii. poſt au-  
 tumnum ſiccum, & æquilonarem.  
92. vi.  
 Acuti morbi extenuationem inducentes.  
133. iii. quando eodem die purgan-  
 di. 120. l. quatuordecim diebus ju-  
 dicantur. 48. ii.  
 Acutis affectionibus, quæ cum febre  
 ſunt, ſi adſint luſtuoſæ respiratio-  
 nes, malæ. 319. febribus convulſio-

nes, & circa viſcera dolores vehe-  
 mentes, malum. 176. l. morbis ſi  
 extremarum partium frigus adſit, ma-  
 lum. 326. qualis dieta. 4. vii. 7. s.  
 Acutiſſimi morbi cur in autumno. 88.  
 iv. qui dicantur. 88. ii.  
 Acutorum duplex eſt genus. ii. i. re-  
 ſectio. 32. iv. prædictiones non om-  
 nino certæ. 44. iii.  
 Acutus morbus cur difficilem progno-  
 ſin faciat. 44. v. vid. *morbus acutus.*  
 Adoleſcentiæ tempus. 106. i. qui mor-  
 bi hoc tempore ſunt. 106. ii.  
 Adſtantium officium. i. ix.  
 Adulti quinam dicantur. 109. l.  
 Adultorum naturalis mutatio, & mor-  
 bi. 109. ii.  
 Æger quomodo ſe gerere debeat. i. x.  
 Ægri facilius potu quam cibo reficiun-  
 tur. 36. iv.  
 Aer intus in capite vi foras effunditur.  
376. iii. ſtrepit, quia per anguſtum  
 ipſi eſt tranſitus. 376. iv. respirando  
 a nobis conſumitur. 80. ii. pluviuſus  
 quales morbos producit. 95. i. ſiccus  
 quid faciat. 95. vii.  
 Aeris humiditas quid faciat in corpori-  
 bus ſanis. 94. iii. ſiccitates pluvio-  
 ſis ſunt ſalubriores, & minus lethā-  
 les. 94. v.  
 Aeris ſiccitas quid faciat. 86. i. ſiccitas  
 quid faciat in corporibus ſanis. 94.  
 ii. viciffitudo crebra cur producit  
 morbos autumnales. 83. ii.  
 Æſtas quibus morbis facilis, vel diffici-  
 lis. 82. iii. pauciora fert alimenta.  
 18. ii. quali naturæ inimica. 81. iv.  
 veri ſimilis quid faciat. 85. l. cur  
 tunc multus ſudor? 85. ii. quando fa-  
 ciat febres acutas? &c. 90. iv. ſicca,  
 & æquilonia quid faciat. 92. ii. quid  
 dein autumnus pluviuſus, & austra-

M m m

lis

lis faciat. 91. 111.  
 Ætate an vomendum. 114. 11. fiunt multi morbi. 100. 11. cur nonnulli fiant morbi venales. 100. 1. alvum ducens evitandum. 117. 1v.  
 Ætatis, & fenum convenientia. 97. 111.  
 Ætas quid faciat ad cognitionem evacuationis. 2. x. determinat assumptionem alimentorum. 17. vii.  
 Ætatis divisio. 103. 11. mediæ & hyemis convenientia. 97. 1v.  
 Ætate quam sit phthisis. 202. 1.  
 Ætatibus tempora magis minusve convenientia. 82. 1v. victus magis minusve conveniens. 82. v. regio magis minusque conveniens. 82. v.  
 Affectionibus acutis, quæ cum febre fiunt, si adfint luctuosæ respiraciones, malæ. 319.  
 Aggyrtarum periculosa Medicina. 126. 11.  
 ἀγυρται quid notet. 121. 11.  
 Alimenta nimia. 5. 111.  
 Alimento multo quæ corpora egent. 14. 1v.  
 Alimenta ad interiora determinant. 8. 1v. quanta copia assumenda. 17. 111. quoties capienda. 17. 11. jucunda an melioribus præstantiora. 63. 1v. ingrata an deterioribus magis noxia. 63. v. celeriter nutrientia celeres egestiones faciunt. 43. 111. qualem usum præbent. 43. 1v. meliora, & deteriora quæ dicantur. 63. 11. jucunda, & ingrata quæ dicantur. 63. 111. quanta copia danda in morbis. 9. 111. ex symptomatum vehementia. 9. v. copiosiora humectant. 123. v.  
 Alimentorum defectus in ætate. 13. 1. assumtio terminatur ex consuetudine. 17. 1v. ex tempestate. 17. v. ex regione. 17. vi. ex ætate. 17. vii. ex ætate. 18. 11. ex autumnio. 18. 111. ex hyeme. 18. 1v. ex vere. 18. v.  
 Alimentis multis an egeat somnus. 15. 111.  
 Alvi siccoris naturalis causa. 45. 11. humidioris naturalis causa. 45. 111. mutatio in siccam. 45. 1v. & vi. siccoris in humidam mutatio. 45. 5.

defluxus ex morbo chronico, malum. 408. 1. defectiones nigrae unde. 131. 11. pessimæ. 131. 111. minus malæ purgantibus. 131. 1v. coloris varii peiores. 131. v. defectio nigra in principio morbi mala. 131. 1. ductio an hyeme facienda. 114. 111.  
 Alvi ductio sub cane, & ante canem difficilis. 115. 111. egestio quamdiu permittenda. 2. xiv. excrementorum mutatio in alvi profluvio critico. 39. 11. in alvi profluvio morbofo. 39. 111. excrementa longitudinem, & brevitate morbi præfigentia. 12. xi. excrementa biliosa in tuberculis. 40. 1v. biliosa excrementa in faucium morbis. 40. 11. fluxus cur fiat ætate. 100. v. quinam sistendus. 112. 111. biliosus qualem tollit surditatem. 138. 111. in tabidis lethale. 205. 11. & 207. 1. in gravidis cur periculum abortus inferat. 227. 1. fluxiones in pluviosis. 95. 111. profluvia diuturna adultis. 109. 1x. dentientibus. 109. v. profluvium longum maxime corripit balbos. 297. profluvium si corripit ophthalmia laborantem, bonum. 282. profluvium diuturnum fluvium vomit, aut alvi profluvio sponte supervenientibus. 280.  
 Alvi profluvium aut vomitus sponte supervenientia a diuturno alvi profluvio detento, solvit morbum. 280. ductio an conveniat sanis. 62. 111. humectationem præfigit lumborum dolor. 183. 11. humiditas senibus. 110. xi.  
 Alvum ducens evitandum ætate. 117. 1v. ægre vomentibus conceditur. 117. 11. ducere in mediocriter carnosus. 117. 111. quibus conducit vere. 312. 111. an conducit arthriticis, & podagricis. 312. 111. ducentia, qualia evacuare debent. 112. 11. ducere quando eodem die in acutis. 120. 1. siccant aquiloniæ constitutiones. 96. vii.  
 Alvus exturbata quando solvit febrem. 170. 111. humectatur sanguinis eruptione. 137. 11. sicca vel humida quæ sit præferenda. 78. 11.

Ama-

Amaritudo oris cacoehylæ signum.

127. v.

Ambidextra non fit mulier. 368.

Anginæ autumnæ. 101. xii. in pluvio-  
sis. 95. vii.

Angina Cynanche ex metastasi febris.

114. i. Synanche ex metastasi lethali.

145. l. difficilem deglutitionem

faciens. 145. ii. colli inversionem in-

ferens. 145. iii. synanche cur lethali.

145. iv. quomodo generat peripneumoniam.

203. i. quam post septimum diem generat suppuratio-

nem. 203. iii.

Anginæ fiunt vere. 99. vi.

Anginosus si tumor fiat in collo, bo-

num. 302. ii.

Animi deliquia calidorum frequentio-

re usu. 209. viii. deliquium quid sit.

66. i. exsolutio, & vomitus a tumo-

re intus rupto. 333. ii.

Antidota an in principio danda. 54. iv.

Anxietas solvitur vino aqua diluto.

381. l.

Aphonia ex cerebri concussionem. 383. i.

Aphthæ puerorum morbus. 103. iv.

Apoplexiæ definitio. 67. i. cur peri-

culosior syncope. 67. ii.

Apoplexia partis, & linguæ impotentia

ex melancholia. 365. i. in pluviosis.

95. vi.

Apoplexia ex melancholia quo ætatis

tempore præcipue generatur. 322.

i. corporis ex melancholia. 321. ii.

fit hyeme. 101. vii. senibus. 110.

viii.

Apoplexiæ cui impossibilis, vel diffi-

cilis curatio. 67. iv.

apoplexia qualis morbus. 127. ii.

Apositiæ in longis dysenterijs, malum.

263. i., & cum febre pejus. 268. ii.

Apositiæ in chronicis, malum. 331. l.

Appetentia, vel inappetentia quæ præ-

stantior in morbis. 57. i. l. convale-

scitibus. 57. iii.

Appetentes circa finem morbi cur me-

lius liberantur. 57. vi. cur ad finem

morbi ut plurimum non appetunt.

57. v.

Apŷchia quid sit. 66. i.

Aqua quamvis levisſima, 219. l. si fe-

cundum venas in alvum fluxerit,

hydropis solutio fit. 279. acervatim

evacuata in hydropicis cur mortem

infert. 292. ii.

Aquilo quos morbos parit. 84. iv.

Aquilonæ constitutiones corpora com-

pingunt, & multa alia præstant.

96. ii.

Ardens febris quid sit. 168. l. quan-

do solvitur a rigore superveniente.

168. ii.

Ardens febris adultis. 109. viii. cur

fiant æstite. 100. ii.

Ardentis febris constans symptoma sitis.

164. l.

Ardentibus febribus tusses siccæ paulu-

lum irritantes unde fiant. 164. ii.

febribus tusses siccæ minuunt sitim.

164. iii.

Articulorum abscessum qualis urina li-

berat. 184. i.

Ardores vehementes si producant con-

vulsionem, aut tetanum, malum.

338.

Ardor internarum partium in remitten-

tibus febribus. 158. ii. ventris in

febribus unde oriatur. 175. i.

Ardore multo, & somno detentus in

acutis, desperatus. 415. iii.

Aridura quid sit. 32. iii.

Aromatum suffus muliebria ducit.

221. i.

Ars longa. i. iii.

Arthritides in siccantibus. 95. x.

Arthriticis, & podagricis an conducit

vere alvum ducere. 312. iii.

Articulorum dolores sanibus. 110. v.

fiunt vere. 92. xiv.

Ascariides pueris frequentes. 185. vi.

Asphyxia quid sit. 66. l.

Asthmata autumnæ. 101. xiii. frequen-

tia pueris. 105. iv. adultis. 109. iii.

Athletæ cur egent plurimo alimento.

15. v.

Athletis cur facienda evacuatio. 3. xi.

asphyxia quid significat. 43. ii.

Atrophia quid sit. 32. iii.

Auditus gravis ab Austro. 84. iii. gra-

visitas in senibus. 110. xiv.

Aures frigide, pellucidæ, contractæ,

lethales sunt. 414.

Aurium dolores cur fiant æstate. 100.  
 vii. humiditates in pueris. 103. x.  
 Ausser ventus quos morbos parit. 84.  
 111.  
 Austrinæ constitutiones quid faciant. 96. x.  
 Autumnales morbi qui dicantur. 83.  
 l. cur ex crebra aeris vicissitudine. 83. 111.  
 Autumnalium morborum natura. 83.  
 111.  
 Autumnus tabidis malus. 89. vii. difficilior fert alimenta. 18. 111. siccus, & aquilonaris quid faciat post similem æstatem. 82. 111.  
 Autumnus cur humidus, & mulieribus commodus. 93. 111. quid biliosis, & siccis faciat. 93. iv. pluviosus australis post æstatem siccam aquiloniam quid faciat. 93. 111.  
 Autumnus, & vere ut plurimum moventur dolores podagrici. 320. cur acutissimi morbi. 88. iv. perniciosissimi morbi. 88. v. quinam morbi fiant. 101. 111.

## B

**B** Albi longo alvi profluvio maxime corripuntur. 297.  
 Balneum qualem oculorum dolorem curat. 296. 111.  
 Bilis vomitus, & febris ex cerebri læsione. 315. l.  
 Biliofis cur fiunt Ophthalmiæ siccæ. 91. vii.  
 Biliofis dejectiones habentibus num lac malum. 257. vii.  
 Biliofum sedimentum in urina superne tenui, in febribus acutum morbum significat. 257. l.  
 Bubonis significatio. 165. i.

## C

**C** Achexia senibus. 110. ix.  
 Cacochylia quid sit, & ejus phenomena. 130. eger purgante. 130. i. exigit vomitorium. 127. l. ejus signa traduntur. 121. l. producit ventris tormen. 130. 111.  
 Cacochymia febris describitur. 179. i.

Calculorum generatio pueris frequens. 105. v.  
 Calculus urinæ an cognoscatur ex urinæ subsidientia arenosa. 89. 111.  
 Calefacere oportet refrigerata. 212. l. derepente malum. 76. iv.  
 Calefacientibus cur egent senes. 14. v.  
 Calida carnis effeminationem inducunt. 209. iv. nervorum impotentiam inferunt. 209. v. mentis torporem. 209. vi. sanguinis eruptionem. 209. vii. animi deliquia. 209. viii.  
 Calidum quid notat. 209. i. quibus partibus utile. 211. 111. applicatum quid faciat. 215. l. suppuratorium non in omni ulcere. 215. 111. cutim emollit, attenuat. 215. 111. dolores sedat. 215. v. rigores, convulsiones, tetanos mitigat. 215. v. capitis gravitatem solvit. 215. vi. multum confert ossibus fractis. 215. vii. maxime convenit denudatis ossibus. 215. viii. capitis ulceribus convenit. 215. ix. iis, quæ ex frigore moriantur aut exulcerantur, convenit. 215. x. convenit herpetibus exedentibus, sedi, pudendo, utero, vesicæ. 215. xi. quibus partibus amicum, & decretorium. 215. xii. innatum quid sit. 14. 111. an incrementi causa. 14. 111. an copiosius hyeme, & vere in ventre. 15. iv.  
 Calidorum usus frequentior qualia damna infert. 209. 111.  
 Calor partis morbi signum. 149. l. laxat, & putredinem promovet. 81. iv.  
 Caloris, & frigoris mutatio morbi longitudinem præfigit. 150. l. mutatio morbi longitudinem præfigit. 150. 111.  
 Calvi an fiunt capillati a superveniens varicibus. 299. 111.  
 Calvis an non fiunt varices magni. 299. i.  
 Cancer occultus quid sit. 303. i. an non curandus. 330. 111.  
 Capillorum defluvium quid notat. 204. 111. cur tabidis lethale. 204. iv.  
 Capitis dolor an curetur vena frontis secta. 261. l. doloris frequentissima causa

causa quæ dicatur. 275. L. dolor quinam solvatur evacuatione sanguinis, puris, vel aque per os, nares, & aures. 275. 11. post autumnum pluviosum, & australem. 92. 1v. fit hyeme. 101. vi. gravitas ab austro. 84. 111. solvitur calidis. 215. vi. ulceribus convenit calidum. 215. ix. plaga si producat stuporem aut delirium, malum. 339. napf 107. uor qualis morbus: & est signum cacochylæ. 127. 111.

Cardiognus in febribus. 175. 111.

Caro livida ex offe agrorante, malum. 327.

Cartilago difficta an neque augetur neque coalescit. 284. 111.

Catarrhi cur senioribus. 91. viii. tussiculosi senibus. 110. 111. a frigido pectori applicato. 217. 11.

Cerebrum quibus periculis fuerit, his necesse est febrem, & bilis vomitum supervenire. 315.

Cerebri vulnera. 283. 111.

Cerebro frigidum noxium. 21. 11.

Cholera adultis. 109. x.

Chronicis morbi extenuationem inducentes. 133. 1v. si excitant alvi defluxum, malum 408. L.

Chronicorum refectio. 32. v.

Chronicis diæta qualis. 4. vi. si adsint apostita, malum. 531. L. si adsint meracæ dejectiones, malum. 331. 11.

Cibus quoties in die capiendus. 17. 11. copiosior in sanis. 42. 11. in morbis. 42. 111. in convalescentibus. 42. 1v. morbum parit 42. v. ostendit sanationem. 42. vi. producit tubercula aut dolores ad articulos. 155. L. pravus exsolvit. 61. 1v.

Cicatrices cur relinquuntur cavæ ex ulceribus vetustis. 310. 111.

Circulatio non fit sola actione cordis, & elatere arteriarum. 21. 111.

Claudicatio, & tabes cruris quomodo in coxæ luxatione. 325. L.

Cocta quænam dicantur. 22. 11. ex assumtis. 22. 11. in morbis quænam dicantur. 22. 111. purganda. 22. v. movenda. 22. vi.

Cæcitas ex melancholia. 321. v.

Collecio sanguinis ad mammæ an mænam prædicat. 133. L

Colli inversio in angina. 145. 111.

Comedens multum post morbum si non roboretur, malum. 33. 11.

Concocta, vid. cocta.

Confertum, & pingue supernatans, unde. 360. L cur significat affectiones hepaticas, & acutas. 360. 11.

Consensus inter uterum, & mammæ. 230. L.

Consuetudo deteriora infuetis minus turbare solent. 75. 11.

Consueti facilius tolerant labores. 74. 11.

Consuetis victus humidus. 16. 1v.

Consuetudo non subito mutanda. 76. 1. longa mutat etiam figuram corporis. 75. 1. determinans alimentorum quantitatem, & ingerendi tempus. 17. 1v.

Consuetudinis mala exempla. 126. 11. differentia. 75. L.

Continuæ febres cur fiunt ætate. 100. 11.

Contra indicationes agendi difficultatem pariunt. 111. L.

Contraria contrariis medentur. 47. vi.

Convalescentem comedentem non roborari, malum. 33. 11. non comedentem non roborari. 33. 111. eum inappetentia indicat evacuationem. 33. 1v.

Convalescentes belle comedentes quid significat. 56. u. edere, & non proficere, malum. 56. 111.

Convalescentium diæta. 33. L.

Convalescentibus an fames, vel inappetentia præstantior. 57. 111. quomodo abscessus. 142. L.

Convulsio a frigido. 210. 11. cur ex Helleboro. 126. 111. quomodo ab Helleboro. 194. 111. ex Helleboro cur lethale. 194. 1v. vulneri superveniens, lethale. 195. L. ab ileo, malum. 335. 111. ex melancholia. 321. 111. a purgantibus potione, lethale. 310. an non admodum afficit quartana correptos. 253. 1.

Convulsio an tollitur superveniente quartana. 263. 11. febrem supervenire pejus. 51. v. aut delirium a sanguinis fluxu, malum. 334. a vigilia, malum. 343. hypothyria in mensium fluxu, malum. 249. L. singultus purgationi immodicæ superveniens, malum. 197. 1. sanguini multo effuso superveniens, ma-



malum . 196. 1. & singultus an a sola repletione, & evacuatione. 304. 11. aut tetanus ab ardoribus vehementibus, malum . 338. & tetanus ex ulcerum detumescencia. 258. 1v.

Convulsionis, & singultus convenientia. 304. 1. definitio . 51. 111. 194. 11.

Convulsionem indicat respiratio interrupta in febribus. 178. 111.

Convulsiones dentientibus. 104. 1v. mitigant calidis . 215. v. ex somno in febribus malum . 177. 111. & circa viscera dolores fortes in acutis, malum. 176. 1. & vulnera magna, & prava si nullos tumores habeant, ingens malum . 259. 1.

Copia ramentorum in alvi excrementis magnitudinem morbi declarat . 392. 1. his confert, alvum inferne purgari. 392. 11.

Cordis vulnera . 283. 1v.

Corpus procerum, an melius, vel deterius. 79. 1.

Corporis apoplexia ex melancholia . 321. 11.

Corpora quam egent multo alimento. 14. 1v.

Corporibus humidas carnes habentibus famem inducere oportet. 384. 11.

Cotyledones uteri muco plenæ an abortum faciant . 238. 1.

Coxæ morbus quinam dicatur. 324. 1. dolores autumno . 101. x1.

Crassi natura quinam dicantur . 69. 1. cur subito magis moriuntur quam graciles. 69. 111.

Crassitudo loci, vel puris suppurationem internam occultat. 306. 1.

Crisis quid sit . 20. 11. an hodie non amplius observatur . 20. 111. quor modis accipitur . 20. 1v.

Crisis divisio in perfectam, & imperfectam . 20. viii. perfecta describitur . 20. viii. vetat moventia . 20. ix. purgantia . 20. x.

Criticum tempus an definit tempus exhibendi fudoriferum. 146. 1v.

Criticus sudor quo tempore . 146. 11.

Cruda quæ dicuntur . 22. 1v. non evacuanda . 22. viii. non movenda . 22. viii. excrementa ab atra bile. 393. 1.

Cruris tabes, & claudicatio in coxæ luxatione, quomodo . 325. 1. an unctione curantur. 325. 11.

Cucurbitæ mammis applicatæ quomodo cohibent menstrua . 243. 1.

Curatio secundum rationem quam sit. 77. 1. variat pro diversitate partis. 211. 1. empirica, conjecturalis, & rationalis. 77. 1. extrema. 6. 11. præservatoria . 312. 1. rationalis non facile mutanda. 77. 11. conjecturalis. 77. 1.

Curationis ordo. 499. 1.

Cutis an rarior viris, quam mulieribus. 262. 11. quibus obtenditur arida ac dura, sine sudore moriuntur; quibus vero laxa ac rara, cum sudore moriuntur. 264. significat, an æger cum, vel sine sudore sit moriturus. 264. 1. emollitur, & attenuatur calidis. 215. 111.

## D

**D**Eciores menses quinam dicantur. 229. 1.

Decubitus humorum periculosi morbis melancholicis. 321. 1.

Debilitas in remittentibus quid notat . 159. 11.

Debilitalis prædictio ex extenuatione. 53. vi. rigor. 156. 111.

Defectus humorum morbi quinam. 47. 1v. morbi difficilium quam repletionis curantur. 47. v. qualem refectionem exigit . 3. x. vocis, & stertor post capitis dolores derepere natos insanis, ex qua causa. 316. 1.

Defluxus alvi ex morbo chronico, malum . 408. 1.

Deglutitio difficilis in angina. 145. 11.

Dejectiones biliosas habentibus num lac malum . 257. vi. meracæ in chronicis, malum . 331. 11.

Dejectio meraca si producit dysenteriam, malum. 348.

Deliquium animi, exolutio, & vomitus a tumore intus rupto . 333. 11.

Deliria cum risu accidentia, securiora: cum studio vero periculosiora. 318.

Delirii definitio . 27. 11. causæ . 27. 111. externæ . 27. 1v. internæ. 27. vi.

Delirium ab ossæ præscisso, si in vacuum

- cum penetraverit. 349. aut convulsio a sanguinis fluxu, malum. 334. a vigilia, malum. 343. stupor a plaga in caput, malum. 339. & difficultas spirandi in remittentibus, lethale. 160. 1. & rigor a multo potu, malum. 332. quomodo solvit tremores in ardentibus. 291. 11.
- Dentibus frigidum noxium. 211. 11.
- Dentientibus quinam morbi fiant. 104. 1.
- Dentium visciditas cur febris vehementioris signum. 163. 11. visciditatis causa. 163. 1.
- Denudatio ossis si producit Erysipelas, malum. 344.
- Destillationes in pectus quo tempore suppurantur. 363. 1.
- Deteriora quid notet. 75. 1.
- Detumescencia ulcerum parit convulsionem, & tetanum. 258. 1v. parit insaniam aut lateris dolores acutos. 258. v. parit suppurationem. 258. vi. parit dysenteriam, si rubicundi fuerint tumores. 258. vii.
- Diæta humida quibus conducit. 16. 1. febricitantibus. 16. 11. pueris. 16. 111. consuetis. 16. 1v. in morbi incrementi principio. 10. 1. in duobus generibus acutorum. 10. vi. in morbo acuto. 7. 1. inter paroxysmos. 10. 1. plena. 5. 1v. tenuis. 5. v. magis lædit. 5. vi. quæ dicatur. 4. 1. remittentium. 11. 111. in intermittentibus. 11. 1v. chronicis. 11. v. rigidissima an conducit sanis. 62. vi. tenuis. 4. 1v. in sanis. 4. v. in chronicis. 4. vi. in acutis. 4. vii. tenuissima in morbi paroxysmo. 8. vi. in morbi incremento. 9. 1.
- Diæta tenuissima in morbi vigore. 8. 1. in quo acuto. 7. vi. qualis in acutis. 7. vii.
- Diaphoreticum an conducit sanis. 62. v.
- Diaphragma quid sit. 128. 11.
- Diarrhœa producit dysenteriam. 400. superveniens a pleuritide aut a peripneumonia detento, malum. 281. vehemens si a leucoplegmatia detento superveniat, morbum solvit. 354.
- Diebus xiv. fit judicatio. 48. 11.
- Dierum criticorum annumeratio. 49. 1.
- causa. 49. vi. observatio firmatur febre quartana. 50. 1.
- Dies critici num observandi. 49. 11. horum impedimenta. 49. 111. ab acutis. 49. 111. a varia diæta, medicatione, climate, ætate. 49. 1v. In Inflammatorii observandi. 49. v. indices. 49. vii. quantum distant a criticis. 49. viii. sextus cur difficulter judicatur. 139. 1.
- Difficile serunt evacuationem. 25. vi. crudi. 25. vii. bonorum. 25. viii. malorum. 25. ix.
- Digitus frigidi contractus, vel remissi, lethale. 412. 11.
- Directio naturæ observanda. 21. 111.
- Diureticum an conducit sanis. 62. 1v.
- Dolens locus abscessum recipit. 142. 11. ante morbum præceteris affligitur. 143. 1.
- Dolentibus in capite an lac malum. 257. 11.
- Dolor quid sit. 31. 111. 71. 11. quomodo dicitur non sentiri. 31. 1. diuturnus partium circa ventrem fit producit suppurationem, malum. 247. capitis an curetur vena frontis secta. 261. 1. hepatis vehemens solvitur superveniente febre. 377. 1. oculorum qualis curatur meri potu. 296. 11. qualis curatur per balneum. 296. 111. qualis curatur per fomentum. 296. 1v. qualis curatur per venæ sectionem. 296. v. qualis curatur per purgationem. 296. vi. vehemens partium circa ventrem fit producit extremarum frigus, malum. 351. vehementior cur obscurat alterum. 71. 111.
- Dolorem fere non sentire. 31. 1v.
- Dolores acuti lateris, aut insanis exulceris detumescencia. 258. v. capitis quinam solvantur evacuatione sanguinis, puris, vel aquæ, per os, nares, & aures. 275. 11. elevati qui dicantur. 272. 1. ventris elevati quare mitiores, non elevati, vehementiores. 272. 11. hypocondriorum sine inflammatione quinam solvantur febre. 305. 11. & tumores articularum levantur frigida multa affusa. 218. 1. circa musculos spinales, & urina, cui pingue confertum supernat, Nephriti-



ticis supervenientia, abcessum præfigit. 361. i. sedantur calidis. 315. iv.  
 Doloris differentia quæ sint observandæ. 370. ii. capitis causa frequentissima quæ dicatur. 275. l. oculorum causa. 296. l.  
 Ducere quæ oportet. 21. ii.  
 Dysenteria adultis. 109. xi. autumnio. 101. x. carunculas deponens, lethale. 136. i. multa significat. 134. i. ab atra bile incipiens, lethale. 134. ii. ex mania, bonum. 330. l. a diarrhœa. 400. producit lienteriam. 401. a merata dejectione, malum. 348. ex ulcerum detumescencia, si rubicundi fuerint tumores. 258. vii. longa cur in lienosis mala. 308. ii. laborantes lienosi, in hydropem, vel lienteriam incidentes, pereunt. 308. iii. lienosis superveniens, bonum. 313.  
 Dysenteria in ficitatibus. 85. xii.  
 quando fiunt pituitosi. 91. vi.  
 Dyspnœa naturalis senibus. 110. ii.  
 Dysuria, & stranguria solvitur vini potu. 373. l.

## E

**E** Brius ex qua causa derepente mutus. 198. l.  
 Efflorescentia latæ non admodum pruriginosæ. 374.  
 Egestionem sanguinis copiosam passis an noceat lac. 257. vii.  
 Egestionem spumosa quæ dicantur, & unde orientur. 255. l. an ex pituita a capite defluente. 355. ii.  
 Ecstasis a mania, bonum. 330. iii.  
 Elevati dolores qui dicantur. 272. i. ventris quare mitiores, non elevati, vehementiores. 272. ii.  
 Elleborus, vid. *Helleborus*.  
 Empirica curatio qualis. 77. l.  
 Empyema quid significet. 201. iii. ex pleuritide. 201. iii. intra quod tempus expurgari debet. 208. ii. quomodo curari possit per sputum. 208. iii. si non expurgatur intra quadraginta dies, tabem infert. 208. iv.  
 Ephemera quæ dicatur. 165. ii. sola cur non mala in bubonibus. 165. iii.

Epilepsia juvenibus. 108. v.  
 Epilepsia definitio. 70. ii. cur facilius pueris. 70. iii. in pluviosis. 95. v. autumnio. 101. xiv.  
 Epilepsia fiunt vere. 99. iv. species quænam liberatur mutatione ætatis, regionum &c. 70. iv.  
 Epileptici pueri quando liberantur. 70. l.  
 Epiphænomena longitudinem morbi præfigentia. 12. vii. i.  
 Erroneæ febres autumnio. 101. iv.  
 Eruptio mensium quid notet. 225. l. sanguinis a forti pulsu in ulceribus, malum. 346.  
 Erysipelatis definitio. 290. l. translatio ad interna, non bonum. 290. ii. ad externa, bonum. 290. iii.  
 Erysipelas uteri an distingui possit ab inflammatione. 236. l. cur prægnanti lethale. 236. ii. si producit putredinem aut suppurationem, malum. 345. ab ossis denudatione, malum. 344.  
 Evacuare quæ turgent. 22. ix. multum & subito est periculosum. 76. ii. ad animi deliquium quando 13. vi.  
 Evacuatio in sanis. 3. l. cur faciendâ athleticis. 3. xi. an ex copia æstimanda. 23. l. qualis esse debeat. 23. iv. judicatur ex facili tolerantia. 23. v. qualis confert. 25. iii. non confert. 25. iv. facile fertur. 25. v. per locum conveniens. 21. iv. copiosior salubris. 2. iii. ex abundantia. 2. iii. mala. 2. iv. sine abundantia. 2. v. unde cognoscitur bona, vel mala. 2. vi. spontanea. 2. ii. regulam curationis suppeditat. 2. vii. sursum quotuplex. 128. iv. faciendâ in abundantia. 3. vii. an sola sanguinis missione minuendâ. 3. viii. an omnes morbos repletionis curat. 47. iii. indicatur ex inappetentia in convalescentibus. 33. iv. neque vetatur neque indicatur semper in omni morbo. 2. xi.  
 Evacuatio per conveniens organum. 2. xii. nigra in extenuatis, lethale. 133. vi. & repletio an causa sola convulsionis. 304. ii.  
 Evacuatio boni sæpe præveniuntur morbi. 3. v. immodica an auferenda abundantia. 3. ix.

Eva-

Evacuationis necessitas 3. 111. 112. L.  
quantitas æstimanda ad prædictionem.  
404. regulæ obſervandæ. 2. xv. mor-  
bi quinam. 47. 1v.  
Eunuchi non laborant podagra, neque  
calvi ſunt. 293.  
Exanthemata late quæ dicantur. 274. L.  
minus pruriginosa. 274. 11.  
Excrementa cruda abatra bile. 303. 1.  
Excretorius humor, vel eſt generalis,  
vel particularis. 193. L.  
Experimentum periculolum. 1. v.  
Exſolutio, vomitus, & animi deliquium  
a tumore intus rupto. 333. 11.  
Extenuatis præter rationem lac conve-  
nit. 257. x.  
Extenuatio a multis cauſis. 53. 1. per  
morbos acutos. 133. 111.  
Extenuatio per morbos Chronicos. 133.  
1v. ex vulneribus. 135. v. his ſi eva-  
cuatione nigra, poſtridie moriuntur. 133. vi.  
Extenuationis, & maciei differentia.  
133. 11.  
Extremarum frigus a dolore vehementi  
partium circa ventrem, malum.  
351. partium frigus in morbis acutis,  
malum. 326.

## F

**F**aciei motus mutatus in remittenti-  
bus mortem præſagit. 159. 111.  
Facile ſerunt evacuationem. 25. v.  
Facilis tolerantia iudicium facit eva-  
cuationis. 23. v.  
Fames quid ſit. 29. 111. quoruplex. 47.  
111. corpora ſiccant. 384. L. naturalis  
an ſolvitur vini potu. 46. 11. nimia  
in morbis non bona. 29. vii. acutis.  
29. viii. chronicis. 29. ix.  
Famem inducere oportet corporibus hu-  
midas carnes habentibus. 384. 11.  
Farinoſum urinaſe ſedimentum longam in-  
firmiſſimam ſignificat in febris. 356. 1.  
Faſtidium cacochylia ſignum eſt. 121. 11.  
Faucium morbus bilioſa urina. 40. 111.  
bilioſa excrementa. 40. 11.  
Febricitanti, niſi diebus imparibus fe-  
bris dimiſerit, reverti ſolet. 171. 1.  
ſi quis cibum det, convaleſcenti qui-  
dem robur, ægrotanti vero morbus

ſit. 390. unde ſudor. 166. 1. ſudor  
ſupervenienti febre non deficiente,  
malum. 166. 11.  
Febricitantibus an non lac dandum.  
257. 111. humidus viſcus. 16. 11.  
Febres non intermittentes, ſi per ter-  
tium diem vehementiores ſiant, peri-  
culoſæ. 387. quibus longæ ſunt, his  
aut tubercula, aut ad articulos dolo-  
res ſunt. 338. acutæ an non ſunt fe-  
nibus. 14. vi. longæ in pluviſis. 95.  
11. dentientibus. 104. 111. longæ ado-  
leſcentibus. 106. 111. omnes male  
in bubonibus præter ephemeram. 165. 11.  
Febris quotidie rigores ſi ſiant, quo-  
tidie febres ſolvuntur. 173. 1.  
Febris longis, & languidiſ lac con-  
venit. 257. ix. quartanis exiſtentibus,  
ſi ſanguis ex naribus fluxerit, ma-  
lum. 406.  
Febris definitio. 153. L. & 51. 1v. divi-  
ſio. 153. 11. intermittens tertio die  
vehementior, periculoſa. 153. 111. &  
bilis vomitus ex cerebri læſione. 316.  
L. cacochymica deſcribitur. 179. 1. niſi  
apprehendit, ſi vocis deſectus, & ſter-  
tor poſt capitis doloreſ deſerente in fa-  
nis natos, obſervantur, cur intra ſep-  
tem dies moriuntur. 316. 11. quom-  
nam hypochondriorum doloreſ ſine in-  
flammatione ſolvit. 305. L. vehemens  
ex dentium viſciditate cognoscitur. 163.  
11. quænam abſceſſu finitur. 161. 11.  
laſſitudinem inducens. 141. L. quan-  
do ſolvitur alvo exturbata. 170. 111.  
quando ſolvitur hæmorrhagia. 170.  
11. metaſtaſis anginam producens. 144.  
11. & 145. L. convulſionem ſuperveni-  
re, pejus eſt. 51. 1v. extenuat. 53. 11.  
valida quando non extenuat. 53. 111.  
Febris quando nimiam extenuationem fa-  
cit 53. 1v. ſupervenientiſ ſolvit doloreſ  
hepatis vehementem. 377. 1. ſi super-  
venerit, & urina abunde fluxerit, quo-  
modo liberat vulvulum ex ſtranguria.  
309. 111. qualis non ex bile naſcitur.  
367. L. ſolvitur multa aqua calida in  
caput affuſa. 367. 11.  
Ferrum ſanat ea, quæ medicamenta  
non ſanant. 409. 11.  
Finis cur debiliora habet omnia. 55. 1v.

N n n

Flu-

- Fluxui muliebri si convulsio, & animi deliquium superveniat, malum. 249.  
 Fluxus, & tabes a puris sputo. 341. i. sanguinis in quibus mensibus deficientibus bonus. 226. ii. alvi in gravidis cur periculum abortus infert. 227. i. sanguinis si producit delirium aut etiam convulsionem, malum. 334.  
 Fœmina, vel mas an ex colore gravidæ prædici potest. 235. i.  
 Fœtus an manere nequeat sanus perseverante menstruatione. 253. i. mares quidem in dextris, fœminæ vero in sinistris magis. 241.  
 Fontem qualem oculorum dolorem curat. 296. iv.  
 Frigefacere repente malum. 76. v.  
 Frigefacta calefacere oportet. 212. i. non calefacienda, quæ sanguinem fundunt. 212. ii.  
 Frigida velut nix, glacies, pectori inimica. 217. i.  
 Frigiditas uteri sterilitatis causa. 255. ii.  
 Frigidum quomodo adhibendum in sanguinis eruptione. 216. ii. quali inflammationi, vel epiphlogismati applicandum. 216. iii. quando erysipelati adhibendum. 216. iv. infert nigrores. 210. iii. rigores febriles. 210. iv. quid sit, & quæ mala infert. 210. i. spasmodum, & tetanum infert. 210. ii. ulceribus mordax. 213. ii. quibus partibus inimicum, & occideas. 215. xiii. noxium ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medullæ. 211. i. cutim obdurat. 213. iii. dolorem insuperabilem facit. 213. iv.  
 Frigoris, & caloris mutatio morbi longitudinem præfagit. 150. i.  
 Frigus internarum partium unde in remittentibus. 158. iii. extremarum partium in morbis acutis malum. 326. auget contractilitatem, & minuit motum vitalem. 81. iii. partis morbi signum. 149. ii.  
 Brontis vena secta an curet capitis dolorem. 261. i.

## H

G Emellorum alteruter an nequeat abortum facere. 231. i.

H Abitus bonus an persistere nequit. 3. xi.

Hæ.

Hæmoptysis mala. [135.](#) [11.](#) juvenibus.

[108.](#) [11.](#)

Hæmorrhagia, vid. *sanguinis fluxus*.  
narium in febris quartanis, ma-  
lum. [406.](#) [1.](#)

Hæmorrhagiæ in quibus mensibus defi-  
cientibus bonæ. [226.](#) [11.](#)

Hæmorrhoides aut varices quamnam  
speciem insanæ solvunt. [186.](#) [1.](#) diu-  
turnæ an non omnes curandæ. [277.](#)  
[1.](#) melancholicis supervenientes, bo-  
num. [276.](#) [1.](#) nephriticis superve-  
nientes, bonum. [276.](#) [11.](#)

Hæmorrhoidibus diuturnis sanatis, cur  
periculum est, ne fiat hydrops, vel  
phthisis. [277.](#) [11.](#)

Hæmorrhoidum fluxus quando bonus.  
[135.](#) [111.](#)

*Hellebori usus, & cautela.* [123.](#) ad [126.](#)

Hellebori usus. [123.](#) [11.](#)

Helleborus quotuplex. [123.](#) [1.](#) quomodo  
generat convulsionem. [194.](#) [111.](#) cur  
inducit convulsionem. [126.](#) [111.](#)

Hepar si ictericis durum fiat, malum. [307.](#)

Hepatis abscessus si pus bonum profert,  
salutem portendit. [370.](#) [1.](#) dolor vehe-  
mens solvitur superveniente febre.  
[377.](#) [1.](#) hydrops si producat ventris hy-  
dropem, *lethale*. [380.](#) [1.](#) inflammatio  
si producit singultum, malum. [342.](#)  
vulnera. [283.](#) [VIII.](#)

Hepati inflammato singultus supervenit.  
[351.](#) [IV.](#)

Herpetibus exedentibus convenit cali-  
dum. [215.](#) [XI.](#)

Hippocratis peritiam, & sapientiam excel-  
lens. [119.](#) [IV.](#)

Horror solvitur vino aqua diluto. [381.](#)  
[111.](#) a sudore non bonum. [329.](#)

Humiditas oculorum, narium, & alvi  
in senibus. [110.](#) [XI.](#) uteri sterilitatis  
causa. [255.](#) [111.](#)

Humorum decubitus periculosi morbis  
melancholicis. [321.](#) [1.](#)

Hydrops qualis morbus sit. [273.](#) [1.](#) su-  
pervenit leucophlegmatæ. [399.](#)

Hydrops ex mania, bonum. [330.](#) [11.](#) o-  
menti solvitur urina multa. [379.](#) [1.](#)  
ventris ex hepatis hydropem, *lethale*.  
[380.](#) [1.](#) hepatis si producat ventris hy-  
dropem, *lethale*. [380.](#) [1.](#) vel lienteria

si corripit lienosos, longa dysenteria  
laborantes, *lethale*. [308.](#) [111.](#)

Hydropes autumnæ. [101.](#) [VI.](#)

Hydropis solutio fit, si aqua secundum  
venas in alvum fluxerit. [279.](#) vel  
phthisis periculum cur ex hæmor-  
rhoidibus diuturnis sanatis. [277.](#) [11.](#)

Hydropicis si aqua acervatim evacuetur,  
cur mortem infert. [292.](#) [11.](#) tussis  
supervenienti, malum. [300.](#) ulcera in  
corpore orta non facile sanantur.  
[273.](#) [11.](#)

Hydropicum si tussis habeat, desperatus  
est. [372.](#)

Hyems facilius fert alimenta. [18.](#) [IV.](#)  
quid faciat & quos morbos inferat.  
[102.](#) [1.](#) quibus morbis facilis vel dif-  
ficilis. [82.](#) [11.](#) australis, pluviosa, &  
tranquilla quid faciat. [91.](#) [1.](#) cui na-  
tura inimica. [81.](#) [111.](#) sicca, & aequi-  
lonia quid facit. [90.](#) [11.](#)

Hyemis & ætatis mediæ convenientia.  
[97.](#) [IV.](#)

Hyeme an alvus ducenda. [114.](#) [111.](#) ma-  
gis vitanda vomitoria. [116.](#) [111.](#) an  
ventres calidissimi. [15.](#) [11.](#) maxime no-  
cet vomitorium in lienteria. [122.](#) [111.](#)

Hypochondria quænam partes dicantur.  
[305.](#) [1.](#) dura in ictero ex febre, non  
bonum. [174.](#) [111.](#) murmurantia unde  
in febribus. [183.](#) [1.](#) quibus elata mur-  
murant an lac noceat. [257.](#) [IV.](#)

Hypochondriorum dolores sine inflam-  
matione, quinam solvantur febre. [395.](#) [111.](#)

Mysterica quid notet. [228.](#) [1.](#)

## I

**I**cteri definitio. [172.](#) [1.](#) species quæ-  
nam ante septimum diem in febrili-  
bus veniens, malum. [172.](#) [111.](#)  
Ictericus non admodum statulentus. [265.](#) [1.](#)  
Ictericis si hepar durum fiat, malum. [307.](#)  
Icterus die critico in febre, bonum.  
[174.](#) [11.](#) ex febre cum hypochondriis  
durus, non bonum. [174.](#) [111.](#)

Jejunium facile fert senex, difficile  
puer. [13.](#) [111.](#)

Ignis sanat ea, quæ ferrum non sanat.  
[409.](#) [111.](#)

Ileus si producit vomitum, malum.

N n n 2

[335.](#)

335. i. singultum, malum. 335. ii. convulsionem, malum. 335. iii. Impetigines fiunt vere. 99. x. Impotentia linguæ & apoplexia partis ex melancholia. 363. l. Impura corpora non nutrienda. 35. iv. Impuritas quid sit. 35. ii. Inappetentia & fastidium quantum differant. 127. ii. an præstantior quam appetitus in morbis. 57. iv. in convalescentibus. 57. iii. Inconstantia sunt, quæ præter rationem fiunt. 52. ii. Incrementum corporis an ab actione vitæ vel calido innato. 14. l. an a calido innato. 14. iii. Infantes quando nascuntur infirmi. 91. v. Inferiores partes quæ dicantur. 128. iii. Inflammato intestino recto supervenit stranguria. 251. l. utero supervenit stranguria. 251. ii. hepati supervenit singultus. 251. iv. Inflammatio hepatis si producit singultum, malum. 342. Inflationis ventris in morituris. 417. l. Insanabilia existimare oportet ea, quæ ignis non sanat. 409. iv. Infantia & melancholia fiunt vere. 99. iii. autumno. 101. xv. quæ species solvit varicibus aut hæmorrhoidibus. 286. l. Infania, aut lateris dolores acuti ex ulceris detumescencia. 358. v. Interperies an nequit esse sterilitatis causa in masculis. 256. i. Intermittentibus febribus rigor. 156. iii. Intermittentium diæta. ii. iv. chronicorum diæta. ii. iv. Intermittens febris tertio die vehementior, periculosa. 153. iii. Interna suppuratione occultatur crassitudine loci vel puris. 306. l. Intestino recto inflammato supervenit stranguria. 251. l. Intestinorum tenuium si aliquid diffusum fuerit, non coalescit. 289. vult. nera. 283. vi. Invasio longitudinem, & breviter morbi præfigens. 12. iv. Judicare quando dicitur. 20. v. Judicata quæ dicuntur. 20. vi.

Judicium difficile. l. vi. difficile exparoxysmis rimari. 140. ii. Juvenes an frequentius, quam senes ægrotant. 64. iii. Juvenum ætas. 64. l. Juvenibus quinam morbi fiant. 108. l.

## L

**L**abia livida, aut etiam resoluta & inversa & frigida, lethalia. 413. Laborandum non est, ubi fames. 41. iv. Labor quid faciat. 41. ii. in morbis quid significet. 26. l. Laboris consuetudo quid in nobis faciat. 74. iii. Lac quid sit. 232. l. quando generatur in mammis ex menstruis retentis. 232. iii. in capite dolentibus an malum. 257. ii. an non dandum febricitantibus. 257. iii. Lac an noceat, quibus hypochondriae lata murmurant. 257. iv. an non dandum sticulis. 257. v. num malum, quibus dejectiones sunt biliosæ. 257. vi. an nocet, quibus copiosa sanguinis fuit secta egestio. 257. vii. convenit tabidis. 257. viii. febribus longis & languidis. 257. ix. præter rationem extenuatis. 257. x. Lactis examen. 257. l. generatio. 232. ii. copiosior effluxus in gravidis curæ forem infirmum significat. 245. l. Lacrymæ ex manifesta causa nil boni vel mali præfigunt. 162. ii. ex latente causa in febre quid præfigunt. 162. iii. in aliis infirmis quid notant. 162. iv. Languis & longis febribus convenit iac. 257. ix. Lassitudo laboriosa. 30. l. spontanea. 30. ii. squalens. 39. iii. laboriosa. 30. iv. ulcerosa. 30. v. tensiva. 30. vi. phlegmonosa. 30. vii. spontanea morbos denunciat. 30. viii. per febres. 141. i. Lassitudo cur præfigit abscissum. 141. ii. Laterum dolores fiunt hyeme. 101. v. Lateris dolores acuti, aut infania ex ulceris detumescencia. 258. v. Lentoris mutatio varia. 22. iii.

Lepra



Lepræ fiunt vere. 99. ix.  
 Lethalia vulnera quæ dicantur. 283. i.  
 Lethargus adultis. 109. vi. fit hyeme.  
 101. iii.

Leucophlegmatia solvitur a diarrhœa  
 vehementi superveniente 354.

Leucophlegmatiz hydrops supervenit.  
 399.

Lienes autumno. 101. v.

Lienosi qui dicantur. 308. L. cur his dys-  
 enteria longa mala. 308. ii. dysen-  
 teria longa laborantes, in hydropem  
 vel lenteriam incidentes, pereunt.  
 308. iii.

Lienosis dysenteria superveniens, bo-  
 num. 313.

Lienteriz causa. 122. i. diurnæ ex  
 qua causa. 266. i.

Lienteria adultis. 109. xii. autumno.  
 101. ix. a dysenteria. 401. verat vo-  
 mitorium. 122. ii. vel hydrops si  
 corripit lienosos longa dysenteria la-  
 borantes, lethale. 308. iii.

Lingua in omnibus infipienda. 410. i.  
 nigra & cruenta quid notet. 410. ii.

Linguz impotentia, & partis apoplexia  
 ex melancholia. 365. L.

Lipothymia aut convulsio in mensium  
 fluxu, malum. 399. i.

Loci vel puris crassitudo suppurationem  
 internam occultat. 306. L.

Longitudo prædicitur ex sudore in tem-  
 pore non critico. 146. iii. ex sudore  
 frigido in mitiore febre. 146. v. mor-  
 bi prædicitur ex extenuatione. 53. v.  
 ex caloris & frigoris mutatione. 150.  
 L. ex caloris mutatione. 150. ii.

Longitudinem præfigit abscessus in fe-  
 bribus. 161. iii.

Longitudinis prædictio ex sudore. 166. iii.  
 Lucem averfans in acutis. 415. ii.

Lumborum dolores fiunt hyeme. 101. v.  
 dolor præfigiens urinæ copiam. 183.  
 111. præfigiens alvi humectationem.  
 183. ii. ex cacochylia. 130. iii.

Lumbrici pueris frequentes. 105. v.

M

Maciei species & causæ. 32. iii.  
 & extenuationis differentia. 133. i.

Macrocephali cingendo caput fiunt. 75. i.

Mammæ graciles abortum præfigiunt.

246. ii. duræ in gravidis quid præ-  
 sagiunt. 246. iii. solidiores cur fœ-  
 tum firmiorem indicant. 245. ii. ex  
 improvviso graciles cur abortum præ-  
 sagiunt. 230. ii.

Mammarum cum utero consensus. 230. i.

Mamma dextra gracilescens an abortum  
 maris præfigit, & vicissim. 231. ii.

Mania ex melancholia. 321. iv. an  
 prædicatur ex sanguinis collectione  
 ad mammæ. 233. L. si producit dy-  
 senteriam, bonum. 330. i. hydro-  
 pem, bonum. 331. ii. ecstasin, bo-  
 num. 330. iii.

Marasmus quid. 32. ii.

Mares fœtus quidem in dextris, fœ-  
 minæ vero in sinistris magis. 241.

Mas vel fœmina an ex colore gravidæ  
 prædicti potest. 235. L.

Medicus qualis esse debeat. i. viiii.

Melancholia producit apoplexiam corpo-  
 ris. 321. ii. convulsionem. 321. iii.  
 maniam. 321. iv. cæcitatem. 321. v.  
 curatio. 321. vi. quo ætatis tempore  
 præcipue generat apoplexiam. 322. L.  
 producit linguæ impotentiam, & par-  
 tis apoplexiam. 365. L. fursum, vel  
 deorsum erumpens, lethale. 132. iii. cur  
 præcipue in vena portarum colligitur.  
119. iii. & infania autumno. 101. xv.

Melancholiz evacuatio in principio dys-  
 enteriz, lethale. 134. ii. cur qui-  
 busdam post autumnum siccum. 93.

viii. & infanz fiunt vere. 99. iii.

Melancholici cur uberius purgandi.  
119. iii. humoris species. 131. ii.

Melancholici qui dicantur. 118. ii.

Melancholica materia describitur. 119. ii.

Melancholicis hæmorrhoides superve-  
 nientes, bonum. 276. L. morbis pe-  
 culosi decubitus humorum. 32. L.

Melancholicum est, si metus & tristitia  
 multo tempore perseverant. 288.

Melicratum quid notet. 75. iii. mu-  
 lieri exhibitum an signum gravidita-  
 tis ostendere valeat. 234. L.

Menses decolores quinam dicantur. 229.

i. inordinati. 229. ii. & decolores cur  
 purgationem indicant. 229. iii. fiunt  
 motu particulari. 249. i. ex quibus  
 causis deficient. 226. L. copiosiores  
 quos

- quosnam morbos producant. 250. 11.  
non prodeuntes morbos uteri faciunt. 250. 111.
- Menstrua sponte subsistentia cum fastidio sine horrore & febre, graviditatis signum. 254. L. erumpentia cur solvunt sanguinis vomitum. 225. 111. retenta quando generant lac in mammis. 230. 111.
- Menstruatio est evacuatio necessaria. 3. v. Menstruatione perseverante, an fœtus sanus manere nequeat. 253. L.
- Mensium fluxui si convulsio aut lypothymia superveniat, malum. 249. 1. naturalis quantitas. 250. 1. eruptio quid notat. 225. L.
- Mens ægrotat, quid denotat. 31. v. præbet signa in morbis. 58. 1.
- Mentem valere in morbis, bonum. 58. 11. se bene habere ad ea, quæ offeruntur, bonum. 58. 111.
- Mentis torpor a calidiorum usu frequentiore. 209. vii.
- Meraca dejectio si producit dysenteriam, malum. 248.
- Meracæ dejectiones in chronicis, malum. 331. 11.
- Meri potus qualem oculorum dolorem curat. 206. 11.
- Metastasis observatio generalis. 302. I. Metus, & tristitia si multo tempore perseverant, melancholicum id ipsum. 288.
- Metereologicæ tabulæ forsan ab Hippocrate conscriptæ. 90. 11.
- Mictio noctu multa quid significet. 193. 11. an sanitati conducatur. 193. 111.
- Mictus cruantus quam partem affectam denotat. 185. 1.
- Morbus acutus quinam. 24. 111. raro exigit purgans. 24. v. constans & inconstans. 87. 11. facilis & difficilis iudicatu. 87. 111. iudicatu facilis ex constitutione temporis. 87. iv. difficilis ex constitutione temporis. 87. v. facilis & difficilis. 12. 111. longus & brevis. 12. 111. ex invasione. 11. iv. ex morbi natura. 12. v. ex temporibus anni. 12. vi. ex paroxysmo. 12. vii. ex epiphœnomenis. 12. viii. ex sputo. 12. ix. ex urina. 12. x. ex alvi excrementis. 12. xi. ex sudoribus. 12. xii. extremis. 6. 11. periculosior naturæ dissimilis. 59. 11. ex dissimilitudine ætatis. 59. 111.
- Morbus periculosior ex dissimilitudine habitus. 59. iv. temporis. 59. v. morbo sæpe supervenit. 51. 1.
- Morbi brevis cognitio. 10. vi. longitudo cognoscitur. 10. vii. ex mensibus copiosioribus, quinam. 250. 11. ab utero fiunt a mensibus non prodeuntibus. 250. 111. vigor tenuissimam dietam exigit. 8. 1. sæpe præveniuntur evacuatione boni. 3. v. paroxysmus tenuissimam dietam exigit. 8. vi. qui fiant ex derepente disparentibus tumoribus circa ulcera. 258. 111. principium. 24. iv. incrementum qualem dietam exigit. 9. 1. facile & difficile ferentes hyemem. 82. 11. ex temporis mutatione. 80. 11. magis fiunt suis temporibus & magis exacerbantur. 98. 111. fieri possunt omni anni tempore. 89. 11. ex aeris mutatione. 80. 111.
- Morbi omnes neque egent neque vetant evacuationem. 2. xi. ex consensu & metastasi. 258. L.
- Moribundus jam est, qui in rabiem actus fuerit intrepide, & non agnoscit, & neque audit, neque intelligit. 416.
- Moriuri ventres attolluntur atque inflantur. 417. L.
- Mors ex acutis quomodo. 418. L.
- Motus vitalis cur facilis quam animalis turbari potest. 67. 111. corporis dolores & lassitudinem parit. 73. 1. derepente factus nocet. 76. vi. major an faciendus in principis. 34. 11. promovet vomitum. 125. 11.
- Movere quæ turgent. 22. ix.
- Movenda non sunt cruda. 22. vii. sunt cocta. 22. vi.
- Movendum quid significet. 54. L. corpus post datum vomitorium. 124. 11. corpus an sit ante cibum. 41. v.
- Movenia vetantur in crisi perfecta. 20. ix.
- Muci abundantia in coxæ articulo unde, & quid faciat. 324. 11.
- Mulieres præter naturam tenues quæ dicantur. 237. 1.
- Mulieres præter naturam tenues cur hæ abortiunt, priusquam crassescunt. 237. 11.

Mu-

Mulier non laborat podagra, nisi menses ipsi de'ecerint. 294. num sit fecunda vel sterilis, an fustitu cognosci possit.

292. 1. ambidextra non sit. 368.

Mulieri, mensibus deficientibus, sanguinis fluxus bonus. 226. sanguinem vomenti cur menstruis erumpentibus solutio fit. 225. 111.

Multum naturæ inimicum. 76. VII.

Mutatio non subito facienda. 76. 1.

Mutus ex qua causa derepente in ebrietate. 198. 1. ex ebrietate convulsus cur moritur. 198. 11. solvitur febre.

198. 111. loquela tempore crapulæ redeunte. 198. 1V.

## N

Nares humidiores & genitura humidior cur minus perfectam sanitatem indicant. 276. 111. & genitalia ficiora perfectiorem sanitatem indicant. 267. 1V.

Nares natura humidiores quid notent. 267. 1.

Narium hæmorrhagia in febribus quartanis, malum. 406. 1. humiditas senibus. 110. XI.

Natura quid notet. 81. 11. quæ non fert hyemem. 81. 111. quæ non fert æstatem. 81. 1V.

Natura morbi longitudinem præfagiens. 12. V.

Navigatio cur nauseam & vomitum inducit. 124. 111.

Nausea cur ex navigatione. 124. 111.

Nephritidis hæmorrhoides supervenientes, bonum. 262. 11. urina cui pingue confertum supernat, & dolore circa musculos spinales, supervenientia, abscessum præfagit. 361. 1.

Nephritides senibus. 110. V.

Nervis frigidum noxium. 211. 11.

Nervus dissectus an neque augetur, neque coalescit. 284. 1V.

Nigrores a frigido. 210. 111.

Nocturna sitis unde. 220. 1.

Nox gravis ante crisin. 38. 11.

Nutrientia confertim. 43. 11.

Nutrimētum quot modis ingeritur. 36. 11.

Nutrire quid denotet. 35. 111. quæ ventant. 40. VI. quando licet. 40. VII.

Nutritio quid sit. 22. 11.

Nutritionis necessitas. 3. 111.

## O

Ocasio celeris. 1. 1V.

Oculi in somno observandi. 317.

1. conniventes in somno, ex qua causa. 317. 11. sine alvi fluxu vel du-

ditione prægressa, cur lethale. 317.

111. rubri & singultus a vomitu,

malum. 328.

Oculorum doloris causa. 296. 1. dolor

qualis curatur meri potu. 296. 11.

qualis curatur per balneum, 296. 111.

qualis curatur per fomentum. 296. 1V.

qualis curatur per venæ sectionem 296.

v. qualis curatur per purgationem.

296. VI. humiditas senibus. 110. XI.

Oculos mordent aquilonæ constitutio-

nes. 96. VIIII.

Omenti hydrops solvitur urina multa.

329. 1.

Omentum os uteri premens, an sterilitatis causa. 239. 1. prolapsum in ventris

vulneribus, cur citius putrescit. 323. 1.

Ophthalmiæ cur fiant æstate. 100. VI.

in siccitatibus. 95. IX. sicca cur bi-

liosia. 91. VII.

Ophthalmia sicca post autumnum sic-

cum, & aquilonarem. 92. V. labo-

rantem ab alvi profluvio corripitur, bo-

num. 282.

Ordo curationis. 109. 1.

Oris amaritudo cacoehylæ signum. 127.

v. exulcerationes cur fiant; æstate.

100. VIIII.

Os an semper abscedere faciunt ulcera

vetusta. 310. 11. dissectum an n. que

augetur, neque coalescit. 284. 11.

quodcumque, aut cartilago aut ner-

vus in corpore dissecta neque au-

gentur, neque coalescunt. 353.

pericissum si in vacuum penetraverit,

producit delirium. 349.

Offis abscessus a sphacelo. 402. denudatio

si producit Erysipelas, malum. 344.

Offis ægotanti si adsit caro livida, ma-

lum. 327.

Offibus fractis, & denudatis convenit

calidum. 215. VII. & VIII. frigidum

noxium. 211. 11.

Offi-



Oscitatio solvitur vino aqua diluto .  
381. 11.

## P

**P**aroxysmi quomodo difficile judicium suggerunt. 140. 11.  
Paroxysmus longitudinem morbi præfagiens. 12. VII.  
Pars tenuis genæ dissecta an neque augetur, neque coalescit. 284. v.  
Partes circa vesicam laborare significat, si quis sanguinem, & grumos mingat, & stranguriam habeat, & dolor incidat ad perinæum, & imum ventrem, & pectinem. 364. dissectæ quænam, quæ neque augentur, neque coalescunt. 284. 1. superiores, & inferiores quæ dicantur. 128. 11.  
Partium circa ventrem diurnus dolor si producit suppurationem, malum. 347. circa ventrem dolor vehemens si producit extremarum frigus, malum. 351. extremarum frigus in morbis acutis, malum. 326.  
Partus cur difficilis, & periculosus, si gravida corripitur febris, & vehementer attenuetur. 248. 1.  
Partui difficili superveniens sternutatio, bonum. 228. 1v.  
Pavores ex somno in febris, malum. 177. 11.  
Pavores puerorum morbus. 103. VII. 11.  
Pectoris dolor ab aquilone. 84. 1v. dolores fiunt hyeme. 101. v. dolorem augent aquiloniæ constitutiones. 46. 1x.  
Pectori inimica frigida, velut nix, glacies. 217. 1. applicata frigida cur inducunt tussim, sanguinis eruptiones, catarrhos. 217. 11.  
Peracutus morbus. 7. 11. futurus conjicitur. 7. 1v. exigit tenuissimum vitium. 7. v.  
Peripneumonia si producit phrenitidem, malum. 337. quomodo ex angina. 203. 11. a pleuritide, malum. 336. adultis. 109. v.  
Peripneumonix aut pleuritidi diarrhœa superveniens, malum. 281. fiunt hyeme. 101. 11.  
Perniciosissimi morbi qui dicantur. 88.

111. morbi cur autumno. 88. v.  
Pharynges ab aquilone. 84. 1v.  
Phrenes notat Diaphragma. 128. 11.  
Phrenitis a peripneumonia, malum. 337.  
Phrenitides adultis. 109. VII.  
Phrenitici qui fiunt supra quadraginta annos, non admodum sanantur. 405.  
11. minus periclitantur, quorum ætati, & naturæ morbus similis fuerit. 405. 111.  
Phreniticis urina alba pellucida. 182. 111.  
Phthisis quid, & quotuplex. 32. 111.  
autumno. 101. VII. quam sit ætare. 202. 1. futuræ signa. 118. 1v. ab empyemate, quod intra quadraginta dies non expurgatur. 208. 1v. vel hydrops periculum cur ex hæmorrhoidibus diurnis sanatis. 277. 11.  
Phthisi confirmata, & instanti nocet vomitorium. 118. 111. & 1v. laborantibus si capilli de capite defluunt, hi, alvi fluxu superveniente, moriuntur. 205. 1.  
Phthisicis sputum olens carbonibus injectum, & capillorum defluvium, lethale. 204. 1v.  
Pingue, & confertum supernatans, unde. 360. 1. cur significat affectiones hepaticas, & acutas. 360. 11.  
Pituitosis quando fiunt Dysenterix 91. VI.  
Pleuritis adultis. 109. 1v. si producit peripneumoniam, malum. 336.  
Pleuritidis mutatio. 201. 1. commutatio in empyema. 201. 111. in peripneumoniam translatio triplex. 336. 1.  
Pleuritidi aut peripneumonix diarrhœa superveniens, malum. 281.  
Pleuritides fiunt hyeme. 102. 11.  
Pleuritici non admodum fiunt, qui acidum eructant. 298.  
Podagricis an conducit vere venam secare. 312. 11. & arthriticis an conducit vere alvum ducere. 312. 111.  
Podagrici morbi quo tempore finiuntur. 314. 1. morbi vere, & autumno moventur ut plurimum. 320.  
Potus quid notet. 121. 11.  
Potu facilius quam cibo repleatur corpora. 36. 111.  
Potus multus si producit rigorem, & delirium, malum. 332. meri qualem occu-

oculorum dolorem curat. 296. 11. vini  
 solvit stranguarium, & dysuriam. 373. 1.  
 Præcordia. 60. 11.  
 Prædictionis fons. 44. 11.  
 Prædictio non omnino certa. 44. 11.  
 Prædictio in acutis. 44. 1v. difficilis est  
 est. 44. v.  
 Prægnans femina vid. *gravida*.  
 Præparatio quid significet. 34. 11. in  
 convalescentibus. 34. 111. in acutis.  
 34. 1v. in chronicis. 34. v. ad alvi  
 ductionem. 34. vi. vomitus. 395. 1.  
 Præputium dissectum an neque auge-  
 tur, neque coalescit. 284. vi.  
 Prasagium abortus ex mammis ex im-  
 proviso gracilescitibus. 230. 11. in  
 suppuratis scelis, vel ultiis ex pure  
 peti potest. 309. 11.  
 Præservatoria curatio. 312. 1.  
 Præter rationem sunt inconstantia. 52.  
 11. permanentia non sunt. 52. 111.  
 non credenda nec timenda. 52. 1v.  
 Principia morbi cur debiliora. 55. 11.  
 Principiis morbi an antidota danda.  
 54. 1v. moventia, vel refrigerantia  
 adhibenda. 54. 11.  
 Principium morbi, vid. *morbi principium*.  
 Pruritus totius corporis in senibus. 110. x.  
 Pudendis convenit calidum. 215. xi.  
 Pudendorum putredines cur fiant æsta-  
 te. 100. ix.  
 Puer difficile fert jejunium. 13. 11.  
 inter hos minime qui alacriores. 13.  
 1v. non laborat podagra ante vene-  
 ris usum. 295.  
 Pueris humidus visus. 16. 111.  
 Puerorum morbi quinam. 103. 112.  
 quo tempore judicantur. 107. 11. post  
 dentitionis tempus. 105. 1. circa pu-  
 bertatem, aut menstruorum eruptio-  
 nes non cessantes perseverare solent.  
 107. 111. & veris convenientia. 97. 11.  
 Pulsus fortis in ulceribus si producat san-  
 guinis eruptionem, malum. 346.  
 Purganda sunt cocta. 22. v. non sunt  
 cruda. 22. vii.  
 Purgandi melancholici uberius. 119. 111.  
 Purgandum in cacochylia. 130. 1.  
 Purgans veterum. 24. 11. cito resolvit.  
 61. 11. an depurat. 61. 111. quan-  
 do dandum in gravida. 111. 111.

quomodo sitim inducit. 129. 1. ra-  
 ro in acutis. 24. v. cum qua cau-  
 tione. 24. vi.  
 Purgantia verantur in crisi perfecta. 20. x.  
 Purgantis potio si producit convulsio-  
 nem, lethale. 350.  
 Purgare qualia oportet. 25. 11.  
 Purgatio qualem oculorum dolorem cu-  
 rat. 296. vi.  
 Puris generatio quid sit. 72. 11. per  
 quam actionem. 72. 11. ex qua ma-  
 teria. 72. 111. qualia symptomata  
 infert. 72. 1v. boni, & mali signa.  
 369. 1. vel loci crassitudo suppu-  
 rationem internam occultat. 306. 1.  
 sputum a sanguinis sputo, malum.  
 340. producit tabem, & fluxum. 341. 1.  
 Pus acervatim effluens in suppuratis cur  
 mortem infert. 292. 1. bonum in he-  
 patibus abscessu salutem portendit. 370.  
 1. velut amurca mortem præfigit.  
 370. 11. unde in urina. 184. 11.  
 Pustulae ulcerose fiunt vere. 99. xii.  
 Putredo aut suppuratio ab Erysipellate,  
 malum. 345.  
 Putredines in pulvisis. 95. 1v.

## Q

Quantitas naturalis mensium. 250.  
 1. evacuationis æstimanda ad præ-  
 dictionem. 404.  
 Quartana febris. 50. 11. vernalis cur  
 brevior. 50. 111. autumnalis cur lon-  
 gior. 50. 1v. superveniens an tollit  
 convulsionem. 263. 11. correpti an  
 non admodum convulsione corripiun-  
 tur. 263. 1.  
 Quartanæ febres autumnis. 101. 111.  
 cur fiunt æstate. 100. 111.  
 Quartanis febribus existentibus, si san-  
 guis ex naribus fluxerit, malum. 406.  
 Quies humectat. 123. vi. & somnus  
 compescunt vomitum. 125. 111. su-  
 bito inducta nocet. 76. vi. curat. las-  
 titudinem, & dolores ex labore. 73. 11.

## R

Ramentorum copia in alvi excre-  
 mentis magnitudinem morbi decla-  
 rat.

rat. 392. 1. his confert , alvum inferne purgari. 392. ix.  
 Ratio in morbis quid sit. 52. 1. in curatione quamvis sit. 77. 1.  
 Rationalis curatio. 77. 1. non facile mutanda. 77. 11.  
 Raucedo quid sit. 65. 11. post autumnum pluviosum. 92. v.  
 Raucedines fiunt hyeme. 101. iv. & tusses fiunt vere. 99. viii.  
 Recidiva quid sit. 37. 11. duplex. 37. 111. a relictis post crisin. 37. iv. praedicatur post imperfectam crisin. 37. v. praedicatur ex sudore in tempore non critico. 146. 111.  
 Recidivat febris, quae non dimittit diebus imparibus. 171. 1.  
 Recto intestino inflammato supervenit stranguria. 251. 1.  
 Refectio quid sit. 32. 11. quanta debeat esse in defectu. 32. x. post chronicos. 32. v.  
 Refectio post acutos. 32. iv.  
 Regio quid faciat ad cognitionem. 2. viii. atque magis minusque conveniens. 32. v. determinat assumptionem alimentorum. 17. vi.  
 Regionibus omnibus an ventrum observationes quaequant. 84. 11.  
 Remittentes febres producentes debilitatem, mortem praesagunt. 159. 11. motum faciei inducentes, quid praesagunt. 159. 111.  
 Remittentibus febribus sputa multa, malum. 157. iv. qualis urina, & alvi egestio bona, & mala. 157. v. qualia sputa mala. 157. 11. qualia sputa bona. 157. 111.  
 Remittentium febrium ardor unde. 158. 11. frigus unde in partibus internis. 158. 111.  
 Renibus suppuratis stranguria supervenit. 251. 111.  
 Renum, & vesicae vitia in senibus difficulter sanantur. 271.  
 Repletio quoruplex. 47. 11. & evacuatio an causa sola convulsionis. 304. 11.  
 Replere de repente, malum. 76. 111.  
 Repletionis morbi quinam. 47. 11.  
 Repletionis morbi an omnes curantur evacuatione. 47. 111.  
 Res externae quales debeant esse. 1. xi.

Resolutio qualis morbus. 68. 1.  
 Resolutionis causa. 68. 11.  
 Respiratio consumit aerem. 89. 11. difficilis, & delirium lethale in remittente. 160. 1.  
 Respirationes luctuosae in acutis affectionibus, quae cum febre fiunt, malae. 319.  
 Respirationis observatio in morbis. 178. 1. interruptio in febribus, malum. 178. 111. convulsionem indicat in febribus. 178. 111.  
 Rigoris definitio. 156. 1. causa. 156. 11.  
 Rigor, & delirium a multo potu, malum. 332. superveniens quando solvit ardentem. 168. 11. in febre intermittente. 156. 111. in debilitatis. 156. 11.  
 Rigores sexto die cur mali. 139. 11. cur magis ex lumbis incipiunt. 262. 2. quotidie in febribus si fiant, hae quotidie solvantur. 173. 1. febriles a frigido. 210. 111.  
 Rigores mitigantur calidis. 215. v.  
 Ritus si adsit in delirio, securus: studium vero periculosius. 318.  
 Rucentes acidum non admodum pleuritici sunt. 298.  
 Ruetus acidus in hienteria diuturna, bonum signum. 266. 11.  
 Ruptiones quae ex dorso ad cubitum descendunt, quomodo solvantur venae sectione. 287. 1.

## S

Sanguis quando mittendus gravidis. 111. iv. in cavitatibus effusus an semper suppuratur. 285. 11.  
 Sanguinis collectio ad mammas an maniam praedicat. 233. 1. eruptiones a calidiorum frequentiore usu. 109. vii.  
 Eruptio a forti pulsu in ulceribus, malum. 346. eruptio quomodo alvum humectat. 137. 11. eruptiones a frigido pectori applicato. 217. 11.  
 Evacuatio sursum, vel deorsum quae bona, & quae mala. 335. 1. fluxus quando solvit febrem. 170. 11. in quibus mensibus deficientibus bonus. 226. 11.  
 Sanguinis fluxus adolescentibus. 106. 11. v. adult.

- adultis. 109. xii. si producit delirium, aut etiam convulsionem, malum. 334. fluxiones fiunt vere. 99. v. missio an sanis conveniat. 62. ii. missione sola an minuenda abundantia. 3. viii. sputum si producat puris sputum, malum. 340. vomitus sine febre, an salutare. 362. l. cum febre, malum. 362. ii. an adstringentibus, & refrigerantibus curandus. 362. iii. cur solvitur menstruis erumpentibus. 225. iii. copiosam egestionem passis an noceat lac. 277. vii. Sanguini multo effuso convulsio, aut singultus superveniens, malum. 196. l. Sanguinem spere quando dicitur. 206. i. cur ex pulmombus. 206. ii. sponte mingere quid significet. 188. l. an ex renibus. 188. ii. Sanguinem quibus de venis auferre conducit, bis vere venam secare oportet. 378. Sanas carnes habentibus cur hellebori usus periculosus. 126. ii. Sanis an conveniat alvi ductio. 62. ii. diureticum. 62. iv. sudoriferum, & diaphoreticum. 62. v. dieta rigidissima. 62. vi. venæ sectio. 62. ii. dieta tenuis. 4. v. Sanitas definitur. 3. ii. an egeat curatione. 3. iii. Satietas definitur. 29. ii. non bona in morbis. 29. iv. acutis. 29. v. chronicis. 29. vi. Satyriasthi pueris frequentes. 105. viii. Scotomos cacochyliz signum. 127. iv. Secretio speciale exigit organum. 21. iii. Secundæ an expellendæ sternutatorio. 242. i. Sedi convenit calidum. 315. xi. Sedimentum biliosum in urina superne tenui, in febribus acutum morbum significat. 357. i. Sedimentum urinæ farinosum longam infirmitatem significat in febribus. 376. i. Senectutis divitiæ. 65. i. Senex facilius fert jejuniū. 13. ii. Senes cur egent calefactantibus. 14. v. an rarius quam juvenes agrotent. 64. iii. Senum, & ætatis convenientia. 97. iii. naturalis mutatio, & morbi.
110. l. ætas. 64. l. morbi diuturni cur ad mortem durare solent. 64. iv. vitia in renibus, & vesica: diffculter sanantur. 271. Senibus cur gravedo, & rauco frequens. 65. iv. non concoquantur. 65. v. an non fiunt febres acutæ. 14. vi. Senioribus cur catarrhi. 91. viii. nimum purgatis si singultus superveniat, non bonum. 366. Sentire quid sit. 31. ii. Septi transversii vulnera. 283. v. Siccitas aeris quid faciat. 86. i. cur producit febres acutas. 86. ii. uteri sterilitatis causa. 255. iv. Signum ex cute, an æger cum vel sine sudore sit moriturus. 264. i. Singultus ab ileo, malum. 335. ii. ab hepatis inflammatione, malum. 342. & convulsionis convenientia. 304. i. & convulsio an a sola repletione, & evacuatione. 304. ii. aut convulsio sanguini multo effuso superveniens, malum. 196. l. purgationi immodicæ superveniens, malum. 197. l. & oculi rubri a vomitu, malum. 328. solvitur sternutationibus supervenientibus. 278. si superveniat senioribus nimum purgatis, non bonum. 366. supervenit Hepati inflammato. 251. iv. Siticulosis an non dandum lac. 257. v. Sitis minuitur in ardentibus tussis sicca. 164. iii. constans febris ardens symptoma. 164. i. nocturna unde. 220. 1. quando per somnum optime sedatur. 220. ii. quomodo a purgante. 129. i. Somnus in morbo. 26. iv. in acutis. 26. v. in chronicis. 26. vi. in delirio. 27. i. quid facere debeat in febribus. 177. l. laborem faciens. 26. i. juvenis. 26. ii. & quies compescunt vomitum. 125. iii. vigilia, utraque modum excedentia, morbus. 396. modum excedens. 28. ii. in acutis. 28. iii. in chronicis. 28. iv. an multo alimento egeat. 15. iii. Somno, & ardore multo detentus in acutis, desperatus. 415. iii. Somni effectus. 26. iii. Spasmi, & tetani differentia. 167. i. Sphacelus quid sit. 375. i. cerebri qualis

- dis post friduum sanari potest. 375.  
 11. producit offis abscellum. 402.  
 Spinali medulla frigidum noxium. 211. 11.  
 Spumosa ejectiones quæ dicantur, & unde oriuntur. 355. 1. an ex pituita a capite deflente. 355. 11.  
 Spumosa urina ex qua causa. 350. 1.  
 Spumosa urina cur renum affectiones significat. 359. 11. cur longam fore in valetudinem significat. 359. 111.  
 Sputum carbonibus injectum olens quid notat. 204. 11. olens cur tabidis lethale. 204. 11. longitudinem, & brevitate morbi indicans. 12. 11. quomodo curat empyema. 208. 111. retentum in tabidis mortem instare significat. 341. 11. multum in remittentibus, malum. 157. 11. puris a sanguinis puto, malum. 340. producit tabem, & fluxum. 341. 1.  
 Sputa qualia mala in remittentibus. 157. 11. bona in remittentibus. 157. 111.  
 Sterilitatis causa an est omentum os uteri premens. 230. 1. an nequit esse intemperies in masculis. 256. 1. uteri frigiditas. 255. 11. uteri humiditas. 255. 111. uteri ficcitas. 255. 11. uteri caliditas. 255. v.  
 Sternutationis causa. 376. 1.  
 Sternutatio fit ex capite, percalefacto cerebro, aut perhumectato, quod est in capite vacuo. 376. 11. in hysterica passione. 228. 11. in secundinis retentis, bonum. 128. 111. in partu difficili, bonum. 228. 11.  
 Sternutationes a singultu derento supervenientes, solvunt singultum. 278.  
 Sternutatorium an exhibendum ad expellendas secundas. 242. 1.  
 Stertor, & vocis defectus post capitis dolores derепente natos in sanis, ex qua causa. 316. 1. cur hi moriuntur intra septem dies, nisi febris apprehenderit. 316. 11.  
 Strangulatio qualis mortuus. 68. 1.  
 Strangulationis causa. 68. 11.  
 Strangulati, & resoluti non sunt mortui. 68. 111. se non recolligunt, quibus spuma circa os. 68. 11.  
 Stranguria autumnus. 101. 1111. senibus. 110. 11. quomodo producit vulum. 309. 1. supervenit intestino recto inflammato. 251. 1. utero inflammato. 251. 11.  
 Stranguria supervenit renibus suppurationis. 251. 111. & Dysuria solvitur vini potu. 373. 1.  
 Stranguriae in siccitatibus. 95. 11.  
 Stranguriae quid notet. 121. 11.  
 Strumæ pueris frequentes. 105. 11.  
 Studium si adfit in delirio, periculosius; risus vero, securus. 318.  
 Stupor aut delirium a plaga in caput, malum. 339.  
 Sudamina cur fiant æstate. 100. x.  
 Sudor unde in febribus. 166. 1. febricitanti superveniens, febre non deficiente, malum. 166. 11. talis significat longitudinem. 166. 111. multam humiditatem. 166. 11. frigidus in acuta febre prædicit mortem. 146. 11. in febre mitiore prædicit longitudinem. 146. v. multus cur in æstate veri simili. 85. 11. si relinquit horrorem, non bonum. 329. multus a somno quid indicat. 151. 1. ab uberiore potu. 151. 11. sine uberiore alimento an evacuatione egeat. 151. 111.  
 Sudor multus semper fluens, malum. 152. 1. & frigidus majorem morbum indicat. 152. 11. & calidus semper minorem morbum indicat. 152. 111. calidus aut frigidus, semper fluens, humidi redundantiam significat. 386. 1. an hac abundantia educenda. 386. 11. criticus quo tempore. 146. 11. partis detegit latentem morbum. 148. 1. longitudinem morbi præfigiens. 12. 11. die non critico præfigit laborem, longitudinem & recidivam. 146. 111. diebus criticis unde veniat. 407. 1.  
 Sudores in diebus criticis oborientes, vehementes & veloces, periculosi. 407. 11. ex fronte velut guttæ, & aquæ salientes, & frigidi valde ac multum, periculosi. 407. 111. frigidi quinam dicantur. 146. 11. causa. 146. 111.  
 Sudoriferum an conducit sanis. 61. v. an exhibendum tempore critico. 146. 11.  
 Suffitus aromatum muliebris ducit. 221. 1. alia sapius esse utilis, nisi capitis gravitates induceret. 221. 11. an

an offendere valeat, dum mulier sit  
fecunda vel sterilis. 252. 1.  
Suffocationis ex improvifo causa. 144. L.  
Sumen. 60. 11. quæ viscera recondit.  
60. 111. melius est crassitudinem ha-  
bere, quam eliquari. 60. 5.  
Superiores partes quæ dicantur. 128. 111.  
Suppuratio quid sit. 285. L. ex ulcerum  
detumescencia. 258. vi. a dolore diu-  
turno partium circa ventrem, malum.  
347. septimo die ex angina 203. 111.  
interna occultatur crassitudine loci vel  
puris. 306. L. aut putredo ab Erys-  
pelate, malum. 345.  
Suppuratis renibus stranguria superve-  
nit. 251. 111. scelis vel ustis, ex pu-  
re peti potest præsignum. 369. 11. si  
pus acervatim effluat, cur mortem  
infert. 292. L.  
Suppuratus coxæ incumbens uterus.  
240. 11. quid producat. 240. 111.  
curatio. 240. 1v.  
Surditas ex minuta alvi egestionem bilio-  
sa, malum. 138. 1v. quamnam tollitur  
alvi fluxu bilioso. 138. 11.  
Surditatis in febribus causa. 170. L.  
Symptoma vehemens & mite quid dif-  
ferat. 9. vi.  
Syncope quid sit. 66. 1. cur minus pe-  
riculosa, quam apoplexia. 67. 11. præ-  
hensus cur improvifo moritur. 66. 11.

T

**T**Abes, vid. *Phthisis*. quid. 98. 11.  
purulenta. 89. 111. catarrhosa.  
89. 1v. colliquativa. 89. v. cruris &  
claudicatio in coxæ luxatione, quo-  
modo. 325. L. & fluxus a puris spu-  
to. 341. L. juvenibus. 108. 111. in  
siccitatibus. 95. viii.  
Tabidis convenit lac. 257. viii.  
Temperamenta uteri. 255. L.  
Tempestatis mutatio quid producit. 90. v.  
Tempestates siccæ vel humidæ, quæ  
præstantiores. 94. L.  
Tempestas alimentorum assumptionem  
determinat. 17. 1v.  
Tempora ætatis magis minusve con-  
venientia. 82. 1v. anni præsignia  
morbi longitudinem. 12. vi. anni

constantia & inconstantia. 87. 1.  
Temporis divisio. 82. 1. mutatio ma-  
xime parit morbos. 80. 11. consti-  
tutio morbos indicatu faciles produ-  
cit. 87. 1v. difficiles facit. 87. v.  
Tempus quid faciat ad cognitionem  
evacuationis. 2. 1x.  
Tenebrosa vertigo in acutis. 415. 1.  
Tenesmus mulieri in utero gerenti su-  
perveniens, abortire facit. 352.  
Tenuis præter naturam quæ dicantur.  
237. L. cur hæ abortiunt, priusquam  
crassescunt. 237. 11.  
Tenuium intestinorum si aliquid disse-  
ctum fuerit, non coalescit. 289.  
Tertiana exquisita quamnam dicatur. 169.  
1. septem paroxysmis solvitur. 169. 11.  
Tertianæ febres cur fiunt æstate. 100. 11.  
intermittentes periculo vacant. 153. 1v.  
Testis dexter frigidus & convulsus,  
lethale. 411.  
Tetanus qualis morbus. 199. 1.  
Tetano, correpti in quatuor diebus pe-  
reunt. 199. 11. quartum diem effu-  
gientes, servantur. 199. 111.  
Tetanus aut convulsio ab ardoribus ve-  
hementibus, malum. 338. ex impetu  
& calore majore. 214. 11. & convul-  
sio ex ulcerum detumescencia. 258. 1v.  
Tetani & spasmi differentia. 167. 1.  
Tonillæ pueris frequentes. 105. 11.  
Translatio Erysipelatis ad interna, non  
bonum. 190. 11. ad externa, bonum.  
290. 111. pleuritidis in peripneumo-  
niam triplex. 336. 1.  
Transversi septi vulnera. 283. v.  
Tremores in ardentibus unde. 291. 11.  
quomodo solvantur delirio. 291. 11.  
Tristitia & metus si multo tempore per-  
severant, melancholicum id ipsum. 288.  
Tuberculis alvi excrementa biliosa. 40. 1v.  
Tuberculis urina biliosa. 40. v.  
Tubercula fiunt vere. 99. xiii. ad artî-  
culos vel dolores ex febribus longis,  
iis qui utuntur cibo copiosiore. 155.  
1. quibus diutina, aut ad articulos  
dolores ex febribus fiunt, hi cibis  
utuntur copiosioribus. 389.  
Tuberculum quibus fit in fistula urinæ,  
his suppurato eo & perempto,  
solutio fit. 382.

Tuber-



**Tubercula** quænam pueris frequentia . 166. x.  
**Tumor** ex qua causa intus rumpitur . 333. l. & rubor ab angina detento . in pectore superveniens, bonum . 374.  
**Tumore** intus rupto, exsolutio, vomitus, & animi deliquium . 333. ii.  
**Tumores** quibus apparent in ulceribus, non valde convelluntur, aut infaniunt . 258. ii. si fuerit rubicundi circa ulcera, ex ulcerum detumescencia dysenteriam pariunt . 258. vii. nulli in magnis & parvis vulneribus & contusionibus, ingens malum . 259. i. circa ulcera derepente disparentes quos morbos pariunt . 258. iii. & dolores articulorum sine ulcere, magna ex parte affusio multa frigida levat . 218. molles boni, duri vero mali . 260. i.  
**Tumorem** fieri in collo, in angina bonum . 307. ii.  
**Turgentia** evacuari & movere . 22. ix.  
**Turgescencia** quando dicatur . 120. ii.  
**Tussis** ab aquilone . 84. iv. post autumnum pluviosum . 92. v. a frigido pectori applicato . 217. ii. fiunt hyeme . 101. iv. si habeat hydropicum, desperatus est . 372. hydropicis superveniens, malum . 309. puerorum morbus . 103. vi.  
**Tusses** & rauedines fiunt vere . 99. viii. sicæ paululum irritantes in ardentibus unde fiant . 164. l. in ardentibus minuunt sitim . 164. iii.  
**Tympanitis** quomodo generari possit . 121. iii. cur post ventris tormina . 121. iv.  
**Tympanitidem** præsignificia signa . 121. l.

## V

**V****Arices** magni an non fiunt calvis . 299. l. supervenientes an calvos faciunt capillatos . 299. ii. aut hæmorrhoides quamnam speciem infantiæ solvunt . 286. i.  
**Vena** frontis secta an curet capitis dolorem . 261. l. portarum cur præcipue colligat melancholiam . 119. iii.  
**Vena** sectio quibus conducit vere . 312. ii. an conducatur podagricis . 312. ii.  
 quomodo solvit ruptiones, quæ ex dorso ad cubitum descendunt . 287. l. qualem oculorum dolorem curat . 296. v. solvit difficultatem urinæ : secunda vero internæ . 301.  
**Venam** secato in doloribus oculorum, postquam merum bibendum dederis, & multa calida laveris . 371.  
**Ventricoli** vulnera . 283. vii. oris morbus signum cacochylia . 127. iii.  
**Ventris** significatio . 15. ii. æstus & cardilogmus in febribus, malum . 175. iv. ardor in febribus unde oriatur . 175. i. dolores elevati quare mitiores, non elevati, vehementiores . 272. ii. hydrops ex hepatis hydropre, lethale . 380. i. inflatio in morituris . 417. i. tormen a cacochylia . 130. i. tormina quomodo generant tympaniam . 121. iv. vulneris si omentum prolapsum sit, cur citius putrescit . 323. i.  
**Ventres** an hyeme & verè copiosius calidum ianacum habent . 15. iv. an calidissimi hyeme . 15. ii.  
**Ventus** quid sit . 84. l.  
**Ventorum** observationes an omnibus regionibus quadrent . 84. ii.  
**Ver** facilius fort alimenta . 18. v. saluberrimum & minime exitiale . 84. vi. quales morbos producat . 99. ii. ficum & aquilonium quid faciat post hyemem australem pluviosam . 99. iii. cur faciat abortum frequentior . 91. iv. pluviosum & australe quid faciat . 90. iii.  
**Vere** & autumno ut plurimum moventur dolores podagrici . 320. quibus conducit venam secare . 312. ii. alvum ducere . 312. iii.  
**Veris** & puerorum convenientia . 97. ii.  
**Veratrum**, Vid. *Helleborus*.  
**Vermes** sæpe in pueris . 105. vi.  
**Vernales** nonnulli morbi cur etiam fiant æstate . 100. i.  
**Verrucæ** pueris frequentes . 105. viii.  
**Vertebrarum** luxationes pueris frequentes . 105. iii.  
**Vertigo** sit hyeme . 101. vii. tenebrosa cacochylia signum . 127. iv. in acutis . 415. l.  
**Vertigines** senibus . 110. vii. faciunt austrinæ

- Urinx constitutiones. 96. xi.  
 Vesica perfecta. 283. ii.  
 Vesicæ & renum vitia in senibus diffi-  
 culter sanantur. 271. calculus an co-  
 gnoscatur ex sedimento arenoso. 189.  
 ii. adjacentium partium laborantium  
 signa. 190. i. exulcerationis signa.  
 191. i. scabies ex urina furfuracea co-  
 gnoscenda. 187. i.  
 Vetus ætatibus magis, minusve conve-  
 niens. 82. v. conf. *Dieta*.  
 Vigilia puerorum morbus. 103. vi. mo-  
 dum excedens in acutis. 28. v. in  
 chronicis. 28. vi. somnus, utraque  
 modum excedentia, morbus. 306. si  
 producit convulsionem aut delirium,  
 malum. 343.  
 Vigor cur omnia validiora habeat. 55.  
 iii. febris quietem indicat. 54. iii.  
 Vini potio an solvit famem. 46. i. potus  
 solvit stranguriam & dysuriam. 373. i.  
 Vino aqua diluta solvit anxietas. 381.  
 i. solvitur ofuscitatio. 381. ii. solvit-  
 ur horror. 381. iii.  
 Viris an cutis rarior, quam mulieribus.  
 262. ii.  
 Viscerum dolores fortes, & convulsio-  
 nes in acutis, malum. 176. ii.  
 Visciditatis dentium causa. 163. i.  
 Visciditas dentium cur signum febris  
 vehementioris. 163. iii.  
 Visus caligo ab austro. 84. iii. extinctio  
 in remittentibus mortem præfagit.  
 159. iv. hebetudo in senibus. 110. xii.  
 Vita brevis. 1. ii.  
 Vitæ generi an affuescendum. 75. iii.  
 Vitilignes sunt vere. 99. xi.  
 Ulcera circum glabra maligna. 269. i.  
 vetusta. 310. i. an semper os absc-  
 dere faciunt. 310. ii. cur relinquunt  
 cicatrices cavas. 310. iii. hydropicis  
 in corpore orta, non facile sanantur.  
 273. ii.  
 Ulcerebus frigidum mordax. 213. ii.  
 Ulcerebus fortis pulsus si producit sangui-  
 nis eruptionem, malum. 346.  
 Ulcerum detumescencia parit convulsio-  
 nem & tetanum. 258. iv. parit in-  
 faniam, aut lateris dolores acutos.  
 258. v. parit suppurationem. 258. vi.  
 parit dysenteriam, si rubicundi fac-  
 rint tumores. 258. vii.  
 Umbilicalis regio. 60. ii. regio quæ  
 viscera recondit. 60. iii.  
 Umbilici inflammationes puerorum mor-  
 bus. 103. ix.  
 Ungues nigri quando lethale signum.  
 412. i.  
 Vocis defectus & stertor post capitis  
 dolores derepente natus in sanis, ex  
 qua causa. 316. i.  
 Volvuli autumnus. 101. xiii.  
 Volvulus quomodo ex stranguria. 309.  
 i. quibus ex stranguria supervenit,  
 cur septem diebus pereunt. 309. ii.  
 quomodo hi liberantur, si febris super-  
 venit, & urina abunde fluit. 309. iii.  
 Vomitoria frequentiori usu verberis.  
 116. i. in gracilibus & facile vomen-  
 tibus danda. 116. ii. hyeme magis  
 vitanda. 116. iii.  
 Vomitorii generales effectus. 118. ii.  
 exhibitio qualis in non facile vomen-  
 tibus. 123. ii.  
 Vomitorio exhibitio quid dein facien-  
 dum. 124. i.  
 Vomitorium quale præparationem ex-  
 igit. 123. iv. dandum in cacochy-  
 lia. 127. i. in præhumeßato corpo-  
 re. 123. vii. nocet in leenteria. 122.  
 ii. maxime hyeme. 122. iii. nocet  
 phthisi confirmatæ. 118. iii. & in-  
 stanti. 118. iv. an dandum in dolori-  
 bus supra diaphragma. 128. v.  
 Vomitus cur fiat æstate. 100. iv. an  
 concitandus æstate. 114. ii.  
 Vomitus præparatio. 395. i. quando per-  
 mittendus. 2. xiii. puerorum mor-  
 bus. 103. v. cur ex navigatione. 124.  
 iii. promovetur motu. 125. ii. com-  
 pescitur somno & quiete. 125.  
 iii. exolutio & animi deliquium a  
 tumore intus rupto. 333. ii. aut al-  
 vi profluvium sponte supervenientia  
 a diuturno alvi profluvio detento,  
 solvit morbum. 220. si relinquat sin-  
 gultum & oculos rubros, malum.  
 328. ab ileo, malum. 335. i. atra-  
 bilis, lethale. 132. iii. bilis & fe-  
 bris ex cerebri læsione. 315. i. cruen-  
 tus quid noceat. 225. ii. malus.  
 135. ii. sanguinis sine febre, an sa-  
 luta-



lutare. 362. r. cum febre, malum. 362. ii. an adstringentibus & refrigerantibus curandus. 362. iii. cruentus cur solvitur mentitris erumpentibus. 225. iii.

Urethræ tuberculum quid faciat. 192. i.

Urina copiosa & tenuis, in febre cacochymica, bona. 179. iii. cur præcipue si talis redditur iis, quibus ab initio, vel non multo post sedimentum inest. 179. iv. conturbata, qualis jumentorum, quæ dicatur. 180. i. jumentosa quomodo generatur. 180. ii. in febribus. 180. iii. his capitis dolores adsunt, vel aderunt. 180. iv. pellucida quæ dicatur. 182. i. & alba mala. 182. ii. cur maxime phreniticis. 182. iii. crassa pilos continens quid notat. 186. ii. furfuracea cur vesicæ scabiem indicat. 187. i. crassa, pauca, grumosa, quid notat in febre cacochymica. 179. ii. spumosa ex qua causa. 359. i. cur renum affectiones significat. 359. ii. cur longam fore invaletudinem significat. 359. iii.

Urina multa solvit hydropem omenti.

379. i. biliosa in tuberculis. 40. iv. in faucium morbis. 40. iii. inæqualis in febribus vehementem turbationem significat. 358. i. an sit sanis similis vel dissimilis, videndum. 391. ii. sanis dissimilis morbofa, sanis vero similis minime morbofa. 391. iii. unde pus continet. 184. ii. cui pingue confertum supernat, & dolores circa musculos spinales, superveniens Nephriticis, abscessum præfagit. 361. i. si abunde fluxerit, & febris si supervenerit volvulo ex stranguria, quomodo liberat. 309. iii. superne tenuis cum bilioso sedimento in febribus acutum morbum significat. 357. i. qualis liberat ab articularum abscessu. 184. i. longitudinem & breviter morbi præfagiens. 12. x. no-

tu multa quid significet. 193. ii.

Urinæ inspectio necessaria. 391. i. arenulæ unde veniant. 189. i. sedimentum arenosum an notet vesicæ calculum. 189. ii.

Urinæ difficultatem vena sectio solvit: secandæ vero internæ. 301. copia præfagit dolore lumborum. 183. iii. caruncula quid notat. 186. i. nubes quid sit. 181. i. rubra quid significat. 181. ii. quarto die apparsit cur notat crism septimo die futuram. 181. iii. sedimentum farinosum longam infirmitatem significat in febribus. 356. i. inspectio necessaria. ibid.

Uterus coxæ incumbens suppuratus. 240. ii. quid producat. 240. iii. curatio. 240. iv.

Uteri caliditas sterilitatis causa. 255. v. cotyledones muco plenæ an abortum faciant. 238. i. erysipelas an distinguatur ab inflammatione. 236. i. cur prægnanti, lethale. 236. ii. cum mamma consensu. 230. i. os durum cur clausum. 247. i. clausum an graviditatis signum. 244. i.

Uteri temperamenta. 255. i. frigiditas sterilitatis causa. 255. ii. humiditas sterilitatis causa. 255. iii. siccitas sterilitatis causa. 255. iv. caliditas sterilitatis causa. 255. v.

Utero inflammato supervenit stranguria. 251. ii. convenit calidum. 215. xi. Vulnere extenuationem inducentia. 133. v. magna & prava, atque contusiones si nullo tumore habeant, ingens malum. 259. i. quæ dicantur lethalia. 283. i. cerebri. 283. iii. cordis. 283. iv. septi transversi. 283. v. intestinorum. 283. vi. ventriculi. 283. vii. hepatis. 283. viii.

Vulnere superveniens convulsio, lethale. 195. i.

Vulnerebus ventris si omentum prolapsum sit, cur citius putrefcit. 323. i.











Calligraphy of a signature or name, possibly "Calligraphy of a signature or name", written in dark ink on a textured, aged, light brown background.